四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四四冊目次

證治準繩六種四十四卷（六）（明）王肯堂撰 明萬曆三十年至三十六年刻本 〇〇一

證治準繩六種四十四卷（六）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

金壇王肯堂宇泰甫輯

肺

【錢】肺主喘　實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者　虛則哽氣長出氣　肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急　肺熱手掐眉目鼻面甘桔湯主之　肺盛復有風冷胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胸滿　肺虛熱唇深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散　肺臟怯唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治肺虛損故也　脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇白而澤者吉白如枯骨者死（此皆診肺之法也唇白色者肺臟怯也阿膠散主之若手尋衣領及亂捻物者肝熱也宜瀉青丸手掐眉目鼻面者肺熱也宜甘桔湯之類是也）　肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搐（海藏云無肝怯故目淡青也）

【潔】肺主燥自病則喘嗽燥則潤之　實則喘而氣盛瀉白散主之　虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之　心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之　肝乘肺微邪惡風眩冒昏憒嗽羌活膏主之　腎乘肺實邪增寒嗽清利百部丸主之　脾乘肺虛邪體重吐痰泄瀉嗽人參白朮散主之

【劉】凡肺之得病必先觀心脾二臟之虛實若心火爍金即當先抑心氣後吃肺藥若心氣和即便看脾脉若脾氣虛冷即不能相生而肺家生氣不足則風邪易感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則痞隔中焦而大腸與肺表裏不能相通夫中焦熱隔則肺與大腸不通其熱毒之氣必上蒸於肺而生痰故患肺熱者多脾實得之心氣盛者瀉之脾氣虛者益之脾氣實者通之然後隨其肺之寒熱以治之故有抑心氣益脾氣通肺氣三藥若診其脉氣心脾兩臟俱和而肺自生疾則但察肺家虛實而治之

【薛】肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲心火炎爍用人參平肺散中焦實痞用大承氣湯脾不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脉右寸必浮而有力宜用瀉白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱還傷肺之說而不用人參則誤矣仍參其證治之

【海】肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮（一作黃芩）

肺欲收急食酸以收之白芍藥　以酸補之五味子
以辛瀉之桑白皮　肺虛以五味子補之如無他
證錢氏補肺阿膠散主之虛則補其母脾乃肺之母
以甘草補脾

阿膠散錢氏　又名補肺散

阿膠壹兩半麩炒　黍粘子炒香　甘草炙各二錢半
馬兜鈴半兩焙　杏仁七個去皮尖炒　糯米壹兩炒

右為末每服一二錢水一盞煎至六分食後溫服
〔海藏〕杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也
當以意消息之　〔醫鑑〕前方乃通治肺金之劑經云
虛則補其母若前藥未應當用五味異功散以補
脾

〔正傳〕肺實以桑白皮瀉之如無他證以瀉白散主之〔實〕
則瀉其子腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

瀉白散錢氏　又名瀉肺散

桑白皮細剉炒黃　地骨皮洗去土焙各壹兩　甘草炒半兩

右件為末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同
煎至六分食後溫服

〔海藏〕治肺熱骨蒸自汗宜用此直瀉之用山梔黃芩
方能瀉肺但當以氣血分之

甘桔湯方見咽喉　大青膏
羌活膏俱見驚搐　百部丸方見咳嗽
人參白术散方見痘渴　四君子湯方見雜病虛勞
參蘇飲見雜病發熱　人參平肺散見雜病咳嗽

咳嗽

內經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣聽從其合也五臟之欬久乃移於六腑又病機式要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也欬嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於脾濕故咳而兼嗽也又生氣通天論云秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣上衝而為咳嗽甚則動於脾濕而為痰也蓋風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒冷小兒多有之火乘肺者多嗽上壅喘唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥痒大便秘澀涕唾稠粘寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐卧濕地或受冷風寒秋之氣或因外感夏是火氣炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來也宜各隨其證而治之

錢氏法　夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大王病嗽者必實非久病也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶丸下之若久者不可下也十一月十二月嗽者

乃傷風嗽也風從背脊第三椎肺俞穴入也當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治之若五七日間其證身熱痰盛唾粘者以褊銀圓下之　有肺盛者欬而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之　若傷風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶藶圓下之後用化痰藥　有肺虛者欬而哽氣時時長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先實脾後以褊銀圓微下之涎退即補肺補肺如上法　有嗽而吐水或青綠水者以百祥圓下之　有嗽而吐痰涎乳食者以白餅子下之　有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯　久嗽者肺亡津液阿膠散補之　欬而痰實不甚喘而面赤時飲水者可褊銀圓下之　治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意增損　杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒蓄入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃輩發散後用涼藥壓之即愈時醫與珠粉丸半夏丸褊銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈召錢視之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時時長出氣錢曰病困十已八九然所

面青而光者肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月肺即虛痿又數下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促短氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治之何者肝太旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉肝而肝病症不退三補肺而肺病尤虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死　京東轉運使李公有

孫八歲病嗽而胷滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘錢氏曰此肺氣不足復有寒邪即使喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈　東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝生牛黃治之一月不愈其證嗽喘悶亂飲水不止全不能食錢氏用使君子丸益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈十分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

潔古法　肺之生病而成嗽大抵秋冬則實春夏則虛更詳五臟兼見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎盛涕唾稠粘咽乾不利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是肺痿也用清肺散治之若虛則面白脫色氣少不語喉中

有聲唾痰清利法當阿膠散補之若亡津液用白术散主之　嗽而兩脇痛者屬肝經用小柴胡湯[illegible]咳而嘔苦水者屬膽經用黃芩半夏生薑湯咳而喉中如梗者屬心經用甘桔湯咳而失氣者屬小腸用芍藥甘草湯咳而右脇痛者屬脾經用升麻湯咳而嘔長蟲者屬胃經用烏梅丸咳而喘息吐血者屬肺經用麻黃湯咳而遺屎者屬大腸用赤石脂湯咳而腰背痛甚則咳涎者屬腎經用麻黃附子細辛湯咳而遺尿者屬膀胱用茯苓甘草湯咳而腹滿不欲食面腫氣逆者屬三焦用異功散吐瀉

曾氏法　咳嗽者固有數類但分冷熱虛實隨證
解治中時未有不因感冒而傷於肺内經曰肺之令
人咳何也岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣
邪氣得從其合故難經云形寒飲冷則傷肺使氣上
而不下逆而不收衝壅咽膈淫淫如痒習習如梗是
令嗽也乍暖脱着暴熱遇風邪氣侵於皮膚肺先受
之而爲咳嗽若初得時面赤唇紅氣麄發熱嗽來痰
鳴此是傷風痰作嗽用清肺飲五拗湯及小柴胡
湯羌活散(方見傷風)皆可解表次青木香湯(方見前)　有小兒牙
出未乾遽翦顖水亦致傷風咳嗽外證眼胞微浮額

汗痰鳴亦宜清肺飲瀉肺湯與之疎風化痰解利邪
熱小柴胡湯亦可　若嗽日久津液枯耗肺經虛矣
肺爲諸臟華蓋卧開而坐合所以卧則氣促坐則稍
寬乃因攻肺下痰之過名爲虛嗽當補不斷喉中痰
鳴氣息欲絶嗽罷則吐白沫或乾嘔此肺虛而氣不
順也面唇皆白而慘軟過額上多汗哽氣長出乳食
減少致脾虛而胃亦虛宜其有吐投茯苓厚朴湯(方見吐)
及藿香飲(方見不乳)次溫脾潤肺理中湯(方見吐)加杏仁北五
味子水煎服盖此藥補脾而益肺藉土氣以生金則
自愈矣或嗽而頰紅有光澤色於理中湯内再加䗪

薑爲用亦良法也　有脾虛亦能作嗽當投補劑用
醒脾散(方見慢驚)茯苓厚朴湯(方見吐)令脾氣實然後間以清肺
飲前服疎解肺經風寒及藿香飲助脾養胃亦投子
益母之法也　有一證咳嗽至極時頓嘔吐乳食與
痰俱出盡方少定此名風痰壅盛肝木克脾土宜以
白附飲(方見吐)投之即効
薛氏法　若咳嗽流涕外邪傷肺也先用參蘇飲
嗽面赤心火刑肺也用人參平肺散及六味地黄丸
若嗽而吐青綠水肝木乘脾也用異功散加柴胡桔
梗嗽而吐痰乳脾肺氣傷也用六君子加桔梗若嗽

唾膿痰者熱蘊於肺而成肺癰也用桔梗湯(方見肺癰)
風邪外傷法當表散而實腠理其用下藥非邪傳於
内及胃有實熱者不宜輕用而色白脉短濇者肺之
本證也易治面色赤脉洪數者火刑金也難治
麻黄湯　治太陽證頭疼發熱身痛惡風無汗
喘滿脉浮緊八九日不解當發汗汗已煩悶瞑目
者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也
甘草(半兩)　麻黄(去節一兩半)　桂枝(一兩)
杏仁(去皮三十五箇)
右每服三錢水煎

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風頭疼目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃不去節 杏仁不去皮尖 甘草生用

右各等分剉散每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服取汗爲度一方加荊芥桔梗嗽甚加五味子細辛各減半又方麻黃去節杏仁去皮尖甘草炙名三和湯治喘嗽尤妙加減在乎活法有熱加前胡傷風加荊芥有痰加半夏

加減三拗湯

麻黃去根節三錢水煮去沫焙乾 桂枝二錢

杏仁去皮尖炒另研如膏 甘草炙一錢

右爲麤末入杏膏拌勻每服一錢水六分煎至四分去滓溫服無時以汗出爲度量大小加減若自汗者不宜服之

五拗湯 治感風濕及形寒飲冷痰嗽咳逆連聲不已

麻黃不去根節 杏仁不去皮尖 荊芥不去梗

桔梗蜜水拌炒各四錢 甘草二錢半

右每服二錢水一盞煎七分無時溫服

熱元 治小兒肺寒壅嗽微喘有痰

百部炒 麻黃去節各三兩 杏仁肆拾枚去皮尖微炒研入

右爲末煮熟棗子丸如皂子大溫水下二三丸無時日三四服此本方也仲景加松子仁五十箇蜜丸更加胡桃肉含化大妙一方加甘草二錢

九寶飲 治小兒嗽是肺臟感寒須表散却服嗽藥

麻黃去節 薄荷 大腹皮

紫蘇各半兩 陳皮 杏仁去皮尖

桑白皮炙 肉桂 枳殼各二錢半

甘草一錢半

右剉散每服二錢生薑烏梅煎服令證去薄荷蘇

證去陳皮桂

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩悶項背拘急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃去節 紫蘇子隔紙炒 桑白皮蜜炙

杏仁炒去皮尖 赤茯苓去皮 陳橘皮去白各半兩

甘草炙二錢

右剉散每服二錢水半盞煎至三分去滓量大小加減食後溫服

金沸草散 治傷風化痰頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼胸膈滿痰涎不利咳嗽喘滿涕唾

搐掣及治時行寒疫壯熱惡風

荊芥（穗）　前胡（去蘆）　麻黃（去節）

旋覆花（各三[illegible]）　甘草（炙）　半夏（湯洗七次[illegible]）

赤芍藥（各一兩）

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚同煎六分去滓溫服不拘時有寒邪則汗出嗽甚加杏仁五味子

參蘇散　治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及瘡疹遍身赤[illegible]瘡疹子餘毒未盡

浮身浮腫痰涎咳嗽或發[illegible]候搐風手足搐搦眼目上視及傷風頭疼並治之

滑石　地骨皮　赤芍藥

石膏　白茯苓　杏仁

知母　甘草　羌活（[illegible]）

人參（各半兩）　麻黃（去節）

右為末每服一錢麥門冬煎湯調下如[illegible]小牙兒感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一字用麥子煎湯調下一方去地骨皮滑石加羌活川芎荊芥煎湯調下

小青龍湯　治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利小便不利或少腹滿喘

麻黃（去節[illegible]）

赤芍藥　半夏（湯洗[illegible]）

細辛　乾薑　肉桂（去皮）

甘草（各[illegible]）　五味子

右剉散每服二錢水一盞煎七分去滓加減服

清肺飲　治肺受風邪客[illegible]咳嗽不斷氣促喘悶痰壅鼻塞流涕失音及解時行瘡疹[illegible]多咳嗽咽痛煩渴

柴胡（淨洗）　人參（去蘆）　杏仁（湯泡去皮尖）

桔梗（炒）　赤芍藥　荊芥

枳殼（去瓤炒）　桑白皮（炒）　北五味子

麻黃（去節）　半夏（湯泡[illegible]）

旋覆花　甘草

右剉散每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服或入薄荷同煎

解表散　主傷風感冷咳嗽痰盛嘔吐瀉利驚悸不熱[illegible]在表裏[illegible]

麻黄同上　杏仁去皮尖　赤茯苓去皮各一兩
川芎　防風去蘆　枳殼麩炒各一兩半
甘草炙
右剉每二錢水一盞薑二片葱白一莖煎七分温服無時有熱入薄荷同煎

和解湯　治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁鼻塞多涕驚悸自汗肢體疼痛及瘡疹已發未發皆可服
羌活　防風　人參
川芎各一兩　乾葛　升麻
甘草　芍藥各半兩
右剉散每服三錢薑棗煎服加荊芥無汗加麻黄

咳嗽者加杏仁五味子桔梗

錢氏葶藶丸　治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身熱喘促
甜葶藶隔紙炒　黑牽牛炒
杏仁去皮尖炒另研如膏　漢防己各一兩
右為末研入杏仁泥取蒸陳棗肉和搗為劑丸如麻子大每服五丸至七丸淡生薑湯下乳食後
或臨夜服量兒大小加減

人參荊芥散　治身熱痰嗽胸膈不利宜下痰去熱
人參半兩　荊芥穗一兩　大黄一分
右為細末水煎調檳榔末木香細末五分服粉一字
乳食服如身熱劑熱宜服清涼飲子入大黄三服
亡病二日却入大黄服之令泄利則愈不可便

褊銀丸　治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘急
巴豆去油膜皮心研半兩　水銀鉛一分　黑鉛二分半水銀結砂子
麝香研半分　好墨八錢燒醋淬研細
右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸如綠豆大捻褊一歲兒一丸二三歲二三丸五歲已上五六丸煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實加減並食後服虛人先以益黄散補後以此方下之下後補脾

瀉肺湯　主傷風後五心煩熱咳嗽喘促唇紅頰赤煩渴引飲
桑白皮剉炒　地骨皮淨洗焙乾各一兩　甘草炙三錢
右㕮咀每服二錢水一盞粳米百粒煎七分食後臨卧溫服或不拘時

加減天門冬散　治小兒心胸煩悶痰熱咳嗽

天門冬去心焙 桑根白皮 赤茯苓
柴胡去苗 百合 紫菀洗去蘆土
蘇葉 甘草炙微赤剉已上各半兩
右件搗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少
許煎至五分去滓量兒大小以意分減溫服

百部散 治小兒欬嗽煩熱乳母服
百部 貝母煨微黃 紫菀洗
葛根一兩各 石膏二兩
右件搗羅為散每服二錢以水一小盞入竹葉二三
七片同煎至六分去滓乳母於食後服令兒飲乳甚佳
吸嗽 見幼科九 十七

黃芩散 治小兒欬嗽
黃芩不拘多少用童子小便浸一日取出曬乾焙乾
右為細末每服一字或半錢白湯少許調下乳食
後服

柴胡石膏湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭疼體疼鼻
塞心胸煩滿寒熱往來咳嗽涕唾稠粘
桑白皮 黃芩各二兩半 升麻一兩
石膏 前胡 赤芍藥
乾葛 柴胡各五兩 荊芥穗三兩
右為末每服二三錢水一盞生薑二片淡豉十粒水煎

嗽後養肺湯 調養脾胃
紫菀洗去土焙乾 半夏湯洗七遍 款冬花
真阿膠炙 人參去蘆 桂心各半兩
右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑二
片糯米五粒煎至五分去滓放溫時時服

菖蒲湯 治肺中風邪喘鳴肩息
石菖蒲節密者 款冬花 紫菀去土洗焙乾
人參去蘆 桂心各一兩
右件搗羅為細末煉蜜同石臼中搗一二百下和丸
如皂子大每服一粒煎糯米飲化下
吸嗽 見幼科九 十八

木香半夏丹 治胃寒咳嗽
木香 半夏湯洗七次焙乾 肉豆蔻各一兩
藿香葉 丁香 白朮各半兩
右件搗羅為細末取生薑自然汁和如黍米大每
服拾粒煎人參湯下量兒大小加減

順肺湯 治心肺不利咳嗽
紫蘇葉 半夏湯洗七遍各一兩 五味子
款冬花 陳橘皮湯浸去白 桂心
木香各半兩
右件搗羅為細末每服一錢水八分入生薑少

各少許煎肆分去滓溫服

溫肺惠陳橘皮散　治小兒咳嗽胸中滿悶不欲
乳食

陳橘皮（湯浸去白焙）　桔梗（去蘆）　雞蘇
杏仁（湯浸去皮尖麩炒）　人參（去蘆各）　貝母（煨微黃）

右件搗羅為粗散每服一錢以水一小盞入燈心
十莖煎至五分去滓溫服日三四服量兒大小以
意加減

麥門冬煎　治小兒咳嗽壯熱胸膈壅滿

麥門冬（去心一兩）　生薑（汁半兩取）　酥
蜜（各一兩）　杏仁（湯浸去皮尖）

右件藥先以水一大盞煎麥門冬及杏仁至四分
入砂盆內研絞取汁却入銀器中次內生薑汁以
慢火熬成膏收於瓷器中每服以清粥飲調下半
茶匙日三服夜一服量兒大小以意加減

[illegible]先生栝蔞膏

栝蔞穰　蜜（各半斤）　人參
蛤蚧（酥炙各半兩）　陳槐花（一分）　栝蔞子（一百二十枚）

右將栝蔞穰及蜜熬成膏入諸藥末同為膏每服
一大黃豆大用人參煎湯調服

注唇膏　治小兒諸般咳嗽

蟾酥　白殭蠶（直者）
鉛白霜　腦子（一字）

右件為細末煉蜜為膏用綠豆大注孩兒唇上二
三歲以下十歲已上皂子大薄荷生薑湯化下

蜜瓜膏　治小兒嗽

栝蔞（取穰）

右為末每服一錢蜜調成膏時時抹兒口內

生犀散　治咳嗽解肌餘熱延喘滿心忪仲驚悸風
熱

杏仁（去皮尖炒）　桔梗　茯苓

甘草　人參　半夏（湯洗）
五味子　前胡（各一兩半）

右剉散生薑薄荷煎服有熱加羌活或加麻黃細
辛

保肺湯　治肺胃受風熱痰嗽欬嗽喘吐不止及治
久嗽不愈

山藥　白茯苓　紫蘇葉
黃芩　防風　杏仁（去皮尖麩炒）
五味子　桔梗　百部（六分）

藿香　百合各分　白殭蠶各二分炒

右水煎食後服

天麻防風丸　治驚風咳嗽身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憒痰涎不利及風邪温熱

天麻　防風　人參

辰砂　雄黃　麝香

甘草炙各一　全蝎炒　殭蠶各半兩炒

牛黃　一方有牛膽南星無麝香

右為末煉蜜丸桐子大每服一二丸薄荷湯下

下氣

紫蘇子散　治小兒咳逆上氣因乳哺無度内挾風冷傷於肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下

紫蘇子　訶子去核　杏仁去皮尖

蘿蔔子炒　木香　人參各三錢

青皮　甘草炒各一錢

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至五分去滓不拘時服量兒加減

肘後療小兒咳嗽方

紫菀六分　貝母二分　款冬花一分

右擣為散每服如小豆大以乳汁[illegible]上令兒和乳嚥之

[illegible]乳汁忌食大鹹醋物兼惠用消[illegible]飲調[illegible]

字

馬兜鈴丹　治小兒肺喘咳嗽大便不利

馬兜鈴　紫蘇子　人參去蘆

款冬花[illegible]　木香各[illegible]　杏仁湯浸去皮尖麩炒

右件同為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎生薑湯下量兒大小加減

化痰

人參半夏丹　消痰飲止嗽

人參去蘆　半夏湯洗七次焙乾　白朮

川芎　天南星[illegible]各[illegible]

右件為細末取生薑汁打麵糊和如黍米大每服十粒煎生薑湯下乳食後服嬰兒如綠豆大治在乳頭上令兒吮之

貝母湯　治肺中風咳嗽喘悶

貝母去心　半夏湯洗七次

乾薑　麻黃各[illegible]　款冬花

甘草炙[illegible]

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑三片杏仁二粒去皮尖同煎至五分去滓温服

[illegible]黃芪湯　治小兒咳嗽喘逆身熱顏紅[illegible]
若是熱入肺經爲咳熱呷呀有聲
黃芪一兩　人參二錢半　地骨皮五錢
桑白皮三錢　甘草二錢半
右㕮咀水煎放溫頻頻服之
兩藏加味四君子湯　治痰嗽
人參　白术　白茯苓
甘草　杏仁　桑白皮炙各等分
半夏麴減半　水煎服
一久治咳嗽用四君子末煎紫蘇湯調下
咳嗽　八　參肝丸　二十三
□漁蟬殼湯　治肺氣不利痰
蟬殼去足　五味子　人參各去蘆一兩
陳橘皮湯浸去白焙　甘草炙各半兩
右件擣羅爲細末每服半錢煎生薑湯調下
白术五味湯方　治嗽逆氣逆上喘
五味子　白术　丁香
人參去蘆頭　款冬花各半兩　細辛去土一分
右件擣羅爲細末每服一錢水八分入生薑三片
煎至四分去滓放溫令時時呷之
人參平肺散　治心火刑肺咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸
脹痞滿
人參　橘紅　甘草炙　地骨皮各一錢
茯苓　知母炒各七分　五味子炒　天門冬去心
青皮各四分　桑白皮炒一錢
右作一服水煎
細辛五味子湯　治肺經不足胃氣怯弱或冒
風邪或停寒有餘咳嗽痰息不得安臥胸滿短氣
乾嘔作熱咳唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身体疼
重語聲不出痛引胸脇不問新久並宜服之
細辛去苗土　半夏湯洗七次一兩　罌粟殼去蒂蘆炒
五味子各三兩　烏梅去核　甘草炙各一兩半
桑白皮炒六兩
右㕮咀每服二錢水一盞生薑五片煎至六分去
滓溫服
咳嗽　八　紫□丸　二四
黃芩半夏生薑湯　治膽腑咳嘔苦水若膽汁
黃芩　生薑各一兩　甘草
芍藥各六分　大棗二箇　半夏五分
右水煎服
甘桔湯　治心臟咳咳而喉中如梗甚則咽腫喉痺
粉草　桔梗各一　右水煎食後服

芍藥甘草湯　治小腸咳咳而失氣

芍藥　甘草炙各一兩　右水煎服

升麻湯　治脾臟咳咳則右脇下痛痛引肩背甚則不可以動動則欬劇方見瘡疹

烏梅丸　治胃腑咳咳而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅三十箇　細辛　附子炮

桂枝　人參　黃蘗各六分

乾薑　黃連各一兩　當歸

蜀椒各肆兩

右爲末用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飯搗和丸如桐子大每服十丸白湯下

赤石脂禹餘糧湯　治大腸咳咳而遺屎

赤石脂　禹餘糧各二兩並打碎

右每服二錢水煎

麻黃附子細辛湯　治腎臟咳咳則腰背相引而痛甚則咳涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黃　細辛各二分　附子一分

右每服一錢水煎

茯苓甘草湯　治膀胱咳咳而遺溺

茯苓二分　桂枝二分　生薑[illegible]

右每服二錢水煎

百晬內嗽　此名乳嗽實難調理亦惡證也當審虛實而施治焉實者散之虛者補之其證氣急痰盛口瘡眼熱發散後以利之比金圓方見驚等藥主之散其實也其證咳嗽吐乳後驚悸困倦自汗者當用補肺散益黃散天麻散補其虛也大抵治驚嗽與散土之天麻圓乃要藥也用天麻[illegible]人參川芎甘草硼砂天竺黃雄黃[illegible]為末[illegible]之煉蜜圓如雞頭大金箔為衣每服一圓薄荷湯化下治乘嗽

百晬咳嗽不止宜服諸藥　曾言百日內嬰孩偶咳嗽痰壅睡中不寧亦因產後感風而得但不可過用發散之劑先以解表散方見前一二服次投貝母湯及惺惺散治　若脾胃內熱者用抱龍丸風邪外感者用惺惺散方見痘　痰熱既去而氣短痰盛或流涎者脾肺氣虛也用異功散方見加桔梗口瘡眼熱大便堅實者用三黃丸方見大便不實者用白术散方見若嘔吐不乳困倦自汗或自利腹脹者脾胃氣虛也用六君子湯加柴胡若驚悸困倦痰盛不乳者心脾血虛也四君子湯加芎歸酸棗仁或因乳母食厚味致兒為

患者仍豪喘嗽何治諸
補肺散又名阿膠散 治小兒久患咳嗽氣急有痰惡心
嘔吐

天麻散 治嬰兒咳嗽有痰氣壅面紅
南星水浸去皮臍 天麻三錢
辰砂一錢 麝香一字
右為末每服一字用杏仁湯調下人參湯亦可

天麻圓 治小兒未滿百晬咳嗽不止名曰乳嗽
天麻 蟬蛻 僵蠶
人參各一錢 川芎一錢 甘草二錢
麝香 分別研丸 一字
鷂砂半錢 辰砂 天竺黃
牛膽南星各二 白附子 蝎
僵蠶一錢 金箔五片
右為末煉蜜圓如芡實大金箔為衣每服一圓薄
荷湯化下

琥珀散 治急慢驚風涎潮昏冒目瞪驚搐內釣腹
痛或夜啼
辰砂 琥珀 牛黃
僵蠶炒去絲 牛膽南星 全蝎
白附子 代赭石 天麻

麝香 蟬殼各一錢
右為末每服一二分白湯調下

貝母湯 主百日內嬰孩咳嗽有痰
貝母一兩 甘草二錢半炙半生
右件剉碎為末每服一字或半錢用陳米煎湯空
心調服痰盛淡薑湯調下

惺惺散 主傷風傷寒咳嗽咳逆理虛和氣寧心清
肌止啼去煩利咽解失音
人參去蘆半兩 桔梗去蘆炒 白茯苓去皮
白朮 天花粉一兩 細辛去葉二錢
防風去蘆 川芎 南星各二錢半生用三錢
甘草七錢半生半炙
右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉慢
火煎七分無時溫服

紫菀湯小品療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐
乳嘔逆晝夜不得息四物湯
桔梗 紫菀各三分 甘草炙一分
麥門冬七分去心
右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差為
度千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升數數服

杏湯中挾絲縣兒口中晝夜四五過節嗽引

張氏雄黃膏　治月裏兒欬嗽并三歲已上皆可服

雄黃細研一分　杏仁二七枚去皮尖　半夏七个薑汁浸一宿切作片子焙乾為末

右一處研勻用生薑自然汁半兩蜜半兩一處入藥末於罐子內重湯煮熬用柳枝子攪成膏每服一皂子大塗奶頭與兒吮或糯米飲調下

趙氏治小兒未晬欬嗽方

白殭蠶直者

右為細末塗少許於乳上令兒咂立效

錢氏曰有喘而吐膿血者乃肺熱食後服甘桔湯　久嗽者肺亡津液阿膠散補之　而痰實不甚喘而面赤飲水者褊銀丸下之

閔齊郎下四歲病欬身熱吐痰數日而咯血前醫以桔梗湯及防己丸治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下褊銀丸一大服復以補肺湯補肺散治之或謂段氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈為順治也若先補其肺為逆耳此所謂識病之輕重先後為治也

甘桔散

桔梗米泔浸一宿焙乾一兩　甘草炒二錢

右為細末每服一大錢水一大盞入阿膠半片炮煎至五分食後温服　海藏甘桔湯仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

王氏手集解肌丸　治外傷風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴頭痛心忪喘嗽或熱在上焦咳嗽有血方

防風　皂角各一分

右件燒沙糖為丸如雞頭大每服一丸食後煎紫蘇湯下

劉參丸　治欬血

阿膠　蛤粉　人參各半兩

右除膠為細末湯化阿膠和丸雞頭大白湯化下

雞清散錢氏　治欬嗽出血下涎

鬱金半兩用皂莢水一盞煮乾為度　滑石半兩生

雄黃

右為細末每服一字常服薄荷湯調下止嗽糯粉米下嗽加雞清調下

嗽作呀呷聲 聖惠夫小兒嗽而咽喉作聲者由肺間痰多嗽動於痰上搏於咽喉之間痰與氣相擊隨嗽動息呀呷有声其咳嗽本体雖同至於治療則加消痰破飲之藥以此為異爾

聖惠射干散 治小兒咳嗽心胸痰壅攻咽喉作呀呷聲

射干 麻黄去根節 紫菀洗去苗土

桂心已上各半兩 半夏半分湯洗七遍去滑 甘草炙微赤一分

右件藥擣麁羅為散每服一𠀋以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓入蜜半茶匙攪令勻不計時候量兒大小分減溫服

陳橘皮散 治小兒咳嗽咽中作呀呷声

陳橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉 杏仁湯浸去皮尖麩炒微黃

甘草炙微赤剉 甜葶藶隔紙炒令紫色已上各一分

右件藥擣麁羅為散每服一𠀋以水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小加減服

蘿蔔子散 治小兒咳嗽喘急作呀呷聲

蘿蔔子微炒 麻黄去根節各一分 燈心一大束

皂莢子十枚煨去皮 甘草炙微赤剉半分

右件藥擣麁羅為散每服一𠀋以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以意分減溫服

蟬殼散 治小兒心胸痰壅咳嗽咽喉不利常作呀呷聲

蟬殼微炒 半夏湯洗七遍去滑 甘草炙微赤剉

漢防已各一分 桔梗去芦頭 陳橘皮湯浸去白瓤焙各半兩

右件藥擣細羅為散每服以生薑粥飲調下一字三歲已上加之半錢

聖惠又方

半夏湯洗七遍去滑 甜葶藶隔紙炒令紫色 杏仁湯浸去皮尖麩炒微黃

五靈脂

右件藥擣羅為末用生薑自然汁煮棗肉和丸如菉豆大每服煎麻黃湯下三丸日三服量兒大小以意加減

聖惠桔梗湯 治小兒咳嗽呀呷咽喉不利

桔梗 半夏湯洗七遍 紫蘇葉炒

石膏 甘草炙各半兩

右件擣羅為細末每服一𠀋水一盞入生薑三片煎五分放溫時時與兒服

寶郭氏曰小兒此疾本因寒濕所侵未經發散邪傳心肺變而為熱有熱生風有風生痰痰實不化

因循日久結為頑塊圓如豆粒遂成痰癖揣不出[illegible]
或啼哭未休遽與乳食或飼以酸鹹氣鬱不利致令
生痰或節令變遷風寒暑濕侵襲或墮水中水入口
鼻傳之於肺故痰母發動而風隨之風痰潮緊氣促
而喘乃痰飲之候[illegible]風化痰先以五苓散同寬氣
飲[illegible]汁和勻沸湯調服次進知母
湯雄黃散如意膏[illegible]

知母湯 治小兒痰喘氣急[illegible]發熱[illegible]咳嗽[illegible]

知母 甘草 貝母 羌活
滑石 大黃 小麥 麻黃
葶藶 訶子肉 薄荷

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

雄黃散 治暴中急驚風[illegible]痰涎滿口及[illegible]
閉汁不通或痰或熱坐臥不安煩

雄黃 [illegible] 川烏
草烏 天麻 川芎

右除雄黃外餘五味剉焙同雄黃為末驚風痰壅
每服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗或用薑葱
薄荷同煎餅服三服[illegible]

如意膏 治痰涎壅盛[illegible]咳嗽連聲不已冷熱二證皆
可投

半夏 南星

右二味為末以生薑汁和勻捻作小餅如大棋用
慢火炙乾剉為末復取薑汁如前再兩次炙乾仍
焙為末煉蜜丸芡實大每服一丸至二丸仍用薑
蜜湯或時化服有熱以薄荷湯下

[illegible] 治小兒胸膈痰滿痰嗽心胸煩悶傷熱積
毒

雄黃 朱砂 杏仁 巴豆
巴豆 豆豉

右杏仁巴豆二味用米醋[illegible]一片指大者
乾研[illegible]一寸[illegible]與皮法製牛
膽一分[illegible]末[illegible]細和勻麵糊為丸如麻
子大每服一丸五丸壯者七丸二歲[illegible]丸淡生薑
湯下

玉訣貝母丸 治小兒[illegible]

貝母 天南星 人參
茯苓 甘草 白附子

末之[illegible]丸小豆大每服五七丸薄[illegible]湯下

油滚丸　治小兒[illegible]及乳積

雷丸　五靈脂各一分　巴豆拾五粒取霜

右末之滴水丸每二[illegible]丸用滚過井水吞下

寬眼肉金丸　治小兒[illegible]咳嗽

[illegible]金　[illegible]

半夏[illegible]　[illegible]

右為末棗肉為丸如小豆大每服三丸至四丸[illegible]心湯下

吉氏家傳治[illegible]方

雄黃　蛤粉炒

右件各分研勻[illegible]抹頭上爽快

蔡子散　治小兒傷風欬嗽不住兼治瘧痢

大黃一分　鬱金二錢

右件二味先以豬牙皂角煮一復時取切片子焙乾為末次入粉霜腦子各少許再同研令勻每服一字沙糖水調下量兒肥瘦加減用之

清金散　治小兒咳嗽聲不出

杏仁[illegible]　[illegible]各[illegible]

右件藥[illegible]

[illegible]又湯煮一十沸却入貝母紫菀末各一分[illegible]分與服[illegible]收瓷器中每服以清粥飲下[illegible]夜一服嗽止為度量兒大小加減

又方

貝母半兩煨　牛黃細研一分　甘草炙一分

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下半錢日三四服量兒大小加減

又方

麥門冬去心焙　杏仁去皮尖麩炒黃　甘草炙

貝母　款冬花各一分　紫菀去土半兩

右件藥搗細羅為散每服以乳汁調下半錢日三四服量兒大小加減以意

又方

杏仁一兩去皮尖[illegible]　紫菀半兩

右以杏仁汁并紫菀末入蜜一合同煎如膏每服以清粥飲調下半茶匙量兒大小加減

驚風嗽　小兒患驚風驚止而嗽作謂之驚膈嗽其先宜下金杏丸次勻氣散與服

金杏丸

杏仁去皮尖　甜葶藶　漢防己　馬兜鈴去皮

右等分為末用蜜為丸小豆大每服十丸用麥門冬熟水吞下（方中〔？〕生亦於前咳嗽門中已有此方為各有所引不可除故兼存之）

勻氣散

桔梗（去蘆頭并炒 五兩） 甘草（二兩） 縮砂仁（一兩）
藿香（洗） 陳橘皮（各一兩） 白薑（一分）

右為末每服半錢一錢用霜木瓜煎湯調下如無即用紫蘇鹽煎湯下

聖惠蘇蘇煎　治小兒久嗽不止心神煩悶

蘇蘇（一握擣碎以童子小便一升相和研絞取汁） 酥（一兩）
甘草（生一分末） 蜜（二兩）

右件藥以銀器中慢火煎如稀餳每服以清粥飲調下半錢日四五服量兒大小加減

不灰木散　治小兒嗽久不止

不灰木（半兩） 貝母（煨令黃） 甘草（炙微赤已上各半兩）

右件藥擣細羅為散每服一錢以新汲水一小盞點生油一二滴打令散煎至五分去滓分溫二服量兒大小加減

桑白皮煎　治小兒經節不差及傷肺見血

桑根白皮（銼五合） 白狗肺（切一具）
甘草 茯苓 升麻 貝母（各〔？〕）

芍藥 杏仁（去皮尖各〔？〕分） 李根白皮（切四分）
款冬花 麥門冬（去心各六分） 黃芩（十一分）
淡竹青皮（八分） 蜜 地黃汁（各一升）

右以水一斗煮及三升去滓下〔？〕地黃汁蜜微火上煎不住攪至二升三合細細綾汁二三歲兒一合溫服之日進三服夜三合

知母散　治大人小兒久嗽不止痰吐喘悶氣壅

知母 貝母 柴胡 黃芪（炙）
紫菀（洗） 馬兜鈴 杏仁（去皮尖麩炒） 半夏（湯洗薑汁煮）
桑白皮（炙） 白礬（〔？〕兩） 款冬花（各等分）

右為細末每服一錢水七分盞同煎三分去滓臨臥服或生薑自然汁煮糊為丸每服五七丸生薑湯下

貝母散　治小兒久咳嗽氣急

貝母（煨） 杏仁（去皮炒） 麥門冬（去心）
款冬花（各一分） 紫菀（去苗）

右為末用乳汁調下半錢大

喘

經素問通評虛實論帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死
〇小兒喘咳重於咳嗽然有虛實冷熱之分不可概治實熱者投瀉肺飲幼科加五和湯東垣水煎急服及瀉肺湯錢氏葶藶丸爲治經云喘急多因氣有餘爲肺主氣故也虛冷者投枳實湯水薑煎并如意膏補肺散坎離湯自効此肺虛感風氣不升降致有是證及用定喘飲常驗不拘冷熱皆可服涎痰多者二聖散主之

〇薛喘急之證有因驚氣鬱心者有因寒邪壅盛者有因風邪外客者有因食鹹酸痰滯者有因停痰積熱者〇清道者然喘與氣急有輕重之別喘則欲言不能隘於胸臆氣急但息短心神迷悶耳治法因驚者用雄朱化痰定喘丸佐以天麻定喘飲以傷肺氣者用小青龍湯風邪傷肺者用三拗湯加減之食鹹酸傷肺者啗以生豆腐熱傷肺氣者當凉肺定喘哮喘喉聲如鋸者梅花飲兼用半夏丸前證多因脾肺氣虛腠理不密外邪所乘真氣虛而邪氣實者爲多若已發則散邪爲主未發則補脾爲主設攻

攻其邪則損真氣徑補其肺則益其邪凡喘嗽之證若小便不利則必生脹脹則必生喘要分標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾蓋肺金司降外主皮毛肺朝百脈通調水道下輸膀胱既受邪則失降下之令故小便漸短致水溢皮膚而生脹滿此則喘爲本而脹爲標也治當清金降火爲主而行水次之脾土惡濕而主肌肉土能克水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標也治當實脾行水爲主而清金次之苟肺證而

用燥脾之藥則金燥而喘愈甚脾病而用清金之藥則脾寒而脹益增觀其證若中氣虛弱者用六君子湯中氣虛寒者前方加炮薑鬱結氣滯者用歸脾湯加柴胡山梔用木剋脾土者用六君柴胡山梔肺氣壅滯者用紫蘇飲加白朮脾經鬱熱者用養胃湯加木香肺中伏熱水不能生而喘者用黃芩清肺飲及五淋散脾肺虛弱不能通調水道者用補中益氣湯及六味丸若膏粱厚味脾肺積熱而喘者用清胃散及滋腎丸心火刑金不能生水者用人參平肺散亦用滋腎丸腎水虧虛火爍金小便不利者用六味丸及

補中益氣湯肝木乘脾不能相制而喘者用八仙粥
如丹痲脾胃虛與腎肝腹脹者用八味地黃丸脾腎
虛水不能攝水如腫脹者用加減腎氣丸肝腎損足
陰而後喘嗽或使不調及疼引作痛者俱用六
味八味加減腎氣等丸治之仍參傷風咳嗽證
錢氏論肺盛復有風冷胸滿短氣氣急喘嗽上氣
當先散肺後發散風冷散肺瀉白散方見發散風冷大
青膏主之方見肺只傷寒則不胸滿　潔古云肺實則
喘而氣盛瀉白散

瀉白散方見　　清肺飲方見

万和湯方見發熱

滑玉丸　治痰嗽氣喘胸滿飲食減少睡不得寧
煩躁有熱

青黛　　明白礬生用　　天南星炮

滑石四味各一兩半　　輕粉五錢　　全蝎去尖

巴豆去殼心膜研細紙去油取霜入乳鉢研細

右除輕粉巴豆外餘五味或曬或焙為末仍入前
二味同在乳鉢杵勻薑汁煮糯米粉為糊丸粟殼
大每服七丸至九丸或十一丸用淡薑湯空心投
熱者薄荷湯下或不拘時

錢氏論肺臟怯云唇白色當補肺阿膠散主之若悶
若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛損故也脾肺病
久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營
故名曰怯肺主唇唇白而澤者吉白如枯骨者死

補肺散　治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠一兩半炒　　白茯苓　　馬兜鈴去老梗

糯米各一兩　　杏仁去皮尖炒　　甘草炙

右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服

坎離湯　治虛喘晝輕夜重食減神昏

華澄湯　　石菖蒲各一錢半　　白朮

白茯苓去皮　　南木香不見火各　　甘草炙

半夏湯泡　　紫蘇

右剉每二錢水一盞煎七分溫服無時

杏仁煎　治小兒咳嗽心煩喘急

杏仁去皮尖　　天門冬去心

寒食麪各一兩　　酥各三合

生地黃汁一盞　　大貝母

右件煎貝母及天門冬至五分便研絞取汁入杏
仁膏等同熬如稀餳每服用溫水調下半錢匕隨
量兒大小以意加減

八味理中丸　治小兒心肺不和息數脈急上下不升降中膈痞滿煩悶胸膈坐臥煩悶神情不樂飲食不下

人參　甘草炙　白朮

乾薑　枳實麩炒　白茯苓

五味子去梗　陳皮去白

右件等分為細末煉蜜為丸小指頭大每服一丸淡豆豉湯粒水一小盞煎至半去豉通口服不拘時候

[illegible]湯　治小兒肺氣不利病喘

白朮五味湯　嬰幼科九　治小兒咳嗽氣逆上喘二方見咳嗽

聚寶方平氣散　治小兒氣逆不和定喘和氣補虛進食

人參　白茯苓　百合

甘草炙　白朮　桔梗各等分

右六味為末每服一錢水八分生薑少許同煎至五分溫服

[illegible]云小兒結熱上氣喘者四順清涼飲子

痰　丹溪云痰喘發者非用涌法吐之重劑瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末須蝦齏汁調服

生白丸　治小兒痰涎不利上喘咳嗽

白附子各　天南星各半兩　半夏壹兩

右為末用生薑汁打麵糊為丸如菉豆大每服二十九至三十九生薑湯下量大小加減

枳實湯　主傷風傷寒胸滿氣促咳嗽不活食多痰吐出

喘　嬰幼科九

枳實去穰麩炒　赤茯苓去皮各半兩　甘草炙各

半夏湯泡七次切焙　桔梗剉炒各半

右件㕮咀每服二錢水一盞生薑三片煎七分無時

加減斟酌

半夏丸　治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿及風痰嘔吐惡心涕唾稠粘

白礬壹兩半燒　半夏壹兩生薑汁製壹宿

右為末生薑自然汁丸赤豆大每服十九薑湯下

經驗後方　大人小兒定喘化痰

右用猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲內子頁

白礬各一字入罐子內封閉勿令煙出火煅通赤
去火細研入麝香一錢人有上喘咳嗽用糯米飲
下小兒半錢甚妙

驚 天劾雄硃化痰定喘丸 治小兒因驚發喘逆觸
心肺暴急張口虛煩神困

雄黃 硃砂各一錢研 蟬蛻
全蠍 地龍 白殭蠶
天南星 白附子炮各二錢 輕粉半錢

右為末麵糊圓如麻子大每服三十丸薄荷茶清
送下食後服

喘 天麻定喘飲 治小兒喘嗽驚風

天麻 防風 羌活
甘草 人參 桔梗
白朮 川芎 半夏麴各等分

右剉散每服二錢水一盞麥門冬十四粒煎至七
分食後服有熱去白朮加芍藥枳殼

氣逆傷風 三拗湯 紫蘇飲子 治肺受風寒喘急痰嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮
五味子 杏仁 麻黃
甘草炙 陳皮各二分 人參
半夏各三分

右[illegible]片水煎溫服

傷寒喘 小青龍湯
麻黃杏仁甘草石膏湯 治傷寒發汗後不可更行
桂枝湯汗出而喘無大熱下後喘亦治

麻黃去節四兩 杏仁五十個去皮尖
石膏半斤碎 甘草炙二兩

右剉散每服三錢水小盞煎六分去滓溫服

金匱要略小青龍加石膏湯 治大人小兒肺脹欬
而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水

麻黃 芍藥 桂枝
細辛 甘草炙 乾薑各三兩
半夏半升洗 五味子半升 石膏二兩

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓强服一升羸者減之日三
服小兒服四合

吉氏治小兒傷冷氣喘涎多方

蓽蘇一个大者開一蒂子 阿膠一分 沙糖半兩

右件將二味投入蓽蘇內以蒂子依舊封着以紙都糊入飯甑蒸兩遍取出隨兒大小約多少冷服

真珠散 治小兒氣喘痰涎

真珠末 生犀角鎊各半兩 香附子四大

龍腦少許

右為末每服半錢桃仁湯調下嬰兒一字二歲以下者半錢

茅先生小兒諸喘氣急方

海漂蛸 罌粟子末 牡蠣

馬兜鈴去皮

右各秤二錢為末拌勻每服抄一錢用[illegible]湯調下

又方

海漂蛸 牡蠣大者

右等分為末每服一錢用煎生薑湯調下

[illegible] 千金射干湯 治小兒咳嗽喘急如水雞聲

射干 麻黃 紫菀

甘草 生薑各半 半夏二兩

桂心二兩 大棗三枚

右剉散每服一錢水一盞半煎入蜜少許服

梅花飲子 治小兒驚熱在臟腑熱上蘊熱于

心熱狀中多汗顏面色赤或白或呀呀發渴清涕

氣急肝肺熱目赤咳嗽夜啼不安或

傷寒斯安尚有餘熱服此加化痰退熱

硼砂 馬牙硝 芒硝

人參各一兩 甘草半兩 梅花腦子

辰砂 麝香各一字

右八味為末以瓷器收貯遇有此候麥門冬湯調下痰喘咳嗽桑白皮湯下常服薄荷湯調下

[illegible] 聖散 治風痰壅閉語音不出氣促喘悶手足動搖似搐者

訶子半生半炮去核 大腹皮

右剉每服一錢水一盞煎七分

[illegible] 定喘飲 治痰風痰喘滿氣促不得臥發熱二證

人參去芦頭 麻黃根節 防己

訶子去核 半夏 甘草炙

剉每服二錢水一盞薑三片煎七分細細服

總治十六般哮嗽出本事方

阿膠蛤粉炒　馬兜鈴　甘草炙

半夏湯洗　杏仁去皮尖各一兩　人參半兩

右㕮散每服二錢水一盞隨病湯使煎至七分臨卧食後服湯使于後

心嗽面赤或汗流加乾葛煎　肝嗽眼中淚出入烏梅一箇糯米十四粒煎　脾嗽不思飲食或惡心入生薑二片煎　胃嗽吐逆吐酸水入蚌粉煎　膽嗽令人不睡用藥半錢茶清調下　肺嗽上氣喘急入桑白皮煎　膈嗽出痰如圓塊生薑自然汁調藥下　勞嗽秦艽末同煎　冷嗽天晚嗽甚葱白三寸同煎　血嗽連頓不住當歸末棗子同煎　暴嗽涕唾稠粘入烏梅生薑煎　產嗽背甲[illegible]一十黃蠟少許煎　氣嗽肚痛脹滿青皮去白煎　哮嗽聲如拽鋸入半夏三箇同煎　腎嗽時復三兩聲入黃芪白飴糖煎

已上十六般嗽疾依法煎服無不效驗

馬脾風　暴喘而脹滿也　田氏云暴喘俗傳為馬脾風也大小便硬宜急下之用牛黃奪命散後用白虎湯平之　馬脾風在百日內者不治

牛黃奪命散　治小兒肺脹喘滿胸膈起急兩脇扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽喝聲嗄而不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風者不治死在旦夕

白牽牛　黑牽牛各一兩半生半熟

川大黃　檳榔各一兩

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許無時加蜜少許

無價散　治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

辰砂二錢半　輕粉伍分　甘遂麪裹煮焙乾一錢半

右為細末每服一字用溫漿水少許入滴油一點挑藥在上沉下去却以漿水灌之立効

又一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者及疳疾積病兒手中指果近掌紋至中指尖截斷如此[illegible]白乳上炙[illegible]橫一莖兩頭盡頭照充灸三壯此法[illegible]

悲哭

萬全方小兒有驚啼有夜啼[illegible]大啼啼者由[illegible]帶乘心臟[illegible]生於熱則精神不定睡卧不安故驚啼夜啼者臟冷也夜則陰盛陰盛相感痛甚於晝故令夜啼一云有犯觸禁忌亦令兒夜啼可作法術斷之其躽啼者由腹中痛甚兒身躽張蹙氣而啼也又有胎寒而啼者此兒在胎時已受病也其狀腸胃虛冷不消乳哺腹脹下痢顏色青白而時或啼叫是也

薛氏悲哭者肺之聲淚者肝之液也若六脈弦緊者先以溫湯浴其身取汗次以涼驚散之類清其內熱若悲哭 幼科九 張子和治法如此若因乳母怒火遏熱於肝肝火妄行久傷肺金金木相擊致悲哭有聲者宜用六君柴胡山梔以補脾清肝用六味丸以壯水生木有因驚風過服祛風燥血之藥而致者有因吐瀉內亡津液而致者及稟賦腎陰不足不能生肝者治各審之若小兒忽然大啼作聲所謂[illegible]不足虛火炎上故也用六味丸多有生者仍察其夜啼客忤驚啼重舌口瘡天釣內釣等症

錢氏蟬花散 治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花 和殼　白殭蠶 直者酒炒熟　甘草 炙各一分
延胡索 一分

右為末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯下

本事方治小兒拗哭龍齒散

龍齒　蟬殼 去翅足　鈎藤 有鈎子者
羌活　茯苓　人參 各等分

右為末每服一大錢煎至八分去滓溫服

子和治一小兒悲苦啼哭不休兩手脈弦而緊戴人曰心火甚則乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云 幼科九 心火甚故燥甚悲亦甚先令浴以溫湯漬形以為[illegible]也肺主皮毛汗出則肺熱散浴止而啼亦止次仍以涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

錢氏云小兒驚啼謂於眠睡中忽然啼而驚覺也驚啼乃邪熱乘心也當安心安神丸主之 方見心臟

乳香丸 治驚風內釣腹痛驚啼

乳香 半錢　沒藥　沉香 各一錢
蝎梢 十四枚　雞心檳榔 一錢半

右為末煉蜜丸梧子大每服二丸菖蒲鈎藤湯調

木香丸　治證同前

乳香　沒藥　全蝎各半錢

鈎藤　舶上藿香　木香各一錢

右先將乳香沒藥另研次入諸藥末和勻取大棗少許研細和丸桐子大每服一丸鈎藤湯下

小兒嬰兒服之蓋忽啼哭或心腹痛面赤口舌乾狀者謂之夜啼乃風熱邪氣乘於心臟名曰驚啼宜用

牛黃散方　常用除熱

牛黃　好朱砂各　人參

甘草炙各半兩　已上並為細末次入

硃砂　雄黃各一分並細研水飛　龍腦半分

右件諸藥一處研細勻煉蜜和成膏如雞頭實大每服半粒至一丸薄荷湯化下乳食後

清靈散

石蓮心一分　天南星炮　綱鐵

全蝎　鬱金皁角　雄黃一分

粉霜半分

右件為末每服一字半錢看大小薄荷湯調下

聖惠牛黃散　治小兒驚啼

犀角屑　鈎藤　升麻

黃芩　甘草炙各一分　人參三分

右㕮咀每服一錢水一盞煎至五分量兒服之

羚羊角散

羚羊角屑　黃芩　犀角屑

甘草炙　茯神各一分　麥門冬半兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減服之

龍齒散　治小兒驚啼眠臥不安

龍齒　麥門冬各　白芍藥

川升麻　川大黃炒　甘草炙各一分

右件㕮咀每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服量小兒大小加減服之

梔子仁散　治小兒驚啼狀如物刺

梔子仁一兩

右件藥一二歲兒每服一字用粥飲調服三四歲兒每服半錢一日三四服量兒大小加減

治小兒五邪驚啼悲傷鮫鯉甲燒之作灰以酒或水和服方寸匕　出本草

小兒生下便驚啼聲嘹喨　醫云是氣急此誤

入命須使此方
收取黃葵門月花陰乾搗散入馬牙硝四分
加前項四味神妙方莫加
右以冷水調下一字至一錢服之立效
興驚治小兒夜啼忽驚啼不識其母與之搐頭方
右小兒忽驚啼不識其母是夢中見其母棄之去謂
母實故啼去但令人抱坐於啼中令母從外把大
火入來喚之即止所以然者謂母去還來也此方
天下未之知隱居方
一法寫天心二字於顖門上寫泥丸二字於丹田上
東氏云小兒在胎時其母將養傷於風冷邪氣
入胞傷兒臟腑故兒生之後邪氣在兒腹內邪動與
正氣相搏則腹痛故兒躽張蹙氣而啼
鈎藤膏 治小兒乾啼後躽方見腹痛
張渙嬰兒在胎之時其母將養一切不如法及取涼
飲冷過度冷氣入兒腸胃使胎氣不強致生下羸
弱多病俛仰多啼名曰嬰兒躽啼宜用養臟湯方
川當歸一兩 沉香 丁香
白朮 桂心 川芎各半兩
右件搗羅為細末每服一錢水八分入生薑二片
煎至四分去粗放溫時時滴兒口中
嬰孺當歸散 治少小胎寒腹痛躽啼
黃芪 當歸 芍藥
乾薑各四分 甘草三分 黃芩壹分
右為末二十日兒用乳汁和一胡豆大一日三夜
一五十日兒一小豆大百日一小豆大藥溫中無
毒與黃芪同類也兒生便服使其氣不得生赤
不叫服之 若寒氣痛啼不可忍以
小者飲之入如服即中凡湯服藥補益之可數十倍
節度無苦
劉氏治胎氣弱陰陽不調晝夜躽啼不已
好乳香水中坐乳鉢細研 沒藥細研
木香 薑黃各四錢 木鼈子二枚去殼
右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和
成劑收之每一歲兒可服半皂子大餘以意加減
煎釣藤湯化下無時次用魏香散
魏香散
蓬莪茂半兩濕紙裹煨 真阿魏一錢
右先用溫水化阿魏浸蓬莪茂一晝夜切焙乾為
末每服半錢煎紫蘇米飲空心調下躽啼積愈服

一開胃丸

開胃丸

白朮　木香　蓬莪茂

人參　當歸各半兩　白芍藥一分

右為細末湯浸炊餅為丸如黍米大每服五七丸

空心食前煎麝香湯下

白朮當歸煎丸　治臟寒腹痛遇夜啼叫身體腹脹

而加瀉狀甘吐不止大便酸臭乳食雖多不生肌

膚

白朮　當歸　木香

右等分為細末煉蜜為丸如桐子大每服一丸煎

木香湯化下

六神散　治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲

腰而啼或大便泄瀉及不吮乳

人參　山藥　白朮各半兩

甘草二錢　茯苓　扁豆炒各一兩

右為末每服二錢薑三片棗一枚煎服一方用當

歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢

為散每服二錢水煎時時服

夜啼　三因小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重

舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣

腹亦冷曲腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小

便赤口中熱腹暖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若

重舌口瘡要吮乳不得口到乳上即啼身額皆微熱

急取燈照口若無瘡舌必重也客忤者見生人氣忤

犯而啼也各隨證治之

曾夜啼者有驚熱夜啼有心熱夜啼有寒痛夜啼有

誤觸神祇夜啼此四者詳具于後　驚熱者為衣衾

太厚或抱于極暖處久坐致令煩悶邪熱攻心心主

神神亂則驚心與小腸為表裏故啼泣而遺溺者是

也治法退熱鎮心則自安矣用白解散牛蒡湯

三解散主之　心熱者見燈愈啼而紅多淚無燈

則稍息蓋火者陽物也心熱遇火兩陽相搏才有燈

而啼甚故經曰火疾風生乃能雨此其義也宜涼心

安神用百解散或五苓散加黃芩甘草水煎服又

牛黃湯三解散及琥珀抱龍丸治　有遇

夜啼後至更啼哭多聲少有啼聲不已直到天明

乃胎中受寒遇夜則陰勝而陽微故腹曲額汗眼中

無淚面瑩白而夾青伏則而啼入盤腸内吊之證皆

為寒痛治法當溫下焦用白芍藥湯烏梅散腹

及啼和飲加鹽炒茱萸茴香水煎服又方蚯蚓[illegible]
客忤 誤觸神祇者面色紫黑氣鬱如怒呼喝若有所
恐懼及睡中驚惕兩手抱母大哭不休此誤觸[illegible]忌
神祇而得或因惡祟所侵蓋嬰孩目有所睹口不能
言但驚哭無時[illegible]手形
無見定知宜爽惡神靈治法先解其表宜百解散
次驅邪氣心用蘇合香丸[illegible]之自
效 滇山王氏[illegible]王小兒
夜啼疎客忤[illegible]云啼而不哭是煩哭而不啼是躁
字[illegible]六夜多啼[illegible]兒日夜頻啼如有[illegible]
悲哭[illegible]
或因熱[illegible]心驚[illegible]或因寒停臟腑宜服溫[illegible]
醫者審而治之乃善也若兒啼哭胃堂仰突宜反服[illegible]
喜見燈者心經有熱宜疎利服三黃丸或洗心散[illegible]
燈心麥門冬子良若兒啼哭頭低身曲眼閉肚緊者
臟腑留寒宜與溫之胃風湯加黃芪煎效若不識證
候但以蟬蛻二七枚全者去大腳為末加朱砂一字
蜜調於吻立效 又方夜啼有二曰脾寒曰心熱也夜
屬陰陰勝則脾臟之寒愈盛脾為至陰喜溫而惡寒
寒則腹中作痛故曲腰而啼其候面青手腹俱冷
不思乳食是也亦曰胎寒用鉤藤散若見燈愈啼者

心熱也心屬火見燈則煩熱內生兩陽相搏故仰身
而啼其候面赤手腹俱緩口中氣熱是也用導赤散
若面色白黑睛少屬腎氣不足至夜陰虛而啼也宜
用六味丸若兼泄瀉不乳脾腎虛弱也用六神散若
兼吐瀉少食脾胃虛寒也用六君炮薑木香大便不化
食少腹脹脾氣虛弱也用異功散心血不足者秘旨
安神丸木火相搏者柴胡梔子散肝血不足者地黃
丸大抵此證或因吐瀉內亡津液或稟賦腎陰不足
不能滋養肝木或乳母恚怒肝木侮金當用六君子
湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水以滋肝木若乳
母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳母暴怒者加味
柴胡湯乳母心肝熱搏柴胡梔子散仍宜參看驚
啼覽之
心鑑治小兒一百二十日內夜啼用蟬蛻四十九箇
去前截用後截為末分四服鉤藤湯調灌之
寶鑑蟬花散 治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬蛻
下半截為末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信
將上半截為末煎湯調下即復啼也古人立方莫知
其妙
[illegible] 錢乙論夜啼云脾臟冷而痛也當與溫中藥

及以汰瘢之花火膏主之

花火膏　取燈火一顆塗乳上令兒吮之

不氏當歸丸　治小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青手冷不吮乳者是也宜此方

當歸　白芍藥　人參各一分

甘草炙半分　桔梗　陳橘皮不去白

右為細末水煎半錢時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發而亦啼焦小便黃赤與三黃丸人參湯下三黃丸方見實熱

辰渙蠲合散　治嬰兒藏寒禀氣怯弱或多啼解顱色青白溫夜多啼甚者煩悶狀若神祟亦由觸犯禁忌所致此名曰夜啼宜用此方

沈香　丁香　人參

五味子　當歸各三兩　赤芍藥

白朮各半兩　桂心一分

右件搗羅為細末每服一錢用淡漿水一小盞煎至六分放溫時時滴兒口中立效

四氏五味子散　治小兒夜啼及腹痛至夜轉劇狀似鬼祟

五味子　當歸　赤芍藥

白朮各半兩　茯神　陳皮

桂心　甘草炙各二

右為麄末水煎量兒大小加減

鉤藤膏　治百日內嬰孩面青腹痛夜啼及周歲已上者盤腸內吊諸般氣疾

鉤藤和鉤　玄胡索　當歸酒洗

粉草炙　乳香各五　肉桂去粗皮各二

麝香一字

右前四味焙乾桂不過火同為末乳香寫葉裹定于灰火煨透候冷入乳鉢同麝細杵後入前藥末再杵勻煉蜜丸芡實大每用一丸至二丸白湯空心化服

鉤藤飲　治小兒夜啼乃臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也鉤藤散主之治驚啼加蟬蛻防風人參

鉤藤鉤　茯神　茯苓

川芎　當歸　木香

甘草　白芍藥各一

右為末每服一錢薑棗略煎服其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證鉤藤飲去木香加

朱砂末一錢研和每服二錢水木通湯調下或剉散煎服亦可

聖惠乳頭散 治小兒夜啼不止腹中痛

黄芪剉 甘草炙 當歸

赤芍藥 木香

右各等分搗細羅爲散每服取少許著乳頭上因兒吮乳服之

張氏[illegible]治腹痛夜啼 方見腹痛

錢氏 錢氏云三黄丸治腹熱痛 熱痛[illegible]不[illegible]夜啼面赤唇焦便赤用人參湯吞下 方見熱

集驗 八 幼科九

吉氏朱砂膏 治諸驚啼夜啼

朱砂 人參 白茯苓

甘草炙各一 腦麝各少許

右末蜜爲丸每服一丸如皂子大金銀薄荷湯下

安神散 治驚啼

犀角 雄黄 人參

車前子各半兩 茯苓一兩

右五味爲末每服一錢桃仁湯下

酒燈花散 治熱燈心躁夜啼以燈花三四顆研細用燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三服

燈花用燈心燒灰亦妙 又一法燈花七枚硼砂一字辰砂少許研細蜜調抹唇上立安

湯先生抹唇膏 主小兒夜啼

蟬殼去足一錢 燈花兩朵 朱砂少許

右爲末如小兒夜啼遇夜用雞冠血調蘸抹兒上下唇即止 又朱砂膏亦效服

丹溪治小兒夜啼

人參三錢 黄連半錢姜炒 甘草炙五分

竹葉二十片 生薑一片 右水煎服

濟生龍齒散 方見前本事方嬰孺散自無差誤

集驗 八 幼科本

小兒夜啼黄連[illegible]炒甘草竹葉燈心煎服

三因蒲黄散

蒲黄[illegible]

右研細每抄些少摻舌下時時摻之更以溫水[illegible]

兼用栗指[illegible]

[illegible] 治客忤夜啼法用本家廚下燒殘火柴頭

削以火焦頭爲上朱書[illegible]見天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼[illegible]

律令勅書了勿令兒知立在床下倚床前腳[illegible]

男左女右效

黃丹散　治小兒卒驚作

竈中黃土　坏烟屎　各等分

右件勺和水塗兒頭上及五心良

千金　千金治夜啼方

右以姙娠時食飲偏所思者物哺兒即効

外臺必効小兒夜啼方

以日未出時及日午時仰臥於臍上橫文中屏氣

以朱書作血字其夜即斷聲効

陳氏蘊餘方

取井口邊草　小兒夜啼着母臥席下勿令母知　六三

子母秘録治小兒夜啼

燕窠中草著席上

葛氏小兒夜啼

取狼屎中骨燒作灰大安母席下勿令母知子母俱吉

又小兒方　仙人杖小兒驚癇及夜啼安身伴睡良

日華子云猪窠內有草治小兒夜啼安席下勿令母知

日華子云烏雌雞窠其治小兒夜啼安席下勿令母知

聖惠方

右臍下書甲字差

又方　取樹孔中草著戶上立止

又方　以車轄安母臥床下勿令母知

又方　取荒廢井中敗草懸戶上良

又方　取牛蹄灸安母臥下勿令母知

又治小兒夜啼符法二道

朱書　兒　上　房

嬰孺治小兒夜啼法

右令母脫去上衣只著中衣躡宅四角一西方白

帝東方青帝南方赤帝北方黑帝中央黃帝乞斷

某甲夜啼夜鬼之日奉還酒脯隨意所用還法安　六十六

右取置中庭四角故四角四畔中央一畔啓顙禮

五帝說日令日奉還隨意所既應之

劉氏方　治小兒夜啼

寫者以色見我以音聲求我是人行邪道不能見

如來燒灰吞之男左一本女右一本

嬰孺寶鑑灸劫宮三壯又灸中指甲後一分　萬全

方灸小兒夜啼上燈啼雞鳴止者灸中指甲後一分

中衝穴一壯炷如小麥大

瘖

內經云音者音聲之機也喉者音聲之關也小兒卒然無音者乃寒氣客于會厭則厭不能發發不能下致其門闔不制故無音也若咽喉音聲如故而舌不能轉運言語則為舌瘖此乃風冷之邪客於脾之絡或中於舌下廉泉穴所致也蓋舌乃心之苗心發聲為言風邪阻塞經絡故舌不能轉運也若舌本不能轉運言語而喉中聲嘶者則為喉瘖此亦為風冷所客使氣道不通故聲不得發而喉無音也然或風痰阻塞或因心經氣虛或因肝之脈絡受風或因風痰滯於脾之絡或因脾氣不足或胃中清氣不升皆足以致瘖大抵此證亦有稟父腎氣不足不能言者有乳母五志之火遺兒熏閉清道不能言者或兒病津液耗損會厭乾涸不能言者或腎氣不充虛火上炎傷肺不能言者有驚風中風不能言者若遺熱與津液耗者用七味白朮散清氣不升者用補中益氣湯稟腎不足與虛火傷肺者用六味地黃丸若仰首咳嗽肢體羸瘦目白睛多或兼解顱呵欠咬牙等證悉屬腎虛非地黃丸不能收功

喉瘖 袁氏云喉嚨者氣之道路喉厭者音聲之門戶也有寒氣客於喉厭得寒即不能發聲故卒然失音也不能語者語聲不出非牙關緊也

腎怯瘖 錢氏論腎怯失音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能嚥藥此非失音為腎怯不能上接於陽故也補腎地黃丸（方見腎）主之失音乃咽病耳

湯氏家傳治小兒患後聲不出

酸棗仁（一兩去殼）　白茯苓（半兩）　朱砂（二錢）

右件為末　丸如豆大每服一丸人參湯下

聖惠雞頭丸（見舌瘖）

驚退而瘖 漢東王先生通關散　治小兒驚風並退只是聲啞不能言

右以天南星炮為末每服嬰孩半字或一字三五歲半錢八九歲一錢豬膽汁調下令孩兒嚥下入喉中便能言語

集驗方治小兒驚退而啞不能言語

木通（剉）　防風（去蘆）　川升麻

羚羊角（屑）　桂心（已上各半兩）　甘草（炙微赤剉一分）

右件藥搗為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹瀝少許更煎一兩沸不計時候量兒大

小加減服之

集驗人方

臘月牛膽釀天南星 不拘多少

右為細末服半字薄荷湯調下臨臥服兒大者服

一字至半錢

嬰孺論 巢氏病源小兒發癎差後六七歲不能語

候風癎發之狀口眼相引或目睛上搖或手足瘈瘲

或脊背强直或頸項反折屈伸如數皆由以兒當風

取涼乳哺失節之所為也而癎發差後不能語者是

風癎因兒汗出腠理開以兒乘風取涼太過為風所傷

瘖 幼幼新書 六九

得之其初發之狀屈伸皆如數或後發或發瘈瘲是也心之

聲為言開竅於口其風邪乘虛入于心為之氣猶滯心之

竅故使心氣不和其聲不發故不能言也

千金大補心湯 治小兒病癎之後風邪留滯於心絡

使心氣不和語聲不發

黃芩　附子 炮去皮臍　甘草

茯苓　桂心 各一兩　石膏

半夏　遠志肉 各　生薑

大棗 二十枚　飴糖 一斤　乾地黃

阿膠　麥門冬 各二兩

右件藥㕮咀每服一大撮入水二盞飴糖半匙許水一二

盞煎半盞服之

聖惠 治小兒中風失音不語舌根強硬方

陳醬汁 半合　人乳 二合

右件藥相和合令勻少少與兒服之

張渙竹瀝膏 治小兒中風失音不語牙關緊急

竹瀝 依法取　生地黃 取汁　蜜 各半合

桂心 為末　石菖蒲 一寸九節者取末各一兩

右件都一處調勻慢火熬成膏硬軟得所如皂莢

大每服一粒取梨汁化下 幼幼新書 七十

救生[illegible]湯 治小兒中風昏

石菖蒲　天麻　生烏蛇肉

全蠍　白僵蠶　附子 炮去皮臍

羌活　人參　白附子 各等分

右為細末每服三錢水兩盞生薑五片薄荷五葉

煎至一盞去柤溫熱時時與服

醒脾散 治小兒驚搐後不語

甘草 炙一兩　冬瓜子　防風 各半兩

人參 一分

右件為細末每服一錢用水一盞入竹葉數片煎

心少許同煎至七分去滓食後温服臨睡

[illegible]茅先生傷寒失音語不得方

金毛狗脊　甘草 等分

右為末每服一錢用黃蠟一塊指頭大水六分同煎四分服

集驗方　治小兒傷寒失音不能語

桂 去粗皮

右含桂口中漸漸嚥汁音如舊

鼻

涕液從小兒肺氣通於鼻氣爲陽若氣受風寒停滯鼻竅間則成鼻塞氣不使津液不收則多涕若冷氣久不散膿涕結聚使鼻不聞香臭則成齆鼻若挾熱則鼻乾皆妨害乳食　薛氏曰鼻乃肺之竅皮毛腠理乃肺之主此因風邪客於肺而鼻塞不利者宜用消風散或用葱白七莖入油膩粉少許搗爛絹帛上乘熱護温貼顖門因驚仆氣散血無所羈而鼻衄者用異功散加柴胡山梔若鼻準青而兼赤者先用柴胡清肝散後用地黃丸右腮赤乃肺大腸實熱也用瀉白散鼻色赤乃脾胃實熱也用瀉黃散微赤乃脾經虛熱也用異功散加升麻柴胡色黃者用濟生犀角地黃湯後用錢氏地黃散淡白色用六君子湯[illegible]悶色赤用四物湯加山梔赤甚用麥門冬散小便赤色用六味丸補中益氣湯若色白用六君子湯久不愈用麥門冬飲子若仍赤病元氣未虧乳食如常發熱壯熱二便秘結作渴飲冷屬不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉肢冷睡而露睛者悉屬形病俱虛當補正

鼻塞門　治初生芽兒一朔五日六晨一臘忽然鼻塞
妨乳不能開口呼吸者多是乳母安睡之時不知持
上兒子鼻中出息吹著兒顖或以冰冷洗用水當冷
不避風邪所以致兒鼻塞宜與通關膏導之消風散
服之或有驚悸作熱往來者以通關膏用白礬
藍豬牙皂角細茶香附子川芎細辛等分為末葱白
同研傅顖午妙

消風散　治脫熱胎風大熱痰涌氣上攻頭目昏痛壅
背拘急肢疼目眩旋暈以致寒多叉皮膚頑麻瘙痒

瘾疹小兒虛風
茯苓　川芎　羌活　荊芥穗
防風去蘆　藿香　僵蠶炒　蟬蛻去足
甘草炙　厚朴製　陳皮去白各等分
右為末每服五分茶清調下薄荷湯亦可急慢驚
風乳香荊芥湯調下或加雄黃名雄風散

薄荷湯　治鼻塞不通及夾驚傷寒極熱變蒸
薄荷葉去梗　羌活　全蝎　麻黃去節
甘草　僵蠶炒各　天竺黃　白附子各二錢半炮
右為末薄荷湯調下熱極生風加竹瀝少許一方
有柴胡白芍桔梗茯苓無全蝎僵蠶天竺黃白附

張渙辛夷膏　治鼻塞不通
辛夷葉洗焙乾一兩　細辛
香白芷　木香各半兩
已上搗羅為細末次用
杏仁一分湯浸去皮尖研
右件用羊髓豬脂各二兩同諸藥相和於石器中
慢火熬成膏赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢拌
勻每用少許塗鼻中乳哺下要兒臥乃吹著兒顖
鼻塞者只塗顖上

[illegible]方　治顖開不合鼻塞不通
右以天南星大者一枚微炮為末以淡醋調塗
緋帛上以貼顖上炙熱手頻熨之

張氏治小兒鼻塞方
右以槐葉為末用乳母唾調塗顖上

吉氏葱涎膏　治兒生三五日鼻塞氣急飲乳之時
啼叫不止
葱葉　豬牙皂角去皮
右爛研同皂角末成膏貼顖門上

[illegible]散　治小兒鼻塞不聞香臭

龍腦(細研)　瓜蒂(十四枚)　赤小豆(廿粒)
黃連(一大分去鬚)
右件藥搗細羅為散入龍腦研令勻每夜臨卧時
以菉豆大吹入鼻中每用有少許清水出為効
張渙滴鼻膏　治鼻齆病
瓜蒂(半兩)　附子(去皮臍生用)　赤小豆
細辛　甘草(炙各一分搗羅為末)
右件入龍腦一錢研勻煉蜜和丸綠豆大內鼻中量
鼻之大小
右二方前一方有熱者宜之後一方有寒者宜之

流涕第(六)　聖惠夫肺氣通於鼻若其臟為風冷所傷
冷隨氣乘於鼻故使液涕不收也夫津液涕唾得熱
則乾燥得冷則流溢也
張渙菊花散　治鼻寒多涕等病
甘菊　防風　前胡(各一兩)
細辛　桂心(各半兩)　甘草(一分)
右件搗羅為細末每服半錢研入乳香少許煎荊
芥湯調下乳後
聖惠菊花散　治小兒腦戶傷於風冷鼻內多涕精
神昏悶

甘菊花　白朮　細辛
白茯苓　甘草(炙微赤剉)　防風
人參(各一分去蘆頭)
右件藥搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生
薑少許煎至五分去滓不計時候量兒大小以意
分減溫服
嬰孺方芎藭散　治證同前
芎藭(半兩)　甘菊花　白朮
防風　人參　細辛
白茯苓　甘草(炙各一分)
右件藥搗羅為散每服一錢以水一盞生薑少許
煎至五分去滓溫服

鼻乾第(七)　聖惠夫小兒肺臟壅滯有積熱上攻於腦
則令腦熱也又肺氣通於鼻主於涕若其臟有熱則
津液乾燥故令無涕也
聖惠木通散　治小兒腦熱無涕口乾心躁眠卧不
安
木通(剉)　麥門冬(去心焙)　川升麻(各半兩)
知母　犀角屑　甘草(炙微赤剉)
杏仁(湯浸去皮尖麩炒微黃各一分)　梔子仁(三枚)

右件藥搗羅爲散每服一錢水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小加減溫服
張渙犀角升麻散 治腦熱肺壅鼻乾病
犀角屑一兩 川升麻 馬牙硝
黃連各半兩
已上搗羅爲細末次用
朱砂半兩細研水飛 牛黃 龍腦各一分細研
右件藥都研爲細末每服半錢溫蜜湯調下乳食後
萬全方麥門冬丸 治小兒心肺壅熱腦乾無涕時
有煩躁
麥門冬去心焙一兩 龍腦細研半分 甘草炙
牛黃細研入各分 黃連 赤茯苓
犀角屑 粉霜 朱砂
馬牙硝各明 生乾地黃 子芩各半兩
右件藥搗羅爲末入研了藥都研令勻每服半錢
以溫蜜湯調下
鼻中息肉 千金翼論曰凡人往往有鼻中肉塞眼食
皆不快利俗方中諸息肉方亦衆而用之皆無成
効惟見本草云礬石主鼻中息肉此言不虛但時人
不知用雄黃之法肉若牛用故彼因藥留有一人患
鼻不得喘息余以故方中以雄黃著肉一大塊消入消下
日肉塞自出當時即得喘息更不重發此鍊雄黃法
作千金翼作門名中具有之宜旁求也明有神驗
千金治小兒鼻塞生息肉方
通草 細辛各一兩
右二味搗末取末如豆以綿裹頭內鼻中日二
千金翼治鼻中息肉塞鼻不得喘息方
取細辛以口濕之唾頭內鼻中傷肉四畔多著日
十易之滿一十日外以
藜蘆一兩 松蘿半兩
右二味搗篩以綿裹如棗核大內鼻中日五六
易之滿二十日外以吳白礬上上者二兩瓦坏裏
燒令汁盡中燒之研瓦碗取搗篩以面脂和如
棗核大內鼻中日五六易更和不得頻和二十
日劑乃若慎行作另及膘蒜麵百日
千金翼治鼽鼻有息肉不聞香臭方
瓜蒂 細辛各半兩
右二味爲散絮裹豆大塞鼻中須臾即通
聖惠 嬰孺方治小兒齆鼻
雄黃 黃丹各半 用蒸根水調傅

或用茵蔯半葉酒蒸為末調服解食毒
間砭法之者是也
薛氏云身色赤乃脾胃實熱也用瀉黃散微赤乃脾經虛熱也用異功散加升麻柴胡色深黃用濟生犀角地黃湯後用楊氏地黃散淡白色用六君子湯

楊氏地黃散　治榮中有熱肺壅鼻衄

生地黃　赤芍藥　當歸身
川芎各等分

右每服二三錢水煎熟入蒲黃少許春夏衄入地黃汁蒲黃各少許秋冬衄用車前子汁少許

龜胸

錢肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸又乳母多食五辛亦成　張乳母乳兒常捏去宿乳夏常洗乳淨捏去熱乳若令兒飲熱乳損傷肺氣胸高脹滿令兒胸高如龜乃名龜胸　曾氏云胸飲聚積心胸再感風熱肺為諸臟華蓋居於膈上水氣泛溢則肺為之浮日久凝而為痰停滯心胸兼以風熱內發其外證唇紅面赤咳嗽喘促致胸骨高如覆掌名曰龜胸治法寬肺化痰利膈以降肺經痰飲先用五苓散和寬氣飲入薑汁葱湯調服次清肺飲雄黃散碧玉丸為治　若投前藥愈而復作衝變目睛直視痰涎上湧發以發搐則難治矣　薛氏曰龜背多因小兒元氣未充腠理不密風邪所乘或痰飲鬱結風熱交攻而致法當調補血氣為主而以清熱消痰佐之若因乳母膏粱厚味者當以清胃散治其母子亦服少許

聖惠大黃丸　治龜胸肺熱壅滯心胸滿悶

川大黃七錢微炒　天門冬一兩焙　百合
杏仁麩炒　枳殼　桑白皮

甜葶藶隔紙炙　川朴硝各等分

右爲細末蜜丸如菉豆大不時温水研五丸量兒大小加減　幼科類萃去朴硝加百合石膏

張氏百合丹　卽大黃丸加減

百合一兩　川朴硝　杏仁湯浸去皮尖

桑根白皮　木通　川大黃

天門冬去心各半兩

右爲極細末煉蜜和如黍米大每服十粒米飲送下量兒大小加減

附五苓散見驚　寬氣飲見驚

清肺飲見咳嗽　雄黃散見驚

碧玉丸見咳嗽　如聖膏見喘

附治小兒龜胸方

蒼朮　黃蘗酒炒　芍藥酒炒

陳皮　防風　山查

威靈仙　加當歸一錢又利後加生地黃

右爲末煉蜜丸食後温水下

外治法　龜尿摩胸骨上瘥

灸法　田氏取兩乳前各一寸五分上兩行三骨縫間六處各三壯炷如麥春夏從下灸上秋冬從上灸下

一寸艾炷如小麥大三五壯卽止此法累用十有二得效亦無全効之功

世龜背在百日內不治

龜背

聖惠云兒因生下客風吹脊風氣達髓使背高如龜雖有藥方多成痼疾以灸法爲要（張渙）依兒生下客風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿點節骨取尿之法當安龜在蓮葉上後用鏡照之其尿自出以物盛之 張渙兒生後一百八十日始髓骨成方能獨坐若強令兒坐之太早即客風吹脊兒背及脊至骨傳入於髓使背高如龜之狀以松蘂丹療之

張松蘂丹 治龜背病 （聖惠）【兩】幼科方 全三

松花（洗焙） 枳殼（去穰麩炒） 獨活
防風（去蘆叉各一兩） 川大黃（炮） 前胡
麻黃（去根節） 桂心（各半兩）

右爲細末煉蜜和如黍米大每服十粒粥飲下量兒大小加減 聖惠麻黃丸多朽藥少前胡一兩方多檳榔訶皮（一方無松花有當歸煨麵糊丸）名枳殼防風丸

聖惠灸法當灸第三椎骨節下兩旁各一寸半肺俞穴又第五椎骨節下兩旁各一寸半心俞穴又第七椎骨節下兩旁各一寸半膈俞穴以小兒中指節爲一寸艾炷如小麥大三五壯即止此法累用十有二二得效亦無全效之功（鐵郎綱因得成良之係 紹熙辛亥春灸即効）

但龜背在百日內不治

脫肛

肺與大腸為表裏肛者大腸之門肺實熱則閉結不通肺虛寒則腸頭出露有因痢久裏急後重努力肛開為外風所吹或伏暑作瀉腸滑不禁或禀賦怯弱易於感冷亦致大腸虛脫凡小兒所患瀉痢皆因暑濕風熱乘脾胃虛而得蓋風屬木木勝則制土土主脾胃虛而受制又濕熱傷脾因虛受濕不能分別清濁水穀交雜則為洞泄洞泄既久大腸亦虛大腸乃手陽明燥金而土虛不能生金金氣既虛則傳送之道亦虛又為風冷所襲故肛門脫而不收法宜補脾温胃使金得受母之益而氣實宜藿香飲[illegible]木散[illegible]主之次則內投固腸之劑用健脾飲[illegible]蒼朮[illegible]服兼外以敷貼之法用伏龍肝散傳之及蓖麻膏貼顖門使引氣上令其自收如收盡仍以[illegible]及有邪熱積滯於大腸未經疎滌[illegible]此證[illegible]肛門色紅而軟[illegible]脈浮數右手指紋[illegible]有熱時或煩躁先以清肺飲[illegible]解[illegible]次用薄荷散[illegible]此散為治[illegible]飲亦佳 曾氏云實熱則大便祕結虛寒則肛門脫出此多因上焦[illegible]

八十五

氣虛肺[illegible]也用補益氣或四君子[illegible]作[illegible]血虛而有熱也用補中益氣湯[illegible]以四物[illegible]皮[illegible]或作痛者氣虛而有熱也[illegible]以四君[illegible]皮大凡手足指熱者屬胃氣熱[illegible]湯[illegible]方治脫肛大腸自肛門出[illegible]令[illegible]上此因瀉痢得之者亦可服[illegible]然後用[illegible]等藥又有用一味五倍子煎湯入朴硝薰洗而縮者又有用蒲黃[illegible]細以[illegible]傅肛門上而入者全嬰方用澁腸散[illegible]痛者用黃丹滑石等分[illegible]用[illegible]半錢片腦半字[illegible]調傅[illegible]黃連解毒湯亦可服用苦參湯洗亦效[illegible]白礬[illegible]傅上更用荊芥防風等[illegible]洗之[illegible]者効

八十六

[illegible]張渙[illegible]丹 治小兒久痢頻併大腸虛冷肛門脫出

白龍骨[illegible] 鱉甲[illegible] 蝸牛皮[illegible]

磁石[illegible] 蝌蚪[illegible]

黃連[illegible]各半兩

右[illegible]為末[illegible]飯[illegible]如黍米大每服[illegible]

粥飲下量兒大小加減乳食前

妙應散

黃蓓子（炒令微黃色） 天南星（炮裂）

上搗羅為細末每服入 白麪 龍骨半兩

右件搗羅為細末每服一字米飲調下乳食前

曾氏蛇蛻散 治腸頭脫肛

蛇蛻（和皮） 當歸 補骨脂（去毛）各一錢 側柏根（半兩）

甘草（半錢）

右件為末每服二錢水一盞入無灰酒少許煎七分

空心溫服或無時

嬰孺 六物竹丸

聚寶方豆蔻丸 治諸痢脫肛

肉豆蔻 紫蘇子

右一味為末每服二錢 痢熱酒調下三服必效

白痢煩渴破取仁子碎於銀器中慢火炒黃褐色

碾細羅一兩過後若帶白者內炒褐色為末研蒸

餅為浸卻握乾和圓如豆大曝焙乾每服十五丸

至二十丸食米飲溫下空心食前服病差即止

毒五痔小兒脫肛亦可漸下內調下立愈

李先生方用破故紙一兩為末炒乾為末每服一錢

空心溫米飲調下 日三服

嬰孺用黃連黃檗二味為末蜜丸如麻子大飲下三丸

日三四服

莊氏用乾蓮花為末米飲調下一二錢

湯氏治大腸虛滑肛門脫下方

龍骨 訶子（煨去核） 沒石子（大者）

罌粟殼（去頂炙黃）各壹兩

右為末白湯點服仍用葱白湯薰洗令軟款款以手

托入用木賊燒灰存性以麝香之氣上即用脚布疊

數重按定使藥氣上透不可過熱令病者以臀坐

於布上如常出血遂灰燼以常得溫熱為度

嬰孺 縮砂丸

常服前藥

懷古五倍子散 治小兒脫肛

五倍子 地榆 各等分

右為細末每服半錢或一錢空心米飲調下

錢氏赤石脂散 治小兒因痢後努躽氣下推

出肛門不入（躽音建反用力努氣也）

真赤石脂 伏龍肝 各等分

右為細末每用五分傅肛頭上頻用按入

曾氏蟠龍散 治陽證脫肛

乾地龍蟠 風化朴硝

右剉焙研為細末仍和合朴硝每用一二錢至三錢
肛門黏濕乾塗或乾燥用清油調塗先以見前
荊芥生葱煮水候溫浴洗輕與拭乾然後傅藥

伏龍肝散　治陰蝕脫肛
伏龍肝一兩　鱉頭骨一具　百藥煎二錢半
右三味焙研為末每用一錢至三錢濃煎紫蘇湯
候溫和清油調塗患處並如前法浴洗拭乾方上
藥

治小兒脫肛用五倍子為末量多少摻患處以物
手按入切忌食發風毒物

王氏　外科九　全九
脫肛治法用蒲黃一兩猪脂二兩煉豬脂和蒲黃塗
寄金腸頭上即縮入

木聖散　治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少焙
為細末乾貼患處

澀腸散　治小兒久痢大腸頭脫出不收
訶子炮　赤石脂　龍骨各等分
右為末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛按入又治
痢米湯調又方治脫肛五倍子焙為末入茶依前
方用

[illegible]膏　治隨腸番花鼠妳等痔熱痛不可忍或已
成瘡者並皆治之
片腦　風化硝
右件各半字用好酒少許研成膏子塗之隨手取
愈

治大人小兒脫肛不收方連翹不以多少洗淨為細
末先以鹽水洗後用藥末時時乾傅脫肛上立差

蓖麻膏　治采患脫肛
蓖麻子壹兩
右件爛杵為膏捻作餅子兩指寬大貼顖上如陰
證脫肛加生附子末葱蒜同研作膏依前法貼之

虎肛　外科九
朱氏家傳治小兒脫肛方
治用磁石以石碾為末麪糊為丸如菉豆大每服
米下五七丸後以磨刀水洗脫肛處立效
脫肛用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後熏上

保生信效　治久痢腸脫肛漏腸出不收至有出數
寸者若楚良極小兒久瀉痢亦名此疾
右先用五倍子四兩以水浙升煎湯一兩沸投入
朴硝四兩通手淋洗至水冷即止若覺熱痛即津
唾調龍腦塗之痛便止當漸收甚者不過淋洗三
五次收盡爲效此藥朴硝能軟五倍子能收二物

柱須以爲用也或更以乾蜘蛛一枚搽之更熱以熨
帛揾入尤妙 搽蜘蛛劉氏方劑
九籥衛生療小兒脫肛方
香附子　荊芥穗各等分
右同爲麤末每用三匙水一大椀煎十數沸淋洗
苦參湯　治脫肛者有效
枳殼　黃連　大黃
甘草　荊芥　苦參
赤芍藥　黃芩各等分
右剉散每用五錢以東南桃枝子芽五個同煎熏洗
八 幼廿九　九十一
灸法　小兒脫肛瀉血秋深不差灸龜尾一壯炷如小麥大
在脊端窮骨也　小兒脫肛者灸臍中三壯　小兒脫
肛久不差及風癎中風角弓反張多哭言語不擇發
無時節甚即吐沫者取百會一穴灸七壯在鼻直入
髮際五寸頂中央旋毛中可容豆炷如小麥大

論小兒肛痒或啖甘肥大腸濕熱壅滯或濕毒生蟲
而蝕肛門若因濕熱下注用四味肥兒丸大便秘
結者用清涼飲熱甚蝕肛門者用化䘌丸後用四味
肥兒丸外以爛艾治濕內若因病不食蟲無所養
而食臟食肛者其齒無色舌上盡白四肢倦怠其
上唇內有瘡唾血如粟心內懊憹此蟲在上食臟若
下唇內有瘡此蟲在下蝕肛門若蝕肛透內者不治
諸蟲惟上半月頭向上可用藥追之望後頭向下爲
患尤當禁食香味蟲頭即向上矣後用藥追之
八 幼廿九　九三
兒諸疳皆緣甘味患疳余謂當禁其厚味急用清胃
之藥以治其積熱不從乃用敷藥以治其外更肛門
作痒發熱瘡益甚頹體骨立飲食少思遂用九味蘆
薈丸清五味異功散加柴胡升麻尋愈　一兒肛
門作痒耳前後結小核如貫珠隱於肌肉之間小便
不調面色青此肝經之火爲患用九味蘆薈丸爲
主佐以五味異功加山梔柴胡又以加味逍遙散兼服
加味歸脾湯服而愈　一兒十三歲肛門作痒或脫
出或大便血遍身生瘡發熱作渴頭大青筋用大蘆

薈丸乃以異功散且病漸愈佐以補中益氣湯熱消
漸止肛門悉愈又用異功散爲主佐以補中益氣湯
虛熱加吳茱萸所製黃連治之而血愈　一兒十五歲
兩目白睛多身似疥非疥肛門作痒晡熱口渴形體
骨立余以爲肝疳之證也用六味地黃丸而痊後陰
莖作痒小便澄白服蟾蜍散肛門腫痛服大黃等藥
肛門脫出作痒不可忍亦用瀉火之藥不應下唇內
生小白瘡余以爲蟲蝕肛門用九味蘆薈丸而愈
一小兒肛門作痒發以爲疳服槐角丸等藥肢體消
瘦鼻下濕爛下唇內生瘡此蟲蝕下部也先用化蟲
丸二服乃用五味異功散四劑却用大蕪荑湯四
味肥兒丸而痊　一兒七歲飲食過多即作瀉面青
黃色服峻利之劑余謂當節飲食健脾胃爲善不信
後牙齦赤爛肛門作痒服清熱之劑腹痛膨脹復請
欲用前劑余曰此元氣虧損虛火上炎也仍不信後
腿闊黑腐余曰此脾氣太虛肉死而不知痛也明矣
後雖信余已不救矣若初用五味異功散健脾胃爲
主佐以大蘆薈丸四味肥兒丸清脾淤熱豈有不治
之理哉後之患者審之　一小兒肛門作痒屬大腸
經風熱用槐角丸而愈　一小兒肛門連陰囊痒生

水淋濕俗肝經濕熱也用龍膽瀉肝湯九味蘆薈丸
治之而愈　一小兒嗜甘肥肛門作痒發熱作渴雜
用清熱之劑腹脹少食鼻下生瘡余謂脾胃濕熱生
蟲也不信後下唇內生瘡先用四味肥兒丸諸證漸
愈又用大蕪荑湯治之而痊

化蟲丸　治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹
痛唇口紫黑腸頭濕䘌

蕪荑　青黛　蘆薈
蝦蟆燒灰　川芎　白芷
胡黃連各等分

右各另爲末猪膽汁糊丸如麻子大每服二三十
丸食後并臨卧杏仁湯下

雄黃散　治走馬疳牙齦蝕肛門

雄黃　銅綠各二錢

右爲末搽患上

腎

錢氏腎主虛　無實也惟痘疹腎實則黑陷　兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱即解囟開面色㿠白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜于下而身縮也腎者陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之心氣熱則上竄宜導赤散[illegible]腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者腎病退重者悸動當搐　[錢]腎主寒自病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實小兒痘疹變黑陷則是腎實水剋退心火　心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之　肺乘腎虛邪喘嗽皮膚寒百部丸主之　肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中丸主之　脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之　劉五行之中惟有腎之一臟母能而子反受邪何則肺屬金射於皮毛所主者氣腎屬水主於骨所藏者精氣之輕浮能上而不能下精之沉重能下而不能上此物性之自然今痘之疏密雖之作而發上於肺則不能下生於腎而腎受邪[illegible]肺氣者和而後可此腎病必先求之於肺次脾臟皮和而腎忽然受病者不過肺之濕抑則於腎而生疾所以有解肺熱去脾邪兩藥若肺脾兩臟俱和而腎自生疾亦察其本臟而治之　[錢]腎下竄[illegible]足不喜覆者蓋膝以下皆腎所主乃心氣下行於腎部也法用地黃丸壯腎水以制心火若因肺脾虛而不能生腎水者用補中益氣湯六味地黃丸以滋化源其痘疹黑陷乃腎虛而邪氣實也亦當用地黃丸

地黃丸

熟乾地黃八錢　山茱萸肉　乾山藥各四錢
澤瀉　牡丹皮　白茯苓去皮各三錢

右為末煉蜜和丸如桐子大三歲已下一二至三丸空心溫水化下

或問錢氏地黃丸補腎又曰補肝何也曰煞手厥陰心主包絡足厥陰肝經俱治在下焦經云不足者滋其化原故肝腎之病同一治法此地黃丸補二經之意也　海藏云若加五味為腎氣丸此滋肺之源以生腎水

薛前丸治腎肝血虛燥熱作渴小便赤秘痰氣上壅或風客淫氣瘰癧結核或四肢發搐眼目瞤動

子111 019

或咳嗽吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或自汗盜汗便血諸血或禀賦不足肢體瘦弱解顱失音或畏明下竄五遲五軟腎疳肝疳或早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬肝腎諸虛不足之證宜用此以滋化原其功不可盡述

海腎實須瀉瀉之腎本無實不可瀉 錢氏止有補腎地黃丸無瀉腎之藥 治脉洪而實 錢氏地黃丸加生地黃去山茱萸是也此治左手寸部脉實若右尺洪實以鳳髓丹瀉之 鳳髓丹見雜病遺精門

解顱顖陷顖填總論

萬全方云小兒有解顱候有顖不合候有顖陷候此三者大同而小異也解顱者謂小兒年長顱應合而不合頭縫開解是腎主骨髓腦為髓海腎氣不成則髓海不足故骨縫開解也其顖不合與顖陷雖因臟腑有熱熱氣上衝致顖或不合或陷然亦本於腎氣不足也 按腎主骨骨氣實則腦髓充而顖早合骨脉盛而齒早生骨氣怯則腦髓虛而顖不合此由父母精血不足宜用地黃丸補之若在乳下當兼補其母更以軟帛緊束其首使其易合皆虛火上衝當 地黃丸見[illegible] 幼科卷九 消補脾腎然亦有顖填顖陷亦因所禀腎氣不足及乳哺失宜脾胃虧損所致夫脾主肌肉氣逆上衝而為填脹元氣下陷而為顖陷也並用補中益氣湯地黃丸及用狗頭骨炙黃為末以雞子清調敷顖門亦有瀉利氣血虛脾胃不能上充者亦用前法若手足並冷前湯加薑桂未應虛寒甚也急加附子緩則多致不救

張渙嬰兒解顱顖顖不合顖填顖陷下不[illegible]皆由腎經

張渙[illegible]用封顖散方

蚍蜉灰 防風 川大黃

白芨 各等分

右件碾為細末入青黛半兩同研勻每用末錢以豮豬膽汁調勻用一紙頭子攤之四邊回合各留少白紙用淡生醋麪糊貼顱上不住以溫水潤動一伏時換

解顱 顖不合

初虞世云父精不足則解顱眼白多 錢解顱生下而顖不合腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多㿠白色瘦者多愁少喜也餘見腎虛 湯解顱者顖大頭縫不合如開解故曰解顱此由腎氣不成故也[illegible]凡得此者不過千日其間亦有數歲者乃廢人也人之無腦髓如木無根才人雖有良方吾所以[illegible]宜依錢氏補[illegible]一有可生之理[illegible]黃 曾凡得此六[illegible]一百證不及千日之內間有數歲者偶因他疾攻激遂成於人若氣色精明能飲食者多服調元散補腎地黃丸俗用囟顱見效者必須調理或有可治者投藥後如故亦難療矣 回解顱治法宜用生地散 丹小兒解顱乃是母氣血虛與熱多耳用四君子四物有熱加酒炒黃連生甘草煎服外以縣米緊用白斂末傅之

錢氏地黃丸 見前腎

天南星散 治囟開不合鼻塞不通天南星大者微炮去皮為細末米醋調絹帛上貼顖上炙手頻

參之立效

調元散 主禀受元氣不足顱顖開解肌肉消瘦腹大如腸致語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲服之効

乾山藥五錢去黑皮 人參去蘆 白茯苓去皮
茯神去皮木 白朮 白芍藥
熟地黃酒洗 當歸 黃芪蜜水炙各
川芎 甘草各二錢半 石菖蒲二錢

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時溫服 若嬰兒幼嫩與乳母同服

[illegible]顱玉乳丹 治嬰兒頭骨應合而不合頭縫開解

鍾乳粉依古法煉者 柏子仁別研 熟乾地黃依法蒸焙者各
當歸去苗洗焙乾各半兩 防風去蘆 補骨脂炒各壹分

戊加黃耆白茯苓

右件除別研者碾為細末次入鍾乳粉等拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒煎茴香湯下乳食前

嬰孺方狗腦丸 治小兒腦長骨𨇽頭解顱

狗腦壹個 [illegible]漆 [illegible]五加皮 甘草炙
白朮 防風 鍾乳石
乾地黃各壹分 牛黃貳分

右以狗腦丸小豆大一歲飲下二丸日再未知加之又云兒顖常令煖冷即病死

小兒顖顱藥

芍藥粉

右取黃雌雞臨兒顖上刺其冠以血滴顖上血止以芍藥粉傅之使血不見一日立差

治小兒解顱虎骨方

虎骨 敗龜版 不灰木
乳香各半兩

右為末用生豬血於手心內調塗在頭縫開處以舊絹子包裹七日第八日以葱湯水洗去前藥再用此藥塗之經年者已效一分又數三日方再用藥塗之又服參苓散

人參 茯苓 白附子炮
羌活 甘草炙 芍藥
白朮 犀角屑 京芎
藿香 以上各壹分後叁味減半

右為末每服半錢水一盞用少金銀同薄荷三葉煎至三分溫服通驚氣

金治小兒顖開不合方

防風（去蘆）　栢子仁　白芨（各等分）

右三味末之以乳和傅顖上十日知二十日愈

一

莊氏家傳方治顖縫不合

山茵蔯（壹兩）　車前子　百合（各半兩）

右為末用烏牛乳汁調塗脚及顖縫上用帛子裹頭三日一換五上必効

王氏封顖散　治顖開不合頭縫開張頭開啼陷咳嗽鼻塞

栢子仁　防風　天南星（各四兩）

右為細末每用一錢以猪膽汁調匀稀稠得所攤在緋絹帛上看顖子大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤動

三辛散　治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解顱

細辛　桂心（各半兩）　乾薑（一錢半）

右為末以薑汁和傅顖上貼之兒面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傅頂上日三四度曾有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良法也

灸法臍上臍下各五分各灸三壯灸瘡未發先合

顖陷

錢氏云小兒臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顖陷如坑不能平滿也理宜用當歸散方見上 地黃丸見前

若顖陷者虛之極也胃氣虛寒則顖陷慢驚中有之用寒掉固中湯若為虛極為以金液丹固真湯見慢驚

又治後元之外則以烏附膏 有後枕陷者其治尤重治法以顖陷藥同不效亦為難療此太虛極百無一活耳

顖陷 方見

百五

烏附膏 理顖門陷

綿川烏生用 綿附子生用各伍錢 雄黃貳錢

右件為末用生葱和根葉細切爛杵入前藥末同煎作心作成膏貼陷處

生乾地黃散 治小兒臟腑壅熱氣血不榮致顖陷不平者

生乾地黃貳兩 烏雞骨壹兩酥炙令黃

右搗細羅為末不計時候以粥飲調下半錢

又治小兒顖陷方

右取猪牙車骨髓煎如膏塗顖上瘥

又方以狗頭骨炙令黃搗羅為末以雞子清調塗

又方以天靈蓋炙令黃搗羅為末以生油調塗

下令小兒顖陷灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

顖填

顖填者顖門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝爲之填脹顖突而高如物堆起毛髮短黃而細是也若其氣上衝則牢鞕[illegible]熱氣上衝即柔軟又小兒脇下有積有痰且喘而氣上逆者喘甚久其氣未定因而乳之者肝氣盛風熱上衝者皆能令顖填當一一審其因而治之寒者溫之熱者涼之氣上逆者抑而降之肝氣盛者瀉青爲主熱盛裏多實

用龍膽湯表多柴胡散虛者以補中益氣湯送下地黃丸神而明之存乎其人言不盡意　閻世言顖腫皆以爲熱殊不知有陰陽二證切宜詳辨堅硬爲陰氣嗽爲陽證要孩實[illegible]寒氣上衝則牢鞕熱氣上衝則柔軟正此之謂若陰證以勻氣散理中湯主之陽證用玉露飲當歸散防風湯爲治　玉環集歌曰顖門腫起定爲風此候應須也不中或若加坑如盞足七日之間命必終　石壁經歌曰積聚脾中熱不通致令面赤口唇紅胸高夜嗽多腹脹休使流傳肺有風狀驟作[illegible]上壅顖門腫起熱來衝[illegible]

靈丹能使三朝建有功　積有冷熱皆能作腫冷則發白或酸臭氣衝人亦有蟲出其食物皆不能化瀉肚痛而多困倦中多喘也熱則使多渴其糞赤面色亦黃赤口內臭氣亦盛當各看其證候調治且須分水穀去積消渴氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎且渴顖陷則冷也腫則熱也　積熱顖虛腫宜將時氣門中三十六種除濕散[illegible]白皮湯下　形證論云肺熱生風涎喘嗽胸脇將白丁香膏一二服或南星丸一二服便退　秘要指迷論方凡小兒生下一月內目或顖門腫此乃受胎熱氣即用黃蘗膏塗於足

心預其兒如肚腫即用牛黃膏[illegible]心此乃嬰兒腎流令氣散于心致令病生[illegible]

行遲

小兒自變蒸至能言隨日數血脈骨節備滿骨成即
[illegible]骨是稟受胎氣血不足者髓不充強故骨不
[illegible]歲不能行 錢氏凡兒生至周歲三百六十日膝
骨成乃能行近世小兒多因父母氣血虛弱故令胎
氣不強骨氣軟弱筋脈無力不能行步麝茸丹主之
曾當大効
[illegible]小兒稟受血氣不足者則髓不滿骨故軟弱而不
能行骨者髓之所養治法當用錢氏補腎地黃丸加鹿茸
加減服之骨得髓養生而骨強自然行矣外甥黃知錄之
子一歲不能行遂合此方服之有驗

麝茸丹 治數歲不能行

麝香 研　茄茸 酥炙黃　生乾地黃
虎脛骨 酥炙　當歸 洗焙乾　黃芪 剉

右件各等分為細末用羊髓煉和成膏如
黍米大每服十粒麝沉香湯下乳食前日三服

錢氏羚羊角丸 治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲
不能行宜補益肝腎

羚羊角 尖細而節密者　虎脛骨 醋炙黃
生乾地黃 焙　酸棗仁 去皮炒　白茯苓 各半兩
桂 去皮取有味者　防風 去蘆頭　當歸 同上
黃芪 蜜炙各一分

右同為細末煉蜜和成劑每服一皂子大兒大者
加之食前溫水化下日三四服久服取效

[illegible]地黃丸 治兒十歲不行

牛膝　當歸　防風
酸棗仁 微炒　白茯苓　黃芪
芎藭　羚羊角　羌活
甘草 炙微赤　桂心 各等分

右為細末煉蜜丸如麻子大食前溫酒下十丸量兒加
減

虎骨散

虎脛骨 酥炙　生乾地黃　酸棗仁 酒浸去皮
辣桂 去皮　白茯苓 去皮　防風 去蘆叉
當歸 去蘆　川芎　牛膝 酒浸焙各等分

右為極細末每服一錢以粥飲調次入好酒二
滴再調食前服日二三方用煉蜜丸如黍米大木
瓜湯下

五加皮散 治小兒三歲不能行者由受氣不足

腎力虛怯腰脊腳膝筋骨軟足故不能行用[illegible]
加皮爲末粥飲調下入好酒少許每服一粟殼許
日三服効　一方五加皮貳錢半木瓜壹錢貳分
半爲極細末用粥飲入酒二滴調服
[illegible]鶴膝兒背熱肺脉弱長不能行　顱顖兒自小傷抱
腳纖細無力行立不得或骨熱疳勞肌肉消瘦宜服
柴胡飲
柴胡　鱉甲米醋塗炙黃　知母
桔梗　枳殼去瓤麩炒　玄參
升麻
右件各等分細剉三歲已下藥半兩水五合煎二
合分二服空心食前後忌毒物　服後澡浴
浴方
苦參　茯苓皮　蒼朮
桑白皮　白礬各半兩　葱白少許
右剉以水二升浸藥一兩通與兒浴溫處避風
千金治數歲不行方
葬家未開戶盜食與哺日三便行[illegible]
寶鑑灸兩足踝各三壯
良方左經丸　治筋骨諸疾手足不隨不能行步

動[illegible]
草烏頭[illegible]　木鱉去殼　白膠香
五靈脂[illegible]　當歸[illegible]　斑蝥[illegible]
右爲末黑豆去皮生杵粉一斤醋糊丸雞頭實大
酒磨下一丸不曾針灸傷筋絡者四五丸必效才
歲兒一丸分三服此藥能通榮衛導經絡專治心
腎肝三經服後小便少淋澁乃其驗也　按此方
非內有污血瘀積不宜用
丁時發治大人小兒判骨行步艱難腳無力續命丹
防風　乳香　蔓荊子
牛膝　麻黃　羚羊角
酸棗仁　草烏頭去皮尖　沒藥
白朮　茯苓各貳錢半　天麻[illegible]
胡麻炒　當歸　續斷[illegible]
川烏頭去皮尖　黃芪各肆錢　蒺藜[illegible]
右爲細末蜜丸小彈大每服一丸煎湯細嚼一[illegible]
三五服後洗藥服藥三日方洗
草烏頭　當歸　地龍
木鱉子　紫貝草　椒目
葱鬚　荊芥各壹兩

右六味煎湯露腳指中從上淋洗次用熏法

柴胡　草烏頭　赤小豆

吳茱萸　羌活　硇砂各等分

右為末黑豆三升煮水滾少頃入黑豆入前藥末攪令八

熏腳閃處令出骨中汗

齒遲

齒者骨之所終而髓之所養也小兒稟受腎氣不足不能上營而髓虛不能充於骨又安能及齒故齒久不生也地黃丸主之　一小兒三歲言步未能齒髮尤少體瘦艱立發熱作渴服肥兒丸不應余曰此腎虛疳證也蓋肥兒丸脾胃經之藥久服則腎益虛其疳益甚不信牙髮漸落余用地黃丸加鹿茸五味子半載而元氣壯健　一小兒體瘦腿細行步艱辛齒不堅固髮稀短少用六味地黃丸補中益氣湯年餘諸症悉愈形體壯實

麝香附丹　治齒不生

大香附子揀淨研去皮　沉香各壹兩

雄鼠骨燒灰　乾蟾燒灰　檳榔各半兩

右件搗羅為細末用羊髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服十粒麝香湯下量兒大小加減

湯氏芎黃散　治小兒齒不生

大川芎　生地黃各半兩　山藥

當歸　甘草炙各壹分

右焙為末熱湯調服或時以藥末擦齒齦

子144 058

千金翼方 猪坑中竹木主小兒齒不生正旦刮
之即生
外臺小品又方 取雌鼠屎三七枚以一枚拭齒根
處盡此止二十一日齒當生雌鼠屎頭尖是也千
金同楊氏產乳方用三十枚仍云雌者用兩頭圓
者是
聖惠治小兒齒不生或因落不生方
右取牛糞中黑豆二七枚小開去頭上皮以此豆
點齒根上時時用之當効也

髮遲

巢氏云足少陰爲腎之經其華在髮小兒有稟性少
陰之血氣不足即髮疎薄不生亦有因頭瘡而禿落
不生者皆由傷損其血血氣損少不能榮於髮也
苣勝丹方 張渙 治髮不生
當歸 洗焙 生乾地黃 芍藥 各壹兩
苣藤 壹分研 胡粉 細研 各半兩
巳上搗羅爲細末次用
右件同研勻煉蜜和如黍米大每服十粒煎黑豆
湯下兼化塗揉頭上無妨量兒大小加減

千金治少小頭不生髮以楸葉擣取汁傅頭上立生
又方 燒鯽魚灰末以醬汁和傅
千金翼治髮漸不生方
先以醋泔清洗禿處以生布揩令火熱臘月猪脂
并細研鐵生煎三沸塗之日三遍
本草甑氣水主長毛髮 以物於炊飯時承取沐頭
令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺
有益好
小兒白禿髮不生擣楡皮末苦酒調傅

聖惠生髮神效黑豆膏　治小兒腦卅頭髮連根作穗了脫落不生無瘡白禿髮不生者並用生髮

黑豆　昌腸各六合　訶黎勒皮壹兩

右件藥搗羅爲末以水拌令勻內於竹筒中以亂髮塞口用塘灰內煨取油貯於瓷器中先以米泔皂莢湯洗頭拭乾塗之日再用十日髮生

又方

葛根末　猪脂　羊脂各壹兩

右件藥入銚子內以慢火熬成膏收於瓷合中每取一錢塗摩頭上日再用不過五七度効

一百七

香薷煎　治小兒白禿不生髮燥痛

陳香薷貳兩　胡粉壹兩　猪脂半兩

右件藥以水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂相和令勻塗於頭上日再用之

惠治小兒頭禿不生髮苦薜蔓菁散

右用蔓菁子搗爲末以猪脂調塗於禿處佳

又方貫衆燒灰細研油調傅

又方麻子一升熬黑壓取脂傅頭上良

又方鹽湯洗過生油和蒲葦灰傅之　鴈脂　熊白

桃葉汁皆可塗〻雞子黃熬取汁塗

髮黃

巢氏云足少陰腎經其血氣華於髮若血氣不足則不能潤悅於髮故髮黃也　錢氏曰小兒長大不行行則脚細齒久不生生則不固髮久不生生則不黑皆屬氣血虛也宜大劑補之

千金翼髮黃方

臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分傅之三日一爲取黑止

又方　以醋煮大豆爛去豆煎令稠塗髮

一百六

又方　熊脂塗髮梳之散頭床底伏地一食頃即出形盡當黑用之不過一升

安師傳治小兒髮黃極妙方

破故紙不討多少銀石器中慢火炒熟爲細末用地黃汁煎成膏和爲丸菜豆大每服十五二十丸鹽湯送下食前

清胃散　治胃火牙痛或連頭面

升麻 各分　生地黄　牡丹皮

黄連　當歸 各分

右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散　愚按前方治脾胃實火作渴口舌生瘡或唇口腫痛齒齦潰爛連頭面或惡寒發熱或重舌馬牙吐舌流涎若脾胃虛宜服之若因脾胃氣虛寒凉剋伐以致口舌生瘡或飲食少思或嘔

四味肥兒丸

大便不實流涎潰爛者用五味異功散

藁本散　治牙齒痛

蒼朮　白附子　川芎

甘草 各半兩並為細末　麝香 各壹錢研細　黄芩

蘆薈

右件都研勻每用一字塗搽患處

雄黄丸　治小兒牙齒黑蚛氣息疼痛

雄黄 壹錢　麝香 半錢

右為細末軟飯和為丸子安在牙內

又方　用後用……以火燒令

極赤……之如粉以臘月豬脂和傅齒齗上日三四

茅先生　小兒牙宣齒縫出血方

苦參 末壹兩　白礬

右為末二日三次揩牙上立效也

張銳雞峰方　治齒齦出血

右以竹葉不以多少不限濃煎取汁入鹽少許寒溫得所含之冷即吐了

又方　右用童子小便半升分為三兩次含之冷即吐了

湯氏麝香散　治小兒唇口臭爛齒斷宜露

麝香 一　雄黄 生　蘆薈

白龍骨 各壹錢　密陀僧 貳錢　石膽 生半兩

乾蟾 壹枚重半兩者入罐燒存性

右合研令極勻細先用綿子纏筋頭上以鹽礬漿水輕輕洗過然後上藥

治齒齦痛　千金翼方

生地黄　獨活 各叁兩

右二味切以酒漬一宿含之

又方　常以白鹽末封齒齗上日三夜二

又方　用大鵰砂研細水化雞羽掃之
聖惠方云手陽明足太陽之脉並入於齒風氣入其經脉與血氣相搏齒齦腫痛膿汁出謂之風䘌
千金翼治齒䘌方
右以白馬懸蹄内孔中塞之不過三度　聖惠方
聖惠蝦蟆散　治小兒齒痛風䘌連頰微腫
乾蝦蟆 壹枚　青黛 細研　用丁皮
白雞糞　蘆黃 已上各壹分
麝香 細研　乾薑 炮裂剉各半分
右件藥搗細羅為散都研令勻以薄綿裹少許内齲齒孔中日一易之
又方
白附子　藁本　細辛
蓽茇　莽草 已上各二兩
右件藥搗細羅為散以薄綿裹少許着齲齒上
治小兒齲齒風疼及蟲蝕疼痛方
乾蝦蟆 燒灰一枚　青黛 壹分　蘆薈 半分
右件藥同研令細以生地黃汁調塗於齒上
治小兒風齲齒痛及蟲蝕疼痛方
青黛 細研　雄黃　藁本

又方　扣齒三百下日一夜二即終身不發至老不病齒
又治齒牙根搖欲落方
右以生地黃大者一寸綿裹着牙上嚼咽汁汁盡去之日三即愈可十日含之更不發也
又齒搖疼方
松葉 一握　鹽 一合　好□ 三升
右三味煎取一升含之
治齒根空腫痛困斃無聊賴方
獨活 肆兩　酒 叁升
右二味於器中漬之塘火煨之令暖稍稍沸得半去滓熱含之不過四五度
又方　燒松節槐枝令熱柱病齒孔須臾蟲緣枝出
又治牙齒疼痛方
杏仁 一百枚去皮尖雙仁者　鹽末 方寸匕
右二味以水一升煮令沫出含之味盡吐却更含不過兩三度
發生必用治小兒牙方
牛蒡子 一分炒香　乳香 壹錢
右為末入白麵少許温水調塗

細辛　雄黃一分細研　麝香少許細研

右件藥擣羅令細同研令勻旋取少許貼於齒上

又方　以郁李根白皮五兩剉以水一大盞半煎取一盞熱含冷即吐之蟲出

又方　以皂莢炙去皮子搗末取少許著齒痛上差

又方　以松脂銳如錐注蟲孔內須臾蟲緣松脂出即差

又方　以雞舌香十兩以水一中盞煎至六分去滓熱含冷即吐

千金翼治蟲蝕齒疼痛方　一方無

右閉氣細書曰兩分作九南方赤頭蟲飛來入某姓名裂齒裏今得蠍蟲孔安置耐居上急急如律令小成紙內著屋柱北邊蠍蟲孔中取水一杯禹步如禁法還誦上文以水沃孔以淨黃土泥之勿令泄氣永愈

又治蟲蝕齒根肉黑方

右燒腐棘取脂塗之十遍雄黃末傅即愈若齒黑者以松木灰揩之細末雄黃塗齦百日日再塗之七日慎油豬肉神効

又治齒蚛方

右以槐一枚令病人踏坐齒痛處以膝上引兩手掌使病仟于帥中指參中指頭橫一一燒兩處一時下火病人口稱咒曰　瘦牙蟲名字鵲莫瘦牙莫齧骨灸人亦愈之

又治齲齒方

右以腐棘針二百枚以水二升煮取一升含漱之日四五差止

又方　取死曲蟮末傅痛處即止

日華子治小兒齒蛀牙方

右濕煎郁李仁水含之　兩分作丸

聚寶方龍骨散　治齒齦有蝕有蟲子不合者　一方無

龍骨（上龍骨者布之赤黃色粟粘人舌者是）　白礬灰　蝸牛殼　南粉　牛黃各一錢

右五味為末每用少許貼齒孔內時時用之

齒落不生千金方

右以牛屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度即生

經驗方　治小兒大人多年牙齒不生

右用黑豆三十粒牛糞火內燒令煙盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生齒處令血出

末少許揩不得見風忌酸鹹物

聖惠方治齒落久不生方

右取路傍遺却稻粉以傅落處然二七日其齒自生出効

聖惠方治大人小兒生齒神効方

右用雄鼠脊骨各一四粒焙乾同研如粉入麝香少許仍先以針挑破損處令血出將散子傅之年高者不過二十日生年少者十日不計傷損及少自退落並自生

得效方 牙齒因打 金治失欠頰車蹉閃不合方 出外科九 出直指

右用一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出指恐誤嚙傷人指也

又方 消蝋和水傅之

又方治舌腫急口噤引舌不轉方

牡蠣 煅　伏龍肝　附子 炮去皮

礬石 煅

右四味等分末之以白酒和為泥傅其上乾則易之取差止

千金灸法失欠頰車蹉開張灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝二穴 在胸前喉下甲骨中是穴

名氣堂

又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報

此三陰交穴也

耳

聖濟云小兒耳中者病由風入於腦停積於手太陽之脈則令耳聾風與氣相搏則耳中生瘡又兒稍大見耳初生以手指之則耳下生瘡者名月蝕瘡又乳母與兒洗浴誤令水入耳中水濕停積搏於血氣蘊結成膿謂之聤耳 一云耳者心腎之竅肝膽之經也心腎主內症精血不足肝膽主外症風熱有餘或聾聵或蟬鳴者稟賦虛也或脹痛或膿痒者邪氣客也稟賦不足宜用六味地黃丸（方見腎）肝經風熱宜用柴胡清肝散若因血燥用梔子清肝散（發熱）未應佐以六味丸間服九味蘆薈丸（方見）若因腎肝疳熱朝用六味丸夕用蘆薈丸若因食積內熱用四味肥兒丸（方見）若因乳母膏粱積熱而致者宜加味清胃散（齒痛）肝經鬱結而致者加味歸脾湯（健忘）肝經怒火而致者加味逍遙散（虛熱）皆令乳母服之兼須其兒少許不可專於治外不惟閉塞耳竅抑亦變生他證延留日久遂成終身之痼疾矣 寶鑑歌云太陽入耳損聰聽氣滯聤多耳必聾鳴是風并熱相搏爲膿腫有邪屬熱積結聤耳邈日深終身聾閉不能聽此患只因滴水入其中

耳聾 巢氏云手太陽之經入於耳內頭腦有風入乘其脈與氣相搏故令耳聾

聖惠治小兒風熱兩耳聾鳴方

遠志（去心） 甘草（炙微赤銼） 柴胡（去苗）
菖蒲 各壹分 磁石（壹兩搗碎水淘去赤汁）
麥門冬（去心焙）壹兩

右件藥搗羅為散每服以蔥白湯調下半錢日三服量兒大小以意加減

張渙通鳴散 治耳聾

菖蒲（壹寸九節者） 遠志（去心各壹兩） 柴胡（去苗）
麥門冬（去心） 防風（各半兩） 細辛
甜葶藶（各壹分） 巳上搗羅並為細末次入
磁石（壹分燒醋淬研） 杏仁（二十粒湯浸去皮尖研）

右件都研勻每服半錢煎蔥白湯調下日二服

聖惠細辛膏 治小兒耳聾或因腦熱或因水入或因吹著並宜用此

細辛 防風（去蘆頭） 川大黃（炒）
黃芩 各壹分 川椒（去目） 蠟

右件藥細剉用清麻油三合煎藥紫色濾過下蠟

取消為膏每日三度用一□點於耳中

聖惠治小兒耳聾不差方

甜瓜蔕　杏仁湯浸去皮尖　鹽各等分

右件藥搗研如膏以少許猪脂和合煎令稠以綿裹如棗核大塞耳中日一易之

又方

松脂　菖蒲末　烏油麻各等分

右件藥相和搗熟綿裹如一紅豆大塞耳日二易

又方

菖蒲末一分　杏仁湯浸去皮尖研如泥半分

右相和研令乳入每用少許綿裹內耳中日一易

又方

右取葱白於煻灰中煨令熟以葱白頭內耳中日三易

又方

蓖麻子去皮十枚　棗肉七枚

同搗如膏每取棗核大綿裹少許塞耳中日一易

又方

右搗芥子令爛以人乳和綿裹少許塞耳中日一易

麝香散　治流耳

麝香少許　白礬一錢　五倍子□錢

右件為末紙撚子蘸入耳中少許

巢氏云邪氣與正氣相擊故令耳鳴久即邪氣停滯遂成聾也

菖烏散　治小兒耳內鳴日夜不止

菖蒲　烏頭炮各一分

右為末綿裹內耳中日再

[illegible]

千金翼治耳疼痛方

附子炮去皮一兩為末　菖蒲一□

右二味等分綿裹塞之

錢治兒心部疳瘍條

巢氏云耳宗脈之所聚腎氣之所通小兒腎藏盛而有熱者熱氣上衝於耳津液壅結即生膿汁亦有因沐浴水入耳內而不傾瀝令盡水濕停積搏於血氣蘊結成熱亦令膿汁出皆為之聤耳久不差即變成聾也

張渙紅藍花散　治聤耳久不差

紅藍花洗焙　黃蘗□□　烏魚骨□□

黄芩稍各半 已上搗羅爲細末次用

雄黄水磨細研半兩 麝香一分研細

右件細研勻細以綿纏裹藥塞耳中日再換

田氏紅玉散 治小兒膿耳

枯白礬 乾臙脂 麝香各一字

右同研勻先以綿裹杖子撚淨滲之

湯氏龍黃散 治小兒停耳汁出不止

枯白礬 龍骨末 黄丹炒各半兩

麝香一錢

右同研細先以綿杖子撚膿水盡用散一字半分

爲兩處吹入耳內日二次

再停耳碗黄末傅之日一夜一妙

祕要用蛐蟮灰末吹入立效有瘡者傅之孫真人方同

薛氏云耳外治方但可治臍瘡之輕者若係肝經

風熱血燥等證必係前方論內服合宜之藥外用

此以收臟濕亦無不可若專泥攻而失內治誤矣

[illegible] 詳見雜病耳證

五軟

五軟者頭軟項軟手軟脚軟肌肉軟口軟是也頭軟

不收乃頭項之病項脉軟而難於[illegible]仍必

胛發手軟則手垂四肢無力亦懶擡舉若得病[illegible]

進飲食乃慢脾風候也尚[illegible]肌肉軟則肉少皮

寬自離喫食不長肌肉可服錢氏橘連丸[illegible]爲

[illegible]兒不能行也脚軟

細小不妨[illegible]服錢氏地黄丸

長大自然肌肉充滿口軟則虛舌出口陽盛更須[illegible]

[illegible]氣喘則難調治也 薛氏

曰[illegible]脉皆虛諸陽之氣不足也乃天柱骨

中腎主骨足少陰太陽經虛也手足軟者脾主四肢

乃中州之氣不足不能營養四肢故肉少皮寬飲食

不爲肌膚也口軟者口爲脾之竅上下齦屬于足陽

明陽明主胃脾胃氣虛舌不能藏而常舒出也夫心

主血肝主筋脾主肉肺主氣腎主骨此五者皆因稟

五臟之氣虛弱不能滋養充達故骨脉不強肢體痿

[illegible]其要須補脾胃爲主蓋胃水穀之海爲五臟之本六

府之大源也治法必先以脾胃爲主俱用補中益氣

學以滋化源頭項手足三錢煎服地黃丸此正治
則多服之藥仍令壯年乳母飲之兼慎風寒調飲食
多能全形　曾戴氏論五軟證名曰胎怯良由父精
不足母血素衰而得誠哉是言以愚推之有因母血
海久冷用藥强補有孕者有受胎而母多疾者或其
父好色貪淫氣體虛弱或年事已邁而後見子有日
月不足而生者或投墮胎之劑不去而竟成孕者然
爾稟陰陽氣尚或有生譬諸陰地淺土之草雖有發
生而暢茂者少又如培植樹木動搖其根而成者鮮
矣由是論之則稟性弱不耐寒暑縱使成人亦多有

疾後愛自降生之後精髓不充筋骨痿弱肌肉虛瘦神
色昏慢才爲六淫所侵便致頭項手足身軟是名五
軟治法用調元散補腎地黃丸漸次調養日久乃安
若投藥不效亦爲廢人○有小兒體肥容壯不爲風
邪忽然項軟頭倒此名下竄皆因肝腎氣虛客邪侵
襲風府傳於筋骨故成斯疾蓋肝主乎筋腎主乎骨
筋骨俱弱則項軟垂下無力又名天柱倒與五軟相
類不遠治同前藥　吳江史萬湖子七歲患吐瀉囟
目頓陷天柱骨倒兼面赤色先用補中益氣湯加附
子一劑吐瀉止而諸證愈又用錢氏地黃丸料煎服

數劑　一小兒七歲夏間過食生冷之物致吐瀉患止
而項軟亦作瀉手足並熱項軟面白午後面青一日
足頭冷脈微欲絕急以六君子湯加附子一劑而安
後因乳哺項頓起而愈小兒元氣易虛易實故治之
者能推用對病之藥亦可回生者　一小兒九歲因
吐瀉後項軟面白手足並冷脈微細飲食喜熱余先
用六君子湯加肉桂五劑未應更加炮薑四劑諸證
稍愈面色未復尺脈未起以八味丸月餘面色微
黃稍有胃氣又兩用前藥又月餘飲食略增熱亦大
減乃朝用補中益氣湯食前用八味丸又月餘元氣

漸復飲食舉首如常又月餘而肌肉充盛諸病悉愈
一小兒十二歲瘧疾後項軟手足冷飲食少思粥
湯稍離火食之即腹中覺冷用六君子湯加肉桂乾
薑飲食漸加每飲食中加茴香胡椒之類月餘粥食
稍可離火又用前藥百餘劑飲食如常手足不冷又月
餘其首能舉後飲食停滯患吐瀉項仍痿軟朝用補
中益氣湯夕用六君子湯及加減八味丸兩月餘而
項復舉畢姻後眼目昏花項骨無力頭自覺大用八
味丸補中益氣湯三月餘元氣復而諸證退後每入
房勞役形氣殊倦盜汗發熱服後二藥即愈　一小

兒十五歲手足痿軟齒不能嚼堅物內熱晡熱小便
[illegible]澀如淋服分利之劑小便如淋服滋陰之劑內熱
益甚服燥濕之劑大便重墜余謂此稟賦腎氣不足早
[illegible]所致精血虧損必男子精未滿而御女以通
其精[illegible]有不滿之處異日有難狀之疾老人陰已
痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀痛如
淋若陰已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈便
愈便則愈痛也遂朝用補中益氣湯夕用六
味丸加五味子煎服各三十餘劑諸證漸愈後患遺
精盜汗手足痿軟痰氣上急用十全大補湯加[illegible]
[illegible]
八味丸料各八劑二便調利手足漸健仍用前二藥
月餘元氣漸復飲食如常又傷食停滯吐瀉腹痛
[illegible]之不應此脾胃受傷也用六君子湯加木香肉豆
蔻治之其吐未已左尺右關二脈輕診浮大按之如
無此六脈脫散于二陰用五味子散四服大便頓止
後又傷食噫酸作瀉大便重墜朝用補中益氣湯夕
用六君子湯加木香乾薑而痊　一老年得子四歲
痿軟面惡風寒見日則悄令乳母日服加減八味
丸[illegible]十全大補湯二劑兒與其子年餘肢體漸強
至一週而能行　一小兒五歲稟父腰軟不便於行

早喪天真年至十七畢姻後遂頭項頹倒[illegible]
其行強當歸道合遂朝服補中益氣湯夕用地黃丸
料加五味子鹿茸煎服年餘而健　一小兒項軟服
[illegible]劑二藥而愈畢姻後患瘵熱作渴發熱以前藥作大
劑煎代茶恣飲兩月餘而瘥熱減年餘而顱顋合
又年餘而後行步若非慎疾雖藥不起
[illegible]生[illegible]小兒又患小疾體虛又不進飲食
患久日久諸症遂見是天柱骨倒醫者不識謂之五
軟服須進金盞散手筋散　形證天柱骨倒其
難[illegible]此病非心脾若患先須因吐瀉不曾調[illegible]
[illegible]頓
至[illegible]大患傷寒無汗脈[illegible]一句云定應效
乘然能進無此卒然生此患又兼不辨四肢與身軟
[illegible]甚項似石而有瘡赤臉如緋此病多經傷寒熱後
[illegible]所
[illegible]風天柱倒但[illegible]須維持貼須[illegible]
立見溫和調[illegible]吐瀉[illegible]
[illegible]此或傷寒或吐或瀉未[illegible]入肝脈熱邪
所侵是致令筋軟長或手足軟而不能舉或項頸軟
而不能舉若有前證即須滌痰諸吐瀉即先調胃氣
此兒宜服藥[illegible]不可太熱亦忌過冷

右研勻

[illegible]個蟹不拘多少直者去蒸炒為末每服半

錢一錢薄荷酒調下一日三服更須用生筋散貼

之

生筋散

木鼈子三個 蓖麻子三十

右各取肉同研每用一錢許津唾調貼[illegible]

上令頸[illegible]起之

四十八候貼項藥方

川烏頭 白芷 地龍

五靈脂[illegible] 赤小豆各等分 [illegible]

右末生薑自然汁與酒同調貼在項上更要竹茹

[illegible]

竹茹等

菊花三錢 黃芩 人參各一錢

大黃半兩 甘草二錢

右為末竹葉煎湯下

二十六候貼項藥方

草烏頭 赤小豆各等分

右為末薑汁調攤帛子上貼經宿項立起

治項軟貼項膏 治小兒肝熱腦冷頭項軟倒

川烏末 肉桂末 芸薹子

天南星 蓖麻子各一錢 黃丹炒一錢七

右大蒜一個煨熟去皮乳鉢內研和勻細每用一

錢入米醋和勻貼項上一日易

張氏方 治小兒腦熱肝風天柱倒折宜服此藥涼

肝[illegible]貼項藥

[illegible]湯 [illegible] 白附子 大附子

麻黃 防風 羌活各一分

[illegible] 地龍[illegible]各半錢 麝香半字

[illegible]

右為細末[illegible]為丸如小豆大每服七丸[illegible]

[illegible]入酒一兩[illegible]

五癎

五癎者[illegible]以動搖氣[illegible]升而更於胸膈[illegible]
手心冷面裂此[illegible]不當於四末也[illegible]四肢
又曰[illegible]定[illegible]若[illegible]陰[illegible]陽也故難
治若[illegible]者[illegible]六君子湯加礬
[illegible]以[illegible]風若[illegible]風邪[illegible]爲風
[illegible]二臟受患當兩[illegible]平肝的[illegible]
[illegible]治之（日問）云如審係風症係中風治之[illegible]
[illegible]生之理不[illegible]命[illegible]湯加減
[illegible]中風不省人事[illegible]鳴及張失音[illegible]
[illegible]　人參　黃芩
川芎　芍藥　甘草[illegible]
杏仁[illegible]皮尖　防已　官桂[illegible]
防風[illegible]　附子[illegible]
右除附子杏仁外[illegible]入二味夾和每
錢[illegible]煎[illegible]前服[illegible]附子[illegible]
[illegible]面[illegible]風故收此方非的風證勿
用

寒熱往來

凡寒熱往來無定期其有定期者瘧也　張氏曰風
邪外客於皮膚而[illegible]內[illegible]於臟腑故令血氣不和
[illegible]更相乘[illegible]陰[illegible]勝[illegible]之風爲邪
所乘邪與正[illegible]寒熱往來
[illegible]論曰[illegible]入[illegible]七[illegible]如寒無
[illegible]此由榮衛虛
[illegible]風邪[illegible]陽則發熱[illegible]陰則發寒久
[illegible]宜[illegible]　又曰若寒熱如瘧不以時度
[illegible]腹[illegible]大便不適或時腹痛胸膈[illegible]悶
[illegible]不化結於[illegible]不舒陰陽交[illegible]
[illegible]陽虛則[illegible]寒陰虛則內熱陽盛[illegible]
[illegible]內寒[illegible]陽[illegible]
[illegible]寒陽[illegible]陽則[illegible]熱[illegible]爲
陽不足[illegible]入[illegible]中[illegible]及脈[illegible]爲陰不足陽
氣下入陰中則發熱陽不足[illegible]先寒後熱陰不足則
先熱後寒陰陽不[illegible]則寒熱交爭也又上盛則
發熱下盛則發寒陽盛則乍熱陰盛則乍寒陰陽相
[illegible]不調故邪[illegible]更作[illegible]往來或乍寒乍熱

證本內實者用之兩界乎太陽陽明之間[illegible]
之分陰陽之氣[illegible]於相乘故寒熱交[illegible]
[illegible]加減調之若飯[illegible]寒熱起伏如常久而不
愈及大病後元氣未復[illegible]生熱[illegible]宜
用人參[illegible]補之甚者[illegible]全大補湯[illegible]為病
亦令寒熱用保和丸[illegible]消之若兼嘔吐泄瀉用六君
子湯調[illegible]令飲熱人參[illegible]中丸[illegible]不止七味白
朮散[illegible]食積[illegible]尚作者肝邪乘脾所勝
乃不勝也用[illegible]散[illegible]加柴胡山梔其瘧證寒熱
見瘧門
[illegible]
[illegible]寒熱[illegible]氣急要令地臥此候宜當[illegible]
[illegible]用平胃[illegible]服進食丸[illegible]見下[illegible]
[illegible]發寒熱不欲食而飲水[illegible]
丸不止衆醫以為瀉熱用牛黃丸不愈又以止渴藥
[illegible]散服之反吐錢曰當以白餅子下之後補脾乃以
[illegible]丸磨之此乃解也後果愈何以故不食但飲水
[illegible]食伏於脾內不能消化致令發寒熱用止渴藥吐
者藥衝脾故也故下之即愈
子和[illegible]論[illegible]八歲病熱[illegible]為傷冷治之以熱
[illegible]水令禁而不與內水[illegible]渴煩躁轉生前後皆

陰陽俱乾寒熱往來咳嗽[illegible]作遍身[illegible]
[illegible]遍[illegible]人責其母曰[illegible]
[illegible]不得其熱尚可[illegible]其母謝以不明[illegible]
[illegible]遂連進數服不[illegible]
[illegible]水[illegible]不[illegible]
下三四十行大熱方去[illegible]通膈丸[illegible]後下十
[illegible]五[illegible]行皆計用水[illegible]
[illegible]一[illegible]
人參[illegible]小柴胡湯 治大人小兒傷寒溫熱病身熱
惡風[illegible]寒熱往來身
[illegible]
不除及[illegible]發熱頭痛婦人傷風頭痛[illegible]
[illegible]瘧發作有時及產後傷風頭痛
煩熱[illegible]
柴胡[illegible] 黃芩 人參[illegible]
甘草[illegible] 半夏[illegible]
右五味[illegible]服二大錢以水一盞半入生
薑五片棗[illegible]同煎至七分濾去滓稍熱服
小[illegible]小兒分作二服更量大小加減
[illegible]芩丸湯 治小兒寒熱往來

秦艽 [illegible] 鱉甲 [illegible] 黃芩 [illegible]
川大黃 [illegible] 麻黃 去根節 竹茹
甘草 炙
右件同為麤散每服一錢水一盞入葱白二寸
同煎至五分去滓溫服量兒大小加減
人參前胡散
人參 [illegible] 前胡 柴胡 [illegible]
桔梗 地骨皮 甘草 [illegible]
[illegible]
右件[illegible]細末每服二大錢水一小盞入生薑
二片煎至半盞去滓放溫服量兒大小加減
芍藥湯
芍藥 黃芩 當歸 [illegible]
柴胡 各[illegible] 肉桂 甘草 [illegible]
右件[illegible]為細末每服一錢水八分一盞入生薑
一片棗一枚同煎至五分去滓溫服量兒加減
王氏手集柴胡人參湯 治小兒肌熱生於往來寒
熱[illegible]
柴胡 人參 芍藥
茯苓 甘草 [illegible]

右件[illegible]每服二錢水一盞入生薑三片煎至四分溫服
全生指迷荊芥散
荊芥穗 人參 白朮
當歸 川芎 芍藥
桔梗 柴胡 甘草 [illegible]
右為麤末每服五錢水[illegible]煎至一盞去滓溫服
全生指迷[illegible]
大黃 [illegible]
右為[illegible]細末[illegible]大每服一丸米飲下
量人[illegible]加減為度
[illegible]
金匱小兒[illegible]方
右[illegible]飲之
小兒[illegible]
[illegible]
[illegible]之命[illegible]方用之[illegible]妙歌云
桃花散末一錢餘甘草 衝湯[illegible]花只消一
兩字[illegible]入口[illegible] 右二味為末每服半
錢湯調服之
莊氏家傳[illegible]少小卒患[illegible]不能服藥李[illegible]浴兒

右用李葉不拘多少煮湯浴兒又[illegible]
下訣 先調氣次解虛熱後不下真珠丸取
真珠丸 治小兒乳癖虛積五臟壅滿及下風涎積
麝香[illegible]
南星 半夏 滑石各二錢
膩粉[illegible] 巴豆[illegible]
右末之[illegible]服[illegible]二十丸[illegible]湯
吞下
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]合至三分
[illegible]
[illegible]
大黃[illegible]
巴豆[illegible]
右五味擣[illegible]令如泥合和以蜜更
擣二千杵丸如[illegible]每一丸湯服之但熱在膈上
當吐在膈下當利預作粥如服已吐下丸法服藥
了食頃不吐下以熱飲動之若不得吐下可更服

一丸半餘藥壯人可二丸此藥便於他下藥甚效
宜大小下多冷粥解之若有瘧前挺如指蜜和
丸塗腹頭目近瘡中隨出之不差更作塗之不得
入眼服之相下得飲食不消亦服之飛尸遁尸藥
服半丸日一[illegible]心腹脹滿痛服一丸瘧者
依發日前勿食[illegible]一丸下[illegible]入服二丸得止
下惡氣[illegible]結中脅走起上
下或絕[illegible]黃服半丸小
兒[illegible]食不生服三四丸
如桐子大一[illegible]服二丸且三丁
[illegible]
川心腹[illegible]忌野豬肉蘆筍
生薑[illegible]而瘥[illegible]不宜
氣若勞[illegible]之[illegible]
柴胡飲[illegible]不下四肢
力心腹[illegible]
柴胡去蘆[illegible]
人參 前胡 桔梗
訶梨勒皮 地骨皮 赤芍藥
杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 甘草炙微赤
陳橘皮湯浸去白[illegible]

右件藥擣篩為散每服一錢水一小盞煎至五分
去滓不計時候温服量兒大小加減

五味子散　治小兒寒熱往來不欲乳食心煩

五味子　當歸剉微炒　人參
桔梗去蘆頭　前胡去蘆頭各半兩　白朮
赤茯苓　黃芩各一分　甘草半兩炙微赤剉
麥門冬半兩去心焙

右件藥擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓温服日三四服更量兒大小以意加減

人參散　治小兒寒熱往來食少羸瘦

人參去蘆頭　黃耆剉　柴胡去苗
白茯苓　鱉甲塗醋炙令黃去裙襴　木香各半兩
甘草炙微赤剉　白朮　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
各一分　訶梨勒皮三分

右件藥擣細羅為散不計時候以粥飲調下半錢
量兒大小加減服之

黃耆丸　治小兒往來寒熱多汗心煩小便赤黃不
欲乳食四肢羸瘦

黃耆剉　麥門冬去心焙　赤茯苓
白朮　子芩　甘草各一分
柴胡去苗　鱉甲塗醋炙令黃去裙襴各半兩

右件藥擣羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥
飲下五丸日三四服量兒大小加減

張渙香甲散　治寒熱往來肌瘦

鱉甲醋炙黃　木香各一兩　川大黃微炒
陳橘皮去白焙　當歸洗焙　柴胡去苗
川芎　甘草炙各半兩　檳榔一枚

右件擣羅為細末每服一錢水一小盞入生薑二
片煎至六分去滓温服量兒大小加減

瘧 以下俱雜病於五藏無所傳故列于後

夜治小兒瘧疾多與大人同法以出汗為瘥[illegible]桂枝
[illegible]麻黃參蘇飲葛根之類又觀其病食痰以意消息之
大抵多是飲食失節得之須以消導為先丁也 寶
內經瘧論瘧疾瘧皆生於風而發作有時何也岐伯曰
夏傷於暑秋必病瘧[illegible]腠理開而汗出遇風或得於
[illegible]浴水氣舍於皮膚之內[illegible]衛氣不守[illegible]並居其皮膚
[illegible]衛久留[illegible]骨髓節[illegible]寒[illegible]則內外皆熱
[illegible]疼而渴乃陰陽之氣交爭虛實更作而然陰氣獨
[illegible]
勝則陽虛故先寒[illegible]
[illegible]則陰虛故先熱[illegible]頭疼腰痛小便
不利陰盛陽虛則[illegible]陽盛陰虛則內外俱熱
此外感八邪或內傷七情飲食[illegible]氣與衛氣并
居故病日作衛氣晝行於陽夜行於陰得陽而外出
得陰而內薄內薄五藏病氣深入不能與衛氣俱出
則間日而作當衛氣所至病氣所在則發在陽則熱
在陰則寒經曰亢則害極乃反俟陰陽各衰衛氣與
邪氣相離則病休陰陽相搏衛氣與病氣再集則病
以各適其衛氣之所在與所中邪氣相合而然也

[illegible]後熱者先傷寒而後傷風名曰寒瘧先熱後寒者
先傷風而後傷寒名曰溫瘧但熱不寒者名曰癉瘧
[illegible]
不熱者名曰牝瘧[illegible]瘧之[illegible]一故[illegible]之
[illegible]隨其陰陽[illegible]病[illegible]汗吐下溫補[illegible]治以
[illegible]為期然皆病中人必因其正氣之虛感受邪氣留
而不去其[illegible]表傳裏先汗後下[illegible]不易故
[illegible]瘧[illegible]先表而百[illegible]水[illegible]大小
[illegible]柴胡湯[illegible]邪以和解表裏之邪自
飲[illegible]劫 若[illegible]五和[illegible]或烏梅
[illegible]大[illegible]丸[illegible]下[illegible]氣散[illegible]止痛[illegible]以養胃者飲子
[illegible]加[illegible]正胃氣[illegible]寒邪則[illegible]
後[illegible]二仙飲[illegible]之寒熱[illegible]
[illegible]用平胃散[illegible]加[illegible]和白虎湯空心調服
[illegible]燥[illegible]實則外邪不戰
[illegible]自[illegible]經久不愈致脾胃
[illegible]飲[illegible]夜[illegible]治
[illegible]是傷於暑者秋必痎瘧其發先起於毫毛伸欠乃
作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破
渴欲冷飲蓋邪氣并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰

陽不及陽勝則熱陰陽上下交爭虛實更作故寒熱
間發也有日發一日一發一日一發有間一日
連二日發後復發有上半日發下半日發及
發於夜者有有汗無汗此其略也以詳言之當分
六經五臟及痰食勞暑鬼瘴之不同（大要見前雜病中）
痰瘧者外感風寒內傷飲食因而成痰令人心下脹滿氣
逆嘔吐是也食瘧者其飲食不節中脘生痰令人噫氣吞酸胸
膈不和是也勞瘧者久而不差表裏俱虛客邪未散
其氣不復故疾雖間遇勞即發是也暑瘧者其人面
垢口渴雖熱已退亦常有汗是也鬼瘧者寒熱無時
是也瘴瘧者嵐山風瘴氣其狀寒熱休作有時是也
久而不愈名曰痎瘧痎老瘧也若瘧不愈結癖於
兩脇之間名曰瘧母此先失於解散或復外感風寒
內傷飲食故纏綿不已也治法風暑之邪從外而入
宜解散之解表後即宜扶持胃氣故丹溪曰無汗要
有汗散邪為主有汗要無汗固正氣為主驟發之瘧
宜解表久發之瘧宜補脾寒瘧宜溫溫瘧宜和癉瘧
宜清熱痰瘧則行痰熱食瘧則消食勞瘧宜安暑瘧宜解
鬼瘧宜祛邪瘴瘧宜散此亦其略也更以詳言之則熱
多寒少者小柴胡湯寒多熱少者清脾飲子無汗者

瘧　幼科九

柴胡桂薑各半湯有汗者柴胡桂枝湯汗多渴者白
虎加人參湯而小便不利者五苓散小便赤熱多而渴者
小柴胡湯熱多汗出腹滿便閉者大柴胡湯渴加葛
根痰瘧二陳湯加柴胡黃芩甚者加枳實食瘧
者二陳湯加山查神麯川芎勞瘧用補
中益氣湯暑瘧者十味香薷飲鬼瘧者四獸散瘴
瘧者平胃散瘧母者鱉甲飲凡脾胃虛而患瘧者不
拘有汗無汗三陰六經悉以六君子湯為主熱多加
柴胡山梔寒多加乾薑肉桂有汗加黃芪浮麥無汗
加蒼朮烏梅元氣下陷及肝木乘脾並加升麻柴胡
切忌用青皮草果常山等藥以為攻截反傷正氣
益虛邪氣益深是多延綿不止而為勞熱者有矣若
乳母七情六欲飲食不調或寒熱似瘧亦火熾盛致
兒為患者又當治其乳母斯無誤矣
全生指迷論曰寒熱之病或寒已而熱或熱已而寒
若寒熱戰慄頭痛如破身體拘急數欠渴欲飲冷或
先寒而後熱或先熱而後寒或辨時而發或間日而
作至其時便發發已如常此謂之瘧瘧脈自弦弦數
多熱弦遲多寒此皆得之於冬中風寒之氣藏於骨
髓之中至春陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑而

瘧　幼科九

[illegible]其邪氣併合而發寒多者宜溫之熱多者宜柴胡湯熱多
者宜解之與柴胡湯寒熱等者宜調之與鱉甲湯
大人小兒瘧疾若寒從背起冷如手不甚戰慄似
欲發熱而汗出或即嘔痛[illegible]吐時作其脈遲小此由
脾胃素弱因氣寒而收聚不散不能運化變而成痰
伏痰在內陰上乘陽陽為陰所乘所以作寒遍而成
下[illegible]服後花丸半碗丸
全生指迷小柴胡湯 治往來寒熱
全生指迷栝蔞湯
栝蔞根四兩 柴胡去苗八兩 人參
瘧
黃芩 甘草炙各三兩 [illegible] 生薑
右為麤末每服五錢水一盞生薑三片棗一枚擘
煎至一盞去滓溫服
全生指迷清脾飲子 治瘧疾脈弦數但寒不熱或
寒多熱少膈滿不食口苦舌乾煩渴小便黃赤大
腸不利
青皮炒 厚朴薑製 白朮
草果 柴胡 茯苓
半夏湯泡七次 黃芩 甘草炙各等分
右每服四錢水煎

全生指迷鱉甲湯
鱉甲[illegible] 牡蠣火煅通赤 甘草炙各一兩
桂去粗皮取心三兩 柴胡八兩 栝蔞根四兩
黃芩一兩去心 [illegible]三兩
右為麤末每服五錢水一盞煎至一盞去滓溫服
不拘時候
草果飲 治寒多熱少手足厥冷遍身浮腫肚腹疼
痛
厚朴薑製 青皮 草果
藿香 [illegible]各 丁皮
神麴 良薑 半夏麴
瘧
右等分㕮咀薑棗煎空心服
消脾湯 治諸瘧久不瘥者脾胃虛弱形容憔悴
厚朴去粗皮薑汁炒 烏梅打破去仁
半夏湯泡七次 良薑[illegible]土炒 青皮去白各
甘草炙 草菓炮去殼取 [illegible]
右件㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎七分未發
前併三服仍忌生冷油膩時果等物
[illegible]丸 治瘧疾往來寒熱經久不瘥者
[illegible]一兩[illegible] [illegible]一兩[illegible]去

右爲細末用豶猪膽汁和水煮麪糊丸如麻子大
薄荷以朱砂爲衣熱多用溫湯早食前北望空心送
下寒多亦於清旦用溫酒面南空心熱服若寒熱
相停用陰陽湯以一半冷水一半熱湯參和是也
不拘向南北投服

秘傳柴胡黃連散　治小兒瘧

人參　胡黃連　草果
檳榔　甘草　柴胡各等分

右剉散水一盞煎至七分服

張渙桃仁湯方

桃仁湯浸去皮尖麩炒黃　鱉甲醋炙黃去裙襴各一兩
桂心　黃芩　赤茯苓
川升麻各半兩

右爲麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫
服量兒大小加減

全生指迷鱉甲湯

鱉甲湯浸刮淨醋炙黃　白朮　桂去皮
柴胡去苗各一兩　牡蠣半兩火煅
常山

右爲麤散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

張渙烏梅丹　治小兒發瘧疾寒熱者

烏梅肉炒乾　母丁香　乾漆微炒
當歸　桂心各半兩　已上爲細散入
麝香研

右件拌勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒粥飲下
量兒大小加減

全生指迷旋覆花丸

旋覆花　桂心　枳實麩炒
人參各五分　乾薑　芍藥
白朮各六分　茯苓　狼毒
烏頭炮去皮　礬石火燒各一分　細辛去苗
大黃濕紙裹煨　黃芩　葶藶炒
厚朴去皮薑汁炙　吳茱萸湯洗炒　芫花醋炒
橘皮各二分　甘遂各一分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三丸未知
加至七丸小兒黃米大二丸

半硫丸

半夏湯洗七次三兩　硫黃二兩研飛

右爲末生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大每服三十丸
米飲下不拘時候小兒黍米大三五丸

方治瘧疾如熱不寒方用黃丹服通紅

發蜜湯調下能飲酒以酒調一法薄服小柴胡湯
大服人參前胡湯
張涣知母丹 治小兒瘧熱瘧甚者
知母 炙焙 鱉甲 醋炙去裙襴 川大黄 濕紙裹煨
赤茯苓 朱砂 細研水飛 川芒硝
川升麻 各半兩 龍腦 壹錢研
右件同拌勻煉蜜和丸如黍米大每服五粒至七粒
煎生薑湯下大便利下即愈量兒大小加減
活人書治瘧疾但熱不寒者
知母 麩炒 甘草 炙 二兩 石膏 壹斤
桂 去皮 二兩 粳米 貳合
右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去
滓服
發散風寒之劑 桂枝麻黄各半湯 治發熱自汗或
無汗
桂枝 白芍藥 生薑
甘草 炙 麻黄 各一兩 杏仁 去皮尖 二十四個湯浸
右水壹鍾大棗貳枚煎四分食遠服
知母麻黄湯 治傷寒或十數日或半月二十日終
不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱症

或作鬼祟或作風疾多服治之不瘥或朝夕潮熱
頰赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞
絡間所致
知母 麻黄 去節 甘草 炙
芍藥 黄芩 各半兩 桂枝 去粗皮半兩
右剉散每二錢水一盞煎七分去滓溫服令微汗
若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃氣和即愈
未汗再服大小加減
柴胡桂枝湯 治瘧身熱多汗
柴胡 黄芩 桂枝
芍藥 甘草 炙 半夏 二錢
右每服二三錢薑棗水煎
白虎加桂湯 治小兒瘧疾發渴
石膏 知母 一兩 甘草 五分
桂枝 五分
右水壹盞粳米壹撮煎服
十味香薷散
香薷 一兩 人參 白朮
黄芪 橘紅 白扁豆

乾木瓜　厚朴（去皮薑製）　白茯苓

甘草（炙）半兩

右為細末每服壹錢不拘時沸湯或冷水調下

人參養胃湯（和劑方）治外感風寒內傷生冷溫中快膈能辟山嵐瘴氣寒瘧脾胃俱寒

厚朴（薑汁炒）　蒼术（米泔浸）　半夏（湯泡各壹兩）

藿香　草果仁　茯苓

人參（各半兩）　甘草（炙）　橘紅（各二錢半）

右剉散每服叁錢水壹盞半薑柒片烏梅壹箇煎至柒分去滓熱服兼治飲食傷脾發為瘧疾或中脘虛寒嘔逆惡心並宜服加薑　（八路卷九）　百九

又方

陳皮（湯浸去白）　甘草（炙）　厚朴（薑製）

半夏（各二錢）　人參　草果（各二錢）

白茯苓（半兩）　藿香（洗）　青皮（去白）

三稜（煨）　蓬莪朮（煨）　大腹皮（洗各壹錢）

蒼术　烏梅（各四分）

右剉散每服叁錢薑棗水煎

四獸飲　治陰陽相勝結聚涎飲為瘧無汗滯濕

半夏　茯苓　人參

白术　草菓　橘紅（各等分）

甘草（減半）

右用烏梅薑棗濕紙裹煨香熟焙乾入藥每服二錢水煎服

鬼瘧鬼哭散　止瘧疾

常山　大腹皮　白茯苓

鱉甲（醋炙）　甘草（炙各等分）

右除甘草鱉甲炙外三味不得見火用桃柳枝各七寸同煎臨發略吐涎不妨只用常山白茯苓甘草亦効　（八路卷九）　百五十

虛瘧千金大五補湯　治大人小兒時行後變成瘧

桂心（一兩二錢半）　遠志　桔梗

川芎（各二兩）　茯苓　芍藥

人參　白术　熟地黃

當歸　黃耆　甘草（各三兩）

竹葉（伍兩）　半夏　麥門冬（去心各一斤）

生枸杞根　生薑（各壹斤）　大棗（二十枚）

右十八味以水三斗煮竹葉枸杞取二斗內諸藥再煮取六升分六服一日一夜令盡之小兒量大小

加減以一合至二合漸服至一升止

聖惠犀角散　治小兒熱瘧氣羸瘧

犀角屑　甘草炙微赤剉　川大黃剉碎微炒

知母各半兩　鼈甲塗醋炙令黃去裙襴

柴胡　常山各壹分半

右件搗羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至伍分

去滓溫服日三四服量兒大小加減

截瘧三聖丸　治諸瘧不拘遠近

穿山甲[illegible]無灰

雞骨常山　雞心檳榔[illegible]各乙兩

右件再曬為細末水煮糯米粉為糊丸菉豆大硃砂

為衣以紅丹為衣陰乾每服叁拾丸至伍拾丸未發

前隔晚用酒空心投一服如再若二服經久不瘥下

祛瘧丹

二仙飲　治同前

青蒿五月五日採曬乾用貳兩　桂枝去粗皮[illegible]二味

右每服壹錢寒熱未發前用涼酒調服或丸隔晚

以酒調下加香茶葉貳好茶芽[illegible]合研成末又名

斬邪丹治證同法療尋瘧尤勝服法同前服

祛瘧丹　治瘧經久不瘥

常山鍊貳兩　烏梅和核[illegible]乙　紅丹半兩研

右除烏梅屋丸別焙常山或曬或焙仍同烏梅紅

丹研為細末糯米粉煮糊丸麻仁大每服二十丸

至五十丸未發前涼酒空心送下或隔晚酒下重

者二服輕則一服忌雞麵羊生冷飲食毒物

消瘧鼈甲飲子　治瘧久不愈腹中結為癥瘕名曰

瘧母

鼈甲醋炙　白朮　黃芩

草果　檳榔　芎藭

橘紅　甘草　厚朴

白芍藥各等分

右為㕮咀水壹鍾薑叁片棗壹枚煎服

經效瘧丹　治瘧母結癖寒熱無已

真阿魏　雄黃各貳錢半　硃砂乙錢半

右沸湯泡阿魏研散雄朱和之稀麵糊丸梧桐子

大每服一丸人參湯化令空心服痞瘧桃枝湯冷

服臨發磨一丸傅鼻頭口畔

瘧母丸

鼈甲醋炙貳兩　三稜　莪茂各醋浸透煨各乙兩

右為細末神麴糊丸如菉豆大每服貳拾丸白湯

量兒大小加減　痒消一半卽止

[illegible]丸

芫花[illegible]　朱砂[illegible]

右爲末蜜丸[illegible]兒黍米大[illegible]丸日二服不知

加[illegible]

[illegible]湯　治小兒瘧疾用藥太早退熱

[illegible]外[illegible]人飲食不進

大腹皮　檳榔　三稜

蓬莪茂各五[illegible]　蒼朮　枳殼各[illegible]

甘草一分

右剉散每服二三錢水一盞生薑皮棗子椒目同煎

青皮湯　治小兒瘧後浮腫兼寒熱不退飲食不進

白朮　茯苓　厚朴　青皮

陳皮　半夏　大腹皮　檳榔

三稜　蓬莪茂　木通　甘草各等分

右㕮咀每服二錢水煎

按上方皆疏泄元氣之藥若病久脾虛而作腫

者當以錢氏異功散爲主亦佐以五皮湯方見腫病

用此必至不救

魃病

魃者小鬼也乳下嬰兒未能行而母更有娠其兒病

微下利寒熱去來毛髮鬖鬖以爲有鬼神導其

肝中胎氣敏而爲亂後名曰魃病也以他人相近亦

能相[illegible]亦曰繼病好娠婦人不慎能致魃亦時有

[illegible]不[illegible]小兒飲交乳且

[illegible]其[illegible]分已[illegible]使兒

病乎則又飼鬼神之咎爲也千金[illegible]伏翼[illegible]

[illegible]者當伯勞鳥毛白馬眼不能滋營氣血乃[illegible]

[illegible]生者爲相繼死者爲傳尸有[illegible]

[illegible]欲有氣而無脈謂之行尸　丁奚[illegible]

名件無辜四異病也　陽易陰易百合狐惑四奇

龍膽湯　治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚

掣吐哯若已能進乳中滿仍不消出熱當分蒸

不解中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之

龍膽草　柴胡　黃芩

桔梗　鉤藤皮　甘草炙

茯苓　[illegible]　[illegible]

大黃（煨）

右爲散以水一升煮取五合爲一劑十歲已下小兒皆可服若兒生一日至七日分一合爲三服八日至十五日分一合半爲三服十六日至二十日分二合爲三服二十日至三十日分三合爲三服皆以得下爲度此兒所爲出腹嬰兒所作若日月長大者亦依此爲例必知客忤及有魃氣者可加人參當歸各半錢十一百日兒加一錢一字二百日兒加一錢半一歲加半兩餘藥皆倣此

聖惠甘草散 治小兒中魃面色白而後變青者

鬼病 幼科九 卷五

如鰕色故復發作面赤若青黑色銜口不治覺病微曉者須覺之早者亦中邪氣不入臟腑又微引乳者可服此

甘草（炙微赤） 龍骨 赤茯苓
牡蠣（燒爲粉） 生乾地黃 黃芩
桂心（各一分） 當歸（剉微炒）

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入淡竹葉七片煎至五分去滓入白蜜一錢更煎一兩沸量兒大小以意加減溫服日三四服

太黃丸 治小兒中魃羸瘦

川大黃（剉碎微炒） 白蘚皮 甘草（炙微赤剉）
犀角屑 黃芩 赤茯苓
赤芍藥（各一分）

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減日三四服

張渙虎骨丹 治被魃病

虎頭骨（塗酥炙） 鬼臼（去毛） 草龍膽
鬼箭（各一兩） 琥珀 白膠香（各半兩）

右件搗羅爲細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒乳香湯下量兒大小加減

鬼病 幼科九 卷五十

客忤

巢氏云小兒中客忤者是小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂之客忤也亦名中客又名中人其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛及倒夭矯面變易五色其狀似癇但眼不上插耳其脈弦急數者是也若失時不治久則難治若乳母飲酒過度醉及房勞喘後乳者最劇能殺兒也其脈急數者宜與龍膽湯下之加人參當歸各如龍膽稱分等多少也

千金論少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還衣服經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆為忤也執作喘息乳氣未定者皆為客忤 凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病欲防之法諸有從外來人及異物入戶當將兒避之勿令兒見若不避者燒牛屎令當有煙氣置戶前則善 小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切兒皆病者豈一切兒悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脈嫩弱秋初夏末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢故夏末秋初小兒多壯熱而下痢未必悉是中客及魃也若治少小法夏末秋初常宜候天氣溫涼有暴寒卒冷者其少小則多患壯熱而下痢也慎不可先下之皆先殺毒後下之耳 小兒中客急視其口中懸壅左右當有青黑腫脈核如麻豆大或赤或白或青如此便宜用針速刺潰去之亦可爪摘決之並以綿纏釵頭拭去血也 少小中客之病吐下青黃赤白汁腹中痛及反倒偃側喘似癇狀但目不上插少睡耳面變五色其脈弦急若失時不治小久則難治矣欲療之方用豉三合水拌令濕擣熟丸如雞子大以摩兒囟上足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛即擲丸道中痛即止

真珠散 治客忤驚風兒並驚邪發熱心舍不寧精神不定心常恆悸睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼喘面赤夜卧多煩渴小便赤澀或吐利真珠散常服辟邪安神

真珠　海螵蛸　滑石各一分

白茯苓　人參　白附子

甘草炙　金蝎　麝香
腦子五分另研　生珠一分另研　金箔三十片
銀箔二十片
右末和勻半分煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服
甘草隱附各一

龐氏論曰治客忤方
忽爾連連哭不休滿身出熱脉如鉤驚啼不得寬
作兒客忤傷心不用犀角雄黃和共搗桃符煎
水石楠糊入參茯苓車前子丸哭三服病不妥

安神丸
客忤　人參犀角升丸　真元
生犀末半分　雄黃研　人參
茯苓　車前子各一分
右為末取桃白皮一兩桃符一兩二味以水三升
同煎至一升去滓更煎成膏和前藥丸如麻子大
每服三丸芍藥湯下

又方　小兒哭氣築心連喘息多愁胃口涎唯有此
疾宜早治為緣客忤氣相煎看有病狀醫難效速
取真珠散半分龍腦生犀香附子小兒餐了保身
安

真珠散
真珠末一分　生犀末二分　香附子末一分
龍腦半字
右同研每服一字桃仁湯調下乳母忌生冷油膩
一切毒物半月

張渙辟邪忤　夫小兒血氣未實皆神氣軟弱除父母
及乳養之常所見外不可令兒見生人及抱往別房
異戶及不可見牛馬獸畜等其父母家人之類自
外及夜行歸家亦不可見兒恐經履鬼神粗惡
暴氣若犯人令兒吐下青黃赤白水穀解離其狀
似發癇者但眼不上戴脈不弦急名曰客忤乳小兒癇
客忤兒亦有中惡者亦宜服此辟邪丹至蘇合

辟邪丸　百字
麝香研　白膠香　沈香
虎頭骨炒　鬼臼去毛　草龍膽
人參　白茯苓
右件各半兩搗羅為細末次入水磨雄黃半兩細
研水飛次研麝香一錢都拌勻煉蜜和如雞頭大
每服一粒煎乳香湯化下及別丸如彈子大用絳
絹袋子盛令兒衣服上帶之仍臥內常燒神妙
川各件闪而驚忤者治法川竈中黃土研二兩雞子
一個大殼一枚打和入少許水丸以桃柳枝湯浴

兒後將此藥塗五心及頂門上陳無擇[illegible]

治卒客忤禁口不能言細辛 桂心等分納口中效 又

以和紀用經療小兒客忤 擣菖蒲汁內口中 又

以墨汁納口中 又磨刀水三四滴妙 又用好墨

研和水温服半錢匕

錢季先生小兒生下犯人禁候而青黑合兩眼

口噤不下乳此候因生下來不免外人看問或有

服藥或因婦人月假不淨或外人帶邪神觸着生下

身夾故乳晡便觸着邪氣之物氣血未就又被風邪擊

客忤 八物羌活丸 百五

致此所治者先用朱砂膏敷顖中乳上吮下後用錢

心先驚夾醒脾散 與服即愈如兒不下乳眼視

肚硬死候大凡初生下兒子家中人不見不可便與

外人入房看問人家各有神祇又恐婦人經氣及月

假不淨觸着恐中客忤此所以養兒之法

千金方剪取驢前膊胛上旋毛大如彈子大以乳汁

煎之令毛消藥成着乳頭上飲之下咽即瘥 又燒

母衣帶三寸并髮合乳汁服之 又取牛鼻津服之

又取牛口沫傅乳頭飲之

治少小兒人來不能腹中所苦者三物燒髮散

用向來者人頭上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰

細末和乳飲兒即愈

中馬忤 千金論曰凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗

易衣裝而便向兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及

聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤慎

護之持重一歲兒也 其狀腹痛吐下青黃白色水

穀解離甚者致夭

千金治小兒中馬客忤法中客忤亦可用

用粉丸如豉法摩兒手足心及心頭臍上下訖

請摩之咒曰摩家公摩家母摩家子兒若客忤從

客忤 八物羌活丸 百五十二

我始偏頭邪良子如舊無良咒訖棄丸道中

又法

取一刀横竈上解兒衣發其心腹訖作撥取刀持

向兒咒之唾輒以刀擬向心腹啡啡音非煌煌

日出東方背陰向陽葛公葛公不知何公

子來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之

神戶下土鬼所經大刀環犀對咽若二七唾客愈

兒驚唾啡啡每唾以刀擬之咒當三遍乃畢用豉

丸亦如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛棄

丸道中人驚客忤即愈矣

簡要濟衆治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面前燒令兒嗅烟氣日燒之差爲度

又方　取馬口角沫塗兒口中効

中惡

錢氏云小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問大小若陰陽順理榮衛平調神守強則邪不干正若精氣衰弱則鬼邪惡氣中之其狀先無他病卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿脉緊大而浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯藏腑之間更發後變爲注也　治法先下蘇合香丸未醒以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟邪客忤亦宜服

蘇合香丸　治傳屍骨蒸諸惡疰易療順氣化痰卒暴心痛鬼魅瘴瘧霍亂吐瀉赤白下痢小兒驚搐

蘇合香油 入安息香膏內　安息香 一兩另爲末用無灰酒半升熬膏

丁香　青木香　白檀香

沉香　蓽撥　香附米

訶子 煨取肉　烏犀 鎊屑　硃砂 各二兩研水飛

薰陸香　片腦 研各五錢　麝香 各半

右爲細末用安息香膏入煉蜜和劑圓如芡實大每空心用沸湯化下小兒一丸老人因丸酒下亦可

用蠟紙裹一丸彈子大用緋絹袋盛當帶之一

邪傳不散逆之腦名犢不樂心丸治一切邪神及
胸脇膨脹腸中虚鳴宿食不消[illegible]並同

沉香降氣湯

降真香　沉香　白膠香
虎頭骨 酥炙　人參　鬼箭
草龍膽 各等分

右爲末次入雄黃五錢麝香一錢煉蜜丸乳香湯化下又令兒帶及燒於內尤妙

葛氏肘後救卒死或先病或常居寢臥奄忽而絕

中惡

右取葱黃心刺其鼻男左女右入七八寸小兒量度之若使目中血出佳扁鵲法同是後吹耳條中扁言此云吹鼻故別爲一法

又方　右令二人以衣壅口吹其兩耳極則易人可以筒吹之並捧其肩上側身遠之莫臨死人上

又方　右以葱葉刺耳耳中鼻中血出者莫怪無血難治有血是候時當捧兩手忽放之須臾死人自當舉手撈人言痛乃止又男刺左鼻女刺右鼻中令入七八寸餘大效小兒當度之亦治自縊死此扁鵲方同

又方　右以綿漬好酒中須臾置死人鼻中手按令汁入鼻中并持其手足莫令驚

又方　右視其上唇裏弦有如黍米大以針決去之

又方　右以小便灌其面數迴即能語此扁鵲法也

又方　右末皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣

又方　右割雞冠取血以塗其面乾復塗并以灰營死人一周

又方　以管吹下部令數人互吹之氣通則活

中惡

千金治卒忤方　此猶即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類爲治皆參取而用之

右鹽八合以水三升煮取一升半二服得吐即愈

備急方云治鬼擊者小便不通筆頭七枚燒作灰末和服之即通

聖惠桃奴散　治小兒中惡心腹堅脹疼痛顏色青黑大便不通

桃奴 伍枚　甘草 一分炙微赤剉　麝香 一分細研
杏仁 二拾枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　桔梗 去蘆頭
赤芍藥　黃芩　柴胡 去苗
川升麻　川大黃 剉碎微炒　鼈甲 [illegible]

右件藥擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服以利為度量兒大小以意加減

鬼箭羽散 治小兒中惡心堅強卒痛欲困

鬼箭羽 真珠末各一分 羚羊角屑

桔梗去蘆頭 川朴硝 川升麻

赤芍藥 柴胡去苗 黃芩各半兩

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 川大黃一兩剉碎微炒

右件藥服法同前

聖惠雄黃丸 治小兒中惡心痛辟除邪氣

雄黃細研 真珠末各半兩 麝香

牛黃一分細研 巴豆二十枚去皮心研紙裹壓去油

右件藥都研令勻入棗瓤及煉蜜和圓如粟米大每服以荊芥湯下三丸量兒大小加減服之

嬰孺方鬼箭羽湯 治小兒中惡心腹堅痛欲困

鬼箭羽三分 朱砂一分 羚羊角屑

桔梗 鬼臼 朴硝湯成下

升麻 芍藥 柴胡各五分

黃芩四分 大黃四分 桃仁二十枚去皮尖

右以水四升煮一升二合二歲兒為四分溫服

大小與服之

時氏肘後灸法以繩量其死人肘腕男左女右

繩從背上大椎度以下又從此灸橫行各半繩

三灸各二所起又令病人人中取盡不也名陰

其手灸下文頭隨年壯又灸鼻中二壯也又灸

宛宛中名承漿先十壯大効又灸兩足大指爪上

毛中七壯此華陀法一云三七壯又灸臍中百壯也

卒死

巢氏云小兒卒死者是三虛而遇賊風故無病倉卒而死也三虛者乘年之衰一也逢月之空二也失時之和三也有人因此三虛復為賊風所傷使陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外而氣壅閉陰陽不通故暴絕而死也若腑臟未竭良久乃蘇亦有挾鬼神氣者皆須邪退乃生也凡中客忤及中惡卒死而邪氣不盡停蓄心腹久乃發動多變成疰也

茅先生卒死候眼合口噤齒緊身如綿軟面青黑口鼻冷此候因驚後不下而結成熱或因有驚感得人一向甚不曾下得驚積久結積遂積聚被邪氣至此

右前件二簡候邪來一般只是要辨元初受患根源治之先下散與吃下風涎 痢後使下勾氣散 二服後下朱砂膏 鎮心丸 與服如有依前候下大黃散 與調理二三日安樂 前件二簡形候只是此一般調理上件疾見鴉聲上喘倒指汗如珠不得臉眼障淚出死候不治

右以馬尿一團絞取汁灌之無濕者水煮乾者取汁

葛氏肘後救卒死而壯熱者

右用礬石半斤水一斗半煮消以漬腳令沒踝

又方救卒死而目閉者

右用騎牛臨面擣薤汁灌之耳中

又方救卒死而四肢不收矢便者

右取牛洞一升溫酒灌口中洞者稀糞也

千金卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也

右用牽牛臨鼻上一百息牛舐必差牛不肯舐著鹽汁塗面上即牛肯舐

又方 右灸熨斗熨兩脇下 備急方云治尸厥

治魘死不自覺者方

右用慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語取東門上雞頭末之以酒服

治卒魘死方 右搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳

景云灌口中

治鬼魘不悟方 右末伏龍肝吹鼻中

又方 右末皂莢如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死

集驗方云

聖惠治小兒卒死方

右取女青末半錢用牛乳汁調服之

又方 右燒猪猪糞水解取汁服之

又方 右以苦參醋煮汁少許內口中即蘇 水煮亦得 又酒煮猪脂木皮取汁服少許

又方 右煎鹽湯令極鹹以物拗口開灌之令入腹即活

又方 以熱湯和灰厚擁身上逡巡即蘇

嬰孺治小兒不知所病便死絕方

右取雄雞冠臨兒口上割血滴入口下即活 千金方 幼科九 同上

明後灸法 卒死而四肢不收屎便者灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯兒小者隨年壯 合谷穴在 手大指間虎口各有餘息

鬼持

巢氏云小兒神氣軟弱精爽微羸而神魂被鬼所持錄其狀不覺有餘疾而但變異多大啼驚口氣常是也 嬰童寶鑑小兒鬼持小兒氣弱命中衰魂魄多怠被鬼持其候夜啼多驚惕不須用藥可良師 鬼氣歌云 鬼氣生時常哭叫目中帶喘間虛如水病一般似驚癇熱發渾身溫心虛常所驚小兒還有此服藥急須看

聖惠治鬼持方 右用虎睛爪牙指骨毛以繫小兒臂上辟惡鬼 見持 幼科又 百金

外臺深師五邪丸 療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此為鬼忤當得殺鬼丸方

丹砂 雄黃 各別研 龍骨

馬目毒公 鬼箭 各伍兩 鬼臼 二兩

赤小豆 三兩 芫青 一枚 桃仁 百枚去皮尖熬別研

右九味擣下篩細研篩合諸藥拌令勻調後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬見之亦服蜜和丸如梧子大一服三丸日三服忌五辛生血物

疰病

尸疰　蠱疰

巢氏云疰之言住也謂其風邪鬼氣留人身內也人無問大小若血氣虛衰則陰陽失守風邪鬼氣因而客之留住肌肉之間連滯腑臟之內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮腫沉滯至死死又疰易傷人故爲疰也小兒不能觸冒風邪多因乳母解脫之時不避溫涼暑濕或抱持出入早晚其神魂軟弱而爲鬼氣所傷故病也

千金治小兒疰方　幼科九

疰方

右用竈中灰鹽等分相和熬熨之

千金大乙備急散　主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼痱及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒陰毒疰六七日方

雄黃　芫花　桂心各二兩

丹砂　蜀椒各一兩　藜蘆

巴豆各一分　附子炮裂去皮臍　野葛　分

右九味巴豆別治如脂傍合治下篩以巴豆合和更擣令勻調以銅器中密貯之一勿泄有急疾水服湯液當于下皆愈忌之月賢不行

千金治邪病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

獺肝一具　雄黃　莽草

丹砂　鬼臼　犀角

巴豆各一兩　麝香二分　大黃

牛黃各一兩　蜈蚣一枚

右十一味末之蜜圓如麻子服如麻子大二圓加至三圓以知爲度

尸疰　幼科九

巢氏云尸疰者是五尸之中一尸疰也人無問小大腹內皆有尸蟲尸蟲爲性忌惡多接引外邪共爲患害小兒血氣衰弱者精神亦羸故尸疰因而爲病其狀沉默不的知病之處或寒或熱淋瀝涉引歲月遂至於死死又疰易傷人故名之爲尸疰也

張渙論小兒亦有疰病與大人疰病無異久後并易傷人傳染骨肉如尸疰蠱毒之類是也

張仲景治大人小兒服尸走馬湯方

巴豆去心皮　杏仁去皮尖各二枚

右二味取綿纏捶令極碎投熱湯二合捻取白汁

服之須臾若未定更一服老小量之通療兒學有
尸疰者常蓄此藥用驗忌野猪肉魚笋備急同

聖惠木香散 治小兒尸疰心腹脹滿疼痛不可忍

木香 鬼箭羽 桔梗去芦頭
當歸剉微炒 紫蘇莖葉各半兩 檳榔三分

右件藥搗羅為粗散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候溫服更量兒大小加減服之

犀角散 治小兒尸疰及中惡諸病皆主之

犀角屑 川升麻 木香
川大黃剉碎微炒 桑根白皮剉 檳榔各半兩
麝香細研 桃仁一十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下半錢日四五服更量兒大小加減服之

張渙雌黃丹 治尸疰病

雌黃 雄黃各細研 川大黃濕紙裹煨
鬼臼去毛各 桃仁三十箇湯浸去皮尖研
白頭翁各半兩已上搗羅為細末
麝香一分另研 巴豆十粒去皮心膜

右件都研勻以羊脂和丸漿水服如黍米大三粒至五粒荊芥湯下更量兒大小加減

立効湯

川大黃剉炒 乾蝎柳葉一分 麝香 梔子仁
赤芍藥各半兩已上搗羅為細末次用
朱砂一分細研水飛 麝香半分細研 雄黃細研各一分

右件都拌勻每服一錢蜜湯調下量兒大小加減服之

巢氏云人有造蠱毒者以蟲蛇之類以器皿盛之令相啖食餘一存者即名為蠱能變化或隨飲食入腹食人五臟小兒有中者病狀與大人老子無異則心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉歷歲月漸深羸困食心藏盡利血心臟爛乃至死死又注易傍人故為蠱疰也

外臺范汪療大人小兒蠱注百病癥瘕積聚發側脅內大小便不利有遺風癎腹脹滿淋水轉相注殃門盡戶延及男女外孫醫所不能療更生十七物紫參丸方

紫參 人參 半夏湯洗
藜蘆 代赭石 桔梗
白薇 肉蓯蓉各三分 石膏
大黃 牡蠣熬 丹參各一分

蝦蟆 [illegible] 烏頭 [illegible] 狼毒 [illegible]
附子 炮伍分 巴豆 [illegible]
右件藥搗篩蜜和爲丸以飲下如小豆大一丸日三
服老小以意減之[illegible]忌豬
肉冷水[illegible]

犀角散 治小兒中蠱腹內堅如石面目青
黃小便[illegible]
犀角 屑 蘘荷 各 兩 梔子仁 七枚
赤芍藥 牡丹皮 黃連 去鬚 各 分
犀角[illegible] 百合
右件藥搗篩爲散每服壹錢以水壹小盞煎至
五分去滓溫服日三四服更量兒大小加減

又方
白鮮皮 [illegible] 苦參 蘘荷根 各一兩
右件藥搗篩爲散每服壹錢以水壹小盞煎至
五分去滓溫服日三四服更量兒大小加減服之

升麻散 治小兒初中蠱毒
川升麻 桔梗 去蘆 菰瓠根 各半兩
右件藥搗篩爲散每服壹錢以水壹小盞煎至五分
去滓溫服[illegible]五服量兒大小加減

雄黃散 治小兒飛蠱狀如鬼[illegible]
雄黃 [illegible] 犀角 末各半兩
右件藥細研令勻每服[illegible]調下半錢日四
五服量兒大小加減

治小兒五種蠱[illegible]之方
右搗[illegible]以水壹小盞
煎五分去滓[illegible]不快吐即
再服

又方 右用敗鼓皮方寸片燒灰細研爲散空心以粥
飲調服[illegible]須臾當呼蠱主姓名病便愈

又方 右用蘘荷[illegible]搗羅爲末以粥飲調下壹錢
其効量兒大小加減服之

治小兒蠱忌中蠱欲死方
右用甘草半兩生剉以水一中盞煎至五分去滓
分爲二服當吐蠱出若平生預防蠱者宜熟炙甘
草煮汁服之即內消不吐神効

治小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露骨立病
變無常方 右用桃根白皮貳兩搗細羅爲散如
茶點服之日四五服

又方 右用[illegible]半錢細研空心服以新汲水[illegible]服即[illegible]

出蠱毒未効再服

治小兒中蠱下血欲死方

右取牛赤雌雞翅下血服之立効

又方　右擣青藍汁頻頻與半合服

嬰孺雄黃丸　治小兒疰病諸蠱魅精氣入心入腹刺痛黃瘦骨立

雄黃　雌黃各肆分　丹砂

野丈人　徐長卿各叁分　大黃伍分

麝香大棗大　羚羊角屑伍分

右為末以青羊脂和丸百日兒酒服黍大三丸日進二服或豆大亦可

張渙雄黃散　專治蠱毒病

雄黃各一分　麝香別研　羖羊角屑

赤芍藥　敗鼓皮炙黃各一兩　馬兜鈴根

蘘荷已上七味各半兩已上藥除麝香外擣羅為細末

右件八味都一處拌勻研細每服半錢溫熟甘草湯調下食前

麝犀湯

犀角屑　[illegible]　[illegible]

水磨雄黃細研各一兩　甘草炙

牡丹皮各半兩　已上擣羅為細末次用

麝香細研半兩

右件都拌勻每服一錢水一大盞煎至五分去滓放溫時服

瘍醫準繩自序

周禮天官冢宰之屬有疾醫有瘍醫瘍醫即今外科之分久矣疾醫中士八人瘍醫下士八人重內輕外自古已然然未有不精乎內而能治外者也瘍醫之所不能生者於父母血氣猶得全而歸之而瘍醫不然至於關節筋骨潰流肌肉男甚焉府而後終為故疾病於人唯瘡瘍最陰而世顧輕之何哉乃世之瘍醫明經絡諳方藥而不嗜利唯以活人為心者千百無一也其見輕固宜然不曰拜自輕其命耶余童而習岐黃之術弱冠而治女弟之乳瘍虞翁之附骨瘍皆起白骨而肉之未嘗有所師受以為外科易易耳後得聰明有志者猶從之復為瘍醫而竟無有該集先代名醫方論以獨得而厥是編與世專科書圖人形列方不肯說為祕傳者焉焉不侔能無而玩神而謂之可以名世矣余

既以便差還故山例得侍父優游之則不安靜之則立異乃以付梓人遂於而後竣事於是諸科分證用藥之書略備夫孰使余得搞揣於朝而又得優游編著以行於世豈非聖主之賜也歟

萬曆三十六年歲在戊申七夕後兩作涼

金壇王肯堂奮懶軒下書

瘍醫準繩目錄

卷之一

癰疽之源一　癰疽之別二　脈法三
分經絡四　善惡五　虛實六　內消七
內托八　灸九　鍼烙十　砭鎌十一
敷貼十二　淋洗十三　將護十四　禁忌十五
用藥十六

內疎黃連湯　內托復煎散　當歸黃芪湯
托裏榮衛湯　加味當歸飲子　人參敗毒散
郭氏神効洗金散　奪命丹
蟾酥丸　寸金丹　烏金散
勝金丹　奪命丹　內托羌活湯
淨液湯　白芷升麻湯　托裏溫經湯
內托黃芪酒煎湯　內托黃芪柴胡湯
當歸拈痛湯　縮毒金粉散　復煎散
升麻和氣飲　金鍼散　十宣散
十六味流氣飲　千金托裏散　托裏散
[illegible]湯　托裏散　破棺丹
瀉心湯　清涼飲　漏蘆湯
內消升麻湯　單煮大黃湯　宣毒散

內托散　車螯散　內消丸
神仙解毒萬病丸　一粒金丹　郭氏瑞效丸
萬靈奪命丹　千金漏蘆湯　威靈仙飲
五香連翹湯　防風通聖散
升麻和氣飲　半表半裏中和湯　內托散
國老膏　牛蒡粥　解毒散
清心內固金粉散　內追毒丹
獨勝散　遠志酒　越鞠丸
五香散　忍冬酒　金銀花湯
槐花酒　黃芪湯　生地黃散
阿膠飲子　牛膠飲　黃礬丸
托裏消毒散　托裏散　散毒飲子
神効托裏散　木香黃芪散　黃芪四物湯
內固黃芪丸　回陽湯　清熱消毒散
黃連消毒散　黃連解毒湯　清心湯
濟陰湯　玄參散　仲景排膿湯
排膿散　木香托裏排膿生肌散
連翹飲　[illegible]飲子　車螯散
內消散　化毒為水內托散　仙方活命飲
潔古保安湯　秘方托裏散　秘方拔毒散

歸芪湯　破毒無忌丸　消毒散
榮衛返魂湯　龍虎交加散　護心散
當歸連翹散　如神托裏散　生肌散
前鋒正將　引兵九鋒　加味十奇散又名固壘元帥
豨薟散　沖和仙膏　神功散
閒藥　傅藥　將軍鐵箍膏
止鐵箍散　大鐵箍散　水黃散
外用漬毒藥　圍毒方　雄黃散
烏龍膏　宣毒散　拔毒散
蠲毒散　退毒散　神功妙貼散

特異萬靈散　隔皮取膿法　雄黃散
萬應鍼頭丸　鍼頭散　萬捷青雲膏
四虎散　回陽玉龍膏　洪寶丹
乳香膏　金黃散　七寶散
太白膏　天花青露散　消腫散
神護膏　水澄膏　五金膏
清涼膏　清水膏　水調膏
郭氏水澄膏　二黃膏　又方搨腫膏
三消散　四面楚歌　水師晶明
網砂膏　六灰膏　援生膏

灸法　神仙隔蒜灸法　神效葱熨法
神效桑枝灸　砭法

卷之二
潰瘍

替鍼丸　替鍼丁香丸　托裏溫中湯
加味十全湯　補中益氣湯　人參養榮湯
四君子湯　六君子湯　異功散
四物湯　八珍湯　十全大補湯
歸脾湯　人參黃芪湯　托裏當歸湯
人參散　麥門冬湯　護壁都尉

六味丸　　東垣癰疽用藥法
人參內托散　黃芪散　當歸補血湯
沉香散　加味逍遙散　梔子黃芩湯
六合回生丹　驪龍散　麥飯石膏
解毒百用膏　劉氏逼毒散　青散子
雄黃解毒散　豬蹄湯　集香散
熏洗方　雄黃散　烏金膏
追毒丹　追毒烏金散　梧桐淚方
神異膏　止痛拔毒膏　郭氏青金錠子
翠霞錠子　信效錠子　紅玉錠子

時効鍼頭散　追毒餅　搜膿翠青錠子
搜膿錠子　麝香輕粉散　膏藥神効當歸膏
神異膏　熱瘡寒膏藥　寒瘡熱膏藥
神仙太乙膏　金絲萬應膏　善應膏
玄武膏　金絲膏　貼膏法
長肌膏　生肌精要生肌散　平肌散
郭氏立應散　生肌散　紅玉散
定肌散　生肌散　神秘方
木香檳榔散　治冷瘡熱瘡藥　乳香散
聖効散　桃紅散　斂瘡口黄丹散

久漏瘡
骨碎補丸　大倭丸　桂附丸
陷脉散　治漏瘡方　取朽骨方
豬骨膏　附子散　雄黄散
黑靈散　馬齒莧膏　神應膏
檳榔散　治漏外塞藥　烏金散
東垣截疳散　應効散
癰疽所兼諸證
渴
托裏消毒散加減法　竹葉黄耆湯
托裏黄耆湯　托裏養榮湯　黄耆六一湯
七味白朮散　竹葉石膏湯　玄參散
葛根散　乾葛飲　忍冬丸
桑枝方　五味子湯　加減八味地黄丸
嘔
橘半胃苓湯　托裏消毒散加減法
托裏健中湯　托裏益中湯　托裏抑青湯
托裏清中湯　托裏益黄湯　托裏越鞠湯
人參理中湯
痛

托裏消毒散加減法　黄芪人參湯
加味解毒湯　内補黄芪湯　當歸和血散
迴瘡金銀花散　郭氏定疼托裏散　乳香止痛散
乳香黄芪散　人參内托散　乳香丸
乳香定痛散　豆豉餅　乳香膏二方
出血
東垣聖愈湯　濟生犀角地黄湯　獨參湯
托裏消毒散加減法
瘡僵肉　瘡攣手急牽陰入腹
咽喉口舌生瘡

大便秘結
潤腸丸
大便瀉利
加減托裏消毒散　和氣散
四神丸　二神丸
小便淋悶頻數
托裏消毒散加減法　黃芩清肺飲
滋腎丸　五苓散　清心蓮子飲
五淋散　清肺飲　腎氣丸

琥珀散　瞿麥散
頭痛眩暈　煩躁　自汗盜汗　多痰
俱托裏消毒散加減法
喘急
人參平肺散
胸痞
托裏消毒散加減法
目斜視上
瀉青丸
四肢沉重

胃苓湯　參苓白朮散
寒熱往來　厥逆
俱托裏消毒散加減法
面目浮腫
調胃白朮散
陽氣脫陷
附子理中湯　薑附湯　參附湯
內癰
傣忠丹
肺癰

小青龍湯　葶藶大棗瀉肺湯　桔梗湯
葦莖湯　加味消風散　黃昏湯
如聖丸　濟生桔梗湯　仲景桔梗白散
牡丹散　如金解毒散　桔梗湯
四順湯　治肺癰方　瀉白散
濟生排膿湯　排膿散　寧肺湯
人參補肺湯　人參平肺散　參芪補脾湯
葶藶散　補肺散　理肺膏　五香白朮散
腸癰
薏苡附子散　牡丹湯　薏苡仁湯

牡丹散　梅仁湯　大黃湯
四聖散　雲母膏　排膿散
神仙蠟礬丸
胃脘癰
射干湯　復元通氣散　芍藥湯
心癰
涼血飲　內托散
腎癰
八味丸　加味十奇散
疔瘡
二活散　奪命丹　返魂丹二方
飛龍奪命丹　走馬赶疔丹　救生丹
羅氏破棺丹　內托連翹散　奪命丹
雄黃丸　追毒丸　奪命返魂散
□□疔奪命散　御史散　加減通聖散
追疔奪命湯　加減追疔奪命湯　防風當歸湯
雄麝湯　解毒消癰散　劫癰消毒散
雄黃消毒散　四神丹　七神散
萬全散　七聖紫金錠　朱墨丸
祛濕散　天馬奪命丹　萬病解毒丸

刷瘡　撥□　洗瘡方
羅氏托裏散　連翹□□湯方　羅氏□□錠子
滴滴金　疔瘡錠子　回瘡錠子
神聖膏藥　奪命散　郭氏寸金錠子
郭氏拔丁錠子　郭氏□□散　麝香蟾酥丸
追毒丹　水沉膏　海馬拔毒散
芫花根膏　治疔□□□　四聖旋疔散
拔毒散　保生錠子　濟生金液散
鐵罐膏　蟾酥丹　鐵粉散
雄黃散　追毒丸　三因蒼耳散

麻蟲膏　蜣螂膏　水沉膏
敷疔膏　灸法　鍼法
百二散　拔黃散　破棺丹
走馬回疔丹　蟾酥走黃丸　二仙蟾酥錠子
化毒丸　霹靂火

卷之三
瘍疽部分
頭部一
百會疽　頂門癰　額疽　太陽疽
髮疽　髮際瘡　癩頭瘡　腦疽

柴胡清肝散　松脂膏　貝母膏
加味平胃散　螵蛸散　黃連消毒散
羌活當歸湯
面部二
發眉　鼻疽　發髭　顴瘍
頰瘍　發頤　面瘡　牙叉發
承漿癰
犀角升麻湯　連翹敗毒散　加味消毒飲子
內托消毒散　消毒救苦散　百合散
二金散　洗面藥方　面油摩風膏
瑩肌如玉散　白附丹　白附子散
祛風白芷散
耳部三
耳發　耳內瘡　耳根毒　耳後疽
水銀膏　胡粉散　黍粘子湯
曾青散　黃連散　當歸川芎散
梔子清肝散　加味地黃丸
口齒部四
口瘡　牙癰　骨槽風　上腭癰
唇瘡

黃連升麻湯　綠袍散　蜜陀僧散
牛黃散　甘桔散　乳香散
没藥散　紅芍藥散　清胃散
東垣神功丸　多効散
項部五
百脉疽　頸癰　項中疽　天柱疽
杼疽　夾喉疽　結喉癰
瘰癧馬刀
東垣連翹散堅湯　升陽調經湯
散腫潰堅湯　救苦勝靈丹湯　柴胡通經湯
柴胡連翹湯　消腫湯　太乙膏
尅効散　下瘰散　羌活連翹湯
防風羌活湯　加味消毒散　嚴氏三聖丸
保命連翹湯　二因必效丸　白花蛇散
小犀角丸　是齋立應散　[illegible]散
遇仙無比丸　射干連翹湯　栝蔞子散
枳殼丸　內消丸　必効散
雞鳴散　法製靈雞彈　妙靈散
內消連翹丸　薄荷丹　四聖散
瞿麥飲子　海菜丸　檳榔散

[illegible] 絳宮丸 治瘰癧結核方
祛風丸 水紅花散 保命[illegible]膏
破結散 益氣養榮湯 散腫潰堅丸
補陰八珍湯 夏枯草湯 托裏[illegible]丸
化氣調經湯 追毒神異湯 蟾酥膏
綠雲膏 金寶膏 龍珠膏
蝸牛散 粉金散 東垣[illegible]散
郭氏奇功散 蝙蝠散 螺灰散
神聖換肌散 生肌乾膿散 如神散
三品錠子 紫霞錠子 三才絳雲錠子
碧玉錠子 清涼散餅 香附餅
荔枝膏 琥珀膏 蜂房膏
鐵筒拔毒膏 黑虎膏 十香膏
洗方拔毒湯 鍼灸法
肩部六
肩疽 肩胛疽 左右串 缺盆疽
肩後疽 過肩疽 瘭疽癰 腋發
夾肢癰
臂部七
臂癰 肘癰 臑癰

白芷升麻湯 [illegible]膏 [illegible]膏
泥油膏 二瓜散
手部八
手發背 手心毒 虎口疽 腕癰
手大指疽 天蛇頭 手指節發 代指
手背補根膏 手心蜈蚣散 [illegible]草[illegible]散
落鴉鎗散 紫金牛[illegible]散 [illegible]拔毒散
治蛇消腫散 除癀消毒散 泛毒散
二品金雞[illegible]散 代指[illegible]升麻湯
胸部九
井疽 甘疽 膻中疽 脾發疽
乳癰乳巖
內托升麻湯 神效瓜蔞散 究原五物湯
連翹飲子 清肝解鬱湯 復元通氣散
消毒散 百齒霜丸 兵部手集方
張氏橘皮湯 獨勝散 鹿角散
雲岐連翹湯 [illegible]川方 敷乳方
卷之四
腹部十
腹疽 內發丹毒

腹部十一
臍上疽 臍癰 小腹疽
背部十二
發背
腰部十三
腰疽 纏腰火丹
下部十四
便毒 毛際瘍 囊癰 陰瘡
婦人陰瘡 穿襠發 鏇疽 湧泉疽
脊癰 懸癰
便毒 子和玉燭散 便毒初起 巳結成膿者
三物湯 四神散 雙解散
補骨脂散 消毒五聖湯 消毒飲
止痛妙絕散 牡蠣散 防風通聖散
蘇方散 東垣青皮湯 復原通氣散
瓜蔞散 威靈仙散 加減龍膽瀉肝湯
退毒散 立消散 敗毒方
鐵圍散 囊癰 加味瀉肝湯 加味小柴胡湯
石灰散 烏金散 腎藏風 三因四生散
本事烏頭丸 全蠍散 牡蠣散

洛浴湯 陰瘡膏 小浴方
沐浴長春散 銅綠散 青黛散
下疳 子和導水丸 大蘆薈丸 八正散
洗毒湯 金銀花散 洗藥
敷藥 追膿錠子 七寶檳榔散
玉粉散 蚯蚓散 丹礬散
地連散 川連散 神妙方
麝香散 津調散 胭脂散
蝦藻散 截疳散 甘石散
胭子散 銀粉散 博金散
勝金散 婦人陰瘡 洗搨散 甘濕散
桃枝熏法 蛇床子散 腎藏風 內托羌活湯
懸癰 甘草膏 清心蓮子飲 加味托裏散
加味十全大補湯 雞內金散
股部十五
股陰疽 股陽疽 附骨疽 腿游風
委中毒
附骨 黃狗下頦方 三生散 內托黃芪柴胡湯
內托黃芪酒煎湯 當歸散 滲濕湯
應痛丸 貫衆湯 蜜陀僧散

膝部 十六
鶴膝風
加味小續命湯　羅氏伊祁丸　換骨丹
大防風湯　還少丹
脛部 十七
脛疽　脛陰瘡　三里發　接骨發
驢馬墜　青蛇便　瓜藤纏　濕毒流注
下注瘡　內踝疽　外踝疽　多骨疽
腓腨發　臁瘡　風疽
二妙丸　黃芪丸　翠玉膏
乳香散　輕粉散　隔紙膏
奇妙梔子散　腎風 蒺藜丸　驢蹄散
風疽 防風湯　海桐皮散浸洗方
足部 十八
脚發　脫疽　脚氣瘡　甲疽 附甲
脚指縫爛瘡　足跗發　足跟疽
足心癰
脫疽 五神散　洗瘡方　脚氣瘡 犀角散
漏蘆丸　鹿茸丸　頭礬散
龍骨散　甲疽 蝦蟆散　豬蹄湯

白礬散　馬齒散　蘭茹膏
綠礬散　蛇黃散　乳香傳方
牡蠣散　烏梅散　華陀沿散甲疽効方
砂糖方　乳沒散　烏倍散
黃連散　香[illegible]散　雄蟬散
陀僧散　黃膏方　蟾水駐車丸
乳香散　訶子散　蟾礬散
神應散　牛黃金虎丹　牛蒡散
百草膏　足 五靈散　數藥
洗藥　松脂膏　無食膏
蠟礬散　蟾酥膏
卷之五
諸瘍
兩面雞散　雞屎子散　退熱消毒散
天花刮毒散　退腫消核散　消腫切毒散
犀角飲　熨風散　鹽沙熨方
水澄膏
石癰石疽
犀角湯　黃連散　大黃散
沉香湯

瘰癧
射干散　丹砂膏
反花瘡
胭脂散　甘草塗傅方　雄黃眼冷傅方
多骨疽
時毒
托裏溫經湯　郭氏升麻牛蒡子散　芩連敗毒散
葛根牛蒡湯　返魂丹　消瘡湯
五利大黃湯　加減解毒丸　羅氏消瘡散
消毒丸　防風通聖散　通聖消毒散
中和湯　芩連消毒飲　通氣散
流注
疏肝流氣飲　敗毒流氣飲　方脈流氣飲
去熱散　九金六馬散　散血消核湯
二馬散　立效散　淡酒方
續骨散　輕脚散　嘣骨散
獨杏散　獨獄散　退劑散
釣鉤藤散　馬鞭散　妙草散
一妙散
楊梅瘡

萆薢湯　換肌消毒散　獨禪消毒散
獨毒換肌飲　九藥　膏藥
發癥瘡毒方　熏法　洗方
水銀膏
惡瘡
乳香消毒散　連翹飲　救苦黃芪散
托裏金銀地丁散　紫花地丁散　增益四物湯
碧霞挺子　錘惡瘡方　拔毒散
桑螵蛸散　洗瘡藥　塗藥
萬寶代鍼膏　龍葵散　神効方
乳香散　熊膽膏　烏金膏
桃花散
丹毒
金花散　漏蘆湯　五香湯
鬼遺金花散　聖塗散　麻黃散
拔毒散　十二件單方　郭氏金黃散
赤白遊風
如冰散
紫白癜風
龍蛇散　何首烏散　當歸散

本事烏頭丸　金蠶　三黃膏
四神散　紫癜白花蛇散　酸石榴丸
桑枝煎　硫黃膏　灰藋膏
白駁烏蛇散　防風湯　苦參散
摩風膏　玉粉膏　三聖膏
紫桂散　癧瘍風烏蛇散　炊帚散
女萎膏　蜀水花膏　蒼耳丸

烏白癩

蝟皮丸　硫黃散　大黑神膏
蜂房釀酒　白癜白花蛇散　鯪鯉甲丸

天麻煎　苦參酒

癮疹

苦參丸　石南湯　加味羌活飲
羚羊角飲　樺皮散　犀角散
鬼箭羽散　漏蘆丸　楓香丸
加味烏荊丸　烏蛇膏　蒴藋膏
莽草膏　青羊脂膏　蒴藋煎
楓香湯　蒴藋根湯　地骨皮湯
卷柏散　丹參散　升麻膏

疥癬

升麻和氣飲　當歸飲子　除濕散
苦參丸　四生散　羌活散
神效散　八仙散　一上散
五龍膏　楓實膏

疥

麻黃飲　消毒散　升麻和氣飲
枳殼散　枳殼丸　苦參丸
赤小豆散　胎調散　掃疥散
秘傳一掃光　一上散　諸般疥癬加減法
藺茹散　丹砂膏　巴豆膏

神異膏　白礬散　苦參散
苦參湯　一笑散　神捷散
殺疥藥　乾疥秦艽丸　皂角膏
一上散　癢疥烏頭散　黃連散
暴疥　久疥羅氏木香散　濕疥漏蘆散
藜蘆膏　苦參湯洗方　瘡疥

癬

何首烏散　白蒺藜散　苦參丸
三神丸　胡粉散　銀粉散
八寶散　五倍子散　丁香散

水銀膏　定粉膏　黃連膏
半夏散　東坡家蘇　鯽魚膏
凌霄花散　昨葉荷草散　砒霜散
風疥烏蛇丸　白花蛇丸　宣風換肌散
雄黃膏　硫黃散　丹參湯
乾疥羅氏柏脂膏　一抹散　濕疥硫黃散
黃連散　螺殼散　荊芥散
祛濕散
浸淫瘡 熱汗浸漬成瘡
升麻湯　香瓣瘡方　雞冠血塗方

天泡瘡
痤
旋復花丸　黑木子
熱瘡痱子
白蒺藜散　蜜陀僧散　白金散
玉粉散　七寶散　赤石脂散
龍腦粉方　玉女英　棟花粉傅方
癧瘍
羚羊角散　秦艽湯　當歸飲子
烏蛇散　荊芥散　防風散

牛膝散　蒺藜丸　黑龍丸
莽草膏　柳枝湯　丹參湯
垂柳湯
結核
海藻連翹湯　連翹丸　五香散
連翹散　獨活散　清肝益榮湯
癭瘤
海藻丸　守癭丸　海藻酒
白頭翁丸　海藻散堅丸　五癭木通散
五癭丸　昆布丸　藻藥散

二海丸　消癭散　含化丸
通氣丸　黃藥酒　昆布散
三因破結散　玉壺散　人參化癭丹
羅氏寶金散　海帶丸　針砂方
昆布散　神効開結散　六瘤清上消鬱湯
解下除濕湯　南星散　枯瘤膏
井金散　造土黃法　黃龍膏
枯瘤方　點瘤贅方　龍骨散
麻藥　止血藥　桃紅散
肬　痣

手足皴裂
東垣潤肌膏　黄蠟膏
凍瘡
如神散　雉腦膏　豹[illegible]膏
柳櫱散
漆瘡
發痙　類破傷風
水入瘡
皂子散　鉛丹散　去水膏
馬汗入瘡

卷之六　損傷門
跌撲傷損　金瘡　杖瘡　竹木刺針入肉　箭頭入肉
瘀血停積論　亡血過多論　脈法
治法　頭目鼻耳傷　舌唇口喉齒頰傷
頸骨肩胛脇肋傷　手傷　胸腹傷
腰臀股膝傷　脚傷　背脊骨傷
陰囊陰門傷　筋骨傷　束縛敷貼用藥訣
十不治證
整骨麻藥　草烏散　外治方藥熨罨法
定痛膏　消毒定痛散　截血膏

散血膏　羊毛餅　接補消腫膏
活血散　一赤散　一黄散
一白散　萬金膏　洗藥荊葉散
接骨丹 二方　走馬散　乳香膏
白膠香散　紫金皮散　消腫膏
芙蓉膏　紫金膏　揉損膏
松葱膏　退腫膏　一紫散
一綠散　退熱散　澤蘭散
內[illegible]方[illegible]　踈風敗毒散　加味交加散　羌活乳香湯
仲景治損傷方　復元活血湯　巴戟湯

當歸導滯散　導滯散　奪命散
雞鳴散　清上瘀血湯　消下破血湯
大紫金皮散　破血藥　花蕊石散
破血消痛湯　二十五味藥　沒藥降聖丹
清心藥　水仙散　止痛藥
散血定痛補損丹　定痛當歸散
四草定痛湯　聖靈丹　何首烏散
[illegible]骨散　活血丹　大活血丸
黄末子　白末子　紅末子
黑末子　牡丹皮散　橘术四物湯

黑神散　當歸鬚血湯　復元通氣散
接骨散　定痛接骨紫金丹　麥斗散
接骨仙方　搜損尋痛丸

金瘡

治金瘡白藥　太乙膏　神傷膏
金瘡神効方　封口藥　洪藥
麻藥　木香地黃散　白芨散
灰彈散　潔古木藥散　生肌止血立効方
劉寄奴散　神仙刀箭藥　麒麟竭散
如神散　金傷散　定血散
五倍散　神奇散　軍中一捻金散
龍骨散　金傷散　完肌散
生肌膏　定血散　松皮散
蘗蛆方　蒲黃方　艾葉方
仲景王不留行散　定痛乳香散
地榆絹煎　當歸散（一名內補散 一名茯苓散）　內塞散
蒲黃散　神仙止血散　磁石散
敗弩弦散　生乾地黃散　白薇散
琥珀散　虎骨散　豆淋酒
必效酒　塗封方　葫蘆方

箭頭入肉

踢鐵膏　雄黃散　紅散子
牡丹散　蟾蜍丸　解骨丸
牛膝膏　鼠油膏　胡椒餅
萬全神應丹　藍汁飲　貝子散

竹木刺針入肉

綠礬散　牛蒡葉散　松脂方
排蠑丸　神聖膏

杖瘡

黑代丹　乳香散　雞鳴散
五黃散　潔古沒藥散　乳香散
龍腦潤肌散　杖瘡丹　圍藥
傳杖瘡妙方　生肌桃花散　靈異膏
乳香膏　銀粉膏　牛脂膏
紅膏藥　白膏藥　黑膏藥
秘傳杖瘡膏方

傷損科分證主治大法

脇肋脹痛

小柴胡湯　破血散

腰脊痛

地龍散
腹痛
加味承氣湯　定痛乳香神應散
小腹引陰莖作痛　肌肉間作痛　創口痛
瘀血作痛　血虛作痛
骨傷作痛
沒藥丸
濕痰作痛　肝火作痛　青腫不消
腐肉不潰　新肉不生　出血　瘀血泛注
昏憒　眩暈　煩躁　發熱

方氣脫陷　胸腹滿悶　作嘔
嘔吐黑血
加味芎藭湯　百合散
喘咳
二味參蘇飲　十味參蘇飲
作渴　大便秘結　手足傷損
手足疼痛
應痛丸　乳香散
破傷風
羌活防風湯　防風湯　蜈蚣散

羌活湯　地榆防風散　大芎黃湯
白朮防風湯　白朮湯　蜈蚣朱砂丸
左龍丸　江鰾丸　養血當歸地黃散
廣利方　白丸子　本事玉真散
急風散　如聖散　一字散
發痙　行氣之非　下血之非
寒藥之非　不砭之非　不補之非
湯火瘡
保生救苦散　水霜散　綠白散
清涼膏　生肌膏　黃蘗散

柏葉散　蛤粉散　止痛膏
神效當歸膏　紫雪　雞黃油
灸瘡
止痛生肌散　柏皮膏　綠雲散
四時貼瘡方　內托黃芪丸
諸蟲獸傷
毒蛇咬　蜈蚣咬　蠼螋傷
蠍螫
雄黃消毒膏　一上散
蜂螫　蜘蛛咬　剌毛蟲傷　蚯蚓傷

螻蛄咬　蠶咬　犬咬
瘋犬咬
定風散
馬咬　鼠咬　人咬　虎咬
熊咬　驢涎馬汗入瘡

瘍醫準繩卷之一

金壇王肯堂輯

癰疽之源一

方書叙癰疽之源有五　一天行時氣　二七情內鬱　三體虛外感　四身熱搏於風冷　五食炙煿飲法酒服丹石等熱毒　細之下出於三因也

外因者運氣癰疽有四　一火熱助心為瘡　經云少陰所至為瘡疹又云少陰司天客勝則丹疹外發及為丹熛瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣鬱炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至為瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃大溫其病膚腠中瘡二之氣火反鬱其病熱鬱於上咳逆嘔吐瘡發於中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣氣乃大溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰司天客勝甚則瘡瘍又云少陰之復病疿疹瘡瘍癰疽痤痔又云火太過曰赫曦其病瘡瘍血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也　二曰寒邪傷心為瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注

下又云太陽司天寒淫所勝血變於中發為癰瘍民病厥
心痛又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰
腫瘡瘍是也　三曰燥邪傷肝為瘡瘍經云歲木不及
曰委和上商與正商同其病支廢癰腫瘡瘍邪傷肝
也又云陽明司天燥淫所勝民病瘡瘍本於
肝是也　四曰濕邪瘡瘍經云太陰司天大濕流變物
甚則身後癰又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流
散於外是也　此四條所謂天行時氣者也素問脈
要精微論帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰
此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此
四時之病以其勝治之愈也靈樞經癰疽篇云血脈
榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡
之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復
反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉肉腐則為膿膿
不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不
得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏熏
於五藏藏傷故死矣又云寒氣客於人令勞汗當風寒
薄為皶鬱乃痤又云開闔不得寒氣從之乃
生大僂營氣不從逆於肉理乃生癰腫是亦寒邪從
勞汗之隙及陽氣開闔不得其理之隙久客之為癰
腫也所謂體虛外感及身熱搏於風冷者也治法則
精要十宣散五香湯漏蘆湯术復煎散等發表之劑
是也
內因者陳無擇云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣
鬱而成經云氣宿於經絡與血俱澀而不行壅結為
癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思
有所鬱而成也治之以遠志酒獨勝散并以五志相
勝之理如怒勝思之類是也
不內外因者經所謂膏粱之變足生大丁受如持虛
又東方之域魚鹽之地其民食魚而嗜鹹安其處美其
食魚熱中鹹勝血故其民黑色疏理其病為癰瘍又
有服丹石法酒而致者亦膏粱之類也今東南之高
粱之變亦是滋味過度榮氣不從逆於肉理榮氣者
胃氣也飲食入胃先輸於脾而朝於肺肺朝百脈次
及皮毛先行陽道下歸五藏六腑而氣口成寸矣今
富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積久太過
其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅而先行
陽道乃反行陰道則濕氣大勝子令母實火乃大旺
熱濕既盛必來尅腎若不慎房事損其真水水乏則
從濕氣之化而上行其瘡多出背上及腦此為大疔

之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔更如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病為本非苦寒之劑為君不能除其苦楚疼痛也如東垣治元好問中焚治宅嗣腦疽皆因好酒故以三黃大黃酒製之又如黃連消毒散當歸散之類是也又有盡力房室精虛氣節之所致者亦為不內外因當以補虛內托為主亦忌用香之藥耗真陰而助邪熱治之之祭以內固與消毒神功托裡散之類也

經云五藏不和九竅不通六腑不和留結為癰又云諸痛癢瘡皆屬於心肺乘肝則為癰腎移寒於肝癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣此乃臟腑之變亦為內因者也

東垣曰生氣通天論云營氣不從逆於肉理乃生癰腫又云膏粱之變足生大疔受如持虛陰陽應象論云地之濕氣感則害人皮肉筋脈是言濕氣外傷則榮氣不行營衛者皆營氣之所經營也營氣者胃氣也運氣也營氣為本本逆不行為濕氣所壞而為瘡瘍也膏粱之變亦是言厚滋味過度而使營氣逆行凝於經絡為瘡瘍也此邪不在表亦不在裡唯在其經中道病也已上內經所說俱言因營氣逆而作也遍看諸瘡瘍論中多言熱化為膿者只言熱化為膿者何言濕氣生瘡寒化為熱而為膿者此皆瘡疽之源也宜於所見之處分別之證中分陰證陽證先瀉其根其本不逆大濕熱相合敗壞肌肉而為膿血者此治次也宜遠取諸物以比之一歲之中大熱無過夏當是時也諸物皆不壞爛壞爛者交秋濕令大行之際也近取諸身熱病在身止顯熱而不敗壞肌肉此理明矣標本不得邪氣不服言一而知百者可以為上工矣

癰疽之別

靈樞經云榮衛稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚骨髓不為焦枯五臟不為傷故命曰癰　熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五臟血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽　疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其候也　鬼遺方云癰之痛只在皮膚之上其發如火焚茅初如黍米大三兩

日如掌面大五七日如桃面大即易治如癰冷發渴
發逆治之難愈　疽發或如小㾦觸則徹心痛四邊
微起如橘皮孔色紅赤不全變膿水不甚出至七八
日疼悶喘急不止若始發腫高五七日忽平陷者此
内攻之候也　又云癰疽有三等毒氣浮淺爲肝毒
氣沉深爲賊毒氣猛烈而行經絡或淺或深㽷定五
臟六腑皆受五毒難爲調理唯宜急切於癰發諸處
不問虛實高腫起盛光澤疼痛只在皮膚之上熱急
脹滿或有疼痛別無惡候初用湯藥平氣次用排膿
發穴[illegible]
[illegible]
疽發諸處不拘大小惟起在背廣一尺二
尺三尺皮厚而紫黑高腫不痛内疼如錐刺攻擊滿
悶癰四肢頭疼而心亦[illegible]可唯癰處及近
筋骨處若膿毒未潰[illegible]肉損爲疽者屬五
臟[illegible]氣深沉多氣伏硬堅實而不宜緩慢治之須内
實五臟外透皮膚令較[illegible]膿透[illegible]用内托實臟
氣之藥排膿[illegible]氣乃可不比癰之[illegible]氣浮淺也此作
一類治之　凡一切癰腫始發思起高腫五七日忽
平陷者此是内攻之候也急以内托散及内補湯藥

補塡臟腑令實最怕透膜膜穿十無一生矣　婁全
善云癰之邪淺其稽留壅遏獨在經脈之中[illegible]尊攻
於外故初發時自表便發熱患處便如桃如[illegible]高腫
而痛甚者縱欲下陷緣正氣内固不肯受故或便秘
或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五臟終不
傷也疽之邪深其稽留壅遏内連五臟而不專攻於
外故身體或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶氣脫眼
黑眼小十指腫黑如墨多死也治之之法癰之初發
當以潔古法爲主表者散之裏者下之火以灸之藥
以敷之膿未成者必消膿已成者速潰也疽之初發
當以鬼遺方爲主補塡臟腑令實勿令下陷之邪蔓
延外以火灸引邪透出使有穴歸着而不亂則可轉
死回生變凶爲吉今世外科不分癰疽一例宜熱拔
毒外以五香耗其氣内以大黄竭其血終不能自悟
其藥之非惜哉　集驗云癰疽之名雖有二十餘證
而其要有二陰陽而已發於陽者爲癰爲熱爲實發
於陰者爲疽爲冷爲虛故陽發則皮薄色赤腫高多
有椒眼數十而痛陰發則皮厚色淡腫硬狀如牛頸
之皮而不痛又有陽中之陰似熱而非熱雖腫而實
虛若赤而不燥欲痛而無膿既浮而復消外盛而肉

屬陰中之陽似冷而非冷不腫而實赤微而焮有膿而痛外雖不盛而內實煩悶陽中之陰其人多肥肉緊而內虛陰中之陽其人多瘦肉緩而內實而又有陽變而爲陰者莫醫涼劑之過也陰變而爲陽者大方熱藥之驗也然陽變陰者其證多猶可返於陽故多生陰變爲陽者其證少不能復爲陰矣故多死然間有生者此醫偶合於法百中幸一耳　觀此則癰與疽但有陰陽深淺內外虛實之分而無大小之別精要乃謂二寸至五寸爲癰五寸至一尺爲疽者謬也

脈法三

沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪深在裡宜先疏通以絕其源　浮大數欲脈在外當先托裡恐邪入內

脈不沉不浮內外證無知其在經當和榮衛　脈數身無熱內有癰膿　脈數應當發熱而反惡寒若有痛處當發癰　若數脈不時見當生惡瘡

浮　腫瘍爲虛爲風　潰瘍爲虛宜補

洪　腫瘍爲虛爲熱盛宜當托拔毒至壯形實宜下　潰瘍爲邪氣盛服藥久不退者難治

滑　腫瘍爲熱　潰瘍爲熱爲虛爲邪氣不退

數　腫瘍爲病進爲熱數而洪者欲膿　潰瘍爲難愈數甚者難治

散　腫瘍爲氣不收斂　潰瘍爲痛未退洪滑大散難治

芤　腫瘍爲血虛　潰瘍爲虛爲脈病相應

長　腫瘍宜消退之法　潰瘍爲易愈而長則氣治也

牢　腫瘍爲邪盛爲欲膿　潰瘍爲邪氣不退

實　腫瘍爲邪氣太盛　潰瘍爲邪不退爲實緩需大者爲虛

弦　腫瘍爲痛爲欲膿弦洪相搏外緊內熱爲疽發也　潰瘍爲血虛爲痛

緊　腫瘍浮而緊發熱惡寒或有痛處是爲癰疽　潰瘍主氣血沉澀爲痛爲有外寒

澀　腫瘍爲氣實爲氣滯　潰瘍爲血虛爲病脈相應

短　腫瘍爲元氣不足　潰瘍爲大虛宜補

微　腫瘍爲虛服藥漸充者佳　潰瘍若微而勻者爲虛爲病脈相應

遲　腫瘍爲寒爲虛尺遲爲血少　潰瘍爲虛爲氣

血不能滋榮於瘡爲有外寒

緩　腫瘍爲可治大而緩爲虛　潰瘍緩而濇者愈以其病脉相應及胃氣充也

沉　腫瘍爲邪氣深　潰瘍爲遺毒在内寸沉爲胸有痰

伏　腫瘍爲陰中伏陽邪　潰瘍爲陽伏陰中爲内餒爲流注浸淫難治

虛　腫瘍便宜補而内托　潰瘍膿既泄宜大補氣血

弱　腫瘍爲元氣不足宜内補托裡　潰瘍爲病脉相應宜補

結　腫瘍爲邪氣結　潰瘍漸勻則愈不調則危

促　腫瘍爲熱爲病進　潰瘍爲熱不減漸進則死漸退即生

代　腫瘍爲氣血敗壞元氣損傷　潰瘍爲元氣竭絶

分經絡

人身之有經絡猶地理之有界分治病不知經絡猶捕賊不知界分其能無誅伐無過之咎乎況手足十二經絡有血氣多少之分如手少陽三焦少陰腎太陰脾多氣少血手厥陰心包絡手太陽小腸足太陽膀胱多血少氣手陽明大腸足陽明胃多氣多血此其大較也多血少氣者易愈多氣少血者難療氣多之經可行其氣血多之經可破其血不可執一也　丹溪曰六陰經六陽經分布周身有多氣少血者有多血少氣者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛處怯薄處前哲已有論及惟分經之言未聞也何則諸經惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以其多氣少血也其血本少肌肉難長瘡久未合必成危證又云少陽經多氣少血與厥陰經同少陽有相

火尤甚於厥陰經者其有不思不經少血遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣請述一二成敗之迹以告來者族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側廉上生結核身微寒熱而易怒食味[illegible]之俱浮大兼數而重似[illegible]日此多慮而勞[illegible]血[illegible]在初秋勿[illegible]之宜急[illegible]變證以人參[illegible]作[illegible]以竹[illegible]皆各[illegible]　外科以上宜五香散相間與服旬日後　日大風投木病者發熱神思不佳急召予視之核稍高大似有膿於中起一紅線延過肩後斜走背脊過入右脇下不痛覺有

背重而急迫食有嘔意脉同前但弦多耳急作人參
膏入芎朮生薑汁傳之用人參三斤作膏服乾又與
四物湯加參朮陳皮甘草半夏煎服有餘月而安此
等若在春令雖神仙不治也幸而在秋金之令不幸
因時下暴風激起木中相火而致此自非參朮膏[illegible]
何由得免此正消子所謂補瀉臟腑之法因又一人
[illegible]之後條而 或曰太陰經非多血少氣者乎何
瘡之生[illegible]無其苦往往閒有不救者在乎其能治之
乎予曰髀居小腹之後而又在其下此陰中之陰也
其消潦其位僻遠且多血氣運不到氣既不到血亦

罕來中年已後不可生[illegible]若有補養之脉經阻見
虛弱使與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常治熱
拔毒舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌可不慎歟 東
陽李兄年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且
過於色忽左腿外廉側上發一紅腫其大如栗 醫
聞其大腑堅實與承氣湯二貼下之不效又一醫教
與大黃朱砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後召予
視之曰事去矣又一予兄四十餘面稍白神甚勞忽
脇下生一紅腫如桃 一人教用補劑衆笑且排於是
以流氣飲十宣散雜進之旬餘後召予視之予曰排

惟不與寒劑御且多得補劑利氣血俱傷難矣已而果
然[illegible]一者皆由不預防本經少陽以血遣猛浪用大黃攻擊而死之者也 一男子年
近六十形素肥初夏於左耳後顴側生一核方圓二
寸餘不甚痛召予治時其[illegible]緩大而弱予曰此因
憂悶而生當氣升散之時須急與人參膏五六斤又
宜作何應病家召他外科以十宣散五六貼而潰甚
予曰此太虛也勿以輕小視之病家不信一外科仍
以十宣散進之又五六貼瘡平陷出清水而死 可
為因虛而生瘡者戒 一婦經歷女及笄性急而
形實未嫁[illegible]生瘡骨中痛者年餘醫以

氣藥雜治之愈而復發在秋冬令忽大痛發熱醫者
方悟髀樞穴上生附骨疽在外廉側少陽之分其人
味性急自若自首至尾遂足五香湯十宣散服至春
潰猶與五香湯者月餘忽一日惡寒發熱膈滿醫者
不悟升散太多陰血已絕孤陽狂越於上猶根服五
香飲久多致膈閉[illegible]大服以進一夕喘汗而死[illegible]
者由不預防本經[illegible]宣五香[illegible] 劉宗厚曰
已上病例不係膏粱丹毒火熱之變因虛勞鬱所
致止宜補以[illegible]經脈其瘡當自消散不待汗之
下之而已也其不詳脉證經絡受病之異者下之先

犯病禁經禁故致失手如此丹溪又曰經絡隨痛屬之脉證但有虛弱便與滋補血氣庶得可保終吉若用尋常驅熱拔毒及紓氣虛之禍不旋踵矣夫火熱為病亦有微甚若火得火是也瘡瘍所發有癰疽瘡癤輕重淺深不同或止發於一經或兼二經者止當求責於一二經不可干犯餘經也若東垣處方用藥是已別有兼風兼濕兼痰兼氣兼血兼陰虛等證治病本不同治當求責前論雖略比之世俗外科等書向人形瘡樣而不分經絡者此則大有徑庭矣

頭部

頭角直耳上 足少陽 手少陽

巔 足太陽 督脉

中行 前自鼻上巔後直項中上頂 督脉

第二行 足太陽 各開一寸五分兩旁為頭第二行

第三行 足少陽

面部

額 足少陽 足陽明

鼻 手足陽明 手太陽 督脉

人中 督脉 手足陽明

唇 足陽明

唇內 足厥陰

承漿 任脉 足陽明

上齒 足陽明

下齒 手陽明

舌 足太陰 足少陰

目內眥 手足太陽 手足陽明

目銳眥 手太陽 足少陽 手少陽

眉至額 直鼻而上 督脉 直目內眥而上 足太陽 直目瞳子而上 足少陽 直銳眥而上 手足少陽

頰 直目內眥而下 足陽明 直目瞳子而下 足陽明 足少陽

頰車 足陽明

耳 手足少陽 手太陽

目系 手少陰 足太陽

頸項部

項中間 督脉

拔項大筋中 足太陽

當完骨下 手少陽 項大筋之前曲頰之後也

當耳下 足少陽

當曲頰下 手太陽

曲頰前一寸

挾喉兩旁動脉 足陽明

缺盆中 任脉

咽 足太陰 足少陰 足厥陰

喉嚨 足少陰 足陽明

喉嚨後 足厥陰

肩

前廉 手陽明

後廉 手太陽

上廉 手足少陽

背部

中行 督脉

第二行 足太陽

第三行 足太陽

膺腧部

中行 任脉

第二行 足少陰

第三行足陽明　第四行足太陰

腹部
中間行任脈　第二行足少陰
第三行足陽明　第四行足太陰

腋下
中間手厥陰　前手太陽
後手太陰

脇部
腋直下髀樞足少陽

臑部[illegible]分經絡
前廉手陽明　後廉手太陽
外廉手少陽　內廉手少陰
內前廉手太陰　內後廉手少陰

臂部
上廉手陽明　下廉手太陰
外廉手少陽　內廉手厥陰
內上廉手太陰　內下廉手少陰

股脛部
前廉足陽明　後廉足太陽
外廉足少陽　內廉足厥陰

內前廉足太陰

諸經向導藥
太陽經　上羌活　下黃柏
陽明經　上白芷升麻　下石膏
少陽經　上柴胡　下青皮
太陰經　上桔梗　下白芍藥
少陰經　上獨活　下知母
厥陰經　上柴胡　下青皮

手太陰肺　琥珀　明[illegible]　桑白皮　青皮　檳榔　杏仁　知母　款冬花　五味子　白茯苓　天門冬　十棗　[illegible]參　麻黃　梔子　桔梗　阿膠　益智　黃芩　山藥　葱白　丁香　石膏

少陰心　白豆蔻　砂仁　檀香　豆蔻爲使

足太陰脾　赤茯苓　麻子仁　茱萸　防風　當歸　黃芪　草豆蔻　代赭石　蒼术　膠飴　砂仁　益智　白术　人參甘草爲使　甘草　半夏

通入手足太陰肺脾　白芍藥　玄胡索　升麻　藿香　芍藥　砂仁　木瓜

手陽明大腸　升麻　白芷　麻子仁　肉豆蔻　秦艽　白石脂　葱白　石膏

足陽明胃　丁香　知母　草豆蔻　白术　砂仁　神麯　防風　枳殼　石膏　烏藥　半夏　蒼术　升麻　白芷　葱白

通入手足陽明　檀香　化以佐藥　麻黃　大黃　連翹　葛根　升麻　石膏　白术　白芷

手少陽三焦　川芎　黃芪　大黃　熟地黃　柴胡　石膏　青皮　細辛　白术　附子

足少陽膽　半夏　柴胡　草龍膽
通入手足少陽　青皮　川芎　柴胡　連翹
手厥陰心包絡　牡丹皮　白芷　沙參
足厥陰肝　柴胡　山茱萸　熟地　當歸
　　　　　代赭石　阿膠　甘草　桃仁　青皮
白朮　吳茱萸
通入足厥陰　青皮　熟地　柴胡
手太陽小腸　羌活　生地黃　苦參　桃仁　川芎
足太陽膀胱　滑石　赤茯苓　茵陳　蔓荊子　澤瀉　生薑
　　　　　白茯苓　黃柏　羌活　麻黃
通入手足太陽　蔓荊子　防風　藁本
　　　　　大黃　羌活　白芷
本經各引　外科一　六
手少陰心　麻黃　代赭石　黃連　紫石英　梔子　當歸　生地
　　　　　知母　地骨皮　黃柏　獨活　赤茯苓
足少陰腎　玄參　牡丹皮　阿膠　豬苓
山茱萸　天門冬　豬苓　白茯苓　澤瀉　五味子　甘草　牡蠣　烏藥
吳茱萸　砂仁　沉香　丁香　獨活　益智
通入手足少陰　五味子　細辛　熟地　澤瀉
　　　　　地榆　附子　知母　白朮
命門　附子　益智　沉香　黃芪
瘡瘍有分五善七惡　動息自寧，飲食知味，一善也；
便利調勻，二善也；膿潰腫消，不臭，三善也；神
氣精明，語聲清爽，四善也；體氣和平，五善也。煩
躁時嗽，腹痛渴甚，或泄利無度，小便如淋，一惡也；
膿血大泄，腫焮尤甚，膿色臭敗，痛不可近，二惡也；
喘粗短氣，恍惚嗜臥，三惡也；目視不正，黑睛緊小，
白睛青赤，瞳子上看，四惡也；肩背不便，四肢沉重，
五惡也；飲食不下，服藥而嘔，食不知味，六惡也；
聲嘶色敗，唇鼻青赤，面目四肢浮腫，七惡也。五善見
三則瘥，七惡見四則危。薛氏曰：若大渴發熱，或泄瀉淋閟者，
微邪淺，更能調攝起居，節飲食，勿藥自愈。惡者乃五臟
虧損之證，多因元氣虛弱，或因膿水出多，氣血虧損，
外科一　十七
或因汗下失宜，榮衛消鑠，或因寒涼克伐，氣血不足，
或因峻厲之劑，胃氣受傷，以致真氣虛而邪氣實，外
似有餘而內實不足。法當純補胃氣，多有可生，不可
因其惡遂棄而不治。若大渴發熱，或泄瀉淋閟者，
邪火內淫，一惡也，竹葉黃芪湯；氣血俱虛，八珍湯加
黃芪、麥門、五味、山茱萸，如不應，佐以加減八味丸煎
服。膿血既泄，腫痛尤甚，膿色敗臭者，胃氣虛而火
盛，二惡也，人參黃芪湯，如不應，用十全大補湯加麥
門、五味。目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上視
者，肝腎陰虛而目系急，三惡也，六味丸料加炒山梔

麥門五味如不應用八珍湯加炒山梔麥門五味
喘嗽短氣恍惚睡臥者脾肺虛火四惡也六君加大
棗生薑如不應用補中益氣湯加麥門五味心火刑
尅肺金人參平肺散陰火傷肺六味丸加五味子煎
服　肩背不便四肢沉重者脾腎虧損五惡也補中
益氣湯加山茱萸山藥五味如不應用十全大補湯
加山茱萸山藥五味　不能下食服藥而嘔食不知
味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁如不
應急加附子　聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫
者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加大棗生薑如不

應用六君子湯加炮薑更不應急加附子或用十全
大補湯加附子炮薑　腹痛泄瀉咳逆昏憒者陽氣
虛寒氣內淫之惡證也急用托裏溫中湯後用六君
子湯加附子或加薑桂溫補　此七惡之治法也
此外更有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不
寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒
身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲投於水其脈
浮大按之微細衣厚仍寒此血氣虛極傳變之惡證
也若手足逆冷肚腹疼痛泄利腸鳴飲食不入吃逆
嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡證也若有汗而不惡
寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頸項勁強此
血氣虛極變痙之惡證也俱用參芪歸朮附子救之
間有可生者　大抵虛中見惡證者難治實證無惡
候者易治宋時齊院令雖當論其狀而未具其因我
朝陶節菴雖各立一方亦簡而未悉予故補其缺
云

虛實六

夫瘡疽脹潰腫毒侵淫證候危惡者須辯虛實況夫
虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差
利害甚大然而虛實多端有瘡之虛實有臟腑虛實

有血氣虛實又有上實下虛真虛邪實者不可不辯
也　夫腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿
稀者瘡疽之虛也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手
足逆冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利
聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便
澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽
乾煩躁多渴身熱脈大精神昏塞者悉臟腑之實也
如膿水清稀瘡口不合聚肝不赤肌寒肉冷自汗色
脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿
水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心

熱咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷譫語咬牙者上實也精滑不斂大便自利腰脚沉重睡臥不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶聲敗四肢浮腫者真氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣盛則實又曰諸痛為實諸痒為虛也又曰診其脈洪大而數者實也微細而軟者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疏利而自導其氣也內經謂血實則決之氣虛則掣引之○元戎云若人氣血壅盛

榮衛充滿抑遏不行腐化而為膿者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱榮衛短澀寒搏而為膿者當補之以接虛怯之氣此治虛實之大法也

瘡疽痛息自寧飲食知味脈證俱緩緩則治本故可以王道平和之藥徐而治之亦無不愈若脈實焮腫煩躁寒熱脈證俱實非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡瘍聚腫不潰潰而膿水清稀或泄利腸鳴飲食不入嘔吐無時或手足並冷此脈證俱虛非大補之藥不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也故治其證者當辨表裏虛實隨宜治之庶得

萬全　薛新甫曰瘡瘍之作皆由膏粱厚味醇酒炙煿房勞過度七情鬱火陰虛陽輳精虛氣節命門火衰不能生土榮衛虛弱外邪所襲氣血受傷而為患當審其經絡受證標本緩急以治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣又虛者必先於治本而兼以治標大要腫高焮痛膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫黯黑不潰者元氣虛甚治之尤難者也主治之法若腫高焮痛者先用仙方活命飲解之後用托裏消

毒散漫腫微痛者用托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣血虛也八珍湯不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂不生肌不收斂脾氣虛也四君加芍藥木香惡寒憎寒陽氣虛也十全大補加薑桂晡熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗五臟虛也六味丸料加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾肺虛也前湯加麥門五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛也十全大補湯加山茱山藥

肉桂泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋秘肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸大凡怯弱之人不必分其殺潰惟當先補胃氣或疑參芪滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又有泥於氣質素實或有痰不服補劑者多致有悞殊不知瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血愈虛豈有不宜補者哉故丹溪先生云但見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉　又當拾時從證如腫赤煩躁發熱引冷便秘作渴脈洪數實是爲五實雖在嚴寒之時必用

大苦寒之劑瀉其陽以救其陰若脈細皮寒瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷是爲五虛雖在盛暑之時必用大辛熱之劑散其陰以回其陽內經曰用寒遠寒用熱遠熱有假者反之雖違其時必從其證若執泥常法則誤矣

內消

癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺深大小經絡處所形脈虛實如發於腦背腰項臀臑者皆太陽經也宜黃連羌活背連脇處爲近少陽宜柴胡並宜敗毒散仙方活命飲形實脉實者宜消瘡湯內疎黃連湯追毒丸宜疎利之氣虛者參芪爲上血虛者芎歸爲上佐以消毒之藥隨分野以引經藥行至病所六經分野上有癰疽其在經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟少陽一經雖曰氣多血少而氣血皆不足也治與氣虛血虛同法凡瓜蔞射干穿山甲金銀花夏枯草蟾酥連翹地丁蒼耳木鱉子之類爲內消之藥仙方活命飲內消丸排茶飲子牛膠飲子車螯散返魂丹消毒飲爲內消之方衆皆知之殊不知補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常則

可內消也其外用紫葛湯淋洗及用散香膏貼者亦使氣血和平而腫熱消退也　薛新甫曰瘡瘍之證當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱渴大便秘結者邪在內也疎通之腫焮作痛寒熱頭疼者邪在表也發散之焮腫痛甚者邪在經絡也和解之微腫微痛而不作膿者氣血虛也補托之漫腫不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補之色黯而微腫痛或膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之若泥其未潰而概用敗毒復損脾胃不惟腫者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之

證蜂起多致不救丹溪先生云癰瘍內外皆實者宜以托裏表散為主如欲用大黃寧無孟浪之非潰後內外皆虛宜以托裏補接為主如欲用香散未免虛虛之失治者審之

內托八

癰疽已成血氣虛弱不能起發或邪氣深者邪氣散漫者不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不腐或難得膿而根腳紅腫開大或毒氣不肯出不合聚腫不赤結核無膿者皆氣血虛不能逐毒以六淫之邪而變生諸證必用內托令其毒出於肌表則可愈也凡內托之藥以補藥為主活血祛邪之藥佐之或以芳香之藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其風寒大抵托裏消毒散托裏散小托裏散十宣散皆為要藥但用隨時加減耳如冬月須氣滯之人五香連翹湯虛弱人去大黃素不宜寒藥者小五香湯形脈實膿色稠不可用補藥者恐冬瓜之類大膿出敗肉去紅腫消當用黃芪人參當歸白朮大劑補之令氣血滋茂新肉易長也 餘詳前有隨證加減用藥附以托裏消毒為主誠內托之良法今採入各證中不復贅敘於此

灸九

凡瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經云陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也 凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處即是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚安於頭上用大艾炷灸之三壯即換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方住最要早覺早灸為上一日二日十灸十活三日四日六七活五六日三四活過七日則不可救矣若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚薄正安於瘡上著艾灸十四壯多至四十九壯 一法凡灸乃開結破硬之法倘有一點白粒如粟米起四圍微腫如錢便當於米粒上著艾火十四五壯三日內灸者只成灸瘡而散三日外者其腫漸少宜多灸之或灸火着處則

結熱可伸灸處先潰則毒勢分殺而一發則不致下陷及壞筋骨傷氣血也所謂灸至不痛者謂着皮肉未壞處則痛火至着毒處則不痛必令火氣至着毒處方止所謂灸至痛者謂初着毒處不痛至好肉則痛必令火氣至好肉方止甚灸者或用獨蒜切片或用豆豉餅或用椒薑鹽蔥搗捏作餅子如當三錢厚鋪艾灸之熱則易新餅亦可散也　灸乃從治之意惟頭爲諸陽所聚艾炷宜小而少若少陽分野尤不可灸灸之多至不救亦有因灸而死者蓋虛其孤陽將絕其脉必浮數而大且鼓精神必短有乎無以抵當火氣宜其危也　又精要云六陽經諸陽所會頸項近咽喉腎俞皆致命之所俱不可灸之

河間灸刺法謂凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少腧穴遠近　從背出者當從太陽五穴選用至陰（在足小指外側去爪甲角如韭葉大）通谷（在足小指外側本節前陷者中）束骨（在足小指外側本節後陷中）崑崙（在足外踝後跟骨上陷中）委中（在膕中央約紋中動脈）　從鬢出者當從少陽五穴選用竅陰（在足小指次指端去爪甲如韭葉）夾溪（在足小指次指歧骨間本節前陷中）臨泣（在足小指次指本節後間陷中）陽輔（在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分）陽陵泉（在膝下一寸外廉陷中）　從髭出者當從陽明五穴選用厲兌（在足大指次指去爪甲如韭葉）內庭（在足大指次指外間陷中）陷谷（在足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸）衝陽（在足跗上五寸骨間動脈去陷谷三寸）解谿（在衝陽後一寸五分腕上陷中）　從腦出者則唯絕骨一穴（在足外踝上三寸動脈中）　詳見癰疽灸經

騎竹馬灸法治一切瘡瘍無有不愈令病人以肘凭几豎臂腕要直用篾一條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷爲則不量指甲却用竹杠一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不着地又令二人扶之勿令偏僂却將前所量臂篾從竹杠坐處尾骶骨起貼脊背量至篾盡處爲則用墨筆點定此只是取中非灸穴也却用薄篾作則子量病人中指節相去兩橫紋爲則男左女右截爲一則就前所點記處兩邊各量一則盡處即是灸穴兩穴各灸五七壯疽發於左則灸右疽發於右則灸左甚則左右皆灸蓋此二穴心脉所過之處凡癰疽皆心火留滯之毒灸此則心火流通而毒散矣起死回生之功屢試屢驗

劉宗厚曰此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉尤宜用附子浸透切作大片厚二三分於瘡上着艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長

滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用白麪硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互換用之紝入瘡內歹肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理即瘥矣盖不止宜灸於瘡之始發也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡亦須內托之藥切當設反逆不唯不瘥恐後再生他病之患也

鍼烙十

凡用鍼烙先察癰疽之淺深及時候未成已成高阜而軟者發於血脈腫平而堅者發於筋脈皮色不相辨者發於骨髓高阜而淺者用鈹鍼開之疽始生白粒便可消退漸長如蜂窠者尋初起白粒上烙及四圍烙四五處如牛項之皮者硬頑平而淺者皆宜用火鍼烙之其鍼用圓鐵如筋如緯鋌大頭圓平長六七寸一樣二枚蘸香油於炭火中燒紅於瘡頭近下烙之宜斜入向軟處一烙不透再烙必得膿也瘡口烙者名口熟瘡膿水常流不假按抑用紝藥使瘡口不合舊用紙撚及新取牛膝根如瘡口大小畧刮去皮一頭繫線紝之不如用翠青擻膿等錠子臨用以

糯米飯和成軟條子看淺深紝之外用拔毒膏貼之瘡毒未成烙之可散潰而未破針之可消但要得其宜耳若當用針烙而不用則毒無從而泄膿瘀潰其內腐爛筋壞骨難平兇矣若瘡深針淺膿不得出毒淺針深損傷良肉不當其所他處作頭此皆不能愈疾反增痛耳或瘀癧潰久不愈瘡瘻經年或通或閉癰疽瘡口不收皆因冷滯不能收斂亦宜瘡口內外固瞬烙之瘡症止發及膿見後紅痕亦用鐵針燒赤門閉刺之則新肌生隆續矣毒氣已成者宜用托裏以涼其血熟深淺而針之膿生而用針氣血既泄膿反難成若膿熟而不針腐潰益深瘡口難斂若瘡深而針淺內膿不出外血反泄若瘡淺而針深內膿雖出良肉受傷若元氣虛弱必先補而後針其膿一出諸證自退若膿出而反痛或煩躁嘔逆皆由胃氣虛弱宜急補之若背瘡熱毒熾盛中央肉黯內用托裏壯其脾胃外用烏金膏塗於黯處其赤處漸高黯處漸低至六七日間赤黯分界自有裂紋如刀劃然黯肉漸潰矣當用鈹針利剪徐徐去之須使不知疼痛不見鮮血爲妙雖有裂紋膿未流利及膿水雖出而仍痛者皆未通於

內旋用針於紋中引之患於背胛之間肉腐膿出遂痛仍作此內有毒筋間隔膿未通耳尤宜引之其元氣虛弱濕服托伐患處不痛或肉將效急溫補脾胃亦有生者後須純補之藥庶可收斂若妄用刀針去肉出血則氣無所依附氣血愈虛元氣愈傷矣何以生肌收斂乎　又曰鍼灸之法有太乙人神周身血忌逐年尻神逐日人神而其穴有禁鍼禁灸之論犯之者其病難瘳理固然也但瘡瘍氣血已傷肌肉已壞宜迎而奪之順而取之非平人鍼灸之比何忌之有外科精義云瘡瘍之證毒氣無從而解膿瘀無從而泄反攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎危惡之發於致命之所禍在反掌腹痛滿急一使不通胸腹脹悶煩疔喉痺咽喉癰塞其禍尤速患者審之

蜞針法治癰疽初作先以筆管一箇入螞蜞一條以管口對瘡頭使蜞吮瘡膿血其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴蜞必死矣累試累効若血不止以藕節上泥塗之若瘡頭未明以井邊泥塗上先乾處即是　按此法可施於血實毒淺之證若積毒在臟腑者徒竭其血於外無益也一人腰後患瘡焮發腫盛用此而愈一小兒亦患取七八大蜞吮其血腫消

三日方蘇而效

砭鎌十一

素問云血實宜決之綱目云病在血脈者治之以砭石但見腫起赤色遊走不定狀如丹瘤者以生油塗赤上以鎌鎌之決洩其毒不可太深內經謂刺皮無傷肉其法雖治瘡疽不可輕用也

敷貼十二

瘡腫初生似有頭而未起即當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也若瘡腫初生即高起四畔焮赤宜擣生寒藥貼熁折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也大抵敷貼之法欲消散腫毒疏通血脈寒熱錯綜皆期於不成膿也凡腫皮厚者以軟帛或綿紙塗藥貼熁之待其藥乾方換腫皮薄者用疏紗或薄紙塗藥貼熁之其藥未乾即當換之至膿潰之後即貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取效肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒涼藥水調貼令血滯而難瘥蓋血脈喜溫而惡寒故也　集驗云癰疽無頭起者用神異膏靈龜膏拔毒膏正鐵箍散貼即令消退潰膿者用靈龜膏貼之或用追毒膏夫膿或用筒子收膿有頭疽瘡每於洗後視赤暈闊狹用涼水

鋼大鐵箍散成膏隆冬用温水調如人肉温貼之腫
赤盛用生地黃自然汁調貼調貼之法從四畔紅暈
處圍貼用皮紙掩上瘡口留孔如米如豆
者用銀篦撥去瘡眼用老皮散傳之再換新藥傅
上凡熱多則赤燄腫散寒多則紫黑外寒鬱之亦紫
血虛無寒則青白大鐵箍散即鐵箍散乃常用之藥
或因風寒熱及穢氣觸等證四時寒熱不同又宜
從權設法熱者宜三黃散熱甚宜三消散風者加羌
活防風風氣滯者加木香寒鬱加桂穢氣觸者宜加
香藥熏之腫處脆嫩者去白芨去貼藥時看毛下竅

外科

中當有汗珠此則血脈疏通熱毒消散赤暈漸縮膿
潰痛止變逆爲順皮毛間活要作良肉但瘡頭有些
少腐開不用刀剪如藥下不生汗珠腐敗必鬭必多
也膿後圍貼則收散漫遮毒氣膿出瘡口貼拔毒
膏藥如膿出不順用追毒膏落肉不去用金寶膏敗
肉去後圍貼則氣血活新肉易長瘡口用長肉膏敷
貼之藥與淋洗藥並行同功　郭氏法如是有頭瘡
瘡就便用朱砂備急膏一丸如黃豆大安於瘡頭上
却用軟粘膏藥蓋護之其瘡必破如瘡暈紫黑色外
用宣毒散周圍敷住毒氣如瘡暈赤紅色用水澄膏

敷之次日用降癰碧霞錠子開了瘡口次用緊急枯瘡
靈錠子去其歹肉稍淨却用緩慢生肌錠子生肌總
名青金錠子不拘日數直待歹肉去淨單用膏藥貼
之候膿水盡肌肉平方許貼生好肌斂口之藥若依
此法免教人受刀剪針烙之苦如是無頭癰腫待膿
成用針刺破方依法收功也

淋洗　十一

古人論瘡腫初生經一二日不退即須用湯水淋射
之其在四肢者溻漬之其在腰腹及背者淋射之其
在下部委曲者浴漬之無非疏導腠理通調血脈使

外科

無凝滯也集驗云淋洗之法每用藥二兩水三升煎
取一升半去查以淨帛或新綿蘸之乘熱溻其患處
漸覺實溫仍淋浴之稍冷則急令再換慎勿冷用腫
瘍宜紫蘇湯　一日五七次洗之每洗後拭乾俟瘡頭
上有白粒如米大者以五灰膏點破之瘡眼借老皮
散次用水調大鐵箍散圍貼四畔紅腫處用正鐵箍
散水調貼瘡口再洗則先去舊藥一次洗換新藥
如前潰瘍用豬蹄湯　一日一二次洗之仍用大鐵箍
散如前圍貼瘡口上用追毒拔毒等貼之敗肉去後
間二三日一洗之可換長肉膏貼之淋洗之功難述

初發則宜拔邪氣可使消退已成洗之則[illegible]導膿壅調和血脉探引熱毒從內達外易深爲淺縮大爲小紅腫延蔓洗之則收膿[illegible]洗之紅活逐惡氣袪風邪除舊生新如瘡口冷而不收者濃煎北艾湯洗焼松香兔毛熏之淋洗之[illegible]與鐵箍散並行同功

大抵灸烙潮漬各有所宜凡疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜溺漬之瘡皮光軟則針開之以洩其毒認是疽[illegible]速以艾灸[illegible]大灸二百壯灸後覺似燃痛乃[illegible]下徹毒氣隨火而出若其瘡痒宜淡豆豉以[illegible]和擣[illegible]作餅子如

當二錢厚安瘡頭上灸之[illegible]再換過又安其上餅乾再易新者若其瘡痛即須更灸壯數以多爲妙已成膿者不可灸當針開之初覺背上有瘡疼痒畧異[illegible]是發背即取淨土水和捻作餅子徑[illegible]寸厚二分貼瘡上作艾炷灸之一壯一易其瘡粟米大時可灸七七壯如錢大者日夜不住灸以瘥爲度其疳瘻惡瘡諸法不瘥者取[illegible]兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不效者又法以乞火婆蟲同前灸之[illegible]累試累效人皆秘之往往父子不傳

將護十四

大凡有瘡疽生皆只如黍粟許大其狀至微人多不以爲急此蘊大患宜速辨之不可自忽若能防之於未形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危困矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚委之於命束手待斃悔之何及可不慎歟夫以不貲之軀托命庸醫任其措置危殆立至若用良醫則可保痊瘉用醫之際不可不擇辨之何謂若能飽讀經書久諳證候湯藥熟閑洞明色脉性行仁善孝義忠信臨事不惑處治有決方爲良醫[illegible]委用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲哀叫呼忿恨驕恣情性

信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹耐煩爲宜於患人左右止息煩雜切忌打觸器物諸惡音聲爭辯是非呪罵鬭毆及產婦淫男體氣不潔帶酒腥穢雞犬乳兒孳畜禽獸並須遠離設或親友[illegible]問疾者可以豫囑徐行低聲款曲何候禮畢辭退勿令嗟呀驚怪話舊引其遊賞樂遂別觀感[illegible]惜懷但恐病人心緒慢愉尤不可亂舉方藥往論虛實惑亂患人疑滯不決秖合方便省問不可久坐多言勞倦病人深不長便夫侍患者宜須[illegible]近中年情性沈厚勤謹耐煩仁慈智惠全在調以術藥無失時節勿冷於患

人左右彈指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之間忌慎非細不可不戒當中勿食驢馬駞騾猪狗牛羖羊等并雜魚鼈鱉鰕蟹及淹浥臭陳自死病倒之類慎勿嘗啖飛禽之中忌食鵝鴨鴈鷹雀鵲鷲鶖鷺鳩鴿鴉雞雉及能學人言者野獸之中忌食獐麞狐兎虎豹熊羆及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生屬菜蔬之中忌食黄瓜茄子蘭香芸薹胡荽生菜蓼芥菌瓜韮蒜葱薤果木之中忌食桃杏柰栗李柰梨梅棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及諸蟲蛀未熟之果若其瘡疱將靨消後血虛弱則可食羊肉鶴鶉蔓菁蘿蔔瓜薺蘿蔔及黄白粳米細米稀粥粳飯若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅蒸粥羹湯熟軟溫和稀稠得中製造如法勿令太飽此時猶忌饅頭蒸餅餺飥餛飩肉角煎餅及炙煿爛煿煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至膿腐欲平惡肉去盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房室喜會嗔怒沐浴登陟臺榭運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待瘡瘢平復精神如故氣力完全方無所忌百日內慎勿觸犯之

禁忌十五

昔仲景先生治傷寒有汗吐下三法東垣先生治瘡瘍有疏通托裏和榮衛三法用之得宜於疾病又假如瘡瘍腫硬木悶煩熱便秘脈沉而實其邪在內當先疏其內以下之焮腫作痛便利調和脈浮而洪其邪在表當先托其裏以汗之元戎云榮衛充滿抑遏而為癰者當泄之以奪盛熱之氣榮衛虛弱壅滯而為癰者當補之以接虛怯之氣又東垣先生云瘡瘍雖面赤伏熱不得攻裏裏虛則下利仲景先生云瘡家雖身體疼痛不可發汗汗之則發痙苟不詳審妄為汗下以致血氣虧損毒反延陷少壯者難以潰斂老弱者多致不救

東垣瘡瘍及諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏為陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脈風證只用發表風藥便可以通利大便若只乾燥秘澀尤宜潤之慎不可下也九竅不利皆不可下瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也慎不可下汗之則愈

丹溪精要云大黄治癰疽之要藥以其宜熱拔毒又云瘡始作皆須以大黄等湯極轉利之且排日不廢

經又自言患難疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者也借曰前用大黃恐因病體實而大腑秘結有積熱沉痼之積者發也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且排日不廢乎若下利之後又與利藥恐非防微杜漸之意瘡之始作卽周禮腫瘍之時也腫在肌肉若非大滿大實堅之證自當行仲景發表之法借五香湯爲倒散之於外何必遽以峻下之藥以奪其裏自取其禍乎
精要云大凡難疽不可舍五香湯此又不能無言者也開卷便於第一論中詳言之吾不知良甫之時有許多大腑堅秘病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而大下者若果有之亦當開陳時之先後證之可否庶乎後人不敢孟浪殺人也或曰排疽用大黃走泄以去毒自孫真人行千金方已言之矣良甫何述其說何吾子病之深也曰大黃除諸實熱而性峻急孫以盛行奇術於公卿間往在晚宋民不知兵交游於富貴之家肉食之輩固皆捷效今良甫不分貧富苦樂勞逸一槩用之寧無孟浪之患乎況有房勞而虛者憂怒而虛者極意貪求而虛者強力動勞而虛者大醉過飽而虛者皆因氣弱而濇血少而濁生疽固是

忌汗

難治之病若大腑秘而稍安穀食肯守戒律甘心澹味者猶爲可治但鄉補工夫耳苟因旬日半月大便秘實不知其氣不降也便以爲實而行大黃[illegible]寒熱不知其血虛不和也便以爲有外感而行[illegible]散如此害人甚速

仲景云瘡家雖身不疼痛不可發汗汗之則痙（[illegible]）

其排膿內補十宣散若用之於此少壯癰疽與冬月盡可助內托之功若於冬月腫瘍用之亦可[illegible]就輕移深爲淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難爲倚仗比見世人用此方者不分癰疽冬夏無經絡無先後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉　又云內補十宣散消衛燥血藥太多止可用於輕小證候虛之甚者恐難倚仗

精要云內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝臟腑名護心散此方專爲服丹石而發疽者若不因丹石而發恐非必用之劑若夫年老者病深者證惡者體重者[illegible]補將有不勝重任之患矣且夫外施敷貼正與發表之意同經曰發表不遠熱大凡氣得熱則散冷則斂向見鄙郡經歷性嗜酒與煎

婦年五十餘忽春末夏初在額絲竹空穴湧出一筋長短大小如雞距稍堅求予治予曰此非膏粱所致而何宜斷厚味先解食毒針灸以開泄壅滯未易治也此少陽經所過氣多血少者鄭以懼煩召他醫以大黃朴硝腦子等冷藥罨之一夕餘開如醬蚶徑三寸一二日後血自蚶中濺出高數尺而斃此冷藥外逼熱鬱不得發宜其發之暴如此也 李世英疽不熱不痛屬陰切不可用冷藥敷貼恐逼毒氣入內

薛內經云五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰又云形傷痛氣傷腫此則臟腑不和瘡發於外也明矣塗貼寒涼豈能調和臟腑宜通氣血耶設使癰痛熱渴脈滑數而有力屬純陽宜內用濟陰丹外用益陽散則熱毒自解瘀滯自散若似癰非癰似痛非痛似潰不潰似赤不赤脈洪數而無力屬半陽半陰宜內用沖和湯外用陰陽散則氣血自和瘀滯自消若微腫微痛或色黯不痛或堅硬不潰脈洪大按之微細軟弱屬純陰宜內服回陽湯外敷抑陰散則脾胃自健陽氣自回丹溪先生云敷貼之劑應酬輕小熱證耳若不辨其陰證陽證之所由分而妄敷寒涼之劑迷塞腠理凝滯氣血毒反內攻而肉反死矣況運氣得寒而不健瘀血得寒而不散瘀肉得寒而不潰新肉得寒而不生治者審之[illegible]蛓針法[illegible]以[illegible]候耳愚謂蛓之為[illegible]臟腑者徒闢之於外而不及於裏[illegible]甫二歲徧身赤疹如霞片[illegible]其母久病[illegible]謂胎熱在血所成者張口唯不因母血所成何[illegible]熱之血予曰其母雖非食肉如平時肉[illegible]熱[illegible]相搏非毒癥張不之信自取[illegible]消乳食起居如傳予曰非其治[illegible]未可以[illegible]提二三日大發熱而斃殆非以[illegible]之於外血大而氣不能獨居乎

薛氏論見前內消條

薛用藥之法如權衡當察病勢輕重邪畜表裏瘡毒癰潰元氣虛實若不詳究其因率爾投治實實虛虛亡懸之禍不能免矣治者審之 [illegible]博掌後患疔紅絲至肘惡寒發熱勢屬表[illegible]命丹一服紅絲頓消又用和解之劑大勢已退後因服敗毒藥發熱口乾紅絲仍見脈浮大而虛此氣血受傷而然以補中益氣湯主之而愈[illegible]奪命丹敗毒性尤猛烈

瘡邪已散而復用之是誅伐太過失內經之旨矣　一
儒者元氣素弱而其氣血出膿而愈後因勞役
瘡痕作癢乃別服敗毒藥一劑以致口噤舌强手足
搐搦痰涎上涌自汗不止此氣血傷而發痙也用十
全大補加附子一錢灌服而甦　一男子患瘡服奪
命丹汗不止而瘡不痛熱不止而便不利此汗多亡
陽毒氣盛而真氣傷矣用參芪歸朮芍藥防風五味
二劑諸證悉愈惟以小便不利為憂□□汗出不宜
利小便汗既止陽氣復而自利矣仍用前藥去防風
加麥門倍用當歸黃芪四劑便行瘡潰而愈

東垣曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍乃營氣而作今反
補之自棄何異雖用藥治不能愈也　精要曰羊雞
牛鵝魚麪煎煿炙酒等味犯之必發熱用梔子黃
芩湯最効　丹溪曰梔芩苦參犀角佐輔人參固可
解食毒之熱若與病人守禁加減乎內經謂膏
粱之變足生大疔此皆瘡瘍之因也禁戒厚味恐其
引起宿火之熱此誠富貴豢養口腹者所當謹若素
貧者夫不然矣予治一人背瘡徑尺穴深而黑家貧
得此急作參芪歸朮膏多肉餛飩與之而安多肉餛
飩補氣之有益者也

腫瘍十六

癰疽初發壅腫而未見膿者也　集驗論瘡瘍之法
其名有三曰癤曰癰曰疽癤者初生突起浮赤而無
根腳腫見於皮膚間止闊一二寸有少疼痛數日後
則微軟薄皮剝起始出清水後自破膿出如不破用
替鍼丸拔毒膏貼之膿出即愈癰者初生紅腫突起
無頭便用火鍼鍼之仰散不散鍼後根腳闊三四寸
發熱惡寒煩渴或不發熱抽掣疼痛四五日後按之
微軟此證毒氣浮淺春夏宜用防風敗毒散□□忽頭
□東煎服秋冬去羌□加木香□□

變身半已下宜加射干治早者即散或用追毒丹丸返
魂丹復元通氣散微利之膿成用鈹針破開或用替
鍼丸咬開又　等皮色不變但覺微腫肌肉內痛夜
間痛甚發熱惡寒煩渴此證可深亦名為疽謂其能
傷筋脈骨髓也日久按之中微軟膿成後用火烙
烙開以決大膿外用拔毒孔膏貼之宜服內托之
藥初發急用大針於腫硬處針之則散疽者初生白
粒如粟米大便覺痒痛觸著其痛應心此疽始發之
兆也急用火針於白粒上針開或灸觸拔或入湯使
覺微赤腫痛三四日後不散根腳亦軟無開須詳看

之方見其暈闊狹如闊四五寸左右渾身發熱微
渴瘡上亦熱此疽也用火針於初起白粒上刺入一
寸餘從寸之間四邊刺四處使用四牛蒡湯淋洗
一日夜共五六次洗之洗了以蟾酥乾在瘡上或
有漸生白粒如黍米或多或少可用針尖挑去勿
令見血或有少血亦不妨不見血者如却用老皮散
傅之用涼水調大鐵箍散圍貼留瘡口瘡口處用
水調正鐵箍散貼之未可用膏藥如再要洗須先去
圍藥令淨然後洗之一次洗一次點檢看上頭生白
粒有則如前挑之六七日瘡頭無數如蜂窠狀不肯

出仍淋洗圍貼冬月用五香連翹湯大黃一味隨虛
實加減夏秋用黃連羌活散吞木又仍用防風敗毒
散加葱白棗煎服秋兵之加木香若形氣實脈洪滑
有力痛腫焮開壯熱便閉於五利大黃湯消癰湯返
魂丹追毒丸復元通氣散選一藥以通利之若大便
潤便小藥用十歲已前可用之虛弱年老之人雖有
便閉之證須慎之勿令過也瘡邊常帶赤焮開圍貼如
赤暈收斂却再換鐵箍散不及用火針證七八日後
中間初起白粒處此瘡已潰通內大膿可用皮紙撚
小紙紅撚入瘡中令透漸漸流出可不用針砭如要

膿透必以大針刺開或周圍四五處其瘡四邊如蜂
房處膿不肯出用正鐵箍散香油調貼一證初生白
粒誤觸後便覺情懷不舒背上沉重如負五七斤
米樣身體煩疼胸膈痞悶而躁飲食無味怕聞食氣
所謂外如麻裡如瓜者乃毒深惡內連臟腑也三五
日內皆可用烙於中間左右上下令毒氣通暢後膿
從諸竅而出五六日不散疽頂生白粒如椒者數日
後漸生多開有大如蜂房蓮子者指捻有膿血而不
流時有清水流出微腫不突根腳紅暈漸漸展開或
痒痛或不痛或根腳暈紫赤焮開至七八寸疽不甚

熱此證甚重用紫葛湯加米醋一盞淋洗可使紅活
如法去白粒傅老皮散圍大箍散瘡口塗正鐵箍散
每用前法如得根腳紅暈收斂突此藥力到變重為
輕如起第一顆頂上白粒雖有膿而紅引不透接之
猶硬或漸不疼使宜用火烙開透若根腳仍舊紫黑
瘡反陷下如牛項之皮漸變黑色肌骨腐潰恍惚沉
重用拔毒乳香膏貼四邊仍用大鐵箍散圍却用豬
蹄湯洗此數項變證必多又宜隨證調理脈若虛弱
便用大料人參當歸濃湯調解毒行經之藥凡癰疽
必服萬全散夏月用桃紅散服以護心若見膿之後

當以潰瘍法調理（按集驗方治法未可盡拘為準繩要當以後論為主參酌諸方用之）
大法腫高焮痛脉浮者邪在表也宜托之如內托復煎散　腫硬痛深脉沉者邪在內也宜下之如黃連內疏湯仙方活命飲苦參丸　外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也宜調和榮衛如托裡榮衛湯白芷升麻湯　焮痛躁煩或咽乾作渴者宜降火如黃連解毒湯　焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之如荊防敗毒散人參敗毒散　大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒藥如仙方活命飲　煩躁飲冷焮痛脉數者邪在上也宜清之如清涼飲或金銀花散　惡寒而不潰者（氣實兼寒邪也）宜宣而補之如十宣散　焮痛發熱汗多大渴便秘譫語者結陽證也宜下之如黃連內疏湯破棺丹　不作膿或熱而不潰者虛也宜補之如補中益氣湯八物湯十全大補湯　焮痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜灸之　腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之如仙方活命飲　腫痛飲冷發熱譫語者火也宜清之如清心湯或防風通聖散加黃連　不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之如托裏消毒散

潔古云瘡瘍者火之屬須分內外若其脉沉實當先疏其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至甚遏絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫此因失托裏及失疏通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疏通行榮衛三法托裏者治其外之內疏通者治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪氣深於內也故先疏通臟腑以絕其原（內疏黃連湯）外之內者其脉浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏以防其干也（內托復煎散）內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宜通知其在經當和榮衛也（當歸黃芪湯）用此三法之後雖未瘥必無變證亦可使邪氣峻減而易痊也　東垣云瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當疏利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣予聞潔古云瘡瘍之生也表裏不同或攻或發少有差舛變證隨能殺人甚於傷寒也針灸施治各隨其宜所用之藥

又當明入五臟君臣是其法也

內疏黃連湯　治嘔啘心逆發熱而煩脈沉而實腫硬木悶而皮色不變色根係深大病遠在內臟腑秘澀當急疏利之

黃連　芍藥　當歸
檳榔　木香　黃芩
梔子　薄荷　桔梗
甘草各壹兩　連翹貳兩

右除檳榔木香爲末外並剉每服壹兩水壹盞半煎壹盞先喫壹貳服次每服加大黃壹錢再加貳錢以利爲度如有熱證止服黃連湯大便秘澀加大黃如無熱證止用復煎散時時呷之如此內外皆通榮衛和調則經絡自不過絕矣

內托復煎散　治腫焮於外根盤不深形證在表其脈浮痛在皮肉恐邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裡

地骨皮　黃芪　防風各貳兩
芍藥　黃芩　白术
茯苓　人參　甘草
當歸　防己各壹兩　桂伍錢

右㕮咀先將蒼朮壹斤用水伍升煎至叁升去蒼朮滓入前藥拾貳味再煎至叁肆盞絞取清汁作叁肆服終日服之又煎蒼朮滓爲湯去滓再依前煎拾貳味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃芪湯　治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸　黃芪　地黃
川芎　地骨皮　芍藥各壹兩

右㕮咀水煎服　如發熱加黃芩　如煩躁不能睡臥者加梔子　如嘔則是濕氣侵胃倍加白术

右三方乃易水師弟治瘡之一法今特列於篇首而以古今諸方臚列於後臨病之工詳審脈證而施用之庶乎可以無失矣

發表　內經曰汗之則瘡已東垣云大抵治一方者在人上其瘡外有六經之形證內無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裏非疔瘡也止癰癤也小則爲癤大則爲癰其邪所受於下風濕之地氣自外而來

俘加於身者也經云營氣不從逆於肉理乃生癰腫諸痛癢瘡皆屬心火此瘡自外而入是內小腸左遷入於臍作痛而非癢也此二方皆主血血為病必痛此元氣不足營氣逆行其瘡初出未有傳變在於肌肉之上皮毛之間只於風熱六經所行經絡地分出矣宜瀉其風濕熱瘡者只知陰覆其陽則汗也此宜發汗者乃濕熱鬱其下足少陽致血脉凝逆使榮衛周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色必赫赤面肝微黯色東方青埋沒之色也風木之性上衛顏以忿色其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微帶黯色

其熱之形勢亦衛榮而過經絡而作痛也其脉止在左手左手足表左寸外洪緩左寸洪緩而弦是客邪在於血脈之上皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪氣去矣以托裏榮衛湯主之　瘡同前論大要三法即此瘡宜汗之及先托裏恐邪氣入內言外因也宜先疎內以絕其源內也當和榮衛調不內外因之謂也故瘡之發於皮表者內大略言汗其汗下和之間亦有外治之次第焉如郭氏治驗云一婦人左耳九歲右耳下天容穴間患一疔瘡其頭黑黯四邊流起黃水時流渾身麻木發熱譫語時昏沉六脉浮洪用烏金散汗之就以鈹針先刺瘡心不痛周遭再刺十餘下紫黑血出方知疼痛以寸金錠子紅入瘡內外用提丁錠子放於瘡上以膏貼護次日汗後精神微爽却用破棺丹下之病即定其疔潰動後用守効散貼舍紅玉錠子紅之八日其疔自出矣此所謂治法汗下之間外治次第如此殊驗不然不依法但只發熱譫語使投涼劑與下咸無以救之發汗反誤人者多矣

丹溪曰癰疽因積毒在臟腑非一朝夕今發於外宜以標本為治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐參以經絡時令使毒氣外發此正仲景解表用麻黃桂枝之意施治之中寓以內消此乃內托之本意也

托裏榮衛湯　治癰疽疔腫及無名腫毒

桂枝（[illegible]分）	人參	黃芪
紅花	蒼朮	柴胡
連翹	當歸身	羌活
黃芩	防風	甘草（炙各壹錢）

右作壹服水壹盞酒壹鍾煎至壹鍾食前服

加味當歸飲子　治諸瘡瘍諸痛癢瘡皆屬心火火

鬱則發之

當歸　生地黄　升麻各伍錢
防風貳錢　荆芥穗　何首烏各貳錢
柴胡伍分　白芍藥　川芎
羌活　黄芪各貳錢　紅花
蘇木　甘草各壹錢

右㕮咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至捌分食遠服沐浴取微汗効速使血氣通和服之應効

人參敗毒散

人參　獨活　柴胡
桔梗炒　羌活　枳殼麸炒
茯苓　川芎　前胡
甘草各壹錢

作壹劑水貳鍾薑叁片煎壹鍾服後服内托復煎散

郭氏神効烏金散　治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等證若瘡黑陷如石堅四肢冷脉細或時昏沉譫語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡起

蒼耳頭五月五日午時收　小草烏頭　火麻頭七月七日收
木賊去節　蝦蟆頭　樺皮節

麻黄去根節

右曬乾各等分同入磁罐内鹽泥固濟炭火内煅早煅至中分如黑煤色爲度碾爲末每服貳錢病重者叁錢用熱酒調下未汗再服取汗乾却服解毒疎利之藥如修合此藥必選天晴好日於靜室中勿令雞犬貓畜及陰人見也又名首功玄黑散

奪命丹　治諸般腫毒疔疽惡瘡

蟾酥　輕粉伍分　硃砂叁錢
白礬枯　寒水石　銅緑各壹錢
蝸牛貳拾壹個　乳香　没藥各壹錢
麝香伍分

右件爲細末將蝸牛另研壹處丸如丸不就用好酒糊爲丸如菉豆大每服壹丸生葱叁伍莖嚼極爛吐於手心包藥在内熱酒和葱送下如重車行伍柒里汗出爲効重者再服壹貳丸

蟾酥丸　治疔黄一切惡瘡

川烏　蓮花蕊　硃砂各壹錢半
乳香　没藥各貳錢　輕粉
蟾酥各壹錢　麝香伍分

右爲細末糊爲丸如菉豆大每服壹丸病重者貳丸
依前法服取汗
右三方郭氏稱爲首藥皆主平發散首出太陽例
後二方出少陰例然皆劫劑也智者當較輕重陰
陽之分取擇用之
寸金丹　一名返魂丹二名朝生丹三名□□丹四名追命丹五
名延壽丹六名來蘇丹七名知命丹八名得道丹
非人勿示此方若有人患瘡身未潰者與三丸服
之嚥下便活如口噤但斡開牙關研化三丸灌下
喉中立生此方治發背腦疽瘡癰遍身附骨腫痛
先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香壹分　南乳香　烏金石
輕粉　雄黃　狗寶
沒藥各壹錢　蟾酥壹錢　粉霜
黃蠟參錢　硇砂伍錢　鯽魚膽
狗膽各壹個臘月　金頭蜈蚣壹條酥炙黃色
頭首男孩兒乳壹合
右件爲細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸
如菉豆大小兒丸如芥子大每服壹丸病重者加
參丸白丁香柒個研爛新汲水調送下用衣服蓋

之睡勿令透風汗出爲度大段疼痛如無頭瘡腫
不過三服立效服藥後喫白粥忌葷就睡大妙
烏金散　治疔毒腫痛
牙皂肆分　人言壹錢　蟾酥
麝香各伍分　血餘煆過　蛇蛻煆過
蜂房煆各壹錢　蟬蛻洗淨　血竭
乳香炙　殭蠶炒去絲各貳錢　辰砂研水
雄黃　穿山甲炙黃各伍分　全蝎炙去足
天龍去頭足炙　川烏尖　沒藥炙
右各爲細末稱準分兩和勻每服參分赤砂糖調
葱頭酒送下取汗爲度

勝金丹　治症同前
麝香　白礬　蟾酥壹錢
雄黃　辰砂　乳香
沒藥　血竭　全蝎
天龍去頭足炙　穿山甲　殭蠶炒去絲伍錢
右爲細末和勻服法同前
奪命丹　治證同前
輕粉　麝香　白砒各壹分
白礬　辰砂　血竭各壹錢

蟾酥酒化入藥 銅綠 寒水石
乳香 沒藥 雄黃各貳錢
蝸牛貳拾壹個
右爲末先將蝸牛研爛如泥勻和前藥爲丸如菉豆大如丸不就加好酒打叁伍百下每服貳叁丸先用葱白叁寸與病者嚼爛吐於男左女右手心將藥丸裹入葱白用無灰酒送下溫熱送下被蓋取汗爲度重者再進一服
右自烏金散以下皆發汗之劑然而赤身拘急疼痛者取汗之法而托裏榮衛一方則同丹溪所謂助氣壯胃使根本堅固而以行經活血爲佐者也與烏金奪命之取汗異矣當歸飲子亦同此意而微有氣血溫涼之分焉故與敗毒散同列爲發表之方而後所列東垣分經諸方則正丹溪所云雖因解表不以取汗爲功尤可師法學者詳之

太陽分藥

閻通父家僮梗於尻臀上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右尺脈俱緊按之無力
內托羌活湯
羌活 黃柏酒洗各貳錢 防風
當歸身 連翹
肉桂叁分 甘草炙 蒼朮
陳皮各伍分 黃芪壹兩
右作壹服酒貳大盞水壹大盞煎至壹盞去柤熱服空心以夾衣覆其癰使藥行罷去之一服愈
丹王姑丈七十餘患項疽脉實而稍大此因鬱悶而生太陽經治之
歸頭貳錢 黃柏 黃芪
羌活 地黃酒 黃芩酒炒
桔梗壹錢 黃連酒炒 連翹

防風 甘草生 人參
陳皮 防己 澤瀉各伍分
白水煎服
浮脉湯 治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴
麻黃 草蔻 防風
柴胡 黃芩 蒼朮各壹錢
桂枝 羌活各貳錢 桔梗
甘草 生地各伍分 當歸梢
紅花少許 升麻 連翹
右剉如麻豆大作壹服水貳大盞煎至壹盞去柤

杳稍熱服
尹老家素貧寒形志皆苦於手陽明經分出癰第四
日忽腫幼有癤癰其臂外皆腫痛先腫在陽明左右
寸皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風
之變以脈斷之邪氣在表然其證大小便如故飲食
如常腹中和口知味知不在裏也不惡風寒止熱躁
脈不浮知不在表也表裏既和知邪止在經脈之中
凝滯爲癰出身半已上風從上受之也故與却寒邪
和經脈中氣血使無凝滯也

白芷升麻湯

白芷柒分　升麻　桔梗各伍分
甘草炙　黄芩生　歸梢
生地各壹錢　酒黄芩　黄芪
連翹各貳錢　中桂少　紅花少

右水酒各壹盞同煎至壹盞臨卧熱服壹服愈
此證雖曰經脈之中然得之白八風之變其藥制
度皆發表之意

婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脈弦
洪按之細小

升麻　連翹　葛根各壹錢半
肉桂伍分　黄芪　歸身
甘草炙各壹錢　黍粘子伍分　黄柏酒

右作壹服水壹盞酒半盞同煎至壹盞去柤食後溫服愈
發汗之則瘡已　丁巳年冬予從軍回住曹州有趙
同知身經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍
發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安卧
一瘍醫腫上砭刺四五百餘針腫赤不減其痛益甚
不知所由然予往診視其脈浮緊按之洪緩此寒覆
皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒地凍
則水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣強內

堅濇當是之時善行水者不能往冰善穿地者不能
鑿凍善用針者亦不能取四厥必待天溫冰釋凍解
而水可行地可穿人脈亦猶是也又曰冬月閉藏水
冰地折故用藥多而少針石也宜以苦溫之劑溫經
散寒則已所謂寒致腠理以苦發之以辛散之也宜
以托裏溫經湯麻黄苦溫發之者也防風辛溫散之
者也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中
之邪故以爲臣血流而不行者則痛以香白芷歸身
辛溫以破血散滯濕熱則腫蒼术苦甘溫體輕浮力
雄壯能泄皮膚腠間濕熱人參甘草甘溫白芍藥酸

以寒調中益氣復托其裏也故以為佐各半如麻豆
大同秤水煎餌之以薄衣覆其下以厚被覆其身且
臥於暖處則經血温腠理開寒乃散陽氣伸大汗出
腫減八九再服去麻黄防風加連翹鼠粘子痛腫悉
去經言汗出則瘡已信哉

托裏温經湯　治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱
伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢
體疼痛

麻黄去根節　白芷　當歸
防風去蘆　葛根　升麻

甘草炙　白芍藥　人參
蒼朮

右剉如麻豆大每服秤一兩水一大盞先煎麻黄令
沸熟去沫再下餘藥同煎至一盞去大查大温服訖
臥於暖處仰以綿衣覆之得汗而散

少陽厥陰分野氣

一瀛津王世祥年二十七感寒濕地氣二月間得附骨
癰於左腿外側足少陽之分少侵足陽明分闊六七
寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮深以指按至
骨大痛又行步作痛與藥下咽疼痛立止二日後柔
軟而腫消矣

黄芪肉桂柴胡酒煎湯

柴胡　鼠粘子　連翹
肉桂　黄芪　當歸梢
黄柏　甘草　升麻

作壹貼好酒壹盞半煎至壹盞大温空心食前服
服之少時以早膳壓之使不令大熱上攻犯上中
二焦也

賈德茂男十歲四月天氣大熱於左足大腿近膝股
内足厥陰肝之經少侵足太陰脾之經分出附骨疽
不辨肉色漫腫皮澤木硬痛勢甚大其脈在三部細
弦按之洪緩略有力

内托黄芪柴胡湯

黄芪　柴胡梢　羌活
連翹　肉桂　土瓜根
生地　黄柏　當歸尾

右作壹服酒壹盞水叁盞煎至壹盞去渣空心熱服壹
服愈

右方皆東垣及羅謙甫丹溪隨癰疽所發分野制
之也其方皆以發表為先不過一二服而愈如癰
疽發在太陽經分野必用防風羌活陽明經分野

必用香白芷升麻少陽經分野必用柴胡太陰經分野必用芍藥升麻少陰經分野必用獨活厥陰經分野必用青皮柴胡皆以桂佐之身半已下者必用酒水多熟煎之空心服使藥下行身半已上者必用酒水少煎之臨臥服使藥上行脉細小無力必於本經藥中加辛熱劑脉洪大有力必於本經藥中加苦寒劑隨證加減活潑潑地其效如神真良醫也

辛涼解表 脉有力而數若春夏者宜之其藥則前條東垣淵甫丹溪諸方（諸上表温經湯）皆是也

丹石癰人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此藥

白朮　川芎（各一錢）　赤芍藥
連翹（貳錢）　陳皮　黄芩
防風（貳錢）　木通（各一錢半）　甘艸（伍分）

分五貼水煎服

又治一好酒老嫗腦疽脉弦緊急且濇用大黄酒煨細切酒拌炒為末又酒拌炒人參入薑煎調壹錢重過兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已亦辛涼解表之意

除濕羌活湯 治一切風濕熱毒注滲湯下注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外臁瘡痒膿水不絕或痒或痛脉沉濕熱多數動滑者並宜服之

羌活　人參　苦參（酒浸）
升麻　葛根　蒼朮（各一錢）
甘草（炙）　黄芩（酒製）　茵蔯葉（一錢半酒炒）
防風　當歸身　澤瀉
知母（酒製）　猪苓（各一錢）　白朮（壹錢半）

右㕮咀每服壹兩水煎空心服臨睡再服之

按此足太陽陽明三陰藥也東垣本號為治脚氣濕熱之劑然世人用治已上諸瘡甚驗故錄之

縮毒金粉散 治但疼痛不急服

乾葛　甘艸　鬱金
川芎　瓜蔞根　白芷（各等分）

右並生為末每服壹錢溫酒入蜜調下不拘時此藥大散五臟積毒熱滯日三服

復煎散 治癰疽發背

黄蘗　黄芩　黄連
知母　生地黄（酒洗各壹錢）　防己
山梔　羌活　黄芪

麥門冬　甘草炙　獨活
人參各半錢　當歸尾八錢　陳皮
防風梢　甘草梢生　蘇木
當歸身　五味子　豬苓
藁本　連翹　桔梗各一分
右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓隨證上
下食前後服
活血當歸湯　瘡疽　黃芪當歸湯　瘡瘍
黃連消毒飲　瘡疽　內托升麻湯　瘡
散腫潰堅湯　升麻調經湯　瘡疽

連翹散堅湯　消腫湯　馬刀
柴胡通經湯　馬刀　郭氏升麻牛蒡子散　瘰癧
中和湯　瘡瘍
解表　不寒不熱半陰半陽者宜之
良方升麻和氣飲　治瘡疽疥癬痒痛
甘草　陳皮　芍藥各一錢
大黃　乾葛　蒼朮
桔梗　升麻　當歸
茯苓　白芷　乾薑
枳殼各半錢　三因方有厚朴半錢

右㕮咀每服壹兩水煎
按此手足太陰陽明經藥也五積散加減法耳俗
多用之故收入蓋欲燥脾胃勝濕和氣為治瘡之
劑然臨證而不通變恐未合宜也
當歸飲子　見前
聖濟總錄金鍼散　治發背諸癰腫
皂角針　春採一寸新
右一味不拘多少曬乾為末食後酒調下貳錢服
按丹溪曰此藥治癰疽已破未破皆用但須到潰
處當入潰瘍中用也

辛溫解表　脈無力而緩者秋冬者宜之
精要十宣散
人參　當歸　黃芪各貳兩
川芎　防風　厚朴
桔梗　官桂　甘草
白芷各壹兩
右為細末每服貳錢加至陸錢止熱酒調下日數
服以多為妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若
酒力之勝也許學士云此方得于都下異人滑吉
者不可勝數　陳無擇謂此藥在第四節服若非

也早服中病者必消散
衛生寶鑑曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火言其常也如
瘡盛形羸邪高痛下始終不可內消之又常中之變也若
時丁之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者
意也隨其宜治之可收十全之功矣故此方用之
於瘡瘍初發或已發或內托然瘡證脈緩澁或身
倦惡寒熱少脈弦或緊細者宜用之散風寒助陽
之劑也表裏氣血之藥若施之於積熱癖毒更不
分經絡時宜不能無悞也丹溪曰精要謂排膿內
補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言

也若用之於些小癰瘡與冬月時令儘收內托之
功若於冬月雖瘍用之亦可轉重就輕移深為淺
若潰瘍於夏月用之其桂朴之温散佐以防風白
芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此者不
分癰疽冬夏無經絡無前後如盲人騎瞎馬夜半
臨深池危哉

十六味流氣飲 治無名惡腫癰疽等證

川芎 當歸 芍藥
防風 人參 木香
黃芪 官桂 桔梗
白芷 檳榔 厚朴
烏藥 甘艸 紫蘇
枳殼 右㕮咀水煎服

按此表裏氣血藥也復以疎風助陽之劑世俗多
用之故收入非脉之洪緩沉遲緊細者不宜用此
每見外科諸家載此往往不分經絡脉證不具時
宜但云化毒消腫有云不退者加以補氣血之藥
蓋又使人不能無疑也用者當斟酌而長之
凡治瘡瘍不審元氣虛實病在表裏便服敗毒流
氣等藥必有失悞盍收發散表藥也果有表症

止宜一二服多則[illegible]有人參亦莫
能補流氣飲托血裏也果氣結胸滿只宜一二服
多則血反作敗雖有芎歸亦難倚仗丹溪曰此不
係膏粱丹毒之變因氣血凝滯所致也

千金托裏散 治一切瘡瘍腫毒有功

黃芪 厚朴 防風
桔梗 連翹 木香
沒藥 乳香 當歸
川芎 白芷 芍藥
官桂 人參 甘草各壹兩

右爲細末每服叁錢酒一盞大盞煎三二沸和滓溫
服
【齊氏】瘡瘍脈無力而遲者陰證者大寒之時皆宜之
托苑散 治癰疽初起而腫發痛不得臥息氣粗
附子(七錢炮去皮尖) 當歸 麻黃
甘艸 官桂 川芎
羌活 石草 龍將艸
右九味等分爲末每服貳錢水一大盞薑叁片鹽
少許同煎

丹溪治一男子年五十餘形實色黑背生紅腫近胛骨下痛甚脈數而洪緊食亦嘔正冬月與騎黃桂枝湯加酒黃蘗生附子括蔞子甘艸節羌活青皮人參黃芪半夏生薑六貼而消此亦內托之一法
【瘡瘍】內疏黃連湯
聖濟射干湯 治風痰熱毒攻咽喉腫痛脈洪實數者
射干 犀角 升麻
玄參 黃芩 麥門冬
大黃(各二錢半) 山梔(一兩)
右㕮咀每服伍錢加竹葉十箇同煎以利爲度

一按此足陽明手太陰經藥也
托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈洪弦實數腫甚欲作膿者三服消盡
大黃 牡蠣 瓜蔞根
皂角針 朴硝 連翹(各三錢)
當歸 金銀花(各一兩) 赤芍藥
黃芩(各貳錢) 爲粗末每半兩水酒各半煎服
按此足厥陰太陰陽明經藥也
破棺丹 治諸熱膿一切風熱瘡毒發熱多汗大渴便秘譫語結陽之證

大黃(二兩半) 芒硝 甘草(各二兩)
右爲末煉蜜丸如彈子大每服半丸病甚一丸至貳丸食後童便入酒半盞化服或白湯合酒化服
按此仲景正陽陽明經藥也
瀉心湯 治瘡毒癰腫發躁煩渴脈實洪數者
大黃(肆兩) 黃連 山梔
漏蘆 澤蘭 連翹
黃芩 蘇木(各貳兩) 犀角(壹兩)
右㕮咀每服叁伍錢水煎服
按此手少陰太陰少陽經藥也出足陽明例

清凉飲　治瘡瘍煩躁飲冷焮痛脉實大便秘結小
便赤澁
大黄炒　赤芍藥　當歸
甘草各貳錢　右水煎服

精要漏蘆湯
生黄芪　連翹　沉香
漏蘆各壹兩　粉草半兩　大黄壹兩
右為細末每服貳錢薑棗湯調下

内消升麻湯　治血氣壯實若患癰疽大小便不通
升麻　大黄各貳兩　黄芩壹兩
枳實麩炒　當歸　芍藥

甘草炙各壹兩　右㕮咀水煎食前服

孫真人單煮大黄湯脉實沉而數宜漿食肉之輩大腑秘者皆當用之
錦文大黄酒洗去皮
右一味剉如麻豆大水煮服

宣毒散　治一切毒瘡其功不可盡述
大黄煨　白芷各伍錢
作一劑水貳鍾煎至壹鍾食前服
𦉪按此方乃宣通攻利之劑若脉沉實便秘者乃
毒在臟也宜服之以絶病源其功甚大或臟腑調
和而脉不實恐不可用醫林集要方大黄壹斤白
芷陸兩為末每服叁錢熱酒調下更用茶清調搽
患處命名萬金散蓋因其功而珍之也當以水送
為是令可服吳江史僉憲兒背患癰十四日堅硬脉
沉實乃毒在内用一服大小便下污物再服而消
恐患者忽此二藥故以所嘗治驗者告之
治背瘡荊芥穗木鼈子肉大黄歸頭甘草節除荊芥
穗為末外餘各等分酒水各半盞煎至半分空心向
東飲即下膿與粥便止若結成者用川山甲半兩夜燒
灰酒下大便秘用枳殼又炙與甘一枚一宿後雖結亦

小矣陶氏
内托散　治諸腫毒惡瘡一服立瘉
大黄　牡蠣各半兩　瓜蔞貳枚
甘草叁錢
右剉每服叁錢水壹大盞煎柒分去滓温服

秘傳背瘡方
大黄伍錢　甘草節叁錢　木鼈仁五枚
右先將甘草木鼈剉碎同酒水各半小碗砂銚内
文武火煮數沸後下大黄煎至半分去滓盛磁器
内以青布覆之明星下露一宿五更温服打下膿

牽牛例

大戟例

血是驗期用生料四君子湯煎服

漏蘆湯（附見鬥卷戰角劉直格）

車螯散　治癰疽一切發腫痛或少年熱盛發背等症

宜宣毒利下熱退為度大人小兒四季皆可服之

紫背車螯（燒赤以鹽泥固濟火煆出火毒用）　輕粉

甘草（各貳錢）　大黃（伍錢）　黃芩

漏蘆（去頭）　瓜根（各□）

右為末每服貳錢薄荷湯下速利酒亦可

內消丸　治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服

之內消

薄荷葉　皂角（不蛀者水煮至軟二味各半斤煎膏）

牽牛（半斤取頭末）　青皮　陳皮（各壹兩）

沉香（半兩）　廣茂（炮）　京三稜（炮各叁錢）

右為末入牽牛頭末用煎膏和丸如菉豆大每服

叁拾丸煎連翹湯送下食後

神仙解毒萬病丸（又名玉樞丹一名紫金錠）　治一切毒及菰子

鼠莽菌蕈金石或疫死牛馬河豚等毒或時行

瘟疫山嵐瘴瘧急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼及

衝冒寒暑熱毒上攻或自縊或溺水或打撲傷損

癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所傷或中邪狂

走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無此藥真

濟世衛身之寶毒藥如嶺南兩廣最多若從宦於

此纔覺意思不快服之即安彼淵有草曰胡蔓草

又名斷腸草陰置水中飲之即死又有取毒蛇殺

之以草覆上以水灑之數日菌生其上取為末酒

調以毒人始亦無患再飲酒即發立死其或淫婦

多與北人配合北人回密與藥置食中乃戒之曰

子某年來若從其言歸乃以藥解之過期則必死

矣名曰定年藥凡北人至彼方亦宜知之若覺中

毒四大不調即便服此況彼下藥時必於雞豚等

肉投之後再食前物必發其毒急服此一錠或吐

或利隨手便差昔有一女子久患勞瘵為屍蟲所

噬磨一錠服之一時吐下小蟲千餘條後只服蘇

合香丸半月遂如常如牛馬六畜中毒亦以此藥

救之無不效者

文蛤（搥破洗刮內桴一名五倍子）　山茨菇（去皮洗淨焙）（貳兩）

續隨子（去殼研細以紙包壓去油再研壹兩）　紅芽大戟（洗淨壹兩）

（伍錢）　麝香（研叁錢）

右各另為細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵

千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如

欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及雞犬之類見之合宜珍重否則無効 如癰疽發背未破用冷水磨塗痛處并服良久覺痒立消 陰陽二毒傷寒心悶譫語狂犴覇殺瘴邪毒未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下 急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下 自縊或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下 蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處如服服或迷悶者更宜服之諸般瘧疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯下 小兒急慢驚風

五疳八痢蜜水薄荷一葉同磨下 牙關緊急磨一錠外塗內服量大小用之牙痛酒磨塗及含少許吞下 湯火傷東流水磨塗傷處 打撲傷損炒松節酒下 年深日久頭痛太陽疼用酒入薄荷磨紙花貼太陽穴上并服之 諸般癇疾口眼歪斜眼目掣眨夜多睡涎言語蹇澁卒中風口噤牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服

【驗】治一婦人腹內結塊久而不消又一婦人月經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不効服

此並痊 一婦人苦頭風作疼數年亦服之吐痰碗許遂不再發 一男子喉閉水漿難下 一男子纏喉風痰涎壅盛 一婦人中風牙關緊急痰涎湧出昏暈服並愈 一男子便毒堅硬 一男子患痔未成膿苦痛大便俱難各進一錠後去二次痛即止不日而消 一男子患發背瘡頭如粟重如負石內服外塗後去三四次病失所苦如灸即日而瘳 三男子剝自死牛即日遍身紫疱不計其數已而俱憤各灌一錠吐瀉而甦一藥不下者遂死 一小兒昏憒六日不省一小兒驚風發

搐諸藥不効它口灌之並蘇 一男子中風牙關緊急口出涎水亦灌之尋愈 一女子為邪所交腹作痛服之隨下惡物其邪仍至又服半錠每夜更灸二三錠使烟氣薰房遂不再至 一家患傳屍勞兄弟五人已死三人有方士令服此藥遂各進一錠一下惡物如鼠狀一下死蟲如蛾形俱獲生其人遂以此方廣濟親舊無不驗者余常以治一切雜病及癰疽等瘡未成膿者其効其已成膿者亦能殺大毒者其藥品雖不言補今癰疽之人服之並効誠劑中之上然以價計之用銀三錢藥

有七十錠可救七十人有力之家宜合之以濟人
近人製此往往加以朱砂雄黃考之諸方並無此
味余故不用恐亂其眞也識者當自知之
郭氏瑞効丸　治腸癰胃癰內積瘀血男子婦人積聚
證
當歸　京三稜　檳榔
木鼈子　穿山甲各壹兩炒　牡蠣火煅
連翹　枳殼各壹兩半炒　硇砂另研
琥珀各壹兩　巴豆貳拾壹粒去油　麝香少許
右爲末酒糊爲丸桐子大每服拾丸至貳拾叁拾丸
溫酒下臨卧再服如利動臟腑減丸數大小便有
膿血出者卻用別藥調治之
萬靈奪命丹郭氏經驗濟世方○又名　治一切癰腫疔疽初起
脉沉實及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之
朱砂　膽花各貳錢半　雄黃
明礬生用　佩香各貳錢　赤石脂
黃丹　琥珀　輕粉各壹錢半
麝香　片腦各壹錢　巴豆去殼水煮十沸
萆麻子另研各肆拾粒去殼
右爲末用巴豆萆麻子膏和藥爲丸如和不就加

煉蜜就成宜收磁器內如用時旋丸芡實大每服
壹丸井花水下或湯亦得忌熱物半日大人小兒
以意加減與服
一粒金丹　治一切惡瘡癰腫無名腫毒
沉香　木香　乳香各伍分
巴豆霜壹錢伍分
各爲細末照拼分數和勻用黑肥棗　箇半去皮
搗爛爲丸如芡實大每服壹丸量人虛實先呷水
一口行一次胃氣壯實者只可呷水三口不可
太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之
威靈仙飲
生威靈仙不拘多少爲末
每服壹錢空心溫酒調服逐日微利爲度
藏復養治癰疽瘰癧並威靈仙飲微利之
發表攻裏　五香連翹湯　治癰疽瘡腫初覺一二日便
厥逆咽喉寒發寒熱
沉香　木香　麝香
丁香各壹兩　乳香另研　連翹
射干　升麻　獨活
桑寄生　甘草炙各壹兩　大黃壹兩半

木通貳兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎柒分溫服取利

按丹溪曰精要第一論云不問癰疽瘡癤虛熱冷熱先與內托散五香連翹湯沉麝湯等諸方不冷不熱不問老幼少壯陰陽虛實冷熱多服爲妙夫癰疽瘡癤臟腑陰陽有淺深虛實冷熱用藥有補瀉溫涼老幼少壯其稟受厚薄形志苦樂隨年歲而增損奈何欲以不冷不熱四五方而通治之又以多服爲妙此不能無疑也學者當審經絡察病淺深而處治可伏此爲通治之法乎

千金漏蘆湯　治癰疽丹疹惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆　連翹　黃芩

白斂　枳殼　升麻

粉艸　麻黃　朴硝各壹兩

大黃壹兩半

右除硝外每服貳錢水壹盞薑叁片薄荷叁葉同煎溫服取利爲度

防風通聖散　治時毒熱毒便秘熱燥若時毒餓餒之後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用

防風　當歸　川芎

芍藥　大黃　芒硝

連翹　薄荷　麻黃

桔梗　石膏　黃芩各壹兩

白朮　山梔　荊芥各貳錢伍分

甘草貳兩　滑石壹兩

右水煎服或爲末白湯調下仍量人虛實

按此表裏氣血之藥也治一切風毒積熱瘡痛脉候弦洪實數浮緊氣血實盛者不可缺此見近有秘傳外科家方以是藥加人參并茯苓黃芪蒼朮金銀花名消腫托裏散雖以參芪爲主復云人參無亦可蓋使人不能無疑而難用也凡臨證加減須較表裏之法如表證多者當從此方以辛甘爲主散之也裏證多者方可從變故此分辛溫辛平辛涼之異

升麻和氣飲　治瘡腫癤疥痒痛此與下條方大黃有多少之異故兩列之

升麻　桔梗　蒼朮

乾葛　甘草　大黃煨各叁錢

陳皮貳錢　當歸　半夏

茯苓　白芷　乾薑

枳殼各伍分　芍藥各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

半表半裏中和湯 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

人參 陳皮各貳錢 黃芪

白朮 當歸 白芷各壹錢半

茯苓 川芎 皂角刺炒

乳香 沒藥 金銀花

甘艸節各壹錢

右水酒各半煎服

內托 內托散一名護心散 一日至三日內宜連進十數服

眞菉豆粉壹兩 明乳香半兩慢火于銀石器中炒手指撚使乾急傾出鋪紙上候冷研細

右研令勻每服貳錢至叁錢濃煎甘草湯調下時時細呷要藥常在胸膈間若毒衝心有嘔逆之證大宜服此如有寒而嘔逆不宜服此常用有驗

丹溪云此散菉豆解丹毒又治石毒味甘入陽明胃性寒能補爲君乳香去惡腫入少陰性溫善竄爲佐甘草性緩解五金八石及百藥毒爲使此方專爲服丹石而發疽者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性涼治嘔有降火之理

國老膏 治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述

甘草大者貳斤

右搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可溶服燒藥丹劑者亦解之本事方每甘草壹斤分作十服空心調下今云一二匙恐力少遲

牛蒡粥 治癰腫

用牛蒡根葉莖洗淨煮令爛於盆中研令細去筋取汁中即下米煮粥鹹淡任性服之極甚良無忌

解毒散 治癰瘡始覺便宜服

犀角屑 川升麻 川朴硝

赤芍藥 木通剉各壹兩 石膏貳兩

玄參 麥門冬去心 甘草各半兩生

右每服肆錢水壹盞半煎至八分去滓溫服無時

清心內固金粉散又名金花散

辰砂另研 白茯苓去皮 人參去蘆

甘草各錢半 菉豆粉生研 白豆蔻仁

朴硝另研各半兩 雄黃研 腦子

麝香另研各貳錢半

右以參苓白豆蔻爲末入研藥令勻每服壹錢半

審湯調下無時候此藥專治惡瘡熱毒焮痛作渴
煩躁此藥[illegible]
内追毒丹　治心解毒散潮
大朱砂　雄黄各伍錢　牛黄[illegible]錢
牛角[illegible]　琥珀[illegible]　沉香各伍錢
右爲末煉蜜丸梧桐子大每服弍拾丸燈心薄荷
湯下
精要云憤鬱不遂志欲之人多犯此疾
因云癰疽瘰癧不問虚實寒熱皆由氣鬱而成經
云氣宿于經絡與血俱澁而不行壅結爲癰疽不言
熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而
成也
獨勝散　治癰疽皆緣血滯氣凝而致者
香附子[illegible]
右無時以白湯調弍錢服之又云瘡疾多因怒氣
得之若有此疾必多怒但服香附進食寬氣自有
効
丹溪云獨勝散治氣鬱血滯而所發瘡愈後常服半年
尤妙此皆施於[illegible]之人[illegible]
而[illegible]實性[illegible]年近六十患背疽[illegible]與他藥皆不行惟
香附末飲之[illegible]此一味[illegible]此以安[illegible]
此[illegible]血實而又[illegible]乃[illegible]一見者也每思[illegible]
附經不言有補惟[illegible]一方乃[illegible]有益用
片子薑黄香附子甘草三味而以不老爲名且引鉄
瓮先生與劉[illegible]其故哉益於行氣中有
補之之理耳人之所以爲人者健而有常也因其不
息所以生生無窮正如[illegible]活血行氣有補陰之
妙故名益[illegible]前[illegible]後所恃者氣與血[illegible]無滯産
後無[illegible]以其行中有補也[illegible]亦然
遠志酒　治一切癰疽發背癤毒惡候浸有死血陰
毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而内攻
則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在内熱逼人手
不可近傳之必清涼或氣虚血冷潰而不斂若七
情内鬱治之必愈
遠志[illegible]
酒[illegible]調末[illegible]以滓傅患處
越鞠丸　治六鬱牙齒痛口舌生瘡或胸膈痞滿
嘔吐吞酸或腹脹腿酸等症
蒼朮炒　神麯炒　香附
山查　山梔炒　撫芎

麥芽各等分

右為末水調麵糊為丸桐子大每服三十丸白
湯下

五香散　升降諸氣宣利三焦疏導壅滯發散邪熱
治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似
癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香　丁香　沉香

乳香　藿香各等分

右剉散每服八錢水一盞半煎食後溫服

補遺謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虚氣結
三證有異耳予謂婦人經滿則行月閉一證固異然
婦人情性執着比之男子十倍雖有虚證宜補亦當
以執着為慮向見樓氏婦年寡居憂恚形肥性沉
憂作八十六七月間生背疽近腰處遂横直裂開
取血絲以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡
居之鬱酒内之毒鬱在其滯將令之熱卒至于平陷
施延兩三月而不救

忍冬酒　初發便當服此或貧乏中或居鄉僻田夫
野老百發百中

忍冬藤 [illegible]

右二味入砂瓶内用水貳碗文武火煎至壹碗入
好酒壹大碗煎十數沸去滓分為三服一日連夜
進盡病勢重一日夜可一劑 [illegible]

歐田夫野老百發百中也

金銀花湯　治一切癰疽發背疔瘡及喉閉乳蛾等
證金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服
甚者不過三五服可保無虞

槐花酒　治發背及一切瘡毒不問已成未成但焮
痛者並治之

用槐花肆伍兩微炒黃乘熱入酒貳鍾煎十餘沸
去柤熱服未成者二三服已成者一二服

黃芪湯　治諸瘡退風熱

黃芪鹽　黃芩去黑心　麥門冬去心

芍藥　甘草炙剉各　生地黃生用

半夏湯洗　當歸切焙　大黃炒

石膏碎　芎藭　人參各等分

右剉如麻豆每服伍錢匕用水壹盞半竹葉柒片
煎至壹盞去滓空心溫服日晚再服

生地黃散　治發癰疽熱毒疼痛心神煩悶

生地黃（貳兩） 川大黃（錢炒碎） 川升麻
地骨皮 當歸（炒） 黃芩
木通 赤芍藥 黃耆
玄參 甘草（各壹兩） 赤茯苓（各壹兩）
右為散每服肆錢水壹中盞入竹葉柒片煎至陸分去滓不拘時溫服

阿膠飲子（精要）

明阿膠（蛤粉炒） 粉草（各壹兩） 橘紅（半兩）
右㕮咀分作三服以水壹盞煎至陸分去滓溫服

牛膠飲 凡癰疽惡瘡發除處服之使毒氣不攻于內

牛膠（明者肆兩） 用酒壹碗入膠內重湯煮溶透攪勻傾出更從酒隨意飲能飲者以醉為度此方活人甚多

黃礬丸 服過壹兩已上無不取效最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數

白礬（壹兩） 黃蠟（半兩）
右和丸如桐子大每服拾丸漸加至伍拾丸溫酒送下如未破即消已破即合一日服百粒則有効能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤於應效

服之尤佳治蛇咬潰化白礬裹涎滿……
一方用明礬飛過研細以雞子……稀稠如糊用無灰陳好酒救……服之……消已成膿者從大小便出……其功大……黃礬丸
丹溪云阿膠飲牛膠飲黃礬丸以牛皮……上補肺氣實大腸兆胃止泄黃礬丸以蠟味甘淡入大腸有補難化固老者以甘草化毒行經逐忌酒忌冬酒皆有補性歸心歸血用之頗切當用者以之配入治腫瘍之散結潰瘍之補虛亦各得功

托裏消毒散 治胃氣虛弱或因……不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯為主並忌寒涼消毒之劑

人參 黃芪（鹽水拌炒） 當歸（酒拌）
川芎 芍藥（炒） 白朮（炒）
茯苓（各壹錢） 金銀花 白芷（各柒分）
甘草（炙） 連翹（各伍分） 右水煎服

托裏散 治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱者宜用此補托其屬六淫七情及諸經

錯雜之邪而爲患者當各審其因而參以主治之
劑其屬胃氣虛弱者當以六君子湯爲主
人參去蘆各又服之 黃芪炒各貳錢 白朮炒
陳皮 當歸 熟地黃酒洗
芍藥酒炒 茯苓各壹錢半 右水煎服
治癰疽初覺腫結未成可以消散去芪飲子
黃芪貳兩 甘草炙 天羅生
山藥炒各壹兩 鬼腰帶葉生於竹籬陰濕石岸絡石而生者妙下者無用其藤柔細兩葉相對形生三角
右爲粗末每服叁錢水壹盞煎至柒分入酒叁盞
同煎一二沸去查溫服
神効托裏散甚驗 治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒
焮赤疼痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之
黃芪去蘆 忍冬藤葉各 當歸上各捌錢
粉草炙錢
右爲細末每服伍錢酒壹盞半煎至壹盞病在上
食後服在下食前服少頃再進留滓外傅
金銀花湯 刑瘡金銀花散見癰疽條
本事黃芪散
綿黃芪蜜炙 甘草半兩 皂角刺揀紅紫者剉炒黃壹兩

細末每服伍錢酒壹盞煎乳香壹塊煎柒分去滓服
海藏云黃芪湯與四物相和亦名托裏湯血氣齊補
也
黃芪四物湯
人參 黃芪 白朮
茯苓 芍藥 甘艸
生薑 當歸 地黃
川芎 右多加金銀花水煎服
內固黃芪丸本事
綿黃芪 人參各半兩
右細末入真生龍腦壹錢研細生藕汁和丸菉豆
大每服叁拾丸溫熟水下加至四拾丸日三服
丹溪治一人婦年六十歲背上患癰脈洪大數午後惡
寒發熱食少
連翹 黃芪半兩 人參壹錢
陳皮 茯苓伍分 甘草炙
白朮各壹錢 縮砂仁 分上貼煎服
右方皆以黃芪爲君甘草歸參爲佐乃實內補虛
之中兼托裏也
右丹溪實內補虛法皆以參朮歸芪又非若獨參

齊其法並見後分經條及散見瘡瘍門虛實寒熱
條真轉死回生之捷法也

元戎素問寒癰丸例　經云腎移寒於脾發為癰腫
少氣脾移寒於肝發為癰腫拘攣又云諸寒[illegible]為腫此
皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣
感則害人皮肉筋脈聖濟云衣服過厚表易著寒所
得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之
不痛久則然後變色疼痛漸更而成膿如泔而稀久
不能差瘡口不合變為疳瘡敗漿肌肉侵損骨髓以
致瘻瘡宜以骨碎補丸主之[illegible]

李世英患疽數日後根脚開大或腹疼泄瀉手足常
冷脉沉微細或自汗出急用薑附之藥其名於臍下
關元着艾三五百壯待手足溫泄瀉止伏食知味方
可為喜

回陽湯　治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫
痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等
症
乾薑炮　附子炮各貳錢　人參
白朮　黃芪各叁錢　當歸
陳皮　甘草炙各貳錢　柴胡
升麻各伍分
右酒水煎服不應薑附倍之散藥用回陽玉龍膏

清熱消毒散　治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴
黃連炒　山梔炒　連翹
當歸各壹錢　川芎　芍藥
生地黃各壹錢半　金銀花貳錢　甘草壹錢
右水煎服

黃連消毒散　治腦疽背疽腫焮疼痛或麻木
黃連　羌活各壹錢　黃芩
黃檗　生地黃　知母

獨活　防風　當歸尾
連翹各肆分　藁本　防己
桔梗各[illegible]錢　黃芪　蘇木
陳皮　澤瀉各貳分　人參
甘草各叁分　右水煎服

黃連解毒湯　治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪數或發
狂言
黃芩　黃檗炒　黃連炒
山梔各壹錢　右水煎熱服

清心湯　治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧

排膿

即防風通聖散每料加黃連伍錢每劑壹兩水煎服

濟陰湯 治瘡瘍純陽腫痛發熱

連翹 山梔炒 黃芩炒

黃連壹錢 芍藥伍分 金銀花叁錢

牡丹皮貳分 甘草壹錢

右水煎服大便秘量加大黃敷藥用洪寶丹

玄參散 治癰腫始發焮赤痛或寒熱心煩四肢疼
痛

玄參 甘草生用各 石膏

麥門冬去心 前胡去蘆 枳實麩炒

人參去蘆 赤芍藥 黃芪

赤茯苓 川芎 生乾地黃

黃芩各壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹中盞入竹葉貳柒片小麥
壹佰粒煎陸分去滓不拘時溫服

仲景排膿湯

甘草貳兩 桔梗叁兩 生薑壹兩

大棗拾枚

右四味以水叁升煮取壹升溫服伍合日再服

排膿散

枳實拾陸枚 芍藥壹兩 桔梗伍錢

右三味杵為散取雞子黃壹枚以藥散與雞子黃
相等揉和煎如薄粥溫服壹升即愈

本事托裏排膿生肌散

皂角刺粗大黑者不拘多少

右先入瓶中盛泥固濟炭火燒過存性放冷出研為
細末每服壹錢薄酒微溫調下者用陳米飲調下

連翹飲 治癰腫瘡癤排膿

連翹 防風去叉各 荊芥

白芍藥 黃芩去黑心 玄參各貳兩

紅棗

人參 白茯苓去黑皮 桔梗剉炒

前胡去蘆 甘草炙各壹兩 黃芪生肆兩

桑根白皮剉炒壹兩半

搗篩每服伍錢水壹盞半煎捌分去滓溫服日二

或問腫瘍何膿可排曰家嫂嘗苦癰疽連患不已爲
程凌霖湖謂針血海可以除根以長針刺之半日出
針膿血相雜臭不可聞後果不復發當是時身無瘡
排膿從何來哉

內消

精要杵木飲子

乾杵木葉剉 乾荷葉中心帶 乾蒼耳根

甘草節　地榆各壹兩

右細剉每服半兩水貳盌煎至壹盌分作二服早晚各一服未成者自消潰者自乾其荷蒂去惡血管根下水解毒利胸膈祛木有芒刺能驅逐地榆去下焦血病輕小證候或可倚仗

車螯散

車螯壹兩煅通赤本草云車螯消酒毒　生甘草壹錢半

輕粉伍分

為細末每服肆錢濃煎栝蔞酒調五更服轉下惡物為度未知再用功在五香之上引子一個栝蔞大者一枚也一名瓜蔞

又方　車螯紫口者用黃泥固濟火煅一宿　瓜蔞壹枚去皮仁土炒香

燈心卅莖　甘草節伍分

右為粗末作一服酒貳盞煎至壹盞去粗入蜜壹大匙和勻再用酒八分盞車螯末貳錢膩粉少許調勻空心溫服取下惡物黃涎為效

內消散　治瘡疽結硬疼痛

人參去蘆　瞿麥　白斂

川升麻　當歸酒炒　黃芩

防風　黃芪剉　沉香

甘草生剉各壹兩　赤小豆壹合煮熟

為細末每服貳錢不拘時溫酒調服

丹溪云車螯散一以輕粉為佐一以燈心為佐其散腫消毒下積安詳穩重輕小瘡候可以倚仗

化毒為水內托散　凡患癰疽發背諸惡瘡疥乳花百種無名無頭及瘡此藥能令內消去旋化為黑水從小便出萬不失一此方不可忽視不可輕視寶之寶之

乳香　穿山甲　白芨

知母　貝母　半夏

金銀花　皂角刺　天花粉各壹兩

右㕮咀用無灰酒壹碗煎半碗去粗作一服溫進不宜加減將粗搗爛加秋過芙蓉葉細末壹兩以蜜水調過一宿自消不必用第二服忌發物大効

仙方活命飲又名真人活命飲　治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香研　防風　白芷

貝母　赤芍藥　當歸尾

明沒藥研　皂角刺炒　天花粉

甘草節　穿山甲炮各壹錢　陳皮

金銀花各叁錢

在背俞皂角刺為君　在腹募白芷為君
在胸次加瓜蔞仁（貳錢）　在四肢金銀花為君
如疔瘡加紫河車草根（三錢如無亦可）
右為粗末大者肆兩小者貳兩作一劑須用無灰酒拾
茶鍾瘡小伍茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令
泄氣煎至叁大鍾去柤作三次服接連不斷隨瘡
上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無
酒氣不動臟腑不傷氣血忌假薄酒鐵器服後側
睡覺痛定回生神功浩大不可臆度

潔古保安湯　治瘡托裏成已成者速潰
瓜蔞（新者一枚去皮火焙）　沒藥（通明者壹錢研）　金銀花
甘草　生薑（各半兩）
右為細末用好無灰酒叁升于銀石器內煎至壹
升分作叁器三次飲盡病微者只一服如服托裏
藥不能發散又作瘡者用此
昔聞縱談云戶部尚書沈詵為人仁厚一兵卒患
背疽乞假親為合藥治之時其疽當穀痛闌在衛
丁寧料理藥內用酒恐其醉不中用自斟酒入藥
服之即愈其法用瓜蔞子一枚乳香沒藥各一錢
甘草三錢用好酒九盞臨服時入沒藥一塊飲此酒
極妙

秘方托裏散　治一應瘡毒始終常服不致內陷
瓜蔞（大者壹枚杵）　當歸（酒拌）　黃芪（鹽水拌炒）
甘草　白芍藥（炒各一兩半）　皂角刺（炒）
金銀花　天花粉　熟地黃（用生者酒拌入）
（四味各壹兩）
用無灰酒伍茶鍾和藥伍兩入磁器內厚紙封口
再用油紙重封置湯鍋內煮用蓋覆之煮至藥香
取出分服直至瘡愈
薛按此方甚為平易消毒之功甚大且不動臟腑
不傷氣血不問陰陽腫潰俱用屢効誠仙方也常
治發背腦疽勢盛者更隔蒜灸若脉沉實大小便
秘者先用疏通而後用此其功甚捷若大毒已退
不作膿或不潰者用托裏消而不斂及膿清用峻
補

秘方拔毒散　治一切瘡瘍初起腫毒其功不可盡述
乳香　沒藥　穿山甲（炮）
當歸　木鱉子（各壹錢）　瓜蔞實（貳錢）
甘草（伍分）　忍冬藤（壹錢）　牙皂角（炒焦分）
大黃（生熟各壹錢半）　連翹（壹錢）　貝母（八分）

作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾食前服
按此方攻毒止痛化膿之良劑已屢用屢驗若有膿或已潰者大黃不可用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖潰脈仍洪數或沉實冷者火邪尚在又所宜用

歸芪湯 治癰疽無頭但腫痛

黃芪　當歸　瓜蔞

甘草　皂角刺　金銀花各

右㕮咀水一鍾半煎一鍾分去滓入乳香一錢再煎服

又方

貝母　穿山甲　天花粉

右為末每服三錢水二鍾煎半鍾一日四服其毒自在大小便下矣 可與前方合為一貼

破毒無比散 豬牙皂角去皮如法醋炙焦黃為末每服半錢加穿山甲合名不忌人蓋在何處就取此處甲用以蛤粉炒為末一錢與皂角末相和溫酒調下病在上食後服在下食前服神効

消毒散 治一切無名腫毒癰癤

貝母一味去心切細一半生曬一半微炒和勻為末病在上食後服病在下食前服酒調一二錢

一男子背癰腫硬作痛惡寒發熱見用白蠟末五錢糊丸以蔥頭湯送下神效惡寒退再服諸證亦退更以仙方活命飲一劑出水而消此秘方名千金化毒湯 黃礬末蔥湯調服因太難服故易為丸 一方治瘡疽不問已潰未潰先用此藥二三服後用消毒藥其効甚捷治瘡乃之人用此即退不用托裡藥亦愈蓋甘礬為患血氣不虧故也若金石毒藥發瘡者尤効蓋礬又能解金石之毒也 一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦効此藥托裡固內止痛解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或更大所傷溶化熱塗患處更以熱酒調末服尤効

衛返魂湯 又名通順散 又名何首烏散○

何首烏不犯鐵　當歸　木通去皮尖

赤芍藥炒　白芷不見火　茴香炒

土烏藥炒　陳枳殼麩炒若惡心加薑汁炒

甘草

右方比此改味各等分水酒湯使隨證用之水酒相半亦可惟流注加獨活每服四錢病在上食後服病在下食前服

此一藥流注癰疽發背傷折非此不能効至於救
壞病活死肌外患於未萌之前拔根於旣愈之後
中間君臣佐使如四時五行更相迭旺其神仙妙
劑隨證加減其効無窮倘則此藥大能順氣匀血
故也夫氣陽也血陰也陽動則陰隨氣運則血行
陽滯則陰凝氣弱則血死血死則肌死肌死則病
未有不死者矣必調其陽和其陰然後氣血匀二
者不可偏廢只調陽不和陰則氣耗而血凝肌必
不活如五香連翹之類是已只和陰不調陽則血
旺而氣弱疾必再作如內補十宣之類是已然二

藥亦須參用不可執一爲妙此藥扶植胃本不傷
元氣蕩滌邪穢自然順通不生變證眞仙劑也用
法列之于左
一發背旣久不愈乃前醫用凉藥過也凉藥內傷
其脾外冰其血脾主肌肉脾旣受傷飲食必減顏
色痿瘁肌肉不生血爲脉絡血一受冰則氣不旺
肌肉糜爛故必理脾脾健肉自生宜於此方中去
木通少用當歸倍加厚朴陳皮減則用家傳對金
飲子又減則加白豆蔻之類爲妙　一凡治流注
可加獨活流注者氣血凝滯故氣流而滯則血注

而凝加此藥者可以動蕩一身血脉血脉旣動豈
復有流注乎　一流注起於傷寒傷寒表未盡餘
毒流於四肢經絡涎於所滯而後爲流注也如病
尚有潮熱則裏有寒邪未盡散此方中可加升麻
蘇葉如服此而熱不退可加乾葛如有頭疼加川
芎並川萆水煎如無潮熱可用水酒相半煎酒大
能行血生氣故也氣生血行病愈可必然流注須
表者何也所以推其因究其源不忘病之根本也
寒邪旣盡表之太過則爲冷流注尤爲難治故宜
略表爲妙表後第二節宜服溫下之藥乃十宣內

補是已如不効第三節宜加附子或服四柱散數
服卽止溫藥亦不可多用恐增潰爛以成膿血不
乾第四節仍歸本方收効然表未盡則餘毒附骨
而爲骨癰大流注者傷寒之餘毒骨癰者又流注
之敗證也流注月傷寒之罪乃醫者表之不盡也
骨癰非流注之過又庸醫凉藥之過也庸醫無識
心盲志昏妄稱明見雖知爲骨癰而治之無法又
復投之凉藥縱之毒力則毒氣滯凉藥繃鐵當則
愈附骨而不能愈矣不然則人之骨何以有癰骨
而成癰非藥所治故名附骨疽又名白虎飛尸留

連周朞展轉數歲冷處朽骨出盡自[illegible]其不愈者
至於終身有之此皆失於初也其有深者多為削
骨箝取可瘥正骨腐則終身廢疾故膿白而清者
碎骨初脫肉深難取膿黃而濃者碎骨將出肉淺
可取宜以利刀取之詳在後章此不過治骨癰之
槩耳　又有病經數月傷於刀刃瘡勞奔擊咳嗽
膿血壞肉陰爛者此皆冷極陽弱陰盛不可以唾
紅[illegible]熱宜以好附子加減治之　又有毒自手腳
頸面而起疼痛偏身上至頸項經絡所係去處如
藕瓜貫珠者此為風濕流氣之證宜以加減小續

命湯及獨活寄生湯與此方參錯用之　又有兩
膝痛起以至偏身骨節皆痛婦人類血風男子類
軟風此名風濕痺又名歷節宜以附子八物湯加
減用之　又有癰腫在項腋兩乳傍兩胯軟肉處
名為瘰癧癰此冷證[illegible]熱宜以內補十宣散與此
方參用小兒不可[illegible]用附子恐生驚癇切不可更
犯針刀瀉血[illegible]肉難合宜以濕熱藥貼散內
消倘犯針刀生努肉亦以此藥收功倘用藥微疼
腫有驚癇宜用[illegible]散加減用之驚定藥如
故常又有小兒亦患痄腮大道者癰腫見於頸項

臂膊胸背等處見為冷極全在熱藥敷貼之功
一病須再作為作治法見後　又有流注人如龜
瓠瓜擬見於胸背其證類發而其後用藥之後形
勢一有微動即非發矣宜以內補十宣與此方隨
證通變用之可以內消大抵諸發皆原於冷故為
痛者骨痛也骨者腎之餘腎虛則骨冷骨冷所以
痛所謂骨疽皆起腎者亦以其根於此也故補腎
必須大附子方能作效腎實則骨有生氣疽不附
骨矣凡用藥不可執一貴乎通變　凡癰疽初萌
必氣血凝滯所成為日既久則血積於所滯而後

盛作故病人氣血盛者此方中減當歸多則生血
發於他所再結癰腫生生不絕斯乃秘傳醫者少
知也　一凡癰而生痰有二證一胃寒生痰此方
中加半夏健脾化痰一熱鬱而成風痰此方中加
桔梗以化咽膈之痰並用生薑和水酒煎　一凡
膈發皆發在上者此方中可大本通恐導虛下元
為上盛下虛之病難於用藥老人虛弱者尤宜去
之　一凡病人有瀉者不可便用此方宜先用止
瀉藥[illegible]候瀉止方用此藥盡
人身以血氣為主病癰之人氣血瀚聚一處為膿

若臟腑不固必元氣泄而血愈虛雖金瘡藥大能順氣故也大抵氣順則血行氣塞則血寒氣寒則血死血死則肌肉不生投之熱藥則氣乃無元氣不足以當之徒增苦投之涼藥則無是理是方雖仙授要在用之得當不然則有刻舟之患矣至於瘡注又不可一槩論也若涼藥耗散元氣虛敗有用一建取效者其疾多緣於冷故也先當審其脈皆其證的出於冷然後用之亦不可過過亦有害口□脈回腫處紅活骨有生氣寒氣不能相附為害門結功不多以取效此萬全妙法　一此藥乃散末皆可水酒湯使臨時斟酌用之貴人加木香為衣病者有熱痰咳嗽當以香□蘇葉湯皆可下

凡用藥劑　一此方非但治傷損發背傷折至於男子婦人疝氣血氣皆可用皆獲效矣有一婦人患氣疾五年發時只是塊痛嘔逆水漿不下一發便欲死用此藥為丸木香湯下一服痛止再服氣順疾遂愈　一凡傷折皆不脫此方但加減有差詳見傷折類中如尋常打破傷損或傷心胞並背治之在頭上則大木通枳殼加川芎陳皮常用加丁皮蘇葉能活血加破故紙五靈脂能破宿血水

煎熟用濃酒一盞候入鍋中沸起入大黃末空心服之如通順藥只四服先一服中入大黃後一服不必用只是催發便下如不通只枳殼湯　問催如若不通即不可治不可坐視人死而不知也補血上宜散之類　一凡傷折當用此方可夫木通名何首烏散蓋首烏能扶令發氣如刀刃傷有潮熱面腫氣喘乃破傷風證可服宗血散楊根湯數服微急煎發散或敗毒散三四服外用敷貼藥依法治之無不愈者矣　一經年漏瘡加黃耆玄胡索以酒煎服　一脚氣加檳榔木瓜穿山甲木煎服之　一宿痰失道非惟人不識且仙授以來惟余一派知之人身有痰潤滑一身猶魚之有涎然痰居胃中不動則無病動則百病生或喘或咳或嘔或作頭痛眩疼徧身拘急骨節痺疼皆外來新益之痰乃血氣敗濁凝結而成也何則臟腑氣逆鬱結生痰當汗不汗蓄積生痰飲食過傷津液不行聚而生痰其常道則自胃脘達肺脘而出其失道自胃脘而流散於肌肉皮毛之間脾主肌肉肺主皮毛故凡胸背頭項腋胯腰腿手足結聚腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄不

熱堅如石破之無膿或有瘀血或清水或如乳汁又有壞肉如破絮又或如瘰癧在皮肉之間如雞卵浮游於水中可移動軟活不硬破之亦無膿血針口努肉突出惟覺咽喉痰實結塞作寒作熱即皆其證急於此方中加南星半夏等藥以治其內外用玉龍熱藥以拔其毒便成膿破為良其輕無膿者必自內消如熱極痰壅則用控涎丹（紫大戟 甘遂 白芥子等分為末糊為丸）如遍身腫硬塊大如盃盂生於喉項要處者危為難治夫血氣和暢自無凶病氣行不順血化為痰痰復失道則血氣凝滯不行而為膿但能為腫硬理必然也此證陽少陰多隨證用藥回陽生氣補血控涎外則用後法作起一身氣血引散冷塊萬一腫不消不作痛不為熱體氣實無他證肉塊與好肉無異此又一證也切不可輕用針刀自戕如艸贅附用針灸除割其肉或用毒藥點脫使人畏寒壯熱法當通順其氣血於此方中加升麻以除其寒邪用斂口結痂之藥以安之使為痼疾而已萬一病自作臭穢糜爛不免動刀則有妙劑可以代刀不可輕泄（白礬 枯礬 二味為末敷之）一肚腸內癰宜服十宣散與此方相間用之並加忍冬

藤此藥最治內癰但當審其虛實或通或補補須用附子通則用大黃如不明虛實則此方亦自能通順十宣自能內補可無他變至於肺癰勿忍飲食有碍胸膈微痛即是此證急須察脉審其虛實虛則用此方加附子消湯入用之若能則下部用十宣散內補之即自消若實則用此方加大黃略通之使熱氣下宣為妙蓋肺與大腸相表裏故通如肺癰已成宜以海上方與此方相兼並服之當吐膿血者猶癰也大便有膿自臍出者非死也忍冬藤甘草煎酒妙

龍虎六加散　治發背癰疽發腦發鬢發疵又治腦虛頭常風濕之症

製藥法

南木香（用紙包煨燥焙乾研為細末）　罌粟殼（去蒂膜薄切焙乾研為細末）

甘艸（用慢火焙乾為細末）　吳白芷（洗去蘆焙乾為細末）

川芎（用紙裹煨焙乾為細末）

右件藥末各另包收看瘡加減用之

加減法

若瘡勢紅腫熱大先服如神托裏散一帖出汗盡取微汗如紅暈大腫高瘡頭自以手按不大自膿者

可進交加散一貼用木香(分) 罌粟殼(貳錢) 甘草(炙)
白芷(壹錢) 川芎(壹錢) 共爲一貼用水柒分生白酒
叁分共盌用銀器煎捌分如無銀器新瓮器亦
好不用銅鐵舊器於炭火邊先滚五七滚用細紗
水濕扭乾濾去柤食後服以乾麵藥鑪之柤敷瘡
四圍用濕絹帕包之如惡心嘔吐即服護心散一
貼止嘔次服前藥若調腹膨滿或大小便閉澁可
服當歸連翹散一貼行五七次用温米粥湯補止
如瘡已成潰膿不寒不熱止定痛用疼痛木香(交)
甘草(壹錢) 川芎(壹錢) 白芷(壹錢肆分) 粟殼(貳錢) 水伍分酒伍

分合煎捌分服若紅暈白若好也仍紅其瘡不退
若紫黑稍可如紅暈不退每日於晚進藥一貼喫
交加散四五貼可服當歸連翹散一貼要行加大
黃只有熱腹不脹不用大黃如瘡潰要將好腐肉
不脫可用針刺破皮令隨膿出將水紅花根煎湯
洗之用生肌散摻上每日洗一次依此法無不効
有蛆若難治最忌酸辣醬麵發氣并生冷之物

護心散　治瘡見前交加散

甘草(炙壹錢)　菉豆粉(炒貳錢)　硃砂(研水飛過壹錢)

右爲細末作一服白湯調下

當歸連翹散　治瘡同前

當歸　連翹　梔子仁
芍藥　金銀花(各壹錢)　黃芩(伍錢)

右㕮咀每服伍錢用水壹盞煎至柒分空心温服
要行加大黃貳錢待藥煎熟入大黃煎一二沸去柤
服

如神托裏散　治發背等瘡初起又治疔瘡并一切
腫毒及發散傷寒

蒼耳根　鬼耳草
金銀藤(即金銀花)　五味子根(各等分)

右㕮咀每服五錢用生白酒壹盞煎至柒分去柤
服訖蓋取微汗柤再煎

生肌散

水紅花葉

右爲細末先用水紅花根剉碎煎湯洗淨却用藥
末撒瘡上每日洗一次撒一次

前鋒正將　治一切癰疽不問發有發背作痒疼痛
其効如神

荊芥　薄荷　山蜈蚣
老公鬚　天花粉　姑英

茹片　收荷心　川白芷
猪牙皂角（炒）　赤芍藥（已上各等分）　淮烏（大者壹個煨）
紅内消（同其數）　甘草（每服伍錢研細）
右爲末每服貳錢薄荷茶清調下欲快利用酒調
服効若服經日未見効恐是凉藥凝血可加當歸
羌活如熱甚雄黄酒調乳癰加萱草根研汁調其
餘只用酒下不飲者門冬去心煎湯亦可但較
緩耳
引兵先鋒　凡用内消先用此解退潮止渴解熱以
升麻葛根湯表散後服此

木通　瞿麥　荆芥
薄荷　白芷　天花粉
甘草　赤芍藥　麥門冬（去心）
生乾地黄　山梔子　車前子
連翹（各等分）
右㕮咀每服貳錢燈心生地黄煎熟調加淡竹葉煎
温服上膈食前下膈空心老人氣虚者宜加當歸
羌活
加味十奇散　主内護治癰發已成未成服内消三五
日不効或年四十已上氣血衰弱成者速潰未成
者速散服至瘡口合而止内能固濟去舊生新又
名固壘元帥
當歸（酒浸）　桂心（不見火）　人參
土芎　香白芷　防風（去蘆）
桔梗　厚朴（去粗皮薑汁炒）　甘草（炙）
乳香　没藥（并别研）
右件藥各等分研爲末每服貳錢酒調日三服病
愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯
一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成服者發
散極効

槐花（壹兩炒焦色）　胡桃（拾個新鮮不油者煻火煨熟去殼）
右二味入砂盆内研爛如泥熱酒調和柤温服如
能飲酒人多飲愈効一醉後所患癰腫散矣
豨薟散　治癰疽發背及一切癰瘡等證如神
豨薟草（其草長如牛舌其氣如猪臭者）　小薊根
五爪龍（即五葉藤）　生大蒜
右四物各等分細研用酒和勻濾去柤服一椀得
大汗通身而愈
又方　治諸般癰腫神効
新掘天門冬（一味約叁伍兩）

右洗淨入砂盆內研酒以好酒濾起濾去粗頻服未効再服一二服必愈

敷貼消藥 戴院使云發散諸般毒多硬白芙蓉葉入草烏末少許蜜調傅重者加入南星末凡諸毒用敷貼藥欲散搓入麝香欲潰搓入雄黃

冲和仙膏（一名黃雲膏）　冷熱不明者用之茶酒隨證治之

川紫荊皮（伍兩炒又名紅肉又名內紅消）　獨活（去節炒）
赤芍藥（二兩炒又名內白消）　白芷（壹兩不見火）　木臘（炒又名望見消又名陽春雪即石菖蒲　[illegible]加亦妙）

右五味並爲細末用法詳見于後
夫癰疽流注雜病莫非氣血凝滯所成遇溫則生遇涼則死生則散死則凝此藥是溫平紫荊皮木之精能破氣逐血消腫獨活土之精能止風動血引氣拔骨中毒去痹濕氣更能與木臘破石腫堅硬赤芍藥火之精微能生血住痛去風木臘水之精能生血住痛消腫破風散血白芷金之精能去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不爛痛止則不掀作風去則血自散氣破則硬可消毒自散五者交攻病安有不愈乎　一凡病有三證治有三法如病極熱則此方中可倍加紫荊皮木臘少用三品亦能消散之但功少遲耳如病極冷則此方微加赤芍藥獨活亦能活血而消散之功亦稍遲而不壞病　一如病熱勢大盛切不可用酒調但可用葱泡湯調此藥熱敷上葱亦能散氣故也血得熱則行故熱敷也如病稍減又須用酒調酒能生血遇熱則血愈生酒又能行血遇溫則血愈行矣　一瘡面有血泡成小瘡不可用木臘恐性粘起藥時生受宜用四味先敷後用木臘蓋在上面覆過四圍以截助攻之血路凡敷藥皆須熱敷乾則又以元湯濕透之使藥性濕蒸而行病自退矣　一如用正方四面黑暈不退瘡口皆無血色者是人曾用冷藥太過不可便用玉龍蓋肌未死也恐藥力緊添痛苦宜於此方加肉桂當歸以喚起死血自然黑暈退見功効血回即除加藥只以正方取効　一如用此方痛不住可取酒化乳香沒藥於火上使溶然後將此酒調藥熱塗痛止　一流注筋不伸者可於此方加乳香敷之其性能伸筋故也　一如瘡口有赤肉突出者其證有三一是着水二是着風三是刀破後刀口番

一突宜以此方加少南星以去風用薑汁酒調其不
消者必是庸醫以手按出膿被太重又以凉藥凉
了皮以致如此若投以熱藥則愈爛此人有口
訣焉宜用白礬枯礬二味爲末敷之又用紙黃末按之外服茶衛如聖金散外那中和
一若病勢熱盛者不可使用凉藥熱盛則氣血凝
會必多大凉則血退不徹返凝於凉故宜温冷相
半用之血得温則動挾凉則散可用此方加對停
洪寶丹用葱湯調塗貼之　一此方乃發背流注
之第一藥也學者當通變妙用表裏相應迴病在
掌握之中但發背甚者死生所係惟此藥功最穩

量終始可恃決無變壞若發之輕者草醫亦能取
効然有變證流弊之患此無他發於陰則非草醫
之可治矣豈如是劑兼陰陽而並治奪造化之神
功哉至如流注一疾雖不能死人而十有九爲廢
疾廢疾流連死亦隨之縱有醫之能愈者亦必半
年周歲之後方見其効此乃百中之一然終爲殘
弱之身矣惟存此派仙方藥奇効速萬不失一而
有起死回生之効非吉所能盡述夫流注乃傷寒
餘毒故有表未盡者餘毒客於經絡氣血不勻則
爲熱流注所謂醫之能愈者熱也熱病少見有表

散太過氣血衰者餘毒流入腠理凑理或踈或密
爲冷流注所謂醫之難醫者冷也冷病常多致冷
寒表未盡者非特爲熱證而已其餘毒亦多爲冷
證皆原於腎虚故作骨疽冷則氣愈滯而血愈積
故但能爲腫而不能爲膿若醫者投之以凉劑則
所謂冷其所冷而陰死於陰惟有壞爛腐肉毒氣
着骨而爲骨癰流爲廢疾故曰骨癰者流注之敗
證也流者動也注者住也氣流而滯則血住而凝
氣爲陽血爲陰陽動則陰隨氣運則血行今流注
能移流注於他處而散之者取其能動故也動則

可移陽既移而動矣陰豈能獨住而不隨之者乎
是故以獨活引之者以其性能動蕩氣血也引之
一動則陰陽調和不能爲膿而散之於所移之處
勢必然矣　一流注在背脾腰腿緊要處當用此
方厚敷患處却並用獨活一味本之酒調煎塗一
路其盡處以玉龍誘之此移法也使血氣趨於他
所聚於無緊要處作膿又或消之若以成膿則引
不下急將此藥拔之出毒氣免作骨疽如庸醫用
了凉藥犯了針刀使成骨癰非藥所愈又待其碎
骨出盡方愈若怯用針刀取之則用玉龍治法在

後若正骨出無治法副骨出可安　一方用白芷
紫荊皮酒調以內消初生癰疽名一勝膏又方只
用赤芍藥木臘紫荊皮作箍藥名三勝膏　一方
治大人小兒偶含刀在口割斷舌頭已垂落而未
斷用雞子軟皮袋了舌頭用破血丹蜜調涂舌根
斷血却以蜜調和蠟稀稠得所調此正方敷在雞
子皮上取其軟薄能透藥性故也如在口溶散勤
勤添敷三日舌接住方可去雞子白皮只用蜜蠟
調藥勤勤敷上七日全安學者覩此可以觸類活
法妙用不在師傳之功如無速効以金瘡藥參錯

治之尤妙　一治癰腫未成膿不可便用洪寶丹
敷貼頭上恐爲冷藥一冰血住不消不能成膿反
能爛肉只用此方敷貼如不消欲其成膿却以玉
龍貼癰頭以爍之又用此正方在玉龍之下四圍
用洪寶丹箍住以截新潮之血又若病未甚宜求於
凉藥者玉龍之下不必用此方上以洪寶丹圍之
一如救壞病未見可用玉龍只用此方自然穩
當免病人苦　一發背初生未成單用紫荊皮末
酒調箍住自然撮細不開服藥止用柞木飲子乃
救貧良劑也　一此方加南星草烏二味三分之

二熱酒調敷諸癰可以消膿不痛若單玉龍要洪
寶丹箍住實此法妙　一猘犬咬人先用紫荊皮
沙糖塗留口金丹退腫嚼杏仁置口中去毒　一
法加南星草烏二味與此方各一半熱酒調敷可
治又損至妙　一小兒軟癤用此方加生薑酒調
敷若初發即用此方酒調敷成膿而止若初發時
用紫荊皮木蠟酒調敷可以必消切不用洪寶丹
一瘭疽心火熱毒也見於五心痛不可忍其狀
如泡瘡而血赤外形雖小內有熱毒在心腌者難
治在手足心者可療然治之須[illegible]上腌

則腐肉粉碎神仙黃膏凡有此疾在手心則用洪
寶於手心環圍敷之以截其血却用冲和於手心
留口收功在足心則用洪寶敷在脚腿交骨四圍
一二寸長以冲和收功如前
神功散　專治發背癰疽一切疔瘡癤瘰癧等瘡已
未成患者効驗不可備述
川烏頭炮去皮尖　川黃蘗炙去粗皮
右二味爲細末後各等分用小兒或大人唾津調
成膏如唾少暾口水亦可發背癰疽等瘡纔有
敷於患處留頭候藥乾用淘米水常潤濕[illegible]

藥敷一次如瘡已成重患將潰爛者先將槐枝艾葉煎湯頓溫將瘡洗淨用絹帛展去膿血以香油潤患處用綿紙仍照患處剪成圓錢留頭貼上後用藥塗於紙如乾依前用淘米水潤日換一次聽其自然流膿不可手擠如敷藥後瘡人覺瘡作疼減熱即愈如生肌則腐肉自落倘而不落者剪割亦可最不宜用針發背不宜貼膏藥凡患瘡瘍去別醫止飲別藥方可治忌氣怒房事勞役并孝服體氣飲酒之人飲食忌酒并自死雞魚肉瓜茄蒜辣之物若因氣怒反復發腫者依前治之如治對口并腦疽不必洗去舊藥逐欠添藥恐動瘡口惹風也

圍藥　南星　草烏頭　黃蘗　白芨（各等分兩）　五倍子（炒黃兩）右爲細末調如糊隨血圍匝如墻壁可移除處於不除處如（□）

敷藥　白斂　白芷　天南星　白芨　貝母（各等分）

右爲末水調傅外用圍藥束定內用傅藥提起制之有理

將軍鐵箍膏　治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋蔓走疰㾦氣

醫霜白梅　南星　大黃

蒼耳根（各等分兩）　白芨　白斂

防風　川烏頭（各等分研）　草烏頭

雄黃（各等分錢）

右爲細末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍涂上止留瘡高突處如藥乾以鷄羽蘸水掃之日換一二三次大妙

又方　治一切癰疽腫毒

草烏　貝母　天花粉

南星　芙蓉葉（各等分研爲末）

右用醋調搽四圍中留頭出毒如乾仍用醋潤之

按此方藥性溫和常用不問陰陽腫毒並效

正鐵箍散

貝母（去心）　白芷　蒼耳草灰（燒存）各貳兩　或加龍骨（貳錢）尤妙

右爲細末水調或香油調貼瘡上

大鐵箍散

芙蓉　豬苓皮　木鱉子（各用兩）

白芷　黃蘗　寒水石

赤豆　白歛　貝母各壹兩
大黃　紫荊皮　白芨
眞地青　羌活[illegible]　防風半兩
右爲細末凉水調圍癰四畔如肉腫大白芨白歛
加生地黃地榆用芭蕉油調傅熱甚者用[illegible]消散

水黃散　圍腫毒
犀角屑　大黃　白芨
草烏皮尖　白歛　麝香
朴硝各等分
右爲細末蜜醋調薄攤油紙上稍乾[illegible]下所涂潤

濕貼之卽消

外用消毒藥　治諸腫毒堅硬不消
升麻　葛根　鼠粘子
地骨皮　金銀花　黃花地丁
甘艸各等分
右爲麁末每用伍米錢水壹升煎拾沸於腫處四
畔熱用冷則再煖

圍腫方　草烏　白芨
白歛　黃檗　朴硝各等分
右爲末用蜜醋調圍腫外仰便收起

神白膏　貼五發未破
南星　大黃　草烏
白歛各半兩　蚌粉　大柏皮各壹兩
小赤豆壹兩　加乳香沒藥尤妙
右爲末取芭蕉頭研取汁調傅四畔

[illegible]黃散　治癰疽發背紫黑疼痛不止
粟米小粉炒黑壹兩　草烏頭　南星
絡石　百合[illegible]　白芨壹兩
乳香　沒藥　雄黃
黃丹各半兩　右爲極細末溫水調敷之

治無名腫毒或背疽　治法腫闊定名鐵井欄
芙蓉葉重陽前收研末　蒼耳端午前收燒灰存性
右同研細以蜜水調敷之

烏龍膏　治一切腫毒癰疽收赤暈
木鼈子去殼　半夏各貳兩　小粉四兩
草烏頭半兩
右於鐵銚內慢火炒令轉焦爲細末出火毒再研
以水調稀稠得所敷瘡四圍中留頂出毒氣或用
醋調亦得

宣毒散　初發或灸後敷卽消腫收赤暈消聚

露蜂房(參兩炒焦) 南星 赤小豆(各壹兩)
小米(壹合) 生草烏(□錢) 生白礬(□錢)
右為細末用淡醋調塗四畔乾即再上
拔毒散 癰疽腫結通用能散能潰
南星(一等大者壹兩) 白草烏頭 白芷(各半兩)
木鼈子仁(壹箇)
右為細末分兩次先醋入蜜調敷紗貼之
縮毒散 治癰疽腫毒未結則散已結則潰大膩排
膿
大南星(壹兩) 貝母(柒錢半) 白芷(□)
赤小豆 白僵蠶(□) 雄黃(□錢)
右為細末初用醋調敷後用蜜水調敷
退毒散 癰腫通用
木鼈子(去殼) 大南星 半夏(□)
赤小豆 白芷 草烏(□)
右為細末硬則以醋調敷熱則以蜜水調敷
神功妙貼散 塗敷癰疽令內使膿血化為水出收
斂瘡
大南星 蓖麻子 五倍子
半夏 白芷 蒲黃

貝母 白芨(各□) 沒藥
乳香(各貳錢) 花蕊石(□)
右為細末次和井水入□調
敷從背邊抹收入東留□以藥若瘡
開大全用紗攤藥以茶籠內自竹葉尺寸兩片
如瘡勢先貼藥上然後貼瘡久舍□竹葉亦
將竹葉出水搽藥以行之凡敷藥須是細末則不
痛
特異萬靈散 治癰疽發背□
軟石膏(燒通紅盌覆在地上一宿) 大白南星
赤小豆 草烏(連皮尖) 乳香(別研□錢)
右為細末蜜水調成膏從外抹收入留放高處如
錢勿敷如瘡已破只忌藥入瘡口忌痛斂瘡排膿
不致潰爛雙效
治冷癰膏硬□
生鐵銹 輕粉(各□) 白松香(□)
麝香(少許)
先將鐵銹松香為細末入銚內加麻油□兩慢火
煎數沸離火待溫少退入輕粉麝香末攪勻即為
膏矣收貯量瘡大小攤貼患處

斂瘡內消方　黄明膠壹兩水半升鎔消了入黄丹壹兩再煮三五沸又放温冷以雞毛掃在瘡口上如未成即塗腫處自消

凡癰不問已潰未潰者以膠一片水漬令軟貼瘡大小貼當頭上開一孔若已潰合膿者當被膠急發之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

治發背祕法李北海云此方神受極奇然以甘草參大兩生搗別篩末大麥麵壹兩於一盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水搜和如餅劑方員大於瘡一分熱傅腫上以油紙隔令

通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消

騙皮取膿法　治諸般腫毒

驢蹄細切壹兩　蕎麥麵壹兩　白鹽半兩

草烏肆錢去皮

右為末水調作餅子慢火炙黄出火毒研末醋調成膏用白紙攤貼患處瘡口毛竅而出其腫自退

雄黄散　治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼成膿

雄黄細研　黄蘗　檳榔

川大黄　麒麟竭各半錢　麝香研壹錢

黄連壹兩　白芷　木香

苦葶藶　桂心各半兩　當歸少失錢

右為細末用臘豬脂調令勻塗於紙上貼瘡急發膿潰後即用膏藥搜膿生肌

萬應針頭丸　治一切腦背瘡惡瘡大痛欲死者一粒即愈

麝香貳錢　血竭如臆者用散者下用弄真者

輕粉　蟾酥揀看者試　硇砂各參錢

片腦壹錢　蜈蚣壹對全用

右為極細末煉蜜和丸為劑如瘡有頭者用針頭

挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用紙花周圍唾津濕貼瘡上不過兩時即愈　如兩腋見無頭瘡即是疔瘡將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用藥貼忌烈酒濕麵一切發熱之物

針頭散　治瘡瘍腫木硬

右以乳香蟾酥各等分同研勻細以兒乳汁和如泥入磁石盒收之乾不妨每用以唾調撥少許點於瘡頭上以膏藥貼之毒氣自消縱然有瘡亦輕

敗搖青小膏　治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿

搽瘰追膿腹中痞塊貼患上　瘰疾貼大椎及牙
桂其効如神

白松香(…)　草麻子(叁百粒去殼)　杏仁(…去皮)

銅青(…)　乳香　没藥(各…兩)

輕粉(…錢)

右共作一處用鐵搥木石於臼中搗爛如泥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用緞帛攤

帛攤貼(…)

醫林集要鬼遺方云凡瘡疽外冷内…由陰氣外遏用熱物熨之大熱亦不覺者須用熱物熨令透隨手便用緊急湯膏藥使膿外出若腫不消用生肉煖瘡和正氣藥令進飲食不傷

治癰疽發背初腫時方

風化石灰(…兩)　細辛(壹兩)

右為粗末用熱醋傅患處乾再傅(…)其腫即消

四虎散　治發背初生筋脉緊急不舒

附子(…去皮)　天南星　半夏

狼毒(各半兩)　一方無附子有草烏各等分

右四味為末熟酒調成膏攤上腫處以熱絹蓋定覺患處如火燒不妨

回陽玉龍膏

草烏頭(…一兩)　南星(…)　軍薑(貳兩…)

白芷(壹兩不見火)　赤芍藥(…)　肉桂(…不見火)

此方治陰發背冷流注…風…冷痺風濕諸脚氣冷腫無紅赤…冷痛不痛者足頑麻痺婦人冷血風諸陰證之第一…熱酒調塗用法詳具于後

夫雜病雖見於皮膚手足之間而内必本於五臟六腑蓋臟腑之血脉經絡…始一臟受病必見於本經…陰陽分手足之所屬也為病有冷有熱熱者易治冷者難療夫冷必由臟腑元陽虛弱然後風邪得以乘間而入血氣不行遂自經絡而客於皮膚之間脉息不能周流遂滯於所滯處冷則愈積而不散復加庸醫用涼劑而内外交攻則其為病鮮有不危者矣學者當觀其外之為證而察其内之所屬表裏相應萬無一失此藥有軍薑肉桂足以熱血生血然既生既熱而不能散又反為害故有草烏南星足以破惡氣驅風毒活死肌除骨痛消結塊喚陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛苦生肌肉

加以酒行藥性散氣血雖十分冷證未有不愈端如發寒灰之焰回枯木之春大抵病冷則肌肉陰爛不知痛痒其有痛者又多附骨之痛不除則寒根透髓非尋常之藥所能及惟此藥大能逐去陰毒迎回陽氣住骨中痛且止肌肉皮膚之病從可知矣當斟酌用之不可太過則為全美　一發背發於陰又為冷藥所誤又或發於陽而誤於藥冷陽變為陰滿背黑爛四圍好肉上用洪寶丹把住中間以此藥敷之一夜陽氣回黑者皆紅察其紅活即住此藥却以冲和仙膏收功如不効欲作膿

又以南星草烏加於冲和用之如陽已回黑已紅惟中間一點黑爛不能紅者蓋血已死可以朴硝明礬又云白丁香碙砂乳香用唾調勻於黑紅交處作一圈上用冲和蓋之至明早起藥自然去黑肉如割却以藥洗之換以生肉合口藥收功　一流注冷證多附骨肉硬不消骨寒而痛筋縮不伸若輕用刀針並無膿血若止有乳汁清流或有瘀血宜用此藥敷之若稍緩止以軍薑白芷肉桂草烏等分熱酒調敷骨寒除而痛止則氣溫和而筋自伸肉硬自消矣然治流注不可無木蠟以其能

破積滯之氣消堅硬之腫最妙又不可多多則能解藥性蓋此證上於溫藥故也　一鼓槌風起於中濕或傷寒餘毒又或起於流注之壞證或起於風濕虛痺此證有三一是兩膝相搭行步艱辛膝胻脛骨微腫二是膝胻脛骨交接處大如搥腿股肉消皮縮裹骨三是上腿腫大下股冷消其證足膝偏肝經有風寒濕氣則血脉不流而作此遂為膝寒所壅凝流不動下股之血脉有去無返是以愈瘦愈冷而筋愈縮上腿之血脉有積而無散是以愈腫愈熱而肉愈瘦其原若[illegible]則肉凝

者為熘爛則冷毒腐骨腐骨一出神仙莫術未破則肌肉尚未死急以此藥熱酒調敷膝胻骨上腿處以住骨痛回陽氣又以冲和塗下腿冷處引其血氣使流動而不通貫血脉又以此方敷脛骨交處以接所引之血脉以散所積之陰氣內用追風丸倍加乳香以伸筋如法服之無不愈者如人欲出方可用五積散加當歸桂並歸又加大川芎牛膝檳榔木瓜或茶或酒調之　一男子婦人久患冷痺血風手足頑麻或不能舉動可用蒲子衣袋此藥在中心却以長長纏在痛處用絹帛[illegible]

能除骨痛附在肉上斑皮膚如蟻緣是其功也如痺可加丁皮吳茱萸沒藥人用烏等分然後合在追風丸表裏交攻大病如神　一風脚痛不可忍內用追風丸外用此方加生薑葱汁調熱敷欲得立止可依法加乳香沒藥化開酒調為妙　一久損入骨者蓋因墜墮跌撲傷折不曾通血以至死血在所患之處久則如雜肺之附肋[illegible]首[illegible]之革右年少之時血氣溫和尤且不覺年老血衰遇風寒雨濕其病即發宜此方熱酒調敷內則用搜損尋痛丸[illegible]表裏交攻為妙[illegible]之人病

在胸肋腰背之間者用之脫垢不除變為血結勞不論老少年遠近歲大而[illegible]半附醫之則一此等乃損傷[illegible]一劑可愈磨以歲月方可安[illegible]　一法只用南星草烏加少肉桂[illegible]服用之不上龍此法大効　一治[illegible]用此方熱酒調敷外却用洪寶膏圍住四圍[illegible]成膿後破　一婦人乳癰多因小兒斷乳之後不能時化又有婦人乳多孩兒飲少積滯凝結又為經候不調逆行失道又有邪氣內鬱而後結成癰腫初發之時切不宜用涼藥冰

之蓋乳者血化所成不能漏泄遂結實而核其性清寒若為冷藥一冰凝結不散聚久而[illegible]須不能化乳者方作熱痛蒸過乳核而[illegible]其常必爛盡而後已故病乳癰者既愈則失其[illegible]乳性最寒而又滯以涼劑則陰爛宜也然涼藥亦未嘗不用用於既破之後[illegible]如初發之時宜於此方中用南星薑汁酒兩[illegible]熱敷即可內消欲急則又佐以草烏此藥[illegible]遂寒熱遇冷即消遇熱即潰如已成膿[illegible]又從中和依常法用之或加此草烏[illegible]木亦可破後視其

原原於冷用冲和收功原於熱用洪寶生肌且須用乳沒住痛以袪其若至於吹藥只用瓜蔞散隨人虛實參以通順散上宜相間服之多口者為乳發乳房堅硬者為乳石近在乳嘴處腫者為吹乳在乳兜囊下為乳漏以肉懸垂而血易滿故也故為難治一囊一口為乳癰五十歲老人無治法亦有老人乳節又為可治蓋在乖囊肉上為癰若近胸則為節矣　一痴痰失道癰腫無膿者可用此藥點頭痛必[illegible]作為往不然則元陽虛耗此為[illegible]元陽虛耗既潰者急用金體玉龍散之

拔出成膿服藥則通順散加桔梗半夏當歸肉桂等藥若稍紅活熱驟則當歸冲和爲佳切不可誤投涼劑此方但能拔毒作膿病回即止不可過若能參用陷麻神劑尤妙出外科精要 一肘癰一證十有九死蓋胃竅陰外寒裏熱凡氣血凝於遏熱避寒故多爲內癰不能外見間有微影欲出則又爲冷藥所觸及服涼劑雖有神仙莫施其功醫者可不慎乎凡有此證初覺腰痛且以手按之痛若走閃移動則爲氣塊若根不動外面微有紅腫則爲內癰急以此方拔出毒氣作成外癰然後收

功冲和內則用通順散加忍冬藤治法如前若癰自能外見者不必用此方只用冲和爲妙不可輕用針刀刼犯鐵器口不能合只用龍貼癰頭上四面以冲和圍之依法自破若膿流不快依法用洪寶三分薑汁七分茶調敷之膿出皆盡內用十宣并補生肌外則依然收功冲和此證陰多陽少損人最甚將安之際宜服內補以生氣血庶乎易愈否則消而復脹口不合既安之後尤宜多服內補加附子否則氣弱難乎歲矜若未破之先尤宜先服附子方好既破之後切不可用急涼飲以之

藥恐食毒不散服藥力到自然合口至於內癰已成不能拔出只用冲和外貼使在外溫和成膿自臟腑而出不至內爛死生所係全在服藥之功治法見前最忌毒食令毒再發反復難療又有孕婦病此者又與此異內用紫蘇飲安胎勿妄與他藥若臍月則兒與膿俱下若尚遠則膿自大腸中下若初萌只服藥可消若癰在外面其疼必甚則可用冲和收功亦須審輕重用之恐有誤也

敷貼涼藥 鬼遺方云凡癰疽外熱內疼者見有客邪內有積毒欲作膿透之候

洪寶丹 又名金丹 寸金 四黃散

天花粉 三兩　薑黃　白芷 各一兩

赤芍藥 二兩

右爲末茶酒湯使隨證涼溫治諸般熱證癰腫金瘡此藥一涼而已能化血爲水又能使血於積又能涼肌生肉去死肌爛肉又能破血退腫又能濡氣爲浮能止痛又能為痛閉膿又能出膿一反一復此方藥性無他遇涼劑必遇熱劑多故非十分陽證不可輕用恐或凝寒洽瘀費力若夫金瘡出血非此不可乃第一藥除外但可爲前一藥也佐使

醫當審之審之　大抵此三藥可合力同功者可獨將專權者可分司列職者可合鬪交攻者可借援求救者可勇力相持者可正兵先鋒奇兵取勝者可奇兵先鋒正兵取勝者神聖工巧端與兵法無異然兵隨印轉將逐令行故立功取勝存乎其人苟非明理通變之士何足語此哉用法如後　一若病勢人熱可用熱茶調敷如冷稍可則用酒調若用以撮膿可用一分薑汁七分茶調何也此藥最凉能使血退薑汁性熱能引血潮故血退則破引血潮破逐進退相持而後成膿作破還脈上流

也　一凡瘡口破處肉硬不消者瘡口被風所襲也此方中加獨活以去風用熱酒調如又不消則風毒已深肌肉結實又加紫荊皮行必消之理矣　一此方莫善去金瘡及諸熱瘡亦推諸血根不使焮赤若瘀班不可輕用恐涼處不散突毒入內在骨則成骨瘤在喉則為風裂喉在胸背則陰爛臟腑在腹肚則為內癰殺人不救可不慎哉只以沖和不能俟其詳審用之為妙　一年少血壯之人衰老血敗之上如有濺血無藥可止血溢人亡若在手足可用茶調敷手足上下尺餘遠若

在胸背腰腹則全體敷之把住血路方能止血卻用斷血藥（五路未方見金瘡篇中）或神効軍中方捻口方得安愈　一治金瘡重者筋斷脈絕血盡人亡如要斷血須用繩及絹袋縛住人手臂卻以此方從手臂上用茶調敷住血路然後卻用斷血藥捻口卻不可使內補及四物等藥即人能令人發幅吐甚則口眼喎邪少馬發熱發熱成破傷風只可下對金飲加川芎白芷當歸煎自安卻徐徐補血如或有破傷風證又須用破傷風藥即當根湯之類（當見）瘡口用軍中方加九肋驚甲蟒灸頭　一凡金

瘡在頭面上者血不止急用此方茶調圍數頸上截血瘡口邊亦用此數軍中方捻口重者十日輕者三日効　一凡金瘡着水肉番花者可用薤汁調此方敷瘡口兩旁以火微炙之或燒早稻稈烟熏之瘡口水出即愈如無水出即是風襲可用南星茶調敷之即愈然後以軍中方捻口妙　一治婦人產後或經絕血行逆上心不能上或吐血鼻衄舌衄可以此方用井花水調數頸上生艾汁調亦妙其血立止然後服藥以絕原如舌衄必有血泡破之復服可用線於舌根頸縛住勿除於舌

須上截血內用黃芩荊芥涼心之藥以收其原去
上用蜜調結口之藥以治之泡破除瘀血不服矣
服涼心藥內物傷加荊芥薄荷硃砂　一此方用
藥調塗熱瘡恐隨乾隨痛若腫不退當用雞子清
調敷者熱毒難乾妙湯火瘡同　一打破傷損在
胸膈上者藥通血不下可用綠豆水調此藥末吞
之即吐出而安又有從高墜下用通血藥不下數
日病人幾死此必天時寒凍服大黃等藥求之血
凝片不行可用熱酒調雞蛋末飲之片時血通人
得更生蓋借熱性以活死血則前藥方能行矣

治發背初發時小後在七日亦腫高即搽藥令內消
散蝕疼免牽引乳香膏
乳香一兩　薄荷葉肆兩乾研
右研勻厚搽患處以青絹蓋之如乾以新汲水潤
之常令濕其熱毒自然消散如熱毒攻結可用金
毒攻結不可用
金黃散　貼癰毒令內消
白芷　白芨　白歛
右等分為細末用新汲水調傅
治湯潑腫毒瘡併令癒

大粉草剉細用竹筒一段刮去青兩頭留節開一小
竅入草在內滿後却用油灰塞竅從冬至日投糞
缸內待立春先一日取起於有風無日陰處二
十一日驗兩竅如却破竹取草為細末用水調傅
藥性論甘蕉根搗傅一切癰腫上乾即易傳無不瘥
者
梅師治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即
死速消方搗苧根傅之數易效
諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若和熟
井花水少許和若不稠不須用水以紙攤如膏藥貼

之立效
又方芙蓉葉搗爛搽立效晒乾為末水調傅亦妙
治發背蝸牛不拘多少活者置淨瓶內新汲水一盞浸瓶
中封閉自晚至曉取其水如涎取水將真蛤粉不拘
多少調之刷瘡上效
治背癰與瘡久年爛壞上黃柏等分為細末生薑汁
捏成膏傅之夏月以炙香湯下一盞貳錢妙點搽
七寶散淋　治癰疽止痛拔毒
乾荷葉心當中如錢片不拘多少
右為末每用叁匙水貳盞慢火煎至一盞半放溫

淋洗乾以太白膏傅之
太白膏　寒水石研飛過　用臘月猪脂調成膏隨瘡大
小薄紙攤貼之
天花青露散　罨圍一切腫毒
白芨　白斂　白薇
白芷　白鮮皮　升麻
青黛　黄藥　老龍骨各一錢
天花粉　青露各二兩　大黄四兩
右為細末醋蜜調勻如瘡毒未成則當頭罨退若
已成四面圍之中留頭用替針膏貼之

消腫散　圍罨腫毒一切瘡癤並治
大黄　水仙子　山藥
芋根　青露　小赤豆
寒水石　水蠹　香蛤粉
花蕊石
右將前藥搗和如乾加醋蜜調勻如瘡毒未成則
當頭罨退若已成四面圍之留一頭用替針膏貼
之
神護膏　圍罨一切腫毒
小赤豆　黄皮　白斂

白芷　天花粉　南星各等分
右為末陰用米醋與蜜水同陽用當陸根亦用芭
蕉油此是你色淡黄金散加黄皮傅上
水澄膏　秘方圍敷腫毒
鬱金　白斂　白芨
五倍子各一兩　乳香　雄黄各伍錢
右為細末水調敷如熱極者用臘水尤妙
五金膏
黄葵花一兩　川連一兩半　山梔三十個
黄藥五錢　川鬱金五錢

右為末井華水調成膏傅此藥法宜治跌打之
清涼膏　治初患癰腫瘡癤熱燉疼痛消腫毒
大黄不拘多少
右為細末用漿水調攤貼之一晝一夜亦得
治諸瘡腫不散者
右取白藥根搗爛傅貼乾則易之無生者用末新
水調塗之亦得
治諸瘡腫馬瘡
右以馬齒莧水煮冷服一升及涂瘡上治濕癬白
禿以馬齒膏和灰塗之效治緊唇面腫搗汁塗冬

用乾末水調塗治丹毒發背癰搗傳之不住者以
藍靛和之更佳治多年惡瘡蠍螫傳之尤良治三
十六種風結瘡取馬齒莧一石水二石煮之
澄清內蠟叁兩重煎之成膏塗瘡上并服之

清水膏 治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔
焮腫撲熱毒散肺氣

羊桃根　川大黃　黃芩
菉豆粉　黃蘗各等分　赤小豆

右為細末用芸薹菜取自然汁入蜜少許相和調
藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻

攤可厚一錢許貼之乾即易

水瀝膏 治癰疽毒熱赤焮疼痛

川大黃細剉　杏仁去皮尖研　鹽花各叁分

右為細末研令勻以新汲水和調稀稠得所旋即
塗腫上乾即易之

水沉膏 治風熱腫毒赤紅色攻焮疼痛不止

白芨　白斂各壹兩　鬱金壹對
大黃　黃檗　黃藥子
榆皮各壹錢　乳香　沒藥
雄黃各半兩

右為細末用新汲水入鐵漿末不以多少澄於水
內藥定去水敷於腫上用白紙封之用雞翎掠
此水濕潤

二黃膏 治一切腫毒

黃檗　大黃各等分

右為末用醋調搽如乾以水潤之

搨毒散

大黃壹兩　白芨壹兩　朴硝貳兩

右為末用井水調搽如乾再搽

薛按此二方乃寒涼之藥若瘡瘍焮腫作痛屬陽
之證宜用之或微腫痛而不焮赤者恐不宜用蓋
氣血喜溫而惡寒若冷氣入裏反為難治之證矣

三消散 退極熱發赤腫焮開者

朴硝　焰硝　大黃
梔子炒黑色　寒水石　南星各等分

右為細末生地黃汁調[illegible]芙蓉葉搗汁調亦可

四面楚歌 敷於一般疽發腫赤痛不可忍未成即散
已成即破至瘡口合而止

荊芥細研　赤芍藥　大檗皮
土當歸　山大黃　上白芷

天南星　赤小豆　商陸根剉片焙
白芨　赤歛　白歛
草烏　寒水石煆炒各等分
右為末生地黃汁調角四畔或苦蕎根汁調用商
陸根研汁末漬則滿塗上或有尖起處則留出瘡
口
水師品明　治瘡發已破未破皆先如成膿潰爛最
要洗淨去故肉生新肉洗後淨乾再用角貼傍藥
一日一次

大腹皮　澤蘭　莽草
荊芥　赤芍藥　山大黃
土白芷　土當歸　獨活各八十
右剉麁散用水煮入葱白大椒橘葉同煎熏洗
如已爛入猪蹄下膝爪骨肉煎可免乾痛淨洗為
度
點藥　癰疽有小白頭者初起即以膏子點之毒輕者
自消毒重者出水甚至流黑汁而愈最甚者即未散
亦大殺其毒矣
硇砂膏　治癰疽腫毒并治瘰癧點落肬痣等
硇砂二錢　石礦灰炒黃色　白丁香炒黃色各二錢

黃丹生用一斤　鹼水四碗
前四味研為極細末先將鹼水煎作壹碗成膏待
冷以前末入膏　和勻藏磁器中一應毒物以此
膏點之白丁香即麻雀兒屎用竪尖者不用軟顆
者
六灰膏　治發背疔瘡癤子腫毒癰瘡痔瘡痣子肬
子其功用與硇砂膏同也
灰莧　桑木　棗木
蕎麥稈　茄科各燒灰　石礦灰等細
右件多少不妨和勻湯泡水淋淋下之水煎成膏

如糊裝磁器中一應毒物以膏點之若點癧瘡痔
瘡待爛去少許再點之再爛去如是漸漸點去
拔生膏　治諸般惡瘡及瘰癧鼠瘡纏起者點破即
愈
血竭三錢　蟾酥　輕粉各二錢
麝香五分　雄黃五錢　乳香
沒藥各二錢　以上藥俱為極細末
右用蕎麥稭灰或真炭灰壹斗叁升淋灰湯捌玖
盌用栗柴或桑柴文武火煎作叁盌取壹盌收留
將貳盌盛於好磁器內候溫將藥末入灰湯內用

鐵瓢或桑柳枝右攪又用好細石灰壹升入藥灰
湯攪勻取出候冷過宿盛於小白磁罐內凡遇諸
惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭食破
約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收留灰湯
和用

灸法

癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢
貼其中心頂以小艾炷灸之五壯而上若形狀稍大
以黃秤紙蘸酒全貼認先乾處為筋腳於先乾處
灸之或兩處先乾皆灸但五七壯止又法屈指從
四圍尋按遇痛處是穴就此重按深入自覺輕快
即此灸之更於痛處灸之或大腫即搗蒜為餅焙
乾攤法貼灸之更換蒜餅或以熨斗火於蒜餅上
熨之更換蒜餅覆以如覺患處走散即以綿帛覆
蓋勿令氣泄候少間數次凡擦洗候大如龜之形
且看頭向上下先灸其前兩腳次灸其尾或紅筋
走緊而長從盡處灸之須留頭并後兩腳勿灸若
盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻入裏
也或辨認不明以

白芷分各　浸水　桑白皮分各等

連鬚葱白拾斤

右取新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現
可以辨驗頭尾

神仙隔蒜灸法　治一切癰疽腫毒前論言之詳矣
凡大痛或不痛或麻木痛者灸至不痛不痛灸至
痛其毒隨火而散此拔引鬱毒從治之法也信有
回生之功其法用大蒜頭切三分厚安瘡頭上用
艾炷於蒜上灸之五炷換蒜再灸未成即消已成
殺其大勢瘡患大以蒜杵爛攤患處將艾鋪蒜上
灸之蒜敗再換瘡色紫或白而不起發不作膿不
大痛不問日期最宜多灸

神效葱熨法　治流注結核骨癰鶴膝等症腫硬或
先已隔蒜灸而餘腫未消最宜用熨以助氣血而
行壅滯其功甚大又爲跌撲傷損止痛散血消腫
之良法用葱白頭搗爛炒熱頻熨患處冷再換

神效桑枝灸　治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛
弱用桑枝燃火着吹熄焰用火灸患處片時日三
五次以助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔
其陰瘡瘰癧流注臁瘡惡瘡久不愈者亦宜用之
大抵此法未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則

補陽氣散餘毒生肌骨其瘍瘡腫痛甚或重如石石初起用此法出毒水即內消日久者用之雖潰亦淺且無若楚惜患者不知有此治者亦不肯用此也

砭法　治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筯一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指輕撮筯稍令磁芒正對患處懸寸許再用筯一根頻擊筯頭令毒血遇刺皆出毒入腹膨脹者難治

豆豉餅 法見[illegible]

瘍醫準繩卷之二

金壇王肯堂輯　門人新安閔承詔校

潰瘍

大法　癰疽已破膿出者是也　集驗云癰疽既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之邪氣漸退氣血亦虛脉之洪數漸宜減退當內補托裏必使氣血滋榮正氣強盛膿色鮮濃亦腫漸收藥宜補氣生血秋冬微加禦風寒之藥如當散甘全大補湯中用桂是也氣滯加香附如毒勢大退氣血未復多宜用人參當歸黃芪四物湯之類癰疽雖已見膿根脚亦帶及展開闊或

不痛或大痛此毒氣不退金銀白芷散十宣散去厚朴桂倍人參川歸黃芪加忍冬藤連翹犀角瓜蔞根消毒之藥春末夏間及秋初宜加酒芩黃連黃蘗羌活膿已下可去桔梗見膿後須以補氣血藥為主解毒藥助之或不宜於補藥者宜忍冬丸四圍腫皺處用火針燒亦刺之約一米深紅腫則縮服藥脉得和緩為佳或破後不潰瘡口堅硬者風也用蜈蚣散傅之或惡肉不腐用雄黃輕粉敷之大忌紅腫不退或飲食進少從權且調理脾胃或無他證又另議藥治腐肉不知痛痒正黑者可去之但不傷內畔好肉及

裏面良肉當去外之黑腐者下皆去黄白如絮之狀
膿肉有紅血絲路又不可動此項大膿大日必自脫
落庶免傷其良肉若怕刀砭三四日必自脫落但用
刀去者新肉易長毒氣漸消凡腐肉亦有少臭氣腐
敗去後則無變四圍腐者漸漸去令淨用長肉膏貼
間日用猪蹄湯洗新肉長如梅李如石榴子紅活可
愛日見堆阜或上有白膜皆是吉兆若腐敗去後下
面良肉色白而平略無紋理亦不能如米如粟不見
漸生之意或膿水清淡或臭此毒氣內逆五臟血氣
枯竭乃是危證肉不能長氣血不榮衛氣不發旋則

風寒著之用北芪黄芪湯煎洗生肌長肉藥傅之用
乳香膏長肉等膏貼之或肉頭長起色黯者遺毒也
用地榆湯活血散敷道毒膏貼之即日紅活瘡口漸
收仍用長肉膏貼或瘡口痒用細茶葱鹽煎湯熱洗
或瘡口易收乃氣血中熱毒故不分消即使長肉必
防流注之患或更迷瘡口如錢大時恐轉他證危
殆凡癰疽瘡口已收但皮嫩未可使去膏藥　見遺
方名凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼
或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺
已上者其赤腫焮熱者即用緊急收赤腫藥圍定不

令引開中心即用拙膿緊毒散貼之急令散毒外透
內服排膿消毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大
小深淺內發其狀汁膿水入湧急須托裏內補難破
穴膿汁不多排須排膿拔毒透後自不令再腫須疼
止痛消患人自覺輕便即是相效也最宜節慎飲食
其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是
毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣保內補散即止
矣[illegible]　[illegible]膿[illegible]而不潰者陽氣虛
也宜補之如聖愈湯之類　瘀肉不潰者宜大補陽
氣更以桑柴火灸之　不作膿或不潰氣虛也托裏

消毒散去金銀花白芷連翹三味加參朮肉桂如不
應暫用十全大補湯　腫赤作痛血凝滯也本方加
乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲　膿出反痛氣
血虛也去三味加參芪歸地　潰後食少無睡或發
熱者虛也宜補之內補黄芪湯之類　倦怠懶食
少不睡者虛也宜補之黄芪人參湯之類　寒氣襲
于瘡口不斂或陷下不斂者溫補之十全大補湯
脈大無力或濇而微此內虛生者氣血俱虛也峻補
之十全大補湯倍用參芪　肉赤而不斂血虛有熱
也托裏消毒散去三味加熟地丹皮　肉黯而不斂

陽氣虛寒也前散去三味加參芪白歛官桂 潰爛
不痛或肉死不潰此氣虛也前散去三味加人參白
朮如不應加薑桂更不應急加附子 肉白而不歛
陽氣虛也前散去三味加參芪歸朮 膿多而不歛
氣血虛也前散去三味加參芪歸朮熟地黃如不應
暫用十全大補湯 飲食少思而不收斂氣虛也前
散去三味倍參芪如不應暫用補中益氣湯 飲食
少思而不收斂脾氣虛也前散去三味加參朮如不應
暫用六君子湯又不應佐以八味丸 口乾多汗帶赤
血虛也前散去三味加歸地參朮如不應暫用八珍
湯加牡丹皮

【膿】集驗云脈緊而數爲膿未成緊去但數爲膿已
成以手按上熱者爲有膿不熱者爲無膿按之牢硬
未有膿也按之半軟半硬已有膿也大軟方是膿成
也大按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按
之即復者爲有膿也不復者無膿也小按便痛者皮
薄剝起者膿淺也按之四痛皮色不變不高阜者膿深
也淺者宜鍼熨破高突者宜鍼深者宜烙更詳虛
實何如腫處軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而
不大熱時時牽痛者氣瘤也虛腫而黃者水也氣結

微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經
久積陰生陽寒化爲熱以此潰必成瘻宜早服內塞
散以排之諸癰瘤疣贅等至年衰皆自內潰不一於
補養而妄行攻蝕必有性命之憂至於瘰癧結核寒
熱發渴經久不消其人面色萎黃被熱上蒸已成膿
也本條已見手足指稍及乳上宜膿熟大潰方可開之麻
豆後股脛上癰稍覺有膿便須決破遲則成瘤曲之
疾

【取膿】凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按
之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按
之白良久方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡

肉平實久而方消 夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫
堅初發並宜灼艾從癰膿成則宜針疽膿成則宜烙
切宜熟視詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲
出只用替針丸自穿頭咬開不半日許其膿自出切
不可用針刀也 治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

替針丸

白丁香 壹字　硇砂 壹字　沒藥

乳香 各壹字

石灰餅藥內種糯米拾肆粒其法用石灰伍升爐

灰叁升以水伍升淋取清汁入大鍋内熬濃汁至
叁貳升用瓦器貯臨用時以小青盞盛取半盞
濃汁却用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯
米拾肆粒種在皮紙面上一宿即是
右爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒不破用
津貼瘡頭薄處即破膿滯不快則用一粒納瘡口
内使膿不滯好肉易生
又方
雄雀糞貳拾粒　硇砂　陳倉米
没藥各壹字

右研勻以米飯丸如粟大每用一粒貼瘡口服中
即潰膿出
替針丁香丸
草烏尖　硇砂　白丁香 [illegible]
右爲末釅醋調熟將破者令速潰若急則無如刀
快蜞針一法亦妙見後
[斷]治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀
糞塗頭上乾即易之雀糞中竪者爲雄
[本事]治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紝
即膿出巴豆壹枚去皮膜不去心油鹽豉拾肆粒
口中含去皮令軟同研爛入麝香少許如雞丸入
少稀糊捏作餅子如凡錢大大小臨時看瘡口經
之只以紙撚子送入藥須臾必痛忍之良久膿遂
出
[附]出一切瘡口用出蛾繭殼燒存性無灰酒調下每
服壹枚服下一个時辰便有瘡口一个若服兩枚出
瘡口兩个

鐵針 [illegible]

[附]癰疽成膿宜針其鐵針用馬銜鐵爲之形如韭葉兩面
皆利可以橫直裂開五六分許取其毒血如是病輕
須先灸而後裂 [要]按癰如椒眼數拾粒或如蜂窠

蓮房而膿出痛不除宜用針者以針橫直裂之則毒
血挾膿出而愈如無椒眼之類只消直入取膿不必
裂之也又法當椒眼上各各灸之亦住不必裂也
鐵鈹針者末如劍鋒以取大膿 [素]夫癰氣之息者
宜以針開除去之 [illegible]
治腐腫者刺腐上視癰大小深淺刺刺大者多血小
者深之必端内針爲故止 [illegible]
[illegible]七字取膿之法盡矣備矣

皮膚淺薄宜烙

[斷]疽成膿宜烙可用銀篦大二分長六寸火上燒令
赤急手熨烙毒上得膿爲効 [鬼遺]凡癰覺在虛處

及眼不見處皆是惡症如發高腫紫赤皮薄光澤覺裏有膿毒諸藥貼熁不破者宜用熟銅鍼於油火上燎透先用墨筆點定却當頭以鍼淺刺入隨針出膿者順也有不隨針膿出當用白紙作紙絍絍入針孔引出膿毒當時腫退可及三分如腫不退逆也腫不退疼不除但膿出一二逆也膿疼不除人不覺疼輕三逆也雖用針破出膿亦須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也其有實處不問淺深如有膿即用針烙無害即肉疼凡近筋脈骨節處不得亂行針烙反致他症也　患症初

生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處發頭不拘多少其間須有一個最大者即是大膿竅當用熟鐵大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定插入一寸或至二寸膿當下然未有膿毒出却用白紙作紙絍絍入竅穴且服出其膿即隨絍下矣膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁其有虛處不得妄行針烙　凡患發背覺微有膿成便用大熟鐵針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通紅烙入可二寸許初入肉即須橫

插入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰熱更不得用針烙如是傍長亦引開闊當須兩頭下火針令膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥人却少瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛受氣實也先宜詳審不可造次便行針烙亦看患人氣脈勻和榮衛氣不飾滯血脉不致壅沸即行針烙無畏切須仔細患人氣虛脉氣大者亦不可亂行針烙針烙之法不可容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色大光澤者即可用針烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不

可用針烙　或問烙法如何曰膿成必泮欲出奈何皮厚肉深難完者既無內托之藥先致力於內後又不用烙以開竅膿膿何由出　膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功於潰瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄僥決恐嚇而脇取利也

治驗　一男子潰後發熱頭痛脉浮緊虛而無表邪也以補中益氣湯加川芎白芷二劑而止更以托裏藥而愈　一男子腫漸潰自牙關緊急腰背反張以玉真散一服而愈仍以托裏藥而斂　一男子患癰將

欬遍身作痒脈浮以消風散一服而止更以托裏藥
而愈

攻裏 薛 一人胸患癰焮痛煩躁發熱作渴脈數而實
時季冬予謂此熱毒內蘊也舍時從證欲治以內疏
黃連湯彼以時當隆寒乃俱用攻毒藥愈熾仍求治
投前湯二劑後大便二次諸證悉退以金銀花散加連
翹山梔四劑出水而消　羅謙甫治實熱伊父親發

清熱 一男子患癰潰而飲冷發渴痛發熱服黃連解毒
湯二劑而止更以托裏消毒散而愈常治癤而大便
秘脈實者用清涼飲治之

己寒 羅 至元壬午有王伯祿者年五十七右臂膊腫
盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈
症俱寒予舉瘍醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲
以燔鍼起之膿清稀解次日肘下再開之加呃逆不絕彥和
與丁香柿蒂湯兩服稍緩次日呃逆尤甚自利臍腹
冷痛腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸
二七壯又處以乾薑附子湯加木香沉香茴香羌活類藥
㕮咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又
當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然
不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不入此

謂五虛呃逆者胃中虛極也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是
定理也此症內外相反須當舍時從證非大方辛熱
之劑急治之則不能愈也遂投之一服呃逆減二服飲食進
瘡勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫
守常者眾人之見知變者大人之事知常而不知變
細事因而取敗者亦多矣況醫乎守常知變豈可同
日而語哉　陳藥則毋泥參

托裏溫中湯　治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮
膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短
促呃逆不絕不得安臥時有昏憒

十二

丁香　沉香　茴香
益智仁　陳皮各壹錢　木香壹錢半
羌活　乾薑炮各叁錢　甘草炙貳錢
黑附子炮去皮臍肆錢

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子乾
薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表以為君羌活
苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血
脈胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大
辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣聚而為滿木香茴
香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也

右㕮咀作一服水弍盞薑伍片煎至壹鍾去渣不拘時溫服忌一切冷物

治驗 一童子腋下患癰不歛膿清脈大倦怠懶食少寐自汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈 凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可 一男子患腰疽不潰針之膿太泄反加煩躁以聖愈湯四劑而安更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩月而愈 此人後患濕氣遂為痼疾 凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必難治療慎之

一婦人患附骨疽瘡口紫陷膿清不歛彼以為毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈 一婦人患附骨疽久而不歛致腿細短軟脈來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈 凡膿潰之後脈澀遲緩者易愈以其有胃氣故也 脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也 若煩痛尚未痊也 洪滑麤散者難療以其正氣虛而邪氣實也 一男子腹中患此發而不潰其氣血止能發起不能培養為膿且投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸朮于兩斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生 大凡癰疽藉氣血為主 若患而不起或潰而不腐或不收歛及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑 亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也 若潰後發熱作渴脈大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱不治 若氣血充實之人患瘡必腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收歛 怯弱之人多不起發不腐潰及難於收歛 若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣 及患後當調養 若瘰癧流注之證尤當補益否則更患他證必難措置慎之

一上舍年踰四十因怒脅內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛 予謂怒氣傷肝致血傷氣鬱為患以小柴胡湯對四物倍用芎歸黃芪貝母肉桂治之 彼謂丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用 況此證為氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛證悉俱診之胃氣更虛彼欲服前藥予謂急者先治遂以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少得更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪肉桂芎歸

數劑膿色少赤并微作痛又二十餘劑而膿成針出投與十全大補湯其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣等藥以益其虛況各經氣血多寡不同心包絡膀胱小腸肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前證正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脉證俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主乃請氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫潰痛甚煩躁脉大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲

老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宜一藥概治結腫之證以致取敗者多矣

進士無錫華氏年六十患背瘡潰發大如旋盤而色赤憩是平日多服金石藥所發問之果然因令後膿欲作而三五升始用退熱解毒生氣血之劑加以十帖膿半月後肌生膿少令服此藥百餘貼方可安全三月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚如常但食少無味因問前日之藥服幾何曰瘡將平遂止不服脉之沉微甚因知其氣血止可供給瘡毒而已於其氣則已竭不可治甫出人所斷死於瘡絕瘡之後果不出半月而死不能此瘡出後之虛損內虛而發變症者亦然若以常法攻之則氣血不勝藥力之散而愈虛邪得以乘機入內多成不救

加味十全湯　治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪 蒸　地黃 蒸　當歸
川芎　人參　茯苓
芍藥 炒　白朮　陳皮 各壹兩
粉草 炙　桂心　五味子 各半兩
烏藥

右㕮咀每服一兩用水二鍾薑三片棗二枚同

煎分作二服留查兩乾爲末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱症之緩急時之寒熱加減用之

丹溪云加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實爲切要若膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡不載時令又在識者觸類而長之今之外科於癰瘍腫平痛寬遂以爲安置不加省往往于結痂後兩三月或半年虛證乃見醫者不察猶治不悟無補接調養之功因而轉成他病者皆是也治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍數飲食如常惟

言問不荅肌上起白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾於背心腹二處自灸至秋冬節次生疽痒用五香連翹湯十宣散敷之令結痂久矣予為作參芪白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者大半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸子作料煎飲予頻服之予諫之不聽因而不救吾以為戒云

補中益氣湯　治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃芪炙壹錢五分　甘草炙　人參

當歸酒拌　白朮炒各壹錢　升麻

柴胡　陳皮各叁分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎壹鍾空心服

人參養榮湯　治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥炒壹錢　人參　陳皮

黃芪蜜炙　桂心　當歸酒拌

白朮　甘草炙各　熟地黃酒拌

五味子炒杵　茯苓各柒分半　遠志去心炒伍分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎壹鍾分食前服

四君子湯　治脾胃虛弱或因克伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛不能攝血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血凡氣血俱虛之證宜於前湯倍加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用四物沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而脾胃虛寒必用八味丸以補土母

人參　茯苓　白朮各貳錢

甘草炙壹錢

右薑棗水煎服

六君子湯　治脾胃虛弱或寒涼克伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸症自愈即前方加陳皮半夏

異功散　治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳

方

四物湯　治血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致晡熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白朮以補脾

熟地黄　當歸各叁錢　芍藥貳錢

川芎壹錢伍分

右水煎服

八珍湯　調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退虛熱此氣血虛之大藥也

當歸酒拌　川芎　芍藥炒

熟地黄酒拌　人參　白朮炒

茯苓各壹錢　甘草炒伍分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食前服

十全大補湯　治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂若血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參　肉桂　地黄酒拌蒸焙

川芎　白芍藥炒　茯苓

白朮炒　黄芪鹽水拌炒　當歸酒拌各壹錢

甘艸炙伍分

作一劑用水貳鍾薑棗煎服

歸脾湯　治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不準晡熱內熱或瘰癧流注等症不能消散潰斂

白朮　白茯苓　黄芪炒

當歸　龍眼肉　遠志肉

酸棗仁炒各壹錢　木香伍分　甘艸炙叁分

人參壹錢

右薑棗水煎服

黄芪人參湯　治諸瘡破後食少無睡及有虛熱觸氣所觸者

黄芪貳錢　人參　白朮

麥門冬　蒼朮　陳皮

升麻　五味子　當歸身

甘草各壹錢　黄蘗炒肆分　炒麯伍分

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

托裏當歸湯　治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂或晡熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等症

當歸　黃芪　人參

熟地黃　川芎　芍藥各一錢

柴胡　甘草各五分　右水煎服

內補黃芪湯

人參散　治癰疽內虛不足

人參　白朮　白茯苓

枸杞子各壹兩　熟地黃　黃芪

桂心　白芍藥　當歸酒炒

甘草炙各半兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞入生薑半分棗叁枚煎至陸分去滓不拘時溫服

麥門冬湯　治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬去心　黃芪　五味子炒

白茯苓去皮　人參去蘆　官桂去粗皮

當歸　遠志去心　芎藭各

甘草炙半錢

右㕮咀每服伍錢水壹盞半入生薑半分煎至壹盞去滓溫服

治諸發已潰未潰生新老人氣血素弱宜服之此潰後服至愈而止

防風去蘆　厚朴薑汁炒去皮　桔梗

白芷　黃芪炙各半　川芎

甘草　肉桂　當歸各叁錢

人參五錢

右為末每服貳錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後更服為佳不飲酒者木香湯無嚴降氣湯尤妙

六味丸　此壯水之劑夫人之生以腎為主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所但知措腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗諸血失血失音水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃八兩杵膏　山茱萸肉　山藥各四兩

白茯苓　牡丹皮　澤瀉各三兩

右地黃杵膏餘為末和丸桐子大每服柒捌拾

丸滾湯下

八味丸　治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺即前六味丸加肉桂附子各壹兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸治症同前即六味丸加肉桂五味子各壹兩

東垣聖愈湯加減法　如發背疔腫膿潰後虛而頑痛者托裏藥內加五味子　恍惚不寧加人參茯神　虛而發熱者加地黃瓜蔞根　潮熱者加柴胡地骨皮　渴不止者加知母赤小豆　虛煩者加枸杞天門冬　自利者加厚朴　膿多者加當歸川芎　痛甚者加芍藥乳香　肌肉遲生者加白蘞官桂　有風邪者加獨活防風　心驚悸者加丹砂　口目瞤動者加羌活細辛　嘔逆者加丁香藿葉　痰多者加半夏陳皮

聖愈湯　外科一

作痛　丹溪云膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此為虛也宜補之（[illegible]加參芪歸地）　脈數虛而痛者屬虛火宜滋陰（加生地）　脈數實而痛者實也宜泄之　脈實便秘而痛者邪在內也宜下之

（[illegible]）　脈濇而痛者氣血虛寒也宜溫補之（定痛托裏散）

亦有穢氣所觸者宜和解之（[illegible]）

亦有風寒所逼者宜溫散之（[illegible]）　若有膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之或用利刀剪之腐肉堵塞者去之

[illegible]小娩病後有傷[illegible]生痛破後筋骨疼脈虛而濇之小便時落膿亦相宜與生血導熱

定痛托裏散　外科二

川芎	當歸頭	條芩
生地黃	赤芍藥	牛膝
黃蘗	甘草（炙各分）	青皮（炒）
檳榔（各五）	通草（壹分）	朴皮（壹錢）

右煎食前熱服之

人參內托散　治潰瘍因氣虛而作痛者

人參	黃芪	當歸
川芎	厚朴	防風
桔梗	白芷	官桂
紫草	木香	甘草

右入糯米壹撮水煎服

餘見後瘀瘡門宜參看

發熱　瘍既潰之後不宜熱之際惟寒壯熱狂言妄語如見

是補膿去已多而大熱不休者似爲難治[illegible]之從膿猶傷寒表證之得汗汗已而反大熱則爲[illegible]矣又云患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯渴多病於渴縱有發熱躁擾等證不可以治宜用益榮生津之劑若大熱不止者難療　脉浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣[illegible]　脉濇而熱者血虛也宜補血四物湯[illegible]　午前熱補氣爲主四君子湯[illegible]黄芪[illegible]　午後熱補血爲主[illegible]　脉浮數發熱而痛者邪在表也宜散之　脉沉數發熱而痛者邪在内也宜下之

癰疽潰後發熱煩躁或出血過多或潰膿大泄或汗多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而非火也若發熱無寐血虛也用聖愈湯汗不止氣虛也急用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕氣血虛也用八珍湯大渴面赤脉洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脉沉而微陰盛發躁也用四君加薑附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱[illegible]是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發熱者重陽無陰也當峻補其陰治者詳之

托裏消毒散加減法　頭[illegible]　川芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用人參敗毒散　頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹二味倍參芪　發熱飲冷便秘内熱也去參芪[illegible]加大黄　發熱飲[illegible]便秘内虛也去[illegible]一味加參[illegible]　[illegible]而目赤也煩熱作渴脉大而虛血脫發躁也去連翹金銀花白芷三味倍黄芪當歸如不應[illegible]用當歸補血湯　身熱惡衣欲投於水脉沉微細氣脫發躁也去三味加肉桂附子如不應[illegible]用附子理中湯　若婦人勞役恚怒或適經行發熱譫語或夜間熱甚[illegible]

[illegible]皮柴胡如不應轉用加味四物湯

一男子膿熟不潰微痛少食倦怠發熱予爲針之[illegible]膿出[illegible]熱[illegible]以人參養榮湯二[illegible]甚此藥力尚未及也又[illegible]以當歸[illegible]湯數劑而痊東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁宜當歸補血湯主之

一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脉洪大按之無力此氣血虛寒也用十全大補加麥門五味治之其

症益甚仍用前藥加附子壹錢四劑諸證悉退却去
附子加肉桂二十餘劑氣血漸復又因勞心發熱惡
寒飲食減少此脾胃復傷元氣下陷用補中益氣加
附子一錢二劑熱止食進仍用大補元氣而安後因
考試不利懷抱不舒更兼勞役飲食日少形氣日衰
吐痰作渴頭痛惡寒或無寒熱或不時而作仍用
補中益氣數劑者症漸愈元氣漸復乃去附子再加
肉桂五分自餘症而愈　一男子背瘡不斂小便赤
澀體腫發熱口乾體倦脈洪數而無力用參芪歸朮
熟地芎藭茯苓麥門五味炙草肉桂以補元氣引火

歸經脉症益甚此藥力未能及也再劑頓退却去肉
桂又數劑而愈此症因前失補元氣故耳　操江伍
松嵐背瘡愈後大熱誤為熱火用苦寒藥一鍾寒熱
益甚欲冷水浴身脉浮大按之全無余曰此陽氣虛
浮於肌表無根之火也急用本方加附子一劑即
愈

宿食宜下

外一男子見素膏粱厚味年十三歲症發于背瘡將拔
五香湯躁熱欲狂予因泄之而後已消後半(?)一日
熱復大作五六日後其脈洪數無倫[illegible]以為虛宜
補予私計膏粱之變也以五香之[illegible]當治以苦寒且

人便不行數日矣盍下之以泄其毒乎乃研石膏末
兩許知母二三錢甘草一錢黄瓜蔞一枚和仁搗碎
爲一劑命僮燃炭注水而自煎之醫更作苦口力諫
以隆冬潰瘍無用白虎湯余故復加石膏兩許而置
大黄片五錢於補中湯俟沸則以補能藥繞若爲移
遞火者而潛下大黄於鍋中時夜將二三鼓皆環爐
坐注目而視不覺也[illegible]潛甫飲是藥必先别
去大黄甫以告余[illegible]之藥[illegible]以飲外舅少頃大便下
燥屎及食物未化者滿行清中熱退身涼乃以四君
子湯調之[illegible]診脉有[illegible]不思食食
少而瘡大去死肉多白虚何以生肌歛口乎予信之
初意只使消阻陽而漫下之亦不知爲傷食發熱也

東生愧甚遂從去

黄芪散　治癰潰後補虚去客熱

黄芪　石膏各貳兩　知母
麥門冬去心　白芍藥　白茯苓
桂心　熟地黄　人參去蘆
川升麻各壹兩　甘草炙[illegible]
右剉碎每服肆錢水壹中盞煎陸分去滓溫服日
三四服

當歸補血湯　治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死宜此主之

黃芪一兩炙　當歸二錢酒拌

作一劑水壹鍾半煎陸分服

沉香散　治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香　柴胡去苗　黃芪

麥門冬去心各壹兩　白朮炒各一　熟地黃洗焙

黃芩　瓜蔞根　甘草生炙各

右剉每服肆錢水壹中盞入竹葉貳七片小麥伍拾粒煎至陸分去滓不拘時溫服

加味逍遙散　治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔癢寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便不利

甘草炙　當歸　芍藥酒炒

茯苓　白朮炒　柴胡各壹錢

牡丹皮　山梔炒各柒分

右水煎服

梔子黃芩湯　治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不住用以退熱

漏蘆　連翹　山梔仁

黃芩去心　防風　石韋去毛如無有以桑白皮代

生甘草　犀角屑　人參

苦參各壹錢　茯苓去皮各　生黃芪去蘆

右為粗末每服肆錢水壹鍾煎至陸分去滓溫服

起異　一男子潰而膿清用四君子湯加芎歸倍用黃芪大料四劑而止嘔水尚多投八珍湯加桂數劑漸少惟瘡口不合以附子餅及十全大補湯每劑加炮附子五分數劑乃去附子又服月餘而愈　一男子潰後畏寒脈虛以四君子加炮薑四劑而愈以十全大補湯月餘而斂　東垣云脈虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脈虛宜托裏和養血信夫

瞑逆　丹溪治一老人年七十

五香白朮散　寬中和氣滋養脾土生肺金進美飲食方見內癰門肺癰條下

禁忌　用五香湯即五香連翹湯去射干大黃升麻連翹加參芪歸芍川芎於腫瘍初用借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用於潰瘍雖多有參芪補之緩補

而走泄太多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下之
重虛之戒可不省乎
精要云血氣聞香則行聞臭則逆[illegible]飲食調令[illegible]
美無其脾土喜甘惡苦其氣喜香惡臭其甘而淡者[illegible]
美有但能抱火以熱傷脾[illegible]氣為戒令曰[illegible]
若毒氣若漲之於膿瘍者似有輕重之理潰瘍後用香
美恐有發熱損真陰之患矣
精要云熱盛脉數宜服漏蘆湯單煮大黃等湯不甚熱
脈緩弱只投五香連翹湯[illegible]數若膿瘍時氣
實秘而體實者猶可與大黃若潰瘍後膿血出多者
熱盛脉數大死為近其可下乎後寫[illegible]之脈古人皆以
為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎
精要云初成膿宜用烙得膿利為効亦服神仙追毒
丸此又不能無疑者也夫追毒丸下積取涎之藥決
無取膿之効今不用烙而得膿若在裏之氣血壯實則
膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑
使膿自托出乎
精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒次與[illegible]
膿湯萬金散五香連翹湯六味車鰲散千金漏蘆湯
皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補[illegible]則

津液生氣血完渴自止矣夫大渴而與利藥非明示
脈症何以知其當下後又言下利後渴又不止卻用
補藥又不明言脈症恐是但有大渴必與峻[illegible]下後
尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥[illegible]渴
屬上焦當膿瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣
之虛何以待下利後方議其虛哉
精要云瘡疾咽喉口舌生瘡歸罪于不得內托以致
熱毒衝心[illegible]用之猶或近
理若於潰瘍後用之[illegible]不動相
邪攻虛以速其死也耶後有[illegible]以大黃佐黃芪
用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有實熱夫瘡潰
體虛[illegible]膿而血消何必以峻冷利
動臟腑若在秋冬何異用刀劍耶
精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒
或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大
汗出不可止以為[illegible]有氣虛而得者亦有因怒
而得者又有[illegible]氣不止而有此者夫氣
虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾
氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉
是溫散瀉衛之藥而欲以一兩人參收拾十四兩之

宋合直 風近

瀉當可乎若用於腫瘍時或實邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎又不知用於腫瘍耶潰瘍耶

鬼遺云有孔慎風仍須再合如再合者為風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣害人之命也　三因瘡瘍未合風入為破傷風濕入為破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認治癰疽瘰癧潰後尤宜謹之

【[illegible]】癤之薄皮剝起癰疽之瘡口緊細瘰癧火針破核之後皆可用追蝕破膿之藥癰疽開後瘡口

再閉宜用藥紝以通之或用紙或用髮或用乾稻草莖皆可塗撚紝塗以蟾酥硇砂白丁香巴豆黍杏麵之類或用五灰膏隨輕重塗紝用之瘡疽腐敗可用手法去之或用金寶膏去之或用雄黃輕粉傳之多待數日亦自脫落疽破後有蠹肉努出者以去木[illegible]蜀塗之則漸漸消去如不消用五灰膏塗之則消雖疽久流膿水不腐不斂氣血不能滋養瘡口滯塞日漸內侵好肉而為蠹肉膿水過處漸成膿管如竹毛管而軟其瘡口如魚嘴樣日久不能愈名漏骨必用金寶膏或塗或紝或封之一日三四次用之不通

者一日二次用之其蠹肉腐去消盡以滋潤膏藥貼之　薛新甫云瘡瘍之症膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連肌用淺者去之內滿者肉損者在臟腑當先助胃壯氣為主使根本堅固而行經活血佐之令其內消余常治脉症虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不死脉症實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散已成自潰又何死肉之有若不大痛或木痛或不赤或內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛也宜用桑枝灸及

十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐其毒自解又何假於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍加白朮壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死者自潰已潰者自斂若初起或因克伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰症急用參附湯溫補回陽亦有可生　[illegible]之內俱宜參惡背疽死肉不潰發熱痛甚作渴少食日晡發熱脈洪大按之如無此內真寒而外假熱當捨時從症先用六君加炮薑肉桂四劑飲食頗進諸症頓退又用十全大補仍加薑桂之類五十餘劑而死肉潰又五十

餘劑而新肉生斯人氣血充盛而瘡易起易斂使瘡
者遍知預為托裏必無此患

六合回生丹 又名六合散 治發背癰疽潰爛者有回
生之妙

鉛粉 壹兩　輕粉　銀硃
雄黃 貳兩 壹錢　乳香 去油　沒藥 去油 各貳分半 共壹[illegible]

右六味各擇真正好者研為極細末收貯凡治其
病先煎好濃茶將瘡洗淨軟帛拭乾後剖開猪腰
子壹枚用藥壹分摻於猪腰子上周傳患處待猪
腰子上發熱如蒸良久取去自此拔毒氣減痛若
定瘡口出膿穢不可手擠第二日依前法仍傳之
第三日亦傳之瘡勢甚者可傳七八九次瘡小只
傳一次可愈猪腰子不發熱勿治又治對口瘡同
前

[illegible]

若臁瘡日久不愈用黃蠟少加好黃丹化攤紙上
量瘡大小裁其蠟紙先洗摻藥末貳分粘在蠟紙
上面貼瘡紙外[illegible]任瘡出毒惡水俟愈若遇
瘡用猪腰子切作兜片摻藥[illegible]以尖刀
穿開猪腰子納藥于內能合其瘡亦[illegible]
犬肉及發毒菜物俱忌之

驪龍散 治發背癰疽[illegible]破與不破二者之間功能提
毒

珍珠 伍分　[illegible]　鐵鏽 [illegible]

右研細末以猪[illegible]傳瘡口二三五次愈
初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飯石膏 在膿潰後開瘡口

麥飯石不拘多少炭火煅令紅以好米醋淬之如
此煅淬十數次研為末重羅去粗者取細末入乳
鉢數人更遞研五七日如麵極細為妙 白斂 為研細末
鹿角 不用[illegible]
右用麥飯石細末[illegible]白斂[illegible]鹿角灰 肆兩
最要研得極細方有效[illegible]大能
止痛收口排膿[illegible]和合藥末多[illegible]
好米醋入銀石器內熬令魚眼沸却旋旋入藥末
用竹篦子不住手攪熬一二時久令稀稠得所提

出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令着塵用時先
以豬蹄湯洗去膿血以故帛挹乾鵝翎蘸膏塗傅
四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大未
潰能令內消已潰則排膿如湍水逐日瘡口收斂
瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥貼瘡但
內膜不穿亦能取安洗瘡勿可手觸嫩肉亦不可
口氣吹着合藥亦忌腋氣之人及月經有孕婦人
見之仍可熬好長膏一大碗收磁器內候逐日用
藥于瘡上久則藥乾以鵝翎蘸醋拂拭藥上勿令
綳也初則一日一洗一換藥十日後兩日一換

古方云麥飯石顏色黃白類麥飯曾作磨者尤佳
按麥飯石不可作磨狀如麥飯團生粒點如無此
石常以舊麵家磨近齒處石代之取其有麥性故
也或溪中尋白石如豆如米大者即是也其石大
小不等或如拳如鵝卵略如握聚一團麥飯

解毒百用膏

猪牙皂角 炒 南星 各壹兩 大米 壹合炒黑
臭小粉 乾者肆兩炒焦去火毒

右為末和勻蜜水調圍 治癰撲酒醋調圍

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜
用逼毒散

黃藥子 白藥子 各壹兩 赤小豆 貳兩
雄黃 壹錢

右為末水調傅

青散子 治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡
口生肌

樺花葉 取皮陰乾肆兩為末 青赤小豆
白芨 各貳兩

右為末臨時用樺花末叁錢匕白芨小豆末各壹
錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不

用貼

雄黃解毒散 治一切癰腫潰爛毒勢成者先用此
藥二三次以後用豬蹄湯

雄黃 壹兩 白礬 肆兩 寒水石 壹兩煅

用滾水貳叁碗乘熱入前藥壹兩洗患處以太乙
膏或神異膏貼之

豬蹄湯 治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉 凡瘡有口便須用此湯洗

香白芷 不見火 黃芩 去心 赤芍藥
露蜂房 取有蜂兒者 當歸 去蘆 羌活

生甘草各等分

右㕮粗末看疽大小用藥如疽大每料用先將豬
豬前蹄兩隻壹斤只用白水煮爛煮軟將汁分作
二次澄去面上油花盡下面滓肉俱去用藥壹兩
投於汁中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸
藥湯溫溫徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗
訖以帛挹乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并
月經見行婦人猫犬並不許入病人房洗瘡切勿
以手觸着洗疽之方所傳甚多惟此方極効其用
露蜂房有理蓋以毒驅毒也

集香散 洗癰疽潰爛

白芷 藿香 茅香

香附子 防風各分 木香

甘草各一錢

作一劑用水壹盌煎數沸去渣淋洗患處

薛按此方乃馨香之劑也經云血氣得香則行得
臭則逆即此意也若瘡毒將潰宜用之若毒未盡
或有瘀肉宜先用猪蹄湯洗之後宜用此方
殊用膏藥護貼使風邪不入肌肉易生大凡一有
瘡口即用膏藥貼之至收口爲度取其生肌之劑

者此散劑

神洗方 凡諸發及獨疽瘰癧臁瘡湯潑火燒等瘡
或有別作一種穢臭氣息不堪聞者最是惡瘡或
已破未破或小或大皆當作急治之可用猪蹄
一握搗細用紙灰淋濾汁服之以滓傅瘡四圍用
雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘡之
瘡出膿後以猪豬蹄湯等十分淨洗久洗
一二時候不妨久用後須藥之

好降真香末 楓香末

右二味於銚中攪熔丸如彈子大却取香爐一枚
依爐口造紙煙筒一個如燒龍涎香樣慢火爇之

緊以煙筒口熏瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更
熏未出膿者即出已出膿者自乾痂假生肌合口
然後止向後有赤腫去處又再熏欲舒其去穢
氣也

疽瘡有死肉不去者用白丁香和梅汁調塗之浸肉
乾摻於膏藥上甚妙

又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡
肉不惟惡瘡凡癰疽有惡肉者俱可去

又方雄黃散 以雄黃壹錢另研巴豆不去皮研如
泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

烏金膏　治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之即潰若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙撚蘸紝其內有等發背因元氣虛弱或因尅伐元氣胃氣潰損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋如刀劃之狀中央漸黑漸脫須用純陽之藥以接其元氣庶能收斂若妄用刀針去肉出血陽隨陰散元氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益而又害之

用巴豆一味去殼炒黑研如膏點於患處臨用余之

追毒丹　治瘡疽黑陷者用針刀開瘡內以此丹使之潰然後去敗肉排膿隨證治之雖癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆 炭稍去皮心不去油研如泥　白丁香

輕粉 各壹錢　雄黃　黃丹 各貳錢

右件研和加白麪叁錢滴水為丸如麥大針破瘡內之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之

追毒烏金散　治瘡口惡肉有潰膿血

巴豆 伍錢　寒食麪 二兩　紅國丹 二錢

右為細末用水和麪作餅子將巴豆包定依數透氣文武火燒成深黑色為細末看瘡貼之用膽汁就和成錠子新水磨用搽五七次妙

梧桐淚方

癰疽勢將熟不潰堅硬以快利刀將惡處割成十字路用麪水調稠存門圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚填半滿用好米醋滴淚上須臾自沸

勿令滾出麪外次日用食鹽花再摻淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

錚按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛不能腐化者宜用大補之劑

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香　輕粉　粉霜

雄黃　麝香 各壹錢　巴豆霜 五分

右為細末新飯和作錠子用之

神異膏　治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃 伍錢　滑石 倍用

右為末洗後摻瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗從、破爛者用此貼之

止痛拔毒膏 治一切瘡發臭爛不可近未破則貼破已破則生肉杖瘡疔瘡皆用之

蟹螯 肆拾玖枚 柳枝 肆拾玖條 木鱉子 柒个

乳香 沒藥 麝香 少許

松脂 叁錢

右用真清油拾肆兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹伍兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪令勻入甆器中收了後用

郭氏青金錠子

銅綠 叁錢 青礬 膽礬

輕粉 砒霜 白丁香

苦葶藶 各壹錢 腦子 少許 麝香

右將葶藶研細次下研藥同研極細打糊糊為錠子或煉蜜加白芨末壹錢為錠如麻黃粗細約二三寸長看瘡口深淺紝入疼者可治不疼難治

第一般緊峻用前錠子砒霜生用治瘡口用

第二般緊緩用前錠子砒霜煅去死肉用

第三般緩慢用前錠子去砒霜加枯礬生好肉用

翠霞錠子 治年深冷漏日久惡瘡有歹肉用之

銅綠 寒水石 煅 滑石 各叁錢

明礬 膩粉 砒霜

雲母石 煅研如粉各壹錢貳分半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡口深淺紝之如修合候天色晴明則可

信効錠子 治一切惡瘡

紅娘子 黃丹 砒霜

蓖麻 上硝 白芨

銅綠 各壹錢半 腦子 麝香 各少許

右研細末以乳汁和為錠子用中病即止

紅玉錠子 去歹肉生肌

乾臙脂 白礬 枯各叁錢 輕粉

砒霜 黃丹 腦子

麝香 各少許

右研極細末糊糊和為錠子用之

時効針頭散 追蝕惡瘡歹肉兼治瘰癧

赤石脂 半兩 乳香 白丁香 各貳錢

砒霜 生 黃丹 各壹錢 輕粉

麝香 各半錢 蜈蚣 壹條焙乾

右為極細末摻於瘡口歹肉自去矣若動刀針豈
瘡雖可有癥

追毒餅　治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿
脹痛不可忍用此捻成小麥子大入放瘡中不不
閉膿水自出瘡口乾好

極好信石　半錢　雄黃　雌黃
大硃砂　各壹錢　輕粉　少許

右研為細末糯米糊丸如麥子大若瘡口閉合生
膿將藥入內仍以膏藥貼之

瘡瘍　內服內追毒丹　方見外科一　四四

薛按此以毒攻毒之意也嘗治一縣尹背瘡竟背
腫潰色黯重者復有甚危治飲食頻進用桃紅散
色漸赤負漸腫再用而肌生更服托裏藥而愈盂
此亦大毒證兼此峻藥竟能治此亦用此故攻毒
有效然有氣血虛不能內潰宜補養氣血常治裴
背初起未成膿先用烏金膏或援生膏點患處數
點以殺其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或
不甘美用六君子湯加藿香連進一二劑如爛皮
腐動用雄黃解毒散洗之卻日用烏金膏塗患處
候有瘡口卻用紙作撚蘸烏金膏紙入瘡內若有
膿為筋膜間隔不出致作脹痛用針引之膿內若
塞者去之若瘀肉腐動用消毒湯洗如與利瘀肉
飲食如常瘀肉自腐用消毒散與托裏散相兼服之
仍用烏金膏塗疳若瘀肉已離好肉即去之如膿
不潰不痛仍作痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑枝灸
患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不
焮痛者服大補之劑仍用桑枝灸之以補接陽氣
解散鬱毒其肉自腐

瘡瘍　乎丹錠子　又名善效錠子治一切背瘡惡瘡并潰
爛追膿水長肌　外科一　四五

銅青　錢　明礬　錢　龍粉
乳香　另研　黃丹　少許　白斂
輕粉　名膏　麝香　一分　杏仁　去皮尖另研
如有死肉加白丁香　一錢

右為細末稠糊為餅子或糯米飯和亦得看淺深
紝之直至瘡平復循可用之大有神效如前裝方
不宜多用謂犯生砒也此藥無毒恐病家猜疑是
毒藥謂口內嘗之爲愿也

提膿錠子　先用追蝕鋒錠子蝕去歹肉惡物止有
膿水皆宜用之

自然銅　川芎　白芷各半兩
黄連　白斂各半兩　木香半錢
麝香少許
右為極細末糯米飯和為錠子用之或作散末乾上亦佳
右二方乃潰瘍必用之要藥余用之救人無算凡瘡口深而窄者先以綿杖子蘸淨膿水却以軟飯和成錠子長短大小一以瘡為準須令藥至底乃效外以膏藥護之若瘡口淺而闊大者蘸湯洗過拭乾只以乾末摻之如瘡口乾燥以白紙竹蘸豆油點着以盞承取滴下油漉調前藥末雞羽蘸傘膿汁自止新肉自生神効

麝香輕粉散　治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡皆治
麝香　輕粉各半錢　白礬飛過
乳香　沒藥各壹錢　右為細末乾瘡乾貼
神効當歸膏　治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能止痛推陳致新
當歸貳兩　麻油肆兩　白蠟伍錢
先用當歸入油煎至焦黑色去柤入蠟溶化即成膏矣近方用蠟為君諸人無云蠟為外科之要藥生肌定痛續筋補虛其功不可並述常見杖瘡者杖後隨食蠟兩許飲酒一兩盞一睡之後血散痛止輕者即消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功為大用者不可忽之
神異膏　治諸般惡瘡疖癤發背癰疽其妙如神
露蜂房要用蜂兒多者為妙細剪淨壹兩　全蛇蛻鹽水洗淨焙乾
玄參去蘆各半兩　綿黃芪柒錢半　黄丹細研伍兩後入
杏仁去皮尖切小片壹兩　男子亂髮洗淨焙乾如雞子大
真麻油壹斤

右件藥先將麻油入銀銚中同亂髮於風爐上慢慢文武火熬候髮焦熔盡以杏仁投入候杏仁色變黑好綿濾去滓再將所熬清油入銀銚內然後入黄芪玄參二味慢火熬一二時取出銚子安一冷風爐上候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移銚於火上不住手攪慢火熬至黄紫色用綿濾過後復入清油在銚內乘冷投黄丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時

必候得所然後用瓷器內封收待用或恐僞然熬煎
火太過稍硬難用却入少蠟熬添麻油在內熬若
盛封蓋於甑上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成
了須用所盛瓷器置淨水盆中出火毒一晝夜欲
三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火
緊慢火猛即藥中火發千萬謹戒膏藥方甚多功無出於此

神效瘡寒膏藥

當歸水洗焙乾壹兩　杏仁湯浸去皮尖壹百个
黃丹研細陸兩　肥嫩柳枝叁兩半切如寸許水洗乾
肥嫩桃枝　麻油

右件先熬麻油熱下桃柳枝熬令半焦以綿裹當
歸杏仁同煎至柳枝黑焦爲度去藥渣濾油澄淨
抹去銚中查滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成
滴水中不散爲度

寒瘡熱瘡膏藥

與寒瘡藥同只將當歸身改作當歸稍桃柳枝分
兩倒遞便是

神仙太乙膏　治八發癰疽及一切惡瘡或軟癤不問
年月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣蟄犬
咬傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以
溫水洗瘡淨軟帛拭乾却用緋帛攤膏藥貼瘡即
用冷水下血氣不通溫酒下赤白帶下當歸酒
下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置口中
含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服
以山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯下
腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白
皮湯下諸漏先以鹽湯洗淨諸瘡並量大小以紙
攤貼每服一丸如櫻桃大蛤粉爲衣其膏可收十
年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧同上瘰癧鹽湯
洗貼酒下一丸婦人血脈不通甘草湯下一切瘡
癤并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參　白芷　當歸
赤芍藥　肉桂去粗皮　大黃
生地黃各壹兩

右剉碎用麻油貳斤浸春五夏三秋七冬十日火
熬黑色濾去粗入黃丹壹斤青柳枝不住手攪候
滴水中成珠不黏手爲度傾入瓷器中以瓦盆覆
掘地坑埋陰樹下以土覆三日出火毒欲服丸如
雞頭子大

全孫萬應膏　治顛撲傷損手足肩背并寒濕脚氣

疼痛不可忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥者一

瀝青貳斤半　威靈仙　黃蠟各貳兩

木鱉子貳拾捌个去殼切片了研　蓖麻子壹百个去殼研

沒藥　乳香各壹兩別研　麻油夏秋肆兩冬春

肆兩

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬花以槐柳枝攪候焦黑色重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤二斤淨再下鍋熔開下麻油黃蠟蓖麻木鱉子泥不住手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不黏手扯拔如金絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加

瀝青試得如法却下乳沒末起鍋在炭火上再用槐柳條攪數百次又以粗布濾膏在水盆內扯拔如金絲頻換水浸一日却用小鐵器頓如落馬墜車於被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉為驗遍換熱水數次浴之則熱血聚處自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上

善應膏　治諸般惡瘡腫毒發背腦疽瘰癧疔牙癰打撲接骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火漆瘡疥癬貼之即愈又治婦人吹乳以藥丸如梧子大新汲水下貳拾丸肺癰腸癰亦可為丸不服

溫酒米飲或北梗甘草煎湯皆可不可犯荅下叉火焙

上等黃丹拾兩研極細　白[illegible]

明沒藥　滴乳香並別研　大當歸

川白芷　杏仁去皮尖　大黃

草烏頭　川烏頭　赤芍藥

檳榔　生乾地黃

亂髮淨洗　滴青[illegible]

右除乳香沒藥外將麄石銚子盛香油壹斤浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色再入蔥白亂髮煎少時用生絹帛濾去滓留下一兩藥油復將所濾油於慢火上熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不住手攪候有微煙起提起藥銚將柳條點滴在水面上凝結成珠不散方成膏如不成珠上火再熬直待成膏提起藥銚起無煙出却入乳香沒藥白膠香末攪勻傾出瓷器內將元留下淺藥油一併收拾器內用新汲水將藥器坐放水內一日一換過三日出火毒方可用之[illegible]量加黃蠟清油入膏內[illegible]

玄武膏　治癰疽發背丁腫内外臁瘡陰𤺋下諸惡瘡及頭項癰腫不問已潰未潰皆可用大能拔膿散毒止疼生肌累有神驗若丁腫先用銀篦或鹿角針於丁瘡中間及四畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大擦入孔中却用此膏貼之如瘡壞爛至甚難以藥貼則將膏一二三片煎油調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙

大巴豆去殼去膜　木鱉子去殼各貳兩　黃丹肆兩研細

真清油拾兩　槐柳嫩枝各壹尺長

右依前法煎熬成膏貼用

金絲膏　治傷筋動骨損痛閃腕風毒惡瘡風濕筋寒諸病

當歸尾　川白芷　杏仁去皮尖

玄參　豬牙皂角去皮　草烏各生用各叁錢

白膠香明者捌兩　連翹　蓖麻子肥者　瀝青半斤明者

乳香　沒藥各半兩另研為末　黃蠟壹兩

男子亂髮洗淨拳大

右用清油半斤將八味依前法熬濾去入膠香瀝青攪勻下黃蠟又攪無烟方下乳香沒藥

貼膏法　如瘡有膿血不淨滿瀝附凝須用藥水洗淨拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出流用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日三日一換貼至愈

長肌膏　治年久諸般爛瘡貼之即愈

白蠟油肆錢　黃蠟捌錢　香油捌錢

大楓子去殼細切　黃連叁錢

豬木鱉肉去殼細切　黃柏叁錢　右同煎濾去柤入後

枯礬叁錢　輕粉叁錢　密陀僧各研細

右將前七味煎濾入後三味攪勻候凝看瘡口大小做薄餅將針穿小孔十數貼瘡上或日易之鹽茶湯洗瘡洗餅再貼以好為度

生肌　夫肌肉者脾胃之所主也潰後收斂遲速乃血氣盛衰使然但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑若瘡毒未盡就用生肌反增潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者重者必致內攻或潰爛而不斂其害大矣　若久瘡不生肌而色赤者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加芎歸黃芪肌熱內熱陰血虛也四物加參朮膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應

代赭石降湯……汁小便長皆不虛也用加減八
味茯苓散服若敗肉去後新肉微赤白治白膜者也
胃中生風也但用四君子湯以培補之則百日而斂
膿水……之作由胃氣不調蓋瘡瘍之潰由胃氣腐化其
瘡之斂由胃氣榮養東垣云胃乃生發之源為人生
之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本牢固誠
哉是言也可不慎歟　外治用猪蹄湯洗拭有淺深紅
白……如有肉惡物已去止有膿水用搜膿錠子於口
淺平則以散末乾上直至膿淨肉滿方用生肌散四
畔輕輕掺之遂令漸小以……矣

精要生肌散

寒水石（煅）　滑石　烏賊骨
龍骨（各壹兩）　定粉　蜜佗僧
白礬灰　乾臙脂（各半錢）
右為細末乾掺用之

平肌散　治諸瘡久不斂

蜜佗僧（煅）　花蘂石（煅）　白龍骨（各壹兩）
乳香（另研）　輕粉（各壹錢）
右為細末和勻乾掺

立應散（郭氏）　治金瘡血出不止并諸瘡久不生肌

寒水石（煅 壹兩）　花蘂石（……）　龍骨（……）
黄丹　没藥（……）　（……）
一方加白芨乳香輕粉
右為細末如一切金刃所傷竹木刺……若用……敷上……
蓋之不作膿血瘡膿水乾貼生肌定疼

生肌散

白礬（枯）　檳榔（各壹兩）　黄丹
血竭（各壹錢）　輕粉（壹錢）　蜜佗僧（壹錢）

紅玉散

煅石膏（半兩）　黄丹（炒 壹錢半）

完肌散

定粉　枯礬　黄連
乳香　龍骨（各壹錢）　黄丹
輕粉（各壹錢）
右各料為極細末貼瘡口生肌長肉看輕重選用之

生肌散　治瘡口不合

木香（貳錢）　黄丹　枯礬（各伍錢）
輕粉（貳錢）
右件各另為細末用猪膽汁拌勻曬乾再研細掺

患處

謹按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生嘗見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能生者當用托裏之劑人有風寒襲於瘡所不能生者宜用豆豉餅灸之若流注瘰癧內有膿管或瘀肉或癧核須用針頭散腐之錠子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡大黃當用神效當歸膏則能去腐生新止痛

神秘方　治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去壞

右用地黃汁壹升松脂貳兩薰陸香壹兩羊腎脂牛酥各如雞子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊脂酥更用蠟半雞子大一同相和以慢火煎令水盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易

治東垣斂瘡口方木香檳榔散用之決無疼痛以猪油塗覆瘡上生肌斂肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏藥熱敷所宜用也貧人客地之宜外冰寒瘡者禁不可用

木香檳榔散方

木香　檳榔　黃連各等分

右為極細末新汲水調攤紙上貼之濕則乾貼

治寒瘡斂瘡口藥

當歸身壹錢　青皮去白貳分　木香壹分

黃連五分

右四味為極細末蠟油調塗取效甚速

保命乳香散　瘡口大者

寒水石煅　滑石各壹兩　乳香

沒藥各半　腦子少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

聖效散　收斂瘡口

黃檗壹兩去粗皮細切炒至赤黑色　木香各半兩炒　穿山甲壹兩炒黃

檳榔　雞肫胵拾枚生用

右為細末旋用少許候大膿出盡洗淨方可乾摻瘡上

桃紅散　斂瘡口定痛辟風邪

滑石肆兩　乳香　輕粉各貳錢

小黃粉壹兩　寒水石煅貳兩

右為細末乾摻瘡口上　一方改小黃粉為定粉

又方治瘡口久不收

小椒（去目炒黑壹錢） 定粉 風化硝（貳錢）

白礬（貳錢半） 乳香 沒藥（各壹錢）

右為細末摻之

有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅隔膜耳自謂必死用大鯽魚一尾去腸肚以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥為細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之

丹精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此為瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮於瘡遂致如此用北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯澆洗瘡口四圍淨肉以絹帛兜艾葉乘熱澆沃一日一次洗了須避風仍燒松香以烟熏瘡口良久用神異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無效夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熱洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪於冷滯大抵潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病體自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎（補接即參芪歸朮之類是也）

蝟亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取壹錢匕酒調服治瘡久不合神驗（此乃□補□之功甚大）

用收斂瘡口止有柳皮白斂煎湯飲之

黃丹散 斂瘡口

黃丹（飛） 白礬（枯） 龍骨

寒水石 乳香 木香（不見火）

黃連 黃芩 檳榔

賦粉（各叁錢） 腦子（少許）

右為末隨瘡乾濕用之乾則用油調濕則乾摻洗淨乾却摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則又痛作

久漏瘡

川漏瘡須先服補藥以生氣血即參芪术歸芎爲主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚以艾炷灸隨漏之大小便灸令微熱不可令痛乾則易之乾者再研爲末再和再灸如困則止來日再灸直至肉平爲効亦有用附片灸者仍以前血氣藥作膏藥貼之

要經云肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大膕留于節湊必將爲敗積寒留舍榮衛不榮卷肉縮筋肋肘不得伸

內爲骨瘻外爲不仁命曰大寒留于谿谷也此用附子灸者蓋此義也

自康祖大夫患心漏二十年當胸數竅血液長流醫皆莫能治或曰竅多則愈損閉則慮冗他歧當存其一二猶爲上策坐此形神困瘁又積苦腰痛行則傴僂不伸酒雖雞魚蠏蛤之屬皆不入口淳熙間通判溫州郡守韓子溫見而憐之爲檢聖惠方載腰痛一門分熱二症貽之使自擇康祖曰某年老久羸安敢以爲熱始作寒症治療取一方用鹿茸者服之逾旬痛減更覺氣宇和暢遂一意專服悉屛他藥洎月餘腰屈復伸無復呼痛心漏亦愈以告醫者皆莫能測其所以然後九年康祖自鎮江通判滿秩造朝訪子溫則精力倍昔飲啖無所忌云漏愈之後日勝一日子溫書吏吳弼亦苦是疾照方服之浹旬而愈其方本治腰痛用鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍皆貳兩鹽花叄分爲末棗肉丸三十丸空心酒下 天聖中王部尚書忠肅公家有婢病漏十餘年一日有醫過視之曰此可治也即取活鱔一竹針五七枚乃擲鱔于地鱔因屈曲盤以竹針貫之覆瘡良久取視有白虫數十如針若鱔即銓置杯水中蠕動如線

復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰虫固未盡然餘皆小虫請以常用藥傳之時得槐柳黃連一味即爲散傳之明日乃以乾艾作湯投白礬末二三錢先洗瘡口然後傳藥蓋人血氣冷必假艾力以助陽而又性亦能殺蟲也如是者再即生肌不逾月愈 醫因瘡一月不治則有虫虫能蠕動氣血亦隨之故瘡漏不可遽合則結癖實虫所爲又曰人絲有疾經月不瘥則必虛憊婦人則補脾血小兒則防驚癖一廣則并治瘻癧由此醫名大著 有人腳肚上生一瘡久遂成漏經二年百藥不効自度必死一山人見之云

此瘡漏耳但以石灰二三升白沸湯泡清洗勿令瘡口
瘁即是也如其言用灰湯淋洗果痊三兩次遂乾
一婦項下忽生一塊漸漸緣至妳上腫起莫知何病
偶用刀刺破出清水一碗日久瘡口合有道人見之
曰此蟻漏也緣用飯誤食蟻得此耳詢之果然道人
云此易治但用穿山甲數片燒存性灰爲末傅瘡上
遂愈蓋穿山甲蟻之畏也 柳休祖者善卜筮其妻
病鼠瘻積年不瘥垂命休祖筮之得頤之復按卦合
得姓石人治之當獲鼠而愈也既而鄉里有奴姓石
能治此病遂灸頭上三處覺佳俄有一鼠從前而從
灸處出 穴 外科一
可瘡明之覩見骨有三灸應其瘡者
扁師云經云脊移寒於脾發爲癰腫少氣脾移寒於
肝發爲癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰
生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉
筋脈聖濟云衣服過厚表易着寒所得之源大抵如
此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則潰發
皮色疼痛漸突而成膿如泔而稀久不能瘥
令變爲冷漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以
骨碎補丸主之
骨碎補丸方

骨碎補	補骨脂	熟地黃
川當歸	續斷	石楠葉
黃芪	石斛	牛膝
杜仲	萆薢以上各貳兩	附子炮
白芍藥	川芎	兔絲子
沙參	羌活	防風
獨活	天麻各一兩	

此方與大僂方相表裏術拾遺後有木瓜兔
絲子白朮
右爲末煉蜜丸如梧子大空心溫酒下
又漏瘡 穴 外科
元戎云邢三郎家小兒病寒瘡久不愈先以四物穿
山甲湯透之復以地黃當歸湯補之繼以骨碎補丸
外治
防風者備則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃
生大僂宜用

羌活	防風	細辛
附子	甘草	川芎
續斷	白芍藥	白朮
當歸	桂心	麻黃
黃芪	熟地黃	

此方與萬開碎補丸相表裏

□不從廷于肉理乃生癰腫　陷脉為瘻留連肉

腠□氣化為傳為善畏及為驚駭

桂附丸　治氣漏諸瘡

桂心　附子炮裂米醋中浸再炮三五次去皮臍

厚朴薑製　粉草炙　白术各壹兩

木香半兩　乳香研貳錢

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下貳叁拾丸丹溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只宜瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴頭温

其瘡漏有血出恐不宜冷藥治以内托之劑與病情相得此方治冷漏瘡若有虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之為當又瘡漏者宜參术歸芪膏

陷脉散　治漏瘡及二三十年瘻瘤或大如杯盂久久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕臥寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑炮　琥珀　大黃

附子炮去皮各壹兩　丹參半兩炙　石硫黃研

白石英研　鍾乳粉研　烏鰂骨研各半兩

右為末貯以瓷合盛　令泄氣若瘡濕即傅無汁即煎豬脂和傅之以乾為度或死肌不消加芒硝貳兩益佳一法用燕窠當救

又方治漏瘡

川芎半兩　細辛半錢　白芷梢半錢

甘草細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小用隔年黃麻根刮去粗皮挺軟撚成繩子撚入孔中至不可入則止日淺一日當用好膏藥貼之

子和小瘡者三日一次漸入□□其瘡經外膿作瘡數

年不已臍汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延為濕瘡求治戴人曰兩股間當有綠水二三升涎數掬表曰何也戴人曰當夜發時必驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也無兩外踝皆足少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如瀝既伏驚涎在中焦飲冷水咽為驚涎所阻水隨經而旁入瘡中故飲水瘡中水出乃上涌寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而瘡乾真可怪也

嘗治足膝下至踝有瘡遍足腫大於好足一倍行步不全用五龍丸大下之者六番每番皆至七行下後

用黄蘗苓木貫衆[illegible]黄甘草升麻葛根南星半夏牛
蒡[illegible]滑石桂調之[illegible]三四日[illegible]安
[illegible]字治瘡有頭[illegible]以[illegible]壹[illegible]燒[illegible]酒
調服[illegible]錢匕立瘥
東垣云瘡[illegible]自幼至老凡所經驗次須寫之嘗記所
瘍惡瘡諸藥不效者取蟾蜍煎湯洗頭安瘡口上灸
灸之七壯一易不過三五枚無不效者又[illegible]
[illegible]蠱見灸之同前法累驗神効人皆祕之往往火
[illegible]神

東垣朽骨久疳[illegible]治中有者　[illegible]
取[illegible]骨[illegible]泥[illegible]火煅過
細取出地上[illegible]泥用骨研細飯丸如粟
米大以紙撚送入孔[illegible]用骨藥貼之
不瘥雄黄治瘡瘍[illegible]凡瘡瘍以瓦旋攻
之[illegible]成注云今醫方有五毒之藥作之用[illegible]
[illegible]丹砂雄黄礬石磁石其中燒三日三夜[illegible]上
着以雞羽取之以注創惡肉破骨則盡出[illegible]大作嘗
[illegible]人楊偶年少時有瘍[illegible]頰連齒[illegible]外[illegible]
若殞腐肉潰出膿血不輒止之痛楚難忍療之百方
彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘡中少頃[illegible]
朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黄[illegible]
瓦盒也

豬骨膏　治諸瘡口氣冷不瘥

豬筒骨貳箇取髓　松脂[illegible]　乳香[illegible]
黄連[illegible]　白芨[illegible]　鉛丹[illegible]
黄蠟[illegible]
右搗研鎔蠟和為膏不拘時傅之

附子散　治冷瘡日夜[illegible]

附子[illegible]　川芎[illegible]　雄黄細研各貳錢半
白蘞[illegible]研　膩粉研[illegible]
為細末研勻[illegible]用[illegible]傅瘡上

雄黄散　治冷瘡[illegible]瘡口

雄黄研　百合　乳香
黄蘗炙去粗皮　墻上爛白蜆殼　小蚌蛤子各壹分
右為細末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯温洗拭
乾傅之

黑[illegible]散　治漏瘡

牡蠣粉　號丹　硫黄研各壹分
露蜂房炒貳分
右同炒令烟盡為細末入髮灰壹分麝香少許研

貼之

馬齒莧膏　治一切瘻

馬齒莧（陰乾）　臘月燭燼（各等分　一作臘月鼠灰）

右為細末以臘豬脂和先以溫泔清淨洗拭乾然後以藥傅之日三

治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

右以鹽少許安口牛耳內然後取牛耳中垢以傅瘡上即瘥如不用鹽即牛耳不痒難取垢

治漏瘡久不合口用炮附子去皮尖為細末唾津和隨瘡大小作餅[illegible]用艾[illegible]灸之更[illegible]

大補氣血藥用江西豆豉為餅多灸之亦効

神應膏　宋藩防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此膏愈之如腸毒胃毒為丸服之神効

當歸（[illegible]錢）　赤芍藥　大黃（各壹兩伍錢）

香白芷　官桂（各壹兩）　玄參（壹兩參錢）

川續斷（壹兩貳錢）　莪朮（壹兩）　生地黃（壹兩貳錢）

右九味細剉用真香油貳斤浸春五日夏三日秋七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去查如熱天用黃丹廿兩冷月十五兩旋旋下丹不住手攪試水中沉為度不可令婦人雞犬見如濕石

孔者以膏送入孔內外以膏攤貼之

腐櫝散　治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫焮硬膿水清稀出而不絕內膜空虛惡汁臭敗瘡邊緊下及好肌不生及療瘡癤瘻惡瘡久潰不斂（[illegible]）

（[illegible]）

治漏外塞藥

爐甘石（[illegible]童便[illegible]）　牡蠣粉　右為極細末傅之

烏金散　貼惡瘡瘻

橡斗子貳個一實黃丹一實[illegible]末[illegible]合定用黑麻皮纏了火內燒研細加麝少許洗淨瘡貼之

東垣截瘺散　治年深瘺瘻瘡

黃連　麝香（另研）　龍腦（各半[illegible]）　密陀僧

黃丹　白芨　白斂（[illegible]）　輕粉（[illegible]錢）

右為細末和勻乾摻在瘡上以膏貼之

應効散（又名托裏散）　治氣瘻瘡蝕瘡多年不効者

地骨皮（不以多少取[illegible]）　為細末[illegible]用紙撚蘸紝瘡口內自然生肉更用末飲調[illegible]空心熱服日三

治漏瘡以五倍子末和血竭末塞之

灸漏瘡　足內踝上[illegible]灸[illegible]　如在上者肩井　鳩尾

肺脉微緩為瘻瘻緩者多熱

八瘡瘍所兼諸證

○渴

大法瘡瘍作渴不問腫潰但脈數發熱而渴用竹葉黃芪湯脈大無力或微弱而渴脈數無力而渴或口乾用補中益氣湯若脈數便秘用清涼飲尺脈洪大按之無力而渴用加減八味丸若治口燥舌黃飲水不歇此丸尤妙

瘡瘍作渴若焮痛發熱便秘者上焦實熱也用竹葉石膏湯腫痛發熱大便秘澀者內臟熱也用四順清涼飲腫痛微熱若熱在外表也用仙方活命飲漫腫微痛者氣血虛弱也八珍補中益氣湯若因胃火消爍而津液短少者用竹葉黃芪湯若因胃氣虛而不能生津液者用補中益氣湯若因胃氣傷而內亡津液者用七味白朮散若因腎水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸或先口乾作渴小便頻數而後患疽或疽愈後作渴飲水或舌黃乾硬小便數而疽生者尤惡候也苟能逆知其因預服加減八味丸補中益氣湯以滋化源可免後患

一婦瘰癧發渴乃氣血兩虛用參芪以補氣歸芍以養血或忍冬丸黃芪六一湯

伍氏云瘡作渴甚者急與神仙追毒丸取下惡毒清膻湯千金漏蘆湯五香連翹湯六味車螯散內金散皆可選用利後仍渴却用生津補氣藥津液生氣血完渴自止　丹溪曰大渴而與利藥非也不詳證何以知其當下後而利後仍渴却用補藥又不明言脈證恐是但有大渴必下下後尚渴方與補藥古人治未病如此用藥可乎況渴屬上焦當健湯時猶或可用若潰瘍後渴多因氣血之虛何待利後方識其虛也潮熱口乾與口渴不同不宜用丹藥鎮墜用之甚禍如反掌用桑枝煎五味湯以救陰水　丹溪曰此妙方也而不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴亦未易除也

李氏云病疽愈後發渴多致不救惟加減八味丸最妙蓋癰疽多因虛而得疽發而渴者服此丸則渴止安而未渴者服此丸不發渴或未疽而先渴者服此不惟渴止而疽亦不作　薛氏曰前證係腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲水無度或舌黃作裂小便頻數或痰氣上壅咽躁不寧或一二年先作渴飲水或口舌生瘡兩足發熱痰氣上壅或瘡愈三四年而口乾作渴小便頻數急用前藥多有復生者能逆知

其因預服前丸可免此患若足下足冷作渴者尤
宜服八味丸大凡瘡後患其作渴不足用加減八味
丸中氣虛弱用補中益氣湯氣血俱虛用十全大補
湯陽氣虛寒加薑桂如不應用八味丸
托裏消毒散加減法　飲冷作渴熱也加赤小豆
知母如不應暫用竹葉黃芪湯　善食作渴胃火
也加石膏山梔天花粉如不應暫用竹葉石膏湯
食少發倦作渴胃氣虛也去芷翹金銀花加人
參白术如不應暫用補中益氣湯　膿多而作渴
氣血虛也去三味加熟地黃五味子　如不應暫

用十全大補湯加五味子麥門冬　口乾舌燥腎
氣虛也去三味加熟地黃山茱萸山藥如不應兼
六味丸又不應佐以補中益氣湯　自汗內熱口
乾胃氣虛也去三味加參芪歸朮如不應暫用六
君子湯　盜汗內熱口乾陰血虛也去三味加熟
地黃麥門冬五味子如不應暫用當歸六黃湯

竹葉黃芪湯補遺　治瘡瘍大渴發熱煩燥作渴或小便如
淋

生地黃　黃芪各貳錢　當歸酒拌
淡竹葉　川芎　甘艸炙
黃芩炒　白芍藥炒　人參
栝蔞根　石膏煅各一錢　麥門冬去心貳錢

水貳鍾薑三片煎八分食遠服

薛氏曰前證乃七惡中之一也此方治之其功甚
捷亦有左手脉浮大而熱或渴者宜發散表邪右
手脉沉實而熱或渴者宜疎其內邪若潰後作渴
或小便如淋或脉大而無力者皆氣血虛也宜大
補氣血亦有潰後熱不止或作渴遂以為敗證不
治者素有胃火或胃經蘊熱未盡胃脉尚數者仍
宜服前湯服而脉反大熱愈甚者湯愈作斯為敗證

蓋因真氣虛而邪氣實也今之潰瘍與作渴黃芪
二藥性冷多不肯服若胃脉未靜非此藥莫能治
也若因循日久煎熬氣血膿血愈多氣血愈虛反
成敗證矣治者當審證從脉可也大抵瘡瘍之證
七惡內見一二惡猶可畏虛中見惡證者不治實
證無惡候者自愈

托裏黃芪湯　治證同前

黃芪炒陸錢　甘草炙　栝蔞根各貳錢

水貳鍾煎捌分頻服之加人參貳錢尤妙

薛氏曰愚用此方治氣虛作渴甚効若氣血俱虛

或呷血大渴竹瀝或煎茶飲熟者宜托裏養榮湯

托裏養榮湯

人參　黃芪炙　當歸酒洗

芍藥炒　熟地黃　麥門冬去心

川芎　白朮炒各壹錢　五味子炒

炙甘草各伍分

水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食遠服

黃芪六一湯　常服終身可免癰疽實治渴補虛之要劑也

綿黃芪去蘆六兩用淡鹽水拌蒸焙乾　甘草壹兩一半生一半炙

每劑壹兩水貳鍾煎捌分食遠服　或為細末每服貳錢早晨日午白湯調服　加人參尤妙

七味白朮散　治胃氣虛或因尅伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

白朮　茯苓去皮　人參各壹錢

甘草炙伍分　木香貳分半　藿香葉伍分

葛根壹錢　右為細末每服叁錢白湯調下

竹葉石膏湯　治癰疽胃火盛而作渴

淡竹葉　石膏　桔梗

木通　薄荷　甘草炙

右各等分水煎服

玄參散　治癰疽或嘔吐不能下食心煩口乾煩渴飲水多四肢羸瘦

玄參　黃連去鬚　犀角屑

麥門冬去心　赤芍藥　白陳皮各壹錢

升麻柒錢半　火麻仁　川朴硝

川大黃剉炒各壹兩半

右剉每服叁錢水壹中盞入生地黃壹分細切同煎至陸分去滓不拘時溫服

葛根散　治癰疽肺熱口乾煩渴或小便赤澁

葛根　黃芪　升麻

麥門冬去心　瓜蔞根　赤芍藥

梔子仁　生地黃各壹兩　黃芩柒錢半

甘草生伍錢

右剉每服肆錢水壹中盞煎至陸分去滓無時溫服

乾葛飲　治發背作渴

黃芩　朴硝各伍錢　乾葛壹兩

右剉散每服叁錢用水壹盞入竹葉十片白毛煎同煎不拘時服

忍冬丸　治渴疾既愈預防發疽先將忍冬草入瓶

內後入無灰酒微火煨一宿取出曬乾少加甘州
俱為末又以所浸餘酒調糊丸如梧桐子大每服
陸柒拾丸溫酒下[illegible]諸變
桑枝方大治口渴取嫩桑枝細切壹升炒以水叁升
煎壹升日服五七劑更多尤妙[illegible]療風痺
乾燥脚氣四肢拘攣上氣眼暈久服補肺消
食利小便輕身聰明令人光澤其功不能盡述
薛氏曰桑枝補血氣生津液輕身明目補肺腎之
良劑也
五味子湯 治腎水枯涸口燥舌乾

黃芪[illegible] 人參[illegible] 五味子
麥門冬[illegible] 粉甘草[illegible]
每服伍錢水煎日夜服五七劑
薛氏曰此方乃六[illegible]設之後分滋化源之
良劑若腎水[illegible]渴[illegible]作渴者須佐
以加減八味丸
加減八味地黃丸
懷慶地黃[illegible]
乾山藥 山茱萸肉

五味子[illegible] 牡丹皮 白茯苓
澤瀉[illegible] 肉桂[illegible]
右各另為末入地黃和勻[illegible]丸如梧桐子大每
服柒捌拾丸空心食前白湯下
李氏曰[illegible]貴人病渴不安[illegible]作日飲水數斤[illegible]
用前方者[illegible]大矣[illegible]此藥若能止渴[illegible]不復
腎矣仍用木瓜烏梅百藥煎等湯愈甚不得已用
此[illegible]口渴止又服氣血益壯飲食加倍

嘔

嘔證精要 大嘔逆有[illegible]

散伏熱在心一證謂氣虛脾氣不正其伏熱在心者
與內托散[illegible]者宜[illegible]不散有寒熱宜正氣
散無與山藥丸以補腎[illegible]衝上嘔穢皆
觸於火內托[illegible]之理若嘉禾散補力
已少徒溫煖以動火耳山藥丸[illegible]以壯下焦之陰
自為近理然[illegible]須[illegible]後隨[illegible]作毒氣上攻
治之[illegible]作陰虛[illegible]遺後嘔逆
不食者宜[illegible]白朮[illegible]隨時隨證
加減恐用山藥丸緩急未易得力河間謂瘡瘍嘔者
濕氣侵胃也藥中宜倍加白朮

瘡瘍作嘔不可泥於毒氣內攻而槩用敗毒等藥
如熱甚焮痛邪氣實也仙方活命飲解之作膿不潰
胃氣虛也托裏消毒散補之膿成焮脹氣血虛也先
用托裏散後用針以泄之焮痛便秘熱結於內也內
疏黃連湯導之若因寒藥傷胃而嘔者托裏健中湯
胃寒少食而嘔者托裏益中湯中虛寒淫而嘔者托
裏溫中湯肝木乘脾上而嘔者托裏抑青湯胃脘停
痰而嘔者托裏清中湯脾虛自病而嘔者托裏益黃
湯鬱結傷脾而嘔者托裏越鞠湯若不詳究其源而
妄用攻毒之藥則腫者不能潰潰者不能斂矣丹溪

又曰腫瘍當作毒氣攻心治之潰瘍當作陰虛治之
亦大率如此今之瘍毒內攻而嘔者多脾胃虛寒
而嘔者多宜調脾胃而致然也　人曰欲嘔作嘔者
外搽內服寒涼或痛甚或感寒邪穢氣而嘔者胃氣
虛也托裏消毒散去芍藥加藿香木香
熱或作嘔因寒涼之藥致傷者托裏溫中湯若不欲熱
脈沉弱只以五香連翹湯　丹溪曰熱盛脈數若腫
瘍在臟府秘而體實者猶可與也若潰瘍膿出多
熱盛脈數去死為近豈可下乎殺弱之脈古人以
為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

李氏云嘔逆乃毒氣衝心乃脾胃之冷當服內
托散楊氏云舅甥初愈不曾長汗毒在經絡則背發
大疽自背下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥投
之終夜大嘔連進內托散嘔止瘡潰赤水淋漓四十
日而愈又有患癰者痛過徹嘔服此即止今有瘡疽
不服此藥者故引楊氏之言以釋世人之惑
丹溪治一老人年七十患背疽徑尺餘已經與五香
十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自服
內托散腦中不安且素有淋病三十年今所苦者淋
之痛與嘔吐不得睡而已急以參芪歸朮煎湯下牛

膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥二斤小便通思食七
日後盡藥四斤膿自涌出而得睡又與前藥而安　一
男子年六十餘性好酒肉背瘡見脈洪逆發熱嘔其
得內托十宣多矣膿似泥淋瀝不散中加丁香以
溫胃行氣時七月大熱脈洪數有力予因謂此證
在潰瘍尤忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲之盡
藥十五斤竹百餘竿而安予曰此病幸安也不淡味
必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左
脇傷生一軟塊如餅一年後潰發為本人且膿血
淋漓而脈洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入

竹瀝飲之又十餘片自落而安又一人十歲患錠如
瘡此病內以托里氣血為專服人參竹瀝而愈若與
內托十宣恐不能有此之安全也　婁全善治一男
子腫瘍悶亂嘔藥不止用獨參湯一服嘔即愈
薛新甫治一人腹癰焮痛煩躁作嘔脈實河間云瘡
瘍者火之屬須分內外以治其本若脈沉實者先當
疏其內以絕其源又云嘔噦心煩脈沉而實腫硬木
悶或皮肉不變邪氣在內宜用內疏黃連湯治之遂
用前湯通利一二行諸症悉去更以連翹消毒散而
愈　一人患腎癰飲冷作嘔服化毒消毒藥愈甚以

涼膈散二劑煩躁更以四物湯加芩連四劑而消
薛新甫又治一人年踰四十患發背已潰忽嘔而瘡痛
胃脈弦緊彼以為餘毒內攻東垣云嘔吐無時手足
厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後發嘔不食者濕氣侵
於內也又云膿出而反痛此為虛也今胃脈弦緊木
乘土位其虛明矣欲以六君子湯用酒炒芍藥砂仁
藿香治之彼自服護心散嘔愈甚復邀治仍用前藥
更以補劑月餘而愈大抵嘔氣內侵或感穢氣
而作嘔者必喜溫而脈弱熱毒內攻而作嘔者必喜
涼而脈數必須辨認明白

茯苓半夏湯　治脾胃虛弱嘔吐不下食不知味
橘紅　半夏（薑製各一錢）　蒼朮（米泔浸炒）
白朮（炒）　厚朴（薑製）　甘草（炙）
茯苓　人參　澤瀉
芽穀（各一錢）　薑汁（數匙）
水二鍾煎八分入薑汁煎一二沸作十餘次飲之
薛氏曰前證七惡中之五惡也用此方後胃氣將
醒宜用六君子湯兼服之亦有煩躁飲冷不食脈
沉實而嘔者恐不可用此宜內疏黃連湯（方見前）
加減托裏消毒散　治瘡瘍欲作膿或外搖內膿

寒涼或瘡瘍為藥所傷或感寒邪秋冬而嘔者胃氣虛也去
白芷連翹金銀花加參朮藿香（方見潰瘍）
托裏健中湯　治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲
食少思或作嘔瀉等證
人參　白朮　茯苓（各二錢）
半夏　炮薑（各一錢）　炙甘草（五分）
黃芪（一錢五分）　肉桂（三分）
右薑棗水煎服
托裏益中湯　治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散
或潰而不斂

人參　白朮　陳皮
半夏　茯苓　炮薑各壹錢
木香　炙甘草各伍分
右薑棗水煎服

托裏抑青湯　治脾土虛弱肝木所傷以致飲食少思或胸膈不利等證

人參　白朮　茯苓
半夏各壹錢　芍藥　柴胡
甘草各伍分　陳皮壹錢
右薑棗水煎服

托裏清中湯　治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參　白朮　陳皮
茯苓各壹錢　半夏捌分　桔梗柒分
甘草伍分　右薑棗水煎服

托裏益黃湯　治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或嘔吐泄瀉等證

人參　白朮　陳皮
茯苓　半夏各壹錢　炮薑
丁香　炙甘草各伍分
右薑棗水煎服

托裏越鞠湯　治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參　白朮各貳錢　陳皮
半夏各壹錢　山梔　川芎
香附子　蒼朮各柒分　炙甘草伍分
右薑棗水煎服

人參理中湯　治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或胸膈虛痞飲食不入

白朮　人參　乾薑
甘草各等分　右薑棗水煎服

○痛

夫瘡瘍之證候不同寒熱虛實皆能為痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒可以止痛殊不知因病制宜自有活法故因熱而痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也因寒而痛者以溫熱之藥熨其寒則痛自除也因風而痛者除其風因濕而痛者除其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡澀滯者利之憂愁者遂志酒飲之盡之

者乳香沒藥止之大抵癰疽不可不痛不可大痛若大痛悶亂者危　薛新甫云瘡瘍之作由六淫七情所傷其痛也因氣血凝滯所致假如熱毒在內便秘而作痛者內疏黃連湯導之熱毒壅盛焮腫而作痛者黃連解毒散治之不應仙方活命飲解之瘀血凝滯而作痛者乳香定痛散和之作膿而痛者托裏消毒散排之膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之若因氣虛而痛四君加歸芪血虛而痛四物加參芪腎虛而痛六味地黃丸口乾作渴小便頻數者加減八味丸此皆止痛之法也

托裏消毒散加減法　若高腫焮痛熱毒也加黃連漫腫微痛氣虛也去金銀花連翹加參朮　腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲　膿出反痛氣血虛也去金銀花連翹白芷加參芪歸地　漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也去三味加人參白朮如不應加薑桂更不應急加附子

癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用黃芪人參湯

黃芪人參湯

人參　蒼朮米泔浸炒　白朮炒

陳皮　麥門冬去心　當歸酒拌

神麯炒　甘草炙　五味子搗碎

黃芪炙貳錢　黃檗炒　升麻各肆分壹錢

作一劑水貳鍾薑三片棗貳枚煎捌分食遠服

薛按前證七惡中之二惡也宜此方治之亦有潰後虛而發熱或作痛少寐尤効若痛少止大便不實黃檗麥門冬可不用蓋恐寒中也凡瘡膿潰之後若脈洪大則難治自利者不治

癰疽大痛不止宜用加味解毒湯

加味解毒湯

黃芪鹽水拌炒　黃連炒　黃芩炒

黃檗炒　連翹　當歸酒拌各柒分

甘草炙　白芍藥　梔子仁炒各壹錢

作一劑水貳鍾煎捌分服之藥下痛即止

按此方若脈洪大按之有力者用此解之其功甚捷亦有便秘脈實而痛者宜用內疏黃連湯下之若潰而反痛者宜用內補黃芪湯補之

內補黃芪湯

黃芪鹽水拌炒貳錢　熟地黃酒拌　人參

茯苓　甘草炙各五分　芍藥炒

溫

川芎　官桂　遠志去心炒

當歸酒洗各捌分　麥門冬去心伍分

作一劑水壹鍾半薑叁片棗貳枚煎至柒分食遠服

當歸和血散　治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦人產前產後腹痛

當歸貳錢　乳香半錢　沒藥半錢

白芍藥叁錢

右為細末每服叁錢水壹中盞煎至柒分和滓溫服日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木香婦人服之加赤芍藥

廻瘡金銀花散　治瘡瘍痛甚已發紫黑者

金銀花連枝葉用四兩　黃芪肆兩

甘草壹兩

右㕮咀用酒壹升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時辰取出去滓頓服之一方無黃芪

郭氏定痛托裏散　治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣充實先用疏利後服此藥

粟殼去蒂炒貳兩　當歸　白芍藥

川芎各半兩　乳香　沒藥

桂各叁錢

右㕮咀每服伍錢水煎

乳香止痛散　治一切瘡腫疼痛不止

粟殼陸兩　白芷叁兩　甘草炙

陳皮各叁兩　乳香　沒藥各壹兩

丁香半兩

右㕮咀每服六錢水一盞半煎

乳香黃芪散　治一切惡瘡癰疖發背疔瘡疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗膿不假刀砭其惡肉自下及治打撲傷損筋骨疼痛

黃芪　當歸　川芎

麻黃去根節　甘草　芍藥

人參去蘆　粟殼去蒂炒　乳香另研

沒藥各另研　陳皮

右為細末每服叁錢水一盞煎至柒分去柤溫服如瘡在上食後在下食前服之

人參內托散　治瘡瘍潰膿而作痛者

人參　黃芪　當歸

川芎　厚朴　防風

桔梗　白芷　官桂

紫草　木香　甘草

右入糯米壹撮水煎服

乳香丸 治發背及一切瘡腫疼痛不可忍

乳香別研 沒藥別研 羌活

五靈脂 獨活各叁錢 川芎

當歸 真菉豆粉 交趾桂

川白芷 白膠香各半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯送下手足損痛不能起者加草烏用木瓜鹽湯送下

乳香定痛散 治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香 沒藥各伍錢 滑石

寒水石煅另研 冰片壹錢

右為細末搽患處痛即止 敷藥中加南星半夏能止痛更加蓖麻仁尤佳

豆豉餅 治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅為末唾津和作餅子如錢大厚如叁文置患處以艾壯於餅上灸之乾則易之如背瘡用漱口水調作餅覆患處以艾鋪餅上灸之如未成者即消已成者亦殺其大毒如有不効氣血虛敗也

乳香膏 治諸瘡疼痛久不瘥

乳香別研 食鹽 松脂

杏仁去皮尖各壹兩半 生地黃取汁 豬脂臘半斤

黃蠟叁兩

右先取豬脂入鐺下杏仁地黃汁蠟煎候臘熔盡入香鹽松脂煎以柳篦攪令勻稀稠得所磁盒盛 瘡上日三度

又乳香膏

木鱉子去殼 當歸各壹兩 柳枝

油肆兩煎令黑色去滓後

乳香 沒藥各半兩

白膠香研細煎淨者用綿濾同研細入

右煉藥鐵銚內令極淨再傾油藥在內候溫入黃丹壹兩半以兩柳枝攪令稍稍再上火煎不住手攪候滴在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水中出火毒搜成劑收之

敗院使云有不傳藥將大痛傳即不痛有不傳藥不痛傳之則痛蓋瘡熱風濕并憂怒等氣積而內攻則痛不禁用藥拔出之故不痛也死血陰毒在中愈伏愈深愈不覺痛藥合之於外故反痛也

○出血

治瘡瘍出血因元臟之氣虛火動而錯經妄行

凡當求其經審其因而治之若肝熱而血妄行者四物炒梔丹皮芩朮肝虛而不能藏血者六味地黃丸心虛而不能主血者四物炒連丹皮茯苓棗仁脾虛熱而不能統血者四君炒梔丹皮若脾經鬱結用歸脾湯加五味子脾肺氣虛用補中益氣加五味子氣血俱虛用十全大補陰火動用六味丸加五味子大凡失血過多見煩熱發渴等證勿論其脈急用獨參湯以補氣經云血生於氣苟非參芪歸朮甘溫等劑以生心肝之血決不能愈若發熱脈大者不治此患血症者當以犀角地黃湯為主　翰林屠漸山年四十患

九十

濕毒瘡疾誤用輕粉之劑耗損元氣久不能愈一日將[illegible]之際忽[illegible]脈忽洪數而有力余曰何服脈之如此侵晨發出瘀血三四碗體倦自汗雖甚可畏所喜血黯而脈靜余曰此輕粉之熱血受其毒而妄行輕粉之毒亦得以泄邪氣去而真氣虛也當急用獨參湯主之余重其為人體恤甚篤但惑於他言不果致邪氣連綿不已惜哉　一人背瘡出血煩躁作渴脈洪大按之如無此血脫發躁用當歸補血湯二劑少愈又以八珍加黃芪山梔數劑全愈　一婦人潰後吐鮮血三碗許余用獨參湯而血止用四君子[illegible]

[illegible]此血脫補氣陽生陰長之理也若用寒涼血降火沉陰之劑脾土生氣復傷不惟血不歸源而死無疑矣　一老婦手大指患疔為人針破出鮮血手背俱腫半體皆痛神思昏憒五日矣用活命飲始知痛在手勢雖甚不宜大攻再用大補劑又各一劑外用隔蒜灸此手背赤腫而出毒水又各一劑赤腫漸潰又用托裏藥而瘥　南儀部賀朝卿陞山西少參別將余見其發熱面黑目赤搔背問其故曰有一小瘡耳余診之脈洪數此非背患敗壞為不治之證余素恐其然也其後不便篤然遂托其僚友張

九十一

東沙堂施留之一盞頃大補但出瘀血虛極也或謂毒熾不能為膿乃服攻毒藥一鍾以致嘔逆脫果卒於南都　一儒者患背瘡腰患漸潰而入房脈洪數兩尺更大余辭不治將發用其子強留頃間吐臭血五六碗余意此腎經虛火而血妄行血必從齒縫出將合肉桂等補陰制火之藥各用罐別煎熟聽用血止拭齒視之果然遂令一鍾冷服之熱渴頓止少頃溫服一鍾脈細欲脫氣息奄奄得藥則脈少復良久仍脫其子疑內有膿欲刺之余曰必無乃以[illegible]經內果如余言次日脈脫胸爽全[illegible]

若大小便腹如潰膿如濃熱已將完彼因傷者將交
婁久患小便不通此陰已痿而思色以降其精精內
敗不出而然耳用加減八味丸料加參芪白术一劑
小便雖愈瘡口不斂而歿
東垣聖愈湯　治諸惡瘡血出不止以寒水石細末
摻之正止或瘡時間作黑色不可潰此藥力太盛
抑紅和如血出多而心煩不安不得眠睡此亡血
也此湯主之
熟地黃　生地黃 各二錢　當歸身 酒拌各壹錢
川芎 貳錢　黃芪 二錢　人參 叁分

右㕮咀都作一服水壹盞半煎至壹盞去滓稍熱
服無時 按此方參芪宜蜜炙熟地宜酒拌
濟生犀角地黃湯　治胃火血熱妄行吐衂或大便
下血者
犀角 鎊末　生地黃　赤芍藥
牡丹皮 各壹錢半　升麻　黃芩 炒各壹錢
右水煎熟入犀角末服
若因怒而致加山梔柴胡若脾氣虛而不能攝用
歸脾湯若肝脾火動而妄行用加味逍遙散若脾
氣虛而不能統用補中益氣湯加炮黑乾薑若血

虛有火而妄行用四物加炒梔若腎經虛火而血
妄行用六味丸料不應急加肉桂以引虛火歸源
獨參湯　治一切失血或膿水出多血氣俱虛惡寒
發熱作渴煩躁盖血生於氣故血脫補氣陽生陰
長之理也用人參貳兩棗拾枚薑拾片水煎徐徐
服
托裏消毒散加減法　膿多帶赤血虛也去金銀花
連翹白芷三味加歸地參术如不應兼用八珍湯
加牡丹皮　忿怒搐搦而出血肝火血虛也去三
味加牡丹皮炒黑山梔熟地如不應兼用八珍湯

送六味丸　面青脇脹而出血肝氣虛而不能藏
血也去三味加山茱山藥五味子如不應兼六味
丸　食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去
三味加參术歸地兼思慮少寐更加遠志酸棗仁
茯神龍眼肉如不應皆用歸脾湯
○瘡僵肉
一例治背瘡肉長夾皮不斂裂見風即成殭以寒水石
燒研為細末傳瘡上再用銅綠細末上之肉即不作
殭矣
○瘡中急痛除入腹

圖經云方療惡瘡癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神効

○咽喉口舌生瘡

精要犀角膏　治咽喉口舌生瘡昔有一貴人因疽而生此證醫者以為心臟絕盡皆辭退愚進此藥一日而安

真琥珀研　生犀角各[illegible]　辰砂研

茯神[illegible]　真腦子[illegible]　人參去蘆

酸棗仁去皮炒研各[illegible]錢

右人參茯神犀角為細末入乳鉢內別研藥味和勻用蜜搜為膏子以瓷瓶收貯俟其疾作旋服皆彈子大以麥門冬去心濃煎湯化服一日連服五服取効此方濃湯不宜用

○大便秘結

許東垣先生云瘡瘍既發深內嘔噦心逆發熱而煩脈沉而實腫硬木悶大便秘結此毒在臟宜疎通之及曰疎通其內以絕其源又曰瘡瘍及諸病面赤雖伏火見不得妄攻其裏為陽氣怫鬱邪氣在經宜發

者[illegible]之故曰火鬱則發之凡大便不通飲食雖多[illegible]不脹切不可通若腹痞脹而不通者乃直腸乾涸也宜用豬膽汁導之若腸胃氣虛血澀而不通者宜用十全大補湯培養之若瘡症屬陽或因入房傷腎而不通者宜用前湯加薑附回陽多有得生者經云腎開竅於二陰藏精於腎津液潤則大便如常若潰瘍有此因氣血虧損腸胃乾涸當大補為善設若不分虛實而一於疏利者鮮有不誤　一人仲夏患發背黯腫尺餘皆有小頭如鋪黍狀四日矣此真氣虛而邪氣實也遂隔蒜灸服活命飲一劑其邪頓退乃

純補其真又將生脈散以代茶飲瘡邪大退余因他往三日復視之飲食不入中央死肉大便祕結小便赤澀余曰中央肉死毒氣盛而脾氣虛也大便不通腸虛而不能傳送小便赤澀脾虛而火下陷治療難矣彼始云[illegible]然乃急用六君子加當歸[illegible]金[illegible]乃[illegible]一男子[illegible]毛裏[illegible]麥

門（云云）而潤月餘仍結燥於人言乃服潤腸丸而瀉不止余用補中益氣湯送四神丸數服而止

潤腸丸　治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸通之若結在直腸宜豬膽汁導之若腎虛火液閉竭於二陰宜補腎水滋潤大便自通若泄液不足脾氣虧損必當培補脾胃以滋化源

麻子仁（一兩）　桃仁（去皮尖研）　羌活

當歸尾　大黃（各五錢）　皂角刺

秦艽（各五錢）

右各另研為末煉蜜或豬膽汁丸桐子大每服叁

肆拾丸白湯下若使豬膽汁導之而不結燥宜補元氣

一大便瀉利

大便泄瀉或因寒涼剋伐脾氣虧損或因脾氣虛弱食不尅化或因脾虛下陷不能升舉或因命門火衰不能生土或因腎經虛弱不能禁止或因脾腎虛寒不能司職所主之法若寒涼傷脾用六君加木香砂仁送二神丸脾虛下陷用補中益氣送二神丸命門火衰用八味丸料送四神丸腎虛不禁用五味子散加吳茱萸五味脾腎虛寒用參附湯送四神丸

病機云脈沉而細身不動作睛不了了飲食不下鼻準氣息者參附湯主之身重四肢不舉者參附湯主之仲景先生云下痢腸鳴當溫之脈沉遲者亦當溫之大孔痛當溫之心痛當救裏可與理中湯附子四逆輩精要云癰疽嘔瀉腎脈虛者不治此發內經之微旨也凡此實難治之症如按前法治之多有可生者　一婦年踰四十背疽不起發泄瀉作嘔食少厥逆脈息如無屬陽氣虛寒用大補湯加附子薑桂不應再加附子二劑瀉愈更以大附子薑桂各參錢參芪歸朮各伍錢作一劑服內始熱嘔瀉乃止手足

漸溫脈息隨復更用大補而潰再用托裏而斂十年後仍患脾胃虛寒而歿

加減托裏消毒散　治飲食少思腸鳴腹痛腹冷泄瀉乃脾氣虛寒也去金銀花加炮薑木香手足逆冷脾血虛寒也更加附子煎送四神丸

和氣散　治癰疽潰後氣虛滑泄四肢逆冷

蒼朮（米泔浸一宿切片炒黃色）　甘草（炙）

青皮（去白）　良薑（炒）　肉桂

乾薑（炮各）　陳粟（炒）

右七味為末每服參錢用炒陳香末半錢粗和溫

泄瀉下不拘時（此症非有濕熱氣下陷者所宜）

四神丸　治脾腎虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

肉豆蔻　五味子（各貳兩）　補骨脂（肆兩）

吳茱萸（湯浸炒壹兩）

右為末別以水貳椀生薑捌兩煮紅棗壹百個熟爛去皮核用和末為丸桐子大每服伍柒拾丸空心食前白湯下

二神丸　治脾腎虛寒不思飲食或食後發五更泄瀉或飲食少思大便不實其功甚効如不應乃命門火衰急服八味丸補火而生土

破故紙（肆兩炒）　肉豆蔻（貳兩生用）

右為末用大紅棗肆拾枚生薑肆兩水煮熟去薑取棗肉和藥丸如桐子大每服伍拾丸空心鹽湯送下

○小便淋悶頻數

按瘡瘍小便淋瀝頻數或莖中澀者腎經虧損之惡症也宜用加減八味丸以補陰足脛逆冷者宜用八味丸以補陽若小便頻而黃者宜用四物湯加參朮麥門五味以滋肺腎若小便短而少者宜用補中益氣加山藥麥門五味以補脾肺若熱結膀胱而不利者宜用五淋散以清熱若脾氣燥而不能化者宜用黃芩清肺飲以滋陰若膀胱陰虛陽無以生者宜用六味丸若膀胱陽虛陰無以化者宜用滋腎丸腎虛之患多傳此症非滋化源不救若用黃蘗知母反瀉其陽以速其危若老人陰痿思色精內敗莖中痛而不利者用加減八味丸加車前牛膝不應更加附子多有復生者若精已竭而復耗之大小便中牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛以前藥加附子亦有復生者王太僕云無陰則陽無以化無陽則陰無以生當

滋其化源苟專用淡滲復損其陰乃速其危也　職方王荊塘背疽潰後小便淋瀝或時自遺作渴引飲煩熱不寐瘡口焮赤時或如灼時或便遺余曰此腎虛之惡症用加減八味丸加麥門數劑而痊　駕部林汝玉冬不衣綿作渴飲冷每自喜壯實哂余衣綿診其脈數大無力余曰子火令當求余也三月間果背熱便悶脈澀用四物加黃連山梔數劑大便稍和却去黃連加參朮茯苓二十餘劑及前丸半斤許渴減六七背熱亦退至夏背發一疽純用托裏之劑而痊

托裏消毒散加減法　瘡中痛而小便不利精內敗
也去連翹白芷金銀花三味加山茱萸山藥澤瀉
如不應佐以六味丸　愈便則愈痛愈痛則愈便
精復竭也去三味煎送六味丸　食少體倦口乾
飲熱小便黃短脾肺虛熱也去三味加五味子山
茱萸如不應暫用六味丸　勞役而小便黃元氣
下陷也去三味加升麻柴胡　午後小便黃短腎
虛熱也去三味加升麻柴胡煎送六味丸

黃芩清肺飲　治肺經陰虛火燥而小便不通若因
脾經有熱當清其脾若因心火尅肺當制其心

黃芩各錢　梔子去殼打碎

右水煎服

滋腎丸　治腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等
證凡不渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥
經云無陰則陽無以化若脾肺燥熱所遺當滋其
化源

知母　黃蘗各酒炒　肉桂貳錢

右為末水丸如梧桐子大每服百丸空心白滾湯
下

五苓散　治下部濕熱瘡毒小便赤少

澤瀉　豬苓　肉桂
白朮　赤茯苓

右為細末每服貳錢熱湯調下

清心蓮子飲　治膀胱氣虛濕熱下淋痛或莖竅
澀滯口苦咽乾小便色赤或白濁夜安靜而晝發
熱

黃芩　麥門冬　地骨皮
車前子　炙甘草各壹錢半　石蓮肉
白茯苓　黃芪　柴胡
人參各壹錢

右水煎服

五淋散　治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如
沙石或如膏汁或熱沸便血

赤茯苓壹錢　赤芍藥　山梔各貳錢
當歸　甘草各壹錢五分

右用燈心貳拾根水煎服

清肺飲　治渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水
生化之源宜用此藥以清化源其水自生而便自
利矣

茯苓貳錢　豬苓叁錢　澤瀉

琥珀　　瞿麥各伍分　　通草陸分

木通　　萹蓄各柒分　　車前子壹錢

燈草□□分

右爲細末每服伍錢水煎服

腎氣丸　治腎經陽虚陰無所化以致膀胱淋瀝或脾肺氣虚不能通調水無所化而膀胱癃閉或腎氣虚熱于於厥陰之絡陰挺痿痺而溺頻數或腎水虚弱陰虧難降使津液敗濁而爲痰水又治腎虚便血及諸見血發熱自汗盜汗等症之聖藥也

即六味地黄丸

琥珀散　治諸般瘡瘍表裏有熱小便赤澁

白茯苓　　黄芩　　茵陳

紫草　　瞿麥　　茅根

石韋　　烏藥　　琥珀

連翹　　車前子各等分

右爲極細末每服弍錢用燈心湯調下不拘時

候

瞿麥散　治癰疽發背排膿止痛利小便

桂心　　赤芍藥　　當歸

黄芪　　川芎　　瞿麥

白歛　　麥門冬[illegible]

右㕮咀每服[illegible]酒煎溫服如消毒已潰未潰瘡中膿血不絶[illegible]加細[illegible]白歛黄芪[illegible]

○頭痛眩暈

托裏消毒散加減法　初腫頭痛[illegible]加川芎羌活若外邪在表[illegible]

毒散　頭痛[illegible]

體倦頭痛或[illegible]中氣虚也去[illegible]味加[illegible]

麻如不應暫用補中益氣湯加蔓荆子[illegible]

痛或眩暈陰血虚也去三味加熟地黄如不[illegible]

以六味丸　夢泄遺精頭暈頭痛或痰喘氣促脾虚不能納氣也去三味倂川芎佐以六味丸如不應大虚寒也用八味丸

○煩躁

托裏消毒散加減法　面目赤色煩熱作渴脉大而虚血脱發躁也去三味加黄芪當歸如不應暫用當歸補血湯　身熱惡衣欲投於水脉沉微細與脱發躁也去三味加肉桂附子如不應暫用附子理中湯

○自汗盜汗

托裏消毒散加減法　昔思慮損傷無寐盜汗脾血虛也去三味加茯苓遠志酸棗仁龍眼肉如不應暫用歸脾湯　寢寐而汗出腎氣虛也去三味加五味子煎送六味丸　飲食而汗出胃氣虛也去三味加參芪歸朮五味子如不應暫用六君子湯　睡覺飽而出盜汗宿食也去三味加參朮半夏如不應暫用六君子湯

○多痰

托裏消毒散加減法　胸滿多痰脾氣虛也去三味加桔梗半夏如不應暫用六君子湯加桔梗枳殼

晡熱多痰脾血虛也去三味加歸地參朮如不應暫用六君子湯加芎歸熟地　咳嗽唾痰腎虧津液泛上也去三味加山茱萸山藥熟地如不應佐以六味丸

○喘急

癰瘍喘急恍惚不得臥此心火刑肺金宜用人參平肺散

人參平肺散

桑白皮炒　知母各八分炒　杏仁去皮尖炒

地骨皮　紫蘇　橘紅

半夏製　茯苓　青皮

人參各七分　五味子　甘草各五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按此方理氣消肺化痰之劑若肺熱作渴脈洪數有力者宜用若無發熱作渴脈洪數有力者宜用解表散此證火剋金爲惡候而亦者亦不治

○胸痞

托裏消毒散加減法　忿怒胸痞肝氣滯也去三味加桔梗山梔如不應暫用補中益氣湯加桔梗枳殼　倦怠胸痞中氣虛也去三味加參朮茯苓如不應暫用八珍湯加柴胡

○目斜視上

癰疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤肝挾火邪宜用瀉青丸

瀉青丸方

當歸酒拌　川芎　山梔仁炒

羌活　草龍膽酒拌炒　防風

大黃各等分酒拌

右爲細末煉蜜丸雞頭實大每服一丸煎淡竹葉湯化下日進二三服如瀉去大黃加荊芥或用黃

連瀉心湯一二劑亦可

薛按前症七惡中之二惡也若肝脉弦緊洪數者最當亦有目視不正睛不瞭瞭脉微或浮者乃真氣虛也宜用大補之劑夫瀉青者瀉肝經之火邪也肝屬木其色青故耳

四肢沉重

胃苓湯

蒼朮米泔浸炒貳錢　厚朴薑製　陳皮

甘草炙　白朮炒各壹錢　茯苓壹錢

澤瀉　木香　白芍藥炒各壹錢

官桂伍分　淡竹葉貳拾片

作一劑水貳鍾薑參片棗貳枚煎八分食前服

按前證七惡中之五惡也服而若脾氣醒濕氣除宜用參苓白朮散之類多服恐耗損津液

參苓白朮散

人參　茯苓　白朮炒

蓮肉去心　縮砂仁炒杵　薏苡仁炒

山藥炒各貳　桔梗炒　甘草炙

白扁豆去皮薑汁浸炒各壹兩

右為細末每服貳錢用石菖蒲煎湯調下

○寒熱往來

托裏消毒散加減法　因苦寒熱往來肝火血虛也去三味加柴胡熟地　因怒寒熱往來肝火氣虛也加柴胡黃芩如不應暫用八珍湯加炒山梔炒酸棗仁酒炒黑乾薑草　體倦寒熱往來肝脾氣滯也去三味加參芪歸朮如不應暫用補中益氣湯　內熱晡熱或寒熱往來陰血虛也去三味加芎歸牡丹皮柴胡如不應暫用八珍湯加牡丹皮　畏寒或寒熱往來胃氣虛也去三味加參苓白朮升麻如不應暫用補中益氣湯　脇痛痞滿或

寒熱往來肝氣滯也去三味加青皮木香如不應屬氣血虛也更加芎歸參朮　若婦人勞役恚怒或適經行發熱[illegible]寒熱往來[illegible]乃熱入血室也去三味加生地丹皮柴胡如不應暫用加味四物湯

○厥逆

加減托裏消毒散　治四肢逆冷乃腎氣虛寒也去三味加桂附仍佐以八味丸

○面目浮腫

雖症[illegible]斷色取[illegible]黃赤面目浮腫宜用[illegible]朮散

加味白朮散方

白朮炒　茯苓各貳錢　陳皮

白芍藥炒　檳榔　澤瀉各壹錢

木香五分

作一劑水貳鍾薑三片煎捌分食後服如腫不退

加白朮炒　枳實麩炒各壹錢

薛按前症乃七情所傷用此方治之若除氣少退用六君子湯參苓白朮散之類中人但不宜尤効再用檳榔木香恐傷其氣也亦有真氣虛而致前症者尤不宜用二藥

○陽氣脫陷

薛按陽氣脫陷或因克伐之劑或因膿血大泄或因吐瀉之後或因誤行入房[illegible]補[illegible]或滑數便血目赤煩喘自汗發熱[illegible]頭[illegible]體倦熱渴意欲飲水投水惡寒[illegible]揚手擲足汗出如水[illegible]反張[illegible]骨不[illegible]此無根虛火之假熱症若[illegible]痛咳逆嘔吐[illegible]聾目[illegible]小便[illegible]泄瀉[illegible]利[illegible]或表[illegible]腹痛[illegible]短縮冷汗時出[illegible]收[illegible]或[illegible]身痛或[illegible]此陽氣脫陷之真寒[illegible]皆勿論其脈勿論其症但見一二急用參

附子湯[illegible]之多有復生者大凡潰後勞役元氣虧損或房[illegible]精[illegible]或滑數便血或外邪乘之或誤用寒涼氣血[illegible]而致斯症治以前藥亦有復生者　內翰楊[illegible]下[illegible]血[illegible]夏[illegible]形[illegible]之[illegible]二[illegible]自餘[illegible]漫腫堅硬重如負石[illegible]以六[illegible]加砂仁二劑[illegible]此脾虛陽氣脫陷劑用溫[illegible]久[illegible]不食仍用前藥作大劑加附子[illegible]又不應遂以參芪各[illegible]斤[illegible]半斤[illegible]服三日而盡[illegible]流[illegible]頓止[illegible]肉[illegible]再用[illegible]等藥托裏健脾腐脫而瘡愈矣　少參史南湖之內

夏患[illegible]不起發[illegible]大而無力[illegible]發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不實喘促時嘔脈微細按之如無惟太衝不絕仍以參芪白朮當歸茯苓陳皮[illegible]斤[illegible]加附子[illegible]一服[illegible]諸症[illegible]而漸[illegible]仍用前藥[illegible]劑後[illegible]日用[illegible]而消　一婦[illegible]十三年[illegible]下[illegible]一塊[illegible]腫[illegible]如[illegible]外[illegible]用涼藥一劑不解[illegible]用[illegible]劑加[illegible]紅[illegible]之[illegible]後[illegible]作[illegible]之劑膿潰[illegible]惡寒[illegible]膿清偶

檢外科發揮發背門云若初起一頭如黍不腫不赤煩躁便秘四五日間生頭不計其數瘡口各如含一粟名曰蓮房發六七日始該為惡症治法雖詳不詳於行逆辟宜參芪涼解散氣血兩虛者急之連投參芪歸朮地黃薑附大劑補益脾胃倘兼經烏金膏數日果腐落筋如脂膜者數片人參每服用捌錢日進二服逾兩月乃平復

附子理中湯　治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子　人參　茯苓　[illegible]

白芍藥各叁錢　白朮肆錢　右水煎服

薑附湯　治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

人參　附子[illegible]　乾薑炮

白朮各伍錢　右作一劑水煎服

參附湯　治失血過多或潰瘍大膿或寒涼汗下真陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症急服以救元氣緩則不治

人參[illegible]　附子[illegible]伍錢

右薑五片水煎服不應倍之

內癰

素問曰肝滿腎滿肺滿皆實即為腫[illegible]肺之癰喘而兩胠滿[illegible]肝癰兩胠滿臥則驚不得小便　腎癰脚下至小腹滿[illegible]

[illegible]

胃脘癰人迎脈逆而盛[illegible]

辨臟府內瘡

中府隱隱痛者肺疽　其上肉微起者肺癰

巨闕隱隱痛者心疽　其上肉微起者心癰

期門隱隱痛者肝疽　其上肉微起者肝癰

章門隱隱痛者脾疽　其上肉微起者脾癰

京門隱隱痛者腎疽　其上肉微起者腎癰

中脘隱隱痛者胃疽　其上肉微起者胃癰

天樞隱隱痛大腸疽　其上肉微起大腸癰

丹田隱隱痛三焦疽　其上肉微起三焦癰

關元隱隱痛小腸疽　其上肉微起小腸癰

懷忠丹　治內癰有敗膿臭血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下血

白芷　單葉紅蜀葵花根各[illegible]兩

白蘞 白芍藥各五錢
右研為末鎔黃蠟丸如梧子大空心米湯下[illegible]
凡推損下血出盡後服十宣散補之忌發物[illegible]
[illegible]
肺癰 丹溪云[illegible]發於內者肺癰肝癰腎癰[illegible]
內癰附[illegible]須先解表分表而出之
千金[illegible]為肺癰若口中欬即胸
中隱痛脈反滑數此肺癰也。 問曰病者欬逆何以
知其肺癰當有膿血吐之則死其脈何如曰寸脈微
而數微為風數為熱微則汗出數則惡寒風中於衛

呼氣不入熱過於營吸氣不出風傷皮毛熱傷血脈
風舍於衛其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫
時時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米粥
始萌可救膿成則死 問曰[illegible]寸脈滑數其
人飲食起居如故此為[illegible]治之
不應何以知有膿[illegible]何以別知其[illegible]假
令[illegible]在胸中者為肺癰[illegible]數[illegible]米
成其脈自數緊去但數為膿已成也 [illegible]
臟之[illegible]也處於胸中主於氣候於皮毛[illegible]
[illegible]不畜外邪所乘內感於肺或入房[illegible]

損虛火上炎或醉酒炙煿辛辣厚味薰蒸於肺或咳
唾痰涎上下過度重亡津液之所致也其候惡風咳
嗽鼻塞項強胸脇脹滿呼吸不利咽燥作渴甚則四
肢微腫咳唾膿血[illegible]胸中隱隱
微痛右手寸口脈數而實者為肺癰[illegible]而無
膿脈數而虛者為肺痿也若咳嗽喘急者小青龍湯
咳嗽胸脹者葶藶大棗瀉肺湯咳膿腥濁者桔梗湯
咳喘短氣或小便短少者佐以參芪補肺湯體倦食
少者佐以參朮補脾湯咳唾痰壅者腎虛水泛也六
味地黃丸口乾咽燥者虛火上炎也加減八味丸此

症皆因脾土虧損不能生肺金肺金不能生腎水故
始萌則可救膿成則多死若脈微緊而數者未有膿
也緊甚而數者已有膿也內經曰血熱則肉敗榮衛
不行必將為膿大凡肺瘡咳唾膿血久久如粳米粥
者難治若唾膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自
止者自愈其脈短而澀者自愈面色當白而反赤者
此火之剋金皆不可治[illegible]有生
者但恐專攻其[illegible]脾胃益虛鮮有不誤者矣
丹溪治一少婦胸膺間潰一竅[illegible]口中所咳相
通而出以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈一云此

因肺癰所致。一項彥章治一人病胸膈壅滿，昏不知人。項以杏仁、薏苡之劑灌之，立甦。繼以升麻、桔梗、黄芪消其膿，服之踰月瘳。項所以知其病者，以陽明脉浮滑，陰脉不足也。浮為火，而滑為血聚，始由風傷肺，故結聚客于肺。陰脉之不足，則過于宣逐也。諸氣本乎肺，肺氣治則出入易，菀陳除，故行其肺氣而病自已。 汪石山治一婦，年近三十，形色瘦白，素時或咳嗽一兩聲，月水或前或後。夏月取凉，遂咳甚，不能伏枕者月餘。嗽痰中或帶血，或兼膿，求治。因吐食，醫用芩連、二陳，不效，反用參芪等補氣，病重。汪視左脉浮滑，右脉稍弱而滑，初傷于腕，常不能伸，右脉似難憑矣。乃以左脉驗之，恐妊兼肺癰也。遂以清肺排膿之劑進之，二服而能著枕，痰不吐膿，不咳，惟時或惡阻。汪曰：此妊之常病也。教用薏苡仁、白术、茯苓、麥冬、黄芩、阿膠煎服，病減。月餘復為診，脉皆稍緩而滑，因然已減矣，但吐紅太多，未免傷胃，教用四君子加陳皮、黄芪、枳殼煎服調理。妊至六月，食雞病作，卻雞而愈。至九月病又復作，聲啞，令服童便，後安。汪曰：產後病除，乃是佳兆；病若復作，非吾所知。月足而產，脾胃病作，如竟不救。 薛立齋治一儒者患肺癰，膿流滿

涌咳唾膿血，胸膈作脹，此風邪外傷也。先用消風散加亂髮灰，二服而鼻利。又用四君加芎歸及桔梗湯而愈。後因勞役咳嗽吐膿，小便滴瀝，面色黄白，此脾土不能生肺金，肺金不能生腎水也。用補中益氣湯、六味地黄丸而愈。 一儒者因素飲咳膿，項強皮膚不澤，此脾肺氣虛，外邪所乘而成肺癰也。先用桔梗湯，後用人參補肺湯而痊。 一男子咳唾痰膿，胸腹膨脹，兩寸與右關脉皆洪數。此火不能生土，而土不能生金也。用桔梗湯為主，佐以補中益氣湯而愈。 一人不時咳嗽，作渴自汗，發熱便數。自用清肺降火理氣滲利之劑，服之反小便不通，面目赤色，唇裂痰壅。脾肺腎三脉浮大，按之而數，此足三陰虧損，不能相生，當滋化源，否則成肺癰矣。彼仍用分利之藥，後果患肺癰。余用桔梗湯及六味丸而愈。 一男子面赤吐膿，發熱作渴，煩躁引飲，脉洪數而無倫次。先用加減八味丸加麥門、人參，服之渴頓止，即熟睡良久，覺而神爽，索食。再劑諸症頓減，仍用前藥，更以人參伍錢、麥門貳錢伍分、五味子一錢，水煎代茶飲，日一劑，月餘而安。此證面赤者當補肺腎，面白者當補脾肺，治法詳論之。 一婦素血虛，發熱咳嗽，或用痰火

先解表次取汗斂補裏

之劑後吐膿血面赤脉數甚為甚危此膿成而血氣虛也余用八珍湯以補元氣用桔梗湯以治肺症脉症漸愈　一婦感冒風寒或用發表之劑反咳嗽喘急飲食少思胸脇不利大便不通右寸關脉浮數欲用通利之劑余曰此因脾土虧損不能生肺金若更利之復耗津液必患肺癰矣不信仍利之虛證悉至後果吐膿乃朝用益氣湯夕用桔梗湯各數劑吐膿漸止又朝仍用前湯夕用十全大補湯各五十餘劑喜其善調理獲愈　一婦咳嗽吐痰胸脇脹痛右寸關浮滑項下牽強此脾胃積熱成痰并癰患也以二

陳湯加山梔白朮桔梗治之而愈　一婦余血虛內熱時咳甲辰孟冬兩尺浮洪余曰當防患肺癰丙午孟春果咳嗽左右寸脉洪數此心火刑尅肺金而成肺癰也膿已成矣夏令可憂余用壯水健脾之劑稍愈彼不慎調攝果歿於仲夏

小青龍湯　治肺受風寒咳嗽喘急

半夏湯泡七次 貳兩半　乾薑炮　細辛

麻黃去節　肉桂　芍藥

甘草炙各叁兩　五味子蜜拌炒 貳兩

右每服伍錢薑水煎服

葶藶大棗瀉肺湯　治肺癰喘不得臥

葶藶炒黃研細丸如彈大　大棗拾貳枚

水叁升入棗先煮取貳升去棗入葶藶又煮壹升頓服之又曰治肺癰胸滿脹一身并面目浮腫鼻塞清涕出不知香臭酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞用前方三日一劑可至三四劑須先與小青龍湯一劑乃與之

桔梗湯　治欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗　甘草炙各壹兩

用水叁升煮取壹升去滓分溫再服則吐膿血也亦治喉痺三因甘草倍之每肆錢名四聖散千金亦名桔梗湯用桔梗叁兩甘草貳兩服後必吐膿血

葦莖湯　治肺癰又云　本治欬有微熱煩滿心胸甲錯

葦莖切 二升　薏苡仁半升　冬瓜仁半升

桃仁去皮 伍拾枚

用水壹斗先煮葦莖得伍升去滓入諸仁煮取貳升分溫五服當吐如膿 千金云肺癰當吐膿血 葦莖即下州間蘆荻之粗

治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入
男子髮灰研細入和之清米飲下可除根貝兩服
亦治吐血 [illegible]消風散方荊芥川芎羌活人參茯苓甘草防風藿香蟬蛻各貳錢厚朴陳皮各[illegible]
[illegible]

韋宙獨行方 治心胸甲錯為肺癰黃芩湯主之
[illegible]
用夜合皮掌大壹片水叁升煮取壹升分再服 [illegible]

右肺癰治要略以小青龍湯先與一劑乃行氣取膿之藥將以解表之風寒邪氣此治腫瘍之例也後以韋宙方終之者將以補裏之陰氣此治潰瘍之例也 [illegible]

如聖丸 [illegible] 治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰喘嗽唾膿血胸滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥穢久久咯膿狀如米粥

擣膠 [illegible] 牛黃 [illegible] 桔梗
甘草 [illegible]

為細末煉蜜丸每兩作貳拾丸每用壹丸噙化

濟生桔梗湯 治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澀 [illegible] 桔梗 貝母 川歸 [illegible] 瓜蔞仁 枳殼 薏苡仁 桑白皮 防風 已上各壹兩 甘草 杏仁 [illegible] 百合各半兩 黃芪壹兩半 右修事㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑伍片煎至捌分去滓服若大便秘加大黃小便秘加木通

仲景桔梗白散 治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 貝母 各三分 巴豆 [illegible] 壹分研

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一碗則定 [illegible]

肺癰膿潰元戎搜風湯吐之

牡丹散 [illegible] 治肺癰吐膿血作臭胸乳間皆痛

牡丹皮 赤芍藥 地榆
苦梗 薏苡仁 川升麻
黃芩 生甘草 各壹錢半

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服 一方無黃芩加生地黃名升麻湯

如金解毒散 治肺癰

桔梗壹錢 甘草壹錢半 黃連炒
黃芩炒 黃柏炒 山梔各柒分

作一劑水貳鍾煎捌分作十餘次呷之勿急服
𤁷按此方乃降火解毒之劑也發熱煩渴脉洪大者用之奇效若脉數咳痰腥臭或唾膿者宜用桔梗湯大抵肺癰之證肺脉洪大或吐膿不止者難治膿自止脉短澀者自愈面赤火尅金也不治

桔梗湯　治男婦欬而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰小便赤黄大便多澁

桔梗　貝母　當歸
瓜蔞仁　枳殼麩炒　薏苡仁微炒
桑白皮　防己去粗皮　甘草節各壹兩
百合蒸　黄芪　北五味子
甜葶藶炒　地骨皮　知母
杏仁各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑伍片煎柒分不拘時溫服咳者加百藥煎熱加黄芩大便不利加煨大黄少許小便澁甚加木通車前子煎煩躁加白茅根煎咳而疼甚加人參白芷煎

四順湯　治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心　紫菀去苗　桔梗炒各壹兩
甘草

右搗篩每服貳錢水壹盞煎至七沸去滓不拘時稍熱服如咳嗽甚加去皮尖杏仁叁枚同煎小兒量減

治肺癰方

右用薏苡仁為末糯米飲調下或入粥內煮吃亦可一方用水煎服當下膿血便愈

瀉白散　治肺癰

桑白皮　地骨皮　甘草炙
貝母去心　紫菀　桔梗
當歸　瓜蔞仁

作一劑水壹鍾半煎玖分食遠服
𤁷按此方乃瀉肺邪消毒之劑也若肺癰咳唾痰沫肺脉浮數者用之有效如脉大發熱作渴宜用排毒散解之而後用此劑若咳吐膿之際宜排膿如唾膿後及脉將安宜補肺初起胸脇脹[illegible]咳嗽宜發散表邪

濟生排膿湯　治肺癰得吐膿後以此排膿補肺

生綿黄芪貳兩細末每服貳錢水壹盞煎伍分服
[illegible]飲煎湯飲之

排膿散　治肺癰吐膿後宜服此補肺

黃芪鹽水拌炒　白芷　五味子炒杵

人參各等分

爲細末每服參錢食後蜜湯調下

寧肺湯　治咳嗽唾膿自汗上氣喘急用此補肺及

治榮衛俱虛發熱自汗

人參　當歸　白朮

熟地黃　川芎　白芍藥

甘草炙　五味子　麥門冬去心

桑白皮炙　阿膠　白茯苓各壹錢

作一劑水貳鍾薑參片煎捌分食後服

人參補肺湯　治肺症咳喘短氣或腎水不足虛火

上炎痰涎涌盛或吐膿血發熱作渴小便短澁

人參　黃芪　白朮

茯苓　陳皮　當歸各壹錢

山茱萸肉　山藥各　麥門冬去心柒分

甘草　五味子　熟地黃

牡丹皮　右薑棗水煎服

人參平肺散　治心火尅肺傳爲肺痿咳嗽喘嘔痰

涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利若因肝木太過而致

當補脾肺若因腎水不足而患當補脾肺若因心火

旺而自病當利小便

人參　陳皮　甘草

地骨皮　茯苓各壹錢　知母分

五味子　青皮　天門冬去心各分

桑白皮錢

右水煎服

參芪補脾湯　治肺症脾氣虧損久咳吐膿涎或中

滿不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參　白朮各貳錢　黃芪伍分

茯苓　陳皮　當歸各壹錢

升麻參分　麥門冬柒分　五味子肆分

桔梗陸分　甘草炙伍分

右薑棗水煎服

葶藶散　治肺癰咳嗽氣急眠卧不安心胸脹滿

甜葶藶子　貝母炒

白附子　北五味子炒　甘草節

羅參　款冬花　百藥煎

紫菀去木各壹兩　大硃砂

右爲末每服貳錢燈心湯調下

神肺散 治肺癰已吐出膿血以此潤護

真鍼乳粉壹兩 白滑石貳兩

右研細每服叁錢米飲調下

理肺膏 治肺癰正作咳嗽不利胸膈迫寒

訶子去核 百藥煎 五味子炒微

條參去蘆 款冬花蕊 杏仁

知母 貝母 甜葶藶子

紫苑 百合 甘草節各錢

右為末用白茅根淨洗秤叁斤研取自然汁入磁石器中熬成膏更添入好蜜貳兩再熬勻候調和

八

煎藥爲圓如梧子大溫水吞下

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香 木香 明乳香

丁香 藿香葉各半兩 白朮

羅參 白茯苓 薏苡仁

山藥 扁豆 桔梗

縮砂 白豆蔻 粉草

蓮肉各壹兩

右爲末每服貳錢鹽湯調空心服煎湯亦可有汗加浮麥煎湯下

肺癰已破入風者不治 肺癰吐膿後其脈短而濇者自痊浮大者難治其面色白而反赤者此火之剋金皆不可治

金匱方論曰熱在上焦者因欬爲肺痿肺痿之病何從得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者爲肺痿之病若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此爲肺癰欬唾膿血脈數虛者爲肺痿數實者爲肺癰 書肺痿屬

八

熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此屬陰虛火熱甚是也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾用炙甘草乾薑此屬寒也肺痿吐涎多心中溫液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治之故肺痿又有寒熱之異也

積勞傷血氣腠理虛而風邪乘之内盛於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胸脇脹滿久久不瘥已成肺痿也 保肺癰者由食啖辛熱炙煿或酣飲熱酒燥熱傷肺所致治之宜早

腸癰 千金謂妄治必殺人腸癰爲病小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀其脉數者小有膿也巢云洪數者巳有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或繞臍生瘡或膿從臍出或大便出膿血　脉經問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脉滑而數滑則爲實數則爲熱滑則爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血爲敗濁小腹痞堅小便或澁或自汗出或復惡寒膿爲已成設脉遲緊則爲瘀血血下則安

丹溪云腸癰大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯加

連翹秦艽　㕍腸癰因七情飲食所致治法脉遲緊者未有膿也用大黃湯下之脉洪數者巳有膿也用薏苡仁湯排之小腹疼痛小便不利膿壅滞也牡丹皮散主之若大便或臍間出膿者不治　内經曰腸癰爲病不可驚驚則腸斷而死故患是者其坐臥轉側理宜徐緩時少飲薄粥及服八珍湯固其元氣静養調理庶可保全其生　丹溪治一女子腹痛百方不治脉滑數時作熱腹微急因痛病脉當沉細今滑數此腸癰也以雲母膏一兩丸梧子大以牛皮膠溶入酒中并水下之餉時服盡下膿血愈　一婦以毒藥去胎後當臍右結一塊痛甚則寒熱塊與臍高一寸痛不可按脉洪數謂曰此瘀血流溢於腸外肓膜之間聚結爲癰也遂用補氣血行結滞排膿之劑三日決一鋒針膿血大出內如糞狀者臭甚病婦恐因謂氣血生肌則內外之竅自合不旬日而愈　呂滄洲治郡守李母龐病小腹痛衆醫皆以爲瘕聚久藥不効呂診循其少陰脉如刀刃之切手胞門乱而數知其陰中痛癰結小腸也告之曰太夫人病在幽隱不敢以聞幸出侍人語之乃出老婦呂曰苦小腸癰以故臍下如瘕聚今膿已成痛迫于玉泉當不得前後

溲溲則痛甚嫗拜曰誠如公言遂用國老將軍爲向導麒麟竭虎珀之類攻之膿自小便出應手愈　呂又治一小兒十二歲患內癰腹脹臍凸而頗銳醫欲刺臍出膿其母不許請呂視之見一僧擁爐熾炭然銅筋一枚烈火中瞪目視翁曰此兒病癰發小腸苟舍刺臍無他法呂諦思之曰臍神闕也針刺所當禁癰舍於內惟當以湯丸攻之苟如而言必殺是子矣僧怒遽而出呂投透膿散一匕明日膿自氣合潰纔以十奇湯下萬應膏丸而瘥　虞恒德治一人得潮熱微似瘧似小腹右邊有一塊大如雞卵作痛右脚

不能伸縮一醫作奔豚氣治十餘日不驗虞診其脉
左寸芤而帶濇右寸芤而洪實兩尺兩關俱洪數曰
此大小腸之間欲作癰耳幸膿未成猶可治與五香
連翹湯加減與之間以蜈蚣炙黃酒調服之三日愈
　儒醫李生治一富家婦有疾診之曰腸胃間有所
苦耶婦曰腸中痛不可忍而大便從小便出諸醫皆謂
古無此證不可治李曰試爲之若服我之藥三日
當瘳下小丸子數十丸煎黃芪湯下之下膿血數升
而愈其家喜問治法李曰始切脉時覺芤脉見於陽
部脉訣云寸芤積血在胸中關內逢芤腸裏癰此癰
在內所以致然所服者乃雲母膏爲丸耳切脉至此
可以言醫矣　薛己治通府張廷用患之兩月餘矣
時出白膿體倦惡寒此邪氣去而中氣虛也乃用托
裏散兼益氣湯徐徐呷之又令以豬肚肺煮爛取其
湯調米粉煮粥呷半盞後漸調理而痊　一男子裹
急後重下膿脹痛此脾氣下陷用排膿散蠟礬丸而
愈後因勞役寒熱體倦用補中益氣湯而安　一婦
人小腹脹痛小便如淋時時汗出此瘀血凝結於內
先以神効瓜蔞散二劑少愈更以薏苡仁湯而愈
一婦人小腹脹痛而有塊脉芤而濇此瘀血爲患也
以四物加玄胡索紅花桃仁牛膝木香二劑血下而
痊　一婦人小腹脹痛大便秘濇轉側有水聲脉洪
數此膿瘀內潰也以梅仁湯一劑下瘀血諸症悉退
再以薏苡仁湯二劑而瘥　一婦人膿成脹痛小便
不利脉洪數此膿毒內潰也服太乙膏三錢膿下甚
多更以瓜蔞散蠟礬丸及托裏散而安如用太乙膏尤妙
一婦人產後惡血不止小腹作痛服瓜子仁湯下瘀
血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化爲膿最爲
難治若流注關節則爲敗症

薏苡附子散　治身甲錯腹皮急如腹脹木無積聚
　身熱脉數者
　附子炮貳分　敗醬伍分　薏苡仁壹錢
右爲末每服方寸匕以水貳合煎頓服小便當下
丑因薏苡附子同前服將用壹兩貳分每四錢水
盞半煎七分去柤空心服
按此方乃辛熱之劑也若積久陰冷所致宜用丹
溪云身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身
無熱脉數此腸內有癰積久陰冷所致故金匱有
用附子溫之即此方也
牡丹湯　治腸癰小腹腫痞按之即痛小便如淋時

時發熱自汗惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當
有血洪數者膿已成不可下
牡丹皮　瓜蔞仁各壹錢　桃仁去皮尖
芒硝各貳錢　大黃伍錢
右作一服水貳鍾煎至壹鍾去滓入硝再煎數沸
不拘時服
按此乃破血之劑也如發熱自汗惡寒小腹作痛
小便如淋脉遲者有効丹溪云小腹腫痞按之痛
小便如淋或自調發熱身無汗復惡寒其脉遲緊
者膿未成宜下之當有血此內結熱所成也故金

匱有用大黃利之即此方也若無前證恐不宜用
亦有腹內脹痛脉滑數或膿已下或後重時時而
下宜用排膿散太乙膏蠟礬丸及托裏藥
薏苡仁湯　治腸癰腹中㽲痛煩毒不安或脹滿不
食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑
似間便可服
薏苡仁　瓜蔞仁各叁錢　牡丹皮
桃仁各貳錢
右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服
按此方藥品和平其功且速常治腹痛或發熱或

脹滿不食水道澀滯產後多有此證或月經欲行
或行後作痛尤效
牡丹散　治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿
牡丹皮　人參　天麻
白茯苓　黃芪　木香
當歸　川芎　官桂
桃仁去皮尖各七錢半　白芷　薏苡仁
甘草各伍錢
為細末每服叁錢用水壹盞煎至柒分食前溫服
梅仁湯　治腸癰裏急隱痛大便秘澀

梅核仁去皮尖九枚　大黃壹兩　牡丹皮壹兩柒錢半
芒硝貳錢半　冬瓜仁壹錢　犀角鎊壹兩半
右剉如麻豆大每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓
溫服以利下膿血三兩行為度
大黃湯　治腸癰少腹堅硬腫大如掌而熱按之則
痛其上色或赤或白小便稠數汗出增寒其脉遲
緊者未成膿如脉數則膿已成
大黃炒　牡丹皮　硝石研
芥子　桃仁去皮尖雙仁各壹兩
右剉碎每服伍錢水一盞半煎至一盞去滓空心溫

服以利下膿血爲度未利再服

四聖散一名神効瓜蔞散 治腸癰癰疽生於腦髭背腋孔便毒服之神効

生黄瓜蔞壹枚去皮 粉草肆錢研末 没藥叁錢研末

乳香壹錢研末

右用好紅酒貳大椀慢火煎至壹椀分作兩服兩日服盡大便順導惡物妙若乾瓜蔞則用兩枚一方若病在上食後服病在下食前服毒已結成卽膿化爲水毒未成卽於小便中出疾甚再合服以退爲度

郭氏瑞効丸 方見□□

雲母膏 治一切癰疽瘡癤折傷等證

蜀椒去目及閉口者微炒 白芷 没藥

赤芍藥 肉桂 當歸

臙花 菖蒲 麒麟竭

黄芪 白芨 芎藭

木香 龍膽草 白斂

防風 厚朴 麝香

桔梗 柴胡 松脂

人參 蒼朮 黄芩

乳香 附子 茯苓

良薑 合歡皮各伍錢 硝石

甘草 雲母各肆兩 桑白皮

槐枝 柳枝 柏葉

水銀以絹另包待膏成以丁細滯在上名養膏母 陳皮各貳兩

清油肆拾兩 黄丹

右除雲母硝石麒麟竭乳香没藥麝香鹽花黄丹八味另研外餘藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝不住手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥黑色爲度去柤再熬後入丹與八味末仍不住手以槐柳枝攪滴水中成珠不軟不硬爲度磁器收貯候溫將水銀彈上用時先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚大也

排膿散 治腸癰小腹脹痛脉滑數或裏急後重或時時下血

黄芪鹽水拌炒 當歸酒拌 金銀花

白芷 穿山甲蛤粉炒 防風

連翹 瓜蔞杵 甘草各壹錢

作一劑水貳鍾煎捌分食前服若膿將盡去穿山甲連翹加當歸川芎或爲末每服叁錢食後蜜湯

調下亦可

神仙蠟礬丸　治腸癰內托神妙不問老幼皆可服之無不効最止疼痛不動臟腑

黃蠟一兩黃色者　白礬二兩明者研

右溶化黃蠟和礬為丸如梧桐子大每服貳拾丸漸加至參拾丸食遠用溫酒送下

胃脘癰　素問帝曰人病胃脘癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃脉其脉當沉細沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃中而不行故胃脘為癰也

濟聖濟總錄云胃脘癰由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不得上升故人迎熱盛令人寒熱如瘧身皮甲錯或咳嗽或嘔膿唾血若脉洪數膿成也急排之脉遲緊瘀血也急下之否則其毒內攻腐爛腸胃矣丹溪先生云內疽者因飲食之毒七情之火相鬱而發用射干湯主之愚常以意苡仁湯牡丹皮散大乙膏選用之亦効若吐膿血飲食少思助胃壯氣為主而佐以前法不可專治其瘡　一男子寒熱作渴不時吐出口內血腥又五日吐膿身皮甲錯用射干湯四劑膿血已止但氣短體倦多以甘桔湯而愈　一男子用射干湯之類將愈但氣喘體倦發熱作渴小便頻數此肺氣不足用補中益氣加山藥山茱萸麥門五味時仲夏更以生脉散代茶飲而愈　一婦人素食厚味吐膿已愈但小便淋澀此肺腎氣虛用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈若膏粱之人初起宜用清胃散

射干湯　治胃脘癰人迎脉逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛　梔仁　赤茯苓去皮

升麻各壹兩　赤芍藥壹兩　白朮半兩

右為末每服伍錢水貳盞煎至壹盞去查入地黃汁壹合蜜半合再煎溫服不計時候

復元通氣散　治諸氣涩耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮　陳皮各肆兩　甘草炙生熟各半

穿山甲炮　瓜蔞根各貳兩　金銀花

連翹各壹兩　右為細末熱酒調下

芍藥湯　治胃脘積熱結聚為癰

赤芍藥　石膏　犀角鎊

麥門冬　[illegible]　木通各貳兩

朴硝　升麻　玄參

甘草（生，各壹兩）

右㕮咀，每服伍錢，水壹盞半，煎捌分，去滓，不拘時溫服。

[redacted]涼血飲　即引兵先鋒方，治心肺有熱，或作寒熱，口乾好飲水，渾身疼，腹內作熱，頭面赤色。

內托散　即兩鋒正將方，治同上，無用蜞角洗貼，已潰多服加味十奇散（方見[illegible]癰疽門）。

[redacted]八味丸　治腎虛嗜慾過度，外挾寒邪，發為癰腫，不可施以涼劑，宜服（方見消渴門）。

加味十奇散　治同上，無用葱白、楠葉、梂葉、豬蹄湯淋洗，仍貼金絲膏（方見腫瘍門）。

疔瘡

疔瘡者，以其瘡形如丁蓋之狀而得名，皆生頭面四肢，發黃疱，中或紫黑，必先癢後痛，先寒後熱。凡人一二日間惡寒發熱，四肢沉重，心悸眼花，頭疼體痛，稍異如常之證，須宜徧身尋認，如有小瘡與常患之瘡稍異，即是疔也。大抵起紫疱者多，起堆核者少；發於手上者多，發於別處者少。生兩足者多有紅絲至臍，生兩手者多有紅絲至腋，生脣面口內者多有紅絲入喉。以鐵刺瘡，不痛無血，是其候也。經云：膏粱之變，足生大疔。大抵多由恣食厚味，卒中飲食之毒，或感

四時不正之氣，或感蛇蟲之毒，或感疫死牛馬猪羊之毒，或人汗入肉而食之，皆生疔瘡，各宜審而治之。若嘔逆直視，譫語如醉者，不可治矣。又有內疔一證，與外疔之證大同，但瘡形不現，過數日間有一處腫起者，即是內疔所發之處。但腹痛甚者，便須作內疔治之，不可緩也，緩則殺人。　華元化云：疔有五色，屬五臟。紅屬心，發於舌根；青屬肝，發於目下；黃屬脾，發於口脣；白屬肺，發於右鼻；黑屬腎，發於耳前。以種類言之，千金方、外臺秘要、神巧萬全方皆稱一十三種，始不止也。　麻子疔，狀如麻子而稍黑，四邊微赤，多

疔尖痛忌食麻子油衣麻衣并入麻田中行穿麻布
人　火疔發於頂門或發於面身熱如火狀如湯火
燒灼瘡頭有黑靨四邊煙焰又如赤粟米忌火炙燒
鐵烙　脚疔生於脣四白　眉疔生於眉　髭疔生
於髭中　龍泉疔生於脣上　虎鬚疔生於脣下
魚尾疔生於眼角外　顴骨疔生於顴骨上亦名赤
面疔其狀色白頂陷如錢孔與有紫色者大凶　耳
疔生於耳中亦名黑疔沖腮赤腫　鼻疔生於鼻內
痛引腦門不能運氣鼻如大瓶黑色者不治　頰疔
生於面頰骨尖高處　氣疔形如氣泡感怒而生

腐疔色白有皰三日內頂陷狀如初灸瘡因夏月造
豆腐時人汗滴於內食之而生忌食豆腐　鬼疔因
中陰邪之毒而生　瓜藤疔延蔓無數忌瓜田中行
石疔皮肉相連堅鞕如石刺之不入肉微痛忌砭
碟　鹽膚疔大如匙面四邊皆赤有黑點如粟粒起
忌食鹹物　水洗疔狀如灸瘡或如錢孔瘡頭白裏
黑靨汁出而中顆極癢透骨亦則快然忌水洗渡河
及飲漿水　浮漚疔其狀圓曲少許不合長而狹如
薤葉大內黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛　三十
六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日

生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能
治未滿者可治俗名黑皰忌嗔怒蓄積愁恨　猪疔
形圓而小瘡口肉有油　羊疔形長而白色　牛疔
形圓而小瘡內無油皰起掐不破有寒熱　狗疔色
赤而長或帶尖與牛疔同無忌不殺人　驢馬疔其
狀三角頂上有黑點根脚有赤色或突起　水疔狀
如水泡因飲隔宿水而生忌飲水　臍疔生於臍
腸疔生於腸　刀鐮疔狀如薤葉長寸許肉黑如燒
烙忌刀鍼　暗疔生兩腋下而無頭但腋下堅鞕四
肢拘急寒熱大作陰囊腫痛睾丸附生突兀如疔寒

熱併作亦名暗疔　寸疔生下指骨節間　虎口疔
生合谷穴　魚臍疔狀如魚臍　茱萸疔中凹邊突
蛇眼疔頭黑皮浮形如小豆狀似蛇眼忌惡眼看
并嫉妬人見之及銅鐵器　紅絲疔一名血箭疔一
名赤疔一名紅演疔生於舌根下或生頭面或生手
足骨節間其證最急宜迎其經刺出惡血則愈稍遲
毒氣攻心嘔噦迷悶者救若絲近心腹者就於絲盡
處刺出惡血更挑破初起瘡頭以泄其毒　芝麻疔
走注不定徧身疼痛不能轉側　爛疔潰出膿水大
如匙面色稍黑有白斑忌沸湯熱食爛物　雌疔瘡

頭稍黄向裏黶亦似灸瘡四面皰漿起心凹色赤大如錢孔又有一枚在他處以衣嘆之則見大忌房事　雄疔其狀頭黑黶突起四畔仰皰漿起有水出色黄大如錢孔忌房事　黄疔有眼在皮發如齒齦之色手足麻木涎出不語者死　黑疔狀如黑皰　櫻桃疔狀如櫻桃　蛇頭疔生手指頭兩旁狀如虵頭其腥臟紫黑色痛引心有潰爛脫落者　足趾疔狀如粟米痒極入骨急隔蒜灸之　大抵如豆如目如箸筴如茱萸如石榴子或發疹搔或面青黄赤色汁出或衣物觸着而疼痛忽生或白而腫實或赤而浮

虛其狀不一初覺頂不起者急隔蒜灸之灸而有皰者吉無皰者凶服汗劑得汗則生無汗則死刺出紫血者危出黑血者死　緩者一日瘡頭皰色微白二日皰色大白三日色微紫四日色眞紫皆緩之候也　急者五日色微青小緊六日色深青大緊七日色黑其形如魚臍或如灸瘡之狀皆急之候也　凡生疔瘡身熱頭疼手足溫和飲食如常疔之四圍赤腫名曰護場可治　凡生疔瘡眼白睛凝不轉渴欲飲水內熱瘡盛唇舌青臥牀不能起五心腫頭暈眼花氣麤食不進脉伏譫語惡心腹痛冷汗出手足冷滑

泄無度疔之四圍無赤腫名曰不護場不可治　瘡證急者有應如生一疔之外別處肉上再生一小瘡即是有應可用鍼挑破護場瘡四圍有赤腫生多瘡者謂之滿天星飲食如常頭痛身熱手足溫　瘡證凶者無應別處肉上無瘡不護場疔四圍無赤腫腹痛甚者有內疔若毒入心腹眼黑如見火光煩悶嘔逆恍忽癡眼睛人不動赤脉貫睛胸膈赤腫瘡陷不起發皆死候也　凡疔瘡必有紅絲路急用鍼於紅絲所至之處出血及刺疔頭四畔出血若鍼之不痛或無血者以鍼燒紅頻烙患處以痛爲度若下部所

患多宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛則灸至痛若灸之而不痛者宜明灸之及鍼疔四畔出去惡血却以稜鍼深刺破疔頭瘡口用海馬拔毒散敷之或雄礬丹敷之待疔四圍發黄皰浮腫知痛爲佳若疔未發用火鍼四畔亂刺如有紅絲脉盡處亦以火鍼三向刺斷疔—·如此樣刺了即服藥若疔不痛不發者用艾火於疔瘡上灸之三壯候瘡發起黄皰發後方可貼膏藥凡疔瘡皆刺中心至痛又刺四畔令出惡血去血傅藥藥氣入鍼孔佳若不鍼透瘡內不得力也若起紫疱初然切不可鍼破服藥趕出皰自破

出血水為妙若服藥遲又不效以鈹針挑破無妨若起紫疱腫痛者以萬病解毒丸外塗内服若成膿不乾者以米醋調鐵鏽塗之自然凸出膿水即乾　多有患此不覺而藥攻者用燈照看徧身有小瘡即是疔毒宜灸瘡處候到更服敗毒藥并追疔奪命湯若肉疔之證用化毒丸置舌上含化出涎或只用蟾酥一粒重者二粒置病人舌上含化化後良久用井水漱去涎為妙若牙關緊急及喉内患者並宜含蟾酥丸或朱墨丸良久用井水漱去更宜服二丸少停又服二丸又服奪命丹或雄黄丸通利一行得利為

度又用霹靂火汗之再用前藥調之或初生一箇次生二箇逐漸流注者急將初生者用鐵筒拔毒膏點破消蝕惡肉即不流注却以油捻蘸退土蜂房皂角刺各另燒存性等分白礬減半為末捻之以平瘡口此即前所謂三十六疔者也其為臍疔瘡頭深黑破之黄水淡出四畔浮浆其毒甚須用前法及服萬病解毒丸以清心行血　治法表實者宜解表以荊防敗毒散追疔奪命湯初發之時必發熱身疼此乃毒氣在表故發汗則毒從毛腠而出　裏實者宜攻裏以救命追黄湯連翹攻裏散表證皆罷毒氣入裏

口渴便秘毒在内也故攻裏則毒從臟腑而出　表裏俱實者宜解表和裏以化毒消腫和裏散加紫河車獨脚蓮紫金藤苔花子其證發熱身疼口渴便秘乃表裏俱見故攻發並用也　腫勢盛脉浮數者宜散之蟾酥丸返魂丹　毒勢盛脉沉實者宜下之奪命丹萬病解毒丸　無表裏證服敗毒消毒藥後以復元通氣散加麝香少許　虚弱人以五香連翹湯合十宣散稍虚者只以人參敗毒散[illegible]之藥[illegible]宜[illegible]　疔毒旋出用金銀白芷散十宣散調理未潰者不須此藥　初發惡寒發熱或拘

急或頭疼或寒熱交作或肢體重痛或大便秘結宜以敗毒散加防風荊芥連翹黄芩木香金銀花天花粉大黄生地黄若無惡寒但發熱者可服坊癰消毒散十神散萬金散若表證皆罷毒氣入裏者可用雄黄丸　怯弱之人不可用峻利藥攻之宜隔蒜灸五十壯以人參敗毒散數劑若生道遠位僻之處非峻利則藥力不到若以峻利則胃氣先傷虚虚之禍有所不免不若灸之為宜　疔瘡四畔紅赤漸散開闊走亂不止此名疔瘡走黄宜以通聖消毒散通利兩三行次去大黄朴硝調理而愈或解毒消癰散亦

可用之有效此宜作瘴氣治之紅點沒　疔瘡腫硬脈
數煩躁喜冷口渴便秘宜以連翹攻裏散宜服次用
蟾酥丸若兼有表邪者以荊防敗毒散加金銀花天
花粉大黃連翹脈實有熱更加黃連黃芩或只加苦
花千退熱治瘴之妙藥也　若因刺割瘡死牛馬豬
羊昏悶身冷遍體俱有紫泡此疔毒也急灸泡處良
久蘇醒即以人參敗毒散加防風荊芥投之　若忽
然惡寒作嘔肩臂麻木手心瘙癢遂昏悶不自覺知
但有一泡此疔毒也急灸五十壯而甦又五十壯知
痛投以荊防敗毒散而愈古人謂眾效多是疔毒急

宜證照遍身若有小瘡紫泡與常者別是急灸其瘡
但足胸腹溫者可救　若因開割瘴死牛馬豬羊之
毒或食其肉致發疔毒或在手足或在頭面或在胸
腹或在脇肋或在背脊或在陰胯或起紫泡或起堆
核腫痛創人發熱煩悶頭疼身痛骨節煩疼先用天
馬奪命丹次用四神丸解毒消瘴散次以七神散又
以萬病解毒丸坊瘴消毒散無服末淋丸汗用祛瘴
散多用毛屎梯根磨水服或仙人薯根磨水服如不
燥熱酒服大熱不退者宜用退熱消毒飲又要以疏
瘴散頻作不使沾傳人以洗瘴散淋洗次以制瘴散

塗制若成瘡以拔疔散拔之好膏藥貼之　若患疔
瘡始初不覺不曾用前法出汗過數日外證皆罷或
在胸腹之間或在胸之下腫起此乃毒氣入裏所致
用霹靂火治之若服當歸散外證不解者亦急用霹
靂火發散　若疔瘡在兩脇間毒氣欲奔心乃危急
之證也可急於瘡尖上用艾炷灸三五壯仍於灸穴
前後左右鍼出少血灸瘡四圍有泡起吉無泡凶若
疔在虛軟不便處不可用鍼只可用松鍼法針斷紅
絲路若生兩胯間毒氣欲奔腎者用松鍼法於兩胯
紅絲路盡處針斷出血若生頭面上者可於項間紅

絲路盡處針斷出血若各處紅絲路亦有不現者亦
可以消毒用松針法針之凡用松針者蓋因紅絲路
不現無可下針故用此法於項下脇下股胯虛軟之
處針斷紅絲路不使毒氣攻心攻腎而已　若手足
厥冷六脈俱絕者此毒氣已深氣血爲毒氣所併不
能通流故體冷而脈不見宜木香流氣飲連進數服
氣血通流脈自回矣然後依法治之萬不失一　內
疔之證與外疔雖同亦發寒熱頭疼身痛但瘡形不
現不過數日胸背腹脇頭面手足間或有一處腫起
即內疔所發之處急用霹靂火如前不獲場汗法於

腫處出汗若身體實熱雖未有腫起但腹痛甚者便
須作內疔治用後法治之不可緩也　治內疔蟾酥
須於取時用桑柴小鉄大入蟾酥攪和得所丸如珍
珠大陰乾用
治驗　張嗣伯嘗聞屋中呻吟聲曰此勞甚重乃往
視之見一老姥稱體痛而處處有黯黑無數張還煮
斗餘湯送令服之服訖痛勢愈甚跳投牀者無數須
臾所黯處皆拔出釘長寸許以膏塗瘡口三日而復
云此名釘疽也　瀟識甫曰丙午歲予居吳歲人多
患疔瘡縣尹黃公曾以今歲患疔瘡者極多貧民

無力醫治近於史侯處得敗毒方用之者無不效官給
藥錢君嘗捨藥治之遂諾其論轉公榜示通衢命予
施藥如此一年全活甚眾其用保生錠子千金托裏
散神聖膏藥破棺丹凡四方　郭氏治一婦年近六
十右耳下天聰穴間患一疔瘡其頭黑靨四邊泡起
黃水時流渾身麻木發熱譫語時時昏沉六脈浮洪
用烏金散汗之就以鈹針走刺瘡心不痛周遭再刺
十餘下紫黑血出方知疼痛就將寸金錠子紝入瘡
內外用提丁錠子放於瘡上膏藥貼護次日汗後精
神微爽却用破棺丹下之病即定其疔潰動後用守

効散貼塗紅玉錠子紝之八日其疔自出矣茲所謂
審脉證汗下之間治以次第如此視彼不察脉證但
見發熱譫語便投涼藥與下或兼以香竄之藥遂致
誤人者徑庭矣　薛己治一婦左手指患疔麻癢寒
熱惡心左半體皆麻脈數不時見曰凡瘡不宜不痛
不可大痛煩悶者不治今作麻癢尤其惡也用奪命
丹二服不應又用解毒之劑麻癢始去乃作腫痛薛
曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄乃針之諸證
頓退又用解毒之劑而瘡　蘇庠從傅學後患疔
紅絲至腕惡寒發熱勢瀕不治與奪命丹一服紅絲

頓消又用和解之劑大勢已退後又服敗毒藥發渴
發熱紅絲仍見脉浮大而虛此氣血受傷而然以補
中益氣湯主之而愈蓋奪命既服瘡邪已散而復用
敗毒之劑是誅伐無過失內經之旨矣　一儒者患
疔元氣素弱薛補其氣血出膿而愈後因勞役瘡痕
作癢乃別服敗毒散一劑以致口噤舌強手足搐搦
痰涎上涌自汗不止此氣血復傷而復痙也用十全
大補加附子一錢灌服而甦　一男子患疔服奪命
湯汗不止瘡不痛熱不止便不利此汗多亡陽而真
氣傷矣用參芪歸朮芍防五味二劑諸證悉退惟以

小便不利為憂薛曰汗出不利小便汗止則陽氣復而自利矣仍用前藥去防風加麥冬倍用黃芩當歸四劑而便行瘡潰而愈　表甥居富右手小指患疔色紫或云小瘡針刺出血敷以涼藥掌指腫三四倍黯而不痛神思昏憒煩躁不寧此真氣奪而邪氣實也先以奪命丹一服活命飲二劑稍可薛因他往或遍刺其手出鮮血碗許罷延臂腕腫大如瓠手指腫數倍不能潰薛用大劑參芪歸朮之類及頻灸遍手而腫漸消但大便不實時常泄氣此元氣下陷以補中益氣加骨脂肉蔻吳茱五味大便實而氣不泄又

日以人參伍錢麥冬參錢五味貳錢水煎代茶飲之又用大補藥五十餘劑而漸愈此證初若不用解毒之劑後不用大補之藥欲生也難矣　一人年二十脣患疔四日矣有紫脈自瘡延至口內將及於喉薛曰此真氣虛而邪氣實也若紫脈過喉則難治矣須針紫脈併瘡頭出惡血以泄其毒則可乃別用解毒之劑頭面俱腫求治甚篤薛曰此日之言不誣矣診其脈洪數按之如無口內腫脹針不能入為砭面與脣出黑血碗許勢雖少退略進湯終至不起　都憲張恒山左足指患之痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯

即能行步欲速愈或用涼藥敷貼遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血毒氣得解腳底通潰腐筋爛肉甚多將愈誤用生肌藥反助其毒元氣虧損而不能愈薛治以托裏藥喜其稟實客處三月餘方愈大凡疔患於肢節灸法有回生之功設投以涼劑收斂腠理隧道壅塞邪氣愈甚多致不起若毒未盡驟用生肌輕者久增潰爛甚者必致危亡　一男子足指患疔作焮痛亦用隔蒜灸人參敗毒散加金銀花白芷大黃一劑痛止又用十宣散加天花粉金銀花大黃數劑而愈　灌陽傅公為曆門亥金

臺有婦人以羊毛徧鬻於市忽不見継而都人身生泡瘤漸大痛死者甚眾瘤內有羊毛道人傳一方以黑豆蕎麥為粉塗擦毛落而愈名羊毛疔

荊芥敗毒散方見肺癰加菊花莖葉鮮者搗汁入藥尤良

治疔瘡

黃連	羌活	青皮
白殭蠶	防風	獨活
蟬蛻	細辛	赤芍藥
甘草節	獨腳蓮各等分	

右㕮咀每服伍錢先將[illegible]服入澤蘭葉少許薑拾

錢重同擂爛熱酒和服然後用酒水各半盞煎至[illegible]
片煎服病勢退減後再加大黃少許煎服瀉下一
二行蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上拔
去根脚

二活散

羌活　獨活　當歸
烏藥　赤芍藥　金銀花
連翹　天花粉　甘草節
白芷各[illegible]錢半　紅花　蘇木
荊芥　蟬蛻　乾葛各叁錢

檀香貳錢

右爲細末每服叁錢煎蒼耳湯調下

奪命丹　治疔瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥[illegible]　硃砂水飛　輕粉伍分
枯礬　寒水石[illegible]　銅綠壹字
麝香[illegible]　海羊[illegible]

右件爲細末將海羊另研爲泥和藥一處丸如菉
豆大如丸不就加好酒成之病輕者壹丸重
者叁丸未效再服服時嚼葱白一大口極爛置手
心放藥丸於葱內裹合以熱酒送下暖處臥取汗
出爲效忌永水薛氏銅綠麝香沒藥乳香各壹錢

返魂丹[illegible]　治十三種疔

硃砂　膽礬[illegible]　血竭
銅綠　蝸牛生用　雄黃
枯白礬[illegible]　輕粉　沒藥
蟾酥各[illegible]　麝香[illegible]

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥爲細末同研和丸如雞
頭大每服壹丸令病人先嚼葱白叁寸吐在手心
將藥丸裹在葱白內用熱酒壹盞吞下如重車行
五里許有汗出即瘥如不能嚼以研爛裹下極効

又返魂丹　經云汗之則瘡已必用此藥汗之

乳香　沒藥　辰砂
雄黃[illegible]　輕粉　片腦
麝香各伍分　海羊[illegible]　蟾酥
青黛　粉草　硼砂[illegible]

右爲細末用海羊搗爛爲丸如難丸加酒麪糊些
少丸如彈子大每服壹丸無生葱嚼三箇細嚼
嚥下疔腫及癰腫毒氣入腦者得微汗即解一
方加銅綠寒水石輕粉枯礬各壹錢重

飛龍奪命丹　治疔[illegible]癰疽附骨疽一

切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛
已成者服之立愈此乃惡症藥中至寶嶮危者服
之立可矣萬無一失此乃家傳之秘方一生受用
不敢輕洩神速之驗即愈立效

輕粉　膽子　麝香各壹錢
血竭　膽礬　寒水石各壹錢
蟾酥酒化　乳香　沒藥
辰砂　銅綠　雄黃
蝸牛

右爲細末先將蝸牛連殼研爛如泥和前藥爲丸如
菉豆大如丸不就入酒打麵糊爲丸每服貳丸先
用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將
藥丸裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避
風處以衣蓋覆之約人行五里之久再用熱酒數
杯以助藥力發熱大汗出爲度
初覺貳丸即消如汗不出重者再服貳丸汗出即
効三五日病重者再進貳丸即愈如疔瘡走黃過
心者難治之汗出冷者亦死矣如病人不能嚼葱
擂碎裹藥丸在內熱酒送下瘡在上食後服瘡在
下食前服服此藥後忌冷水黃瓜茄子油豬雞魚

肉濕麫一切發風發瘡等物不可食之又忌
婦人洗換狐臭等人後中此瘡者犯之多矣

走馬赴筵丹　治疔瘡
沒藥　乳香　硼砂
硇砂　雄黃　輕粉各貳錢
片腦壹分　麝香少許
右爲細末蟾酥汁和爲丸如菉豆大每服壹丸溫
酒送下

救生丹　治諸種疔瘡眼內火…昏迷不醒
右於三月取日…葉用竹針穿成孔用紙
裹封固陰乾至端午日…細末用蟾酥和爲丸
如小豆大用時…以雄黃同藥…丸研細放舌中
汗出効
右奪命返魂等方皆蟾酥雄朱等攻毒之藥非發
汗藥也而能發汗者乃…從腠理而出爲
汗故也

羅氏破棺丹　治瘡毒入腹危者
大黃　甘草　芒硝各壹兩
右爲細末煉蜜丸如彈子大每服…丸食後溫酒化
下或童溺半盞研化之忌冷水

又破棺丹 一方有當歸川芎赤芍藥金銀花紫花地丁宜選用之

山梔　牽牛末　大黃各壹兩

甘草 炙二錢

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

內托連翹散 疔瘡出時皮色不變及不疼痛後搐不動身發寒熱便是此瘡有名疔瘡紫燕疔火疔諸般疔瘡如瘡黃於黃上用針刺仍服內托散自然消散

連翹　白芷　生地黃

赤芍藥各壹錢　大黃　黃芩

薄荷葉各柒錢　朴硝貳錢　黃芩去心半兩

甘草

右爲麤末每服五錢水盞燈心竹葉煎柒分其人喘加人參少許大病只與肆服愈如服了心煩嘔用不二散止之

甘草半兩　菉豆粉壹兩

右爲末分作貳服酸漿水下

奪命丹 治疔瘡大便秘實不通者或心腹痛者

巴豆去殼　大黃各壹錢　鬱金

雄黃　乳香各伍分　硃砂

黃丹各伍分　輕粉貳分　麝香少許

蜈蚣多少不拘

右末麪糊爲丸如菉豆大隨虛實服之茶清送下伍柒丸至玖丸止以利爲度如無此丸以雄黃丸代之

雄黃丸 治證如前

巴豆拾肆粒　麝香少許　全蠍

牙皂　雄黃　大黃

鬱金各壹錢

右末米糊丸如菉豆大硃砂爲衣每服伍柒丸茶清送下以利爲度

追毒丸

海浮石燒赤醋淬柒次半兩　乳香

沒藥各壹錢　巴豆　川烏壹兩

右爲末醋糊丸如桐子大若患二三日服拾丸五六日服拾肆丸隨病上下服之先喫冷酒半盞或壹盞又用冷酒吞下如嘔吞之不妨出藥服之病人大便不動再用參丸如疔有得端的不破用頭垢留患處後服藥

五聖散 治疔瘡

皂角鍼 炒 大黃
金銀花 生用 甘草節 各壹兩
右㕮咀用好酒貳升同煎至一升分二次服不拘時溫
服
奪命返魂散 治一切疔瘡始寒發熱煩悶不語腫
徧皮痒不思飲食
大黃 連翹 山梔子 已上各
巴豆 杏仁 去皮尖 各壹錢
人言 [illegible]
蟾酥 [illegible]
牽牛頭末 苦丁香 各壹錢
右為細末研勻每服半錢病重者服壹錢用新汲
井花水調下每服見効如病重無脉者喫下藥約
一頓飯時吐出惡物便醫不待吐不了藥即活
立馬回疔奪命散 治疔瘡及喉痺[illegible]腫痛大効
牡蠣 當歸 牛旁子
白殭蠶 各 大黃
右㕮咀每服半兩用酒一盞水一盞煎至[illegible]去
滓連進二服疔瘡服後出汗者生無汗者死
御史散 治疔瘡
生鐵銹 [illegible]

為末木香磨酒調下分病上下食前食後服之得
微汗而愈
愚按此方乃秘法也未嘗試用常治疔瘡有赤絲
攻心腹者用鐵銹參錢牡蠣貳錢青鹽壹錢爲末
挑破瘡頭以好醋內調搽其絲自回名喚回丹
但未用服者之本草云鐵鏽乃生鐵上衣也治惡瘡
疥癬蜘蛛蟲咬蒜磨敷之亦未云服家藏方用猫
兒眼草壹擔細切以水搭浸貳日煎百餘沸去
粗取汁煎至參肆碗用生鐵鏽細研末參兩徐徐
入汁內以鐵杖不住手攪再煎至貳碗許可成膏子
治一切癰疽瘡毒甚效瘰癧潰後塗瘡內尤效
防風通聖散 聖濟
加減通聖散 治疔瘡瘴氣紫泡風[illegible]
防風 荊芥 連翹
赤芍藥 當歸 川芎
桔梗 黃芩 梔子
甘草 青木香 玄參
牛旁子 大黃 芒硝
紫金皮 [illegible] [illegible]
谷藤根 芙蓉根 [illegible]

嘔吐又

右薄荷生地黃煎服

追疔奪命湯　秘方速效能內消腫

羌活　獨活　青皮多用

防風多用　黃連　赤芍藥

細辛　甘草節　蟬蛻

殭蠶　脚蓮　加河車

澤蘭　金銀花

有膿加　何首烏　白芷

要利加　青木香　大黃

牽牛　梔子

在脚加　木瓜各等分

右㕮咀每服伍錢先將壹服加澤蘭少用葉金銀花各壹兩生薑拾片同藥擂爛好酒鏃之熱服不喫酒者水煎爲妙然後用酒水各壹盞半生薑拾片煎至熱服汗出爲度病退減後再加大黃貳錢煎至熱服再以利壹兩次去除爲妙此方以藥味觀之甚若不切然效速於神驗萬無一失累用累効如有別證再出宜隨證加減治之

若心煩嘔吐加　甘草節壹錢　豆粉

嘔吐惡心加　乳香　豆粉

加減追疔奪命湯　治疔瘡及癰疽發背惡瘡嫩赤腫痛割人或紫游風赤游風並大效

防風　赤芍藥　連翹

羌活　獨活　細辛

青皮　殭蠶　蟬蛻

青木香　甘草節　金銀花

紫河車　獨脚蓮

右生薑澤蘭生地黃煎服　病勢退減加大黃取利下叁伍行去大黃

防風當歸湯　治疔瘡發熱大便實者

金銀花　山茨菰　青木香

當歸　赤芍藥　白芷

防風　荊芥　連翹

升麻　羌活　獨活

甘草　大黃

右薄荷生地黃煎服

雄麝湯　解疔毒如神凡解毒不可無雄黃硃砂

雄黃　硃砂　麝香各另研

乳香壹錢各另研　白芷　甘草根

真菉豆粉　地丁草各六錢　牡蠣
殭蠶　牛蒡子炒　大黃
金銀花　青木香　梔子
荊芥穗　朴硝　甘草各壹錢
胡桃五箇去殼
右咀片以瓷器盛之味細切用無灰酒壹碗及水
貯瓷細細熬至壹碗去滓及研劑入
前件黃等伍味攪勻作壹服更審其病在經絡分野
依東垣引經瀉火藥加之尤妙欲利者加大黃朴
硝貳味臨後下　前草即蒲公英也地丁即大薊也
一云剪刀草開黃花者名黃花地丁開紫花者名紫花地丁

解毒消癰散　治疔瘡癰氣發熱者
柴胡　黃芩
黃蘗　梔子　木通
赤芍藥　當歸　防風
連翹　大黃　甘草
青木香　紫金皮　鷄屎子
許效子　青王叉　嫩柏根
苦花子
右薄荷生地黃煎服

初瘡消毒飲　治疔瘡癰氣發熱者及刺痛者並治牛馬豬羊而中其毒者或因食瘴疫之肉而中其毒者先服加減通聖散通利大便次服此藥
百丈光名小天麻又名土人參　苦花子
金腦香即杜茶根梗素但所用　大小青
紫金藤　生藍葉　水竹根
烏龍根　嫩柏根　青王叉
山烏豆　鷄屎子　脆絆西
狸咬柴　土木香　臭木待根
右薄荷煎服　腫勢甚加水金鳳水苦蕎　手足
拘攣加鈎藤根棱婆子根　發熱加吉面消毛
蕨根　小便不通加木通梔子

青黃消毒散　治疔瘡癰氣服涼藥過劑沉而不發
不退者
雄黃研　大小青各壹兩　八角茴香伍錢
右末陳酒調服又以醋和米泔塗患處一日服三
次
四神丹　治因剥割瘴疫牛馬豬羊不避其氣以中
其毒或因食瘴疫牛馬豬羊之肉者或手足各處
發疔毒或起紫泡或起堆核初則創入次漸腫大

疼痛不可忍發熱口渴心煩四肢强痛頭目昏花一切瘴毒並皆治之先服此藥次服劫瘴消毒散

苦花子（又名毛桃子又名小紫金鷄舌梗葉俱可 名天仙果花 名馬蹄[illegible]） 土木香（根名青木香梗）

仙人薯（用根鮮生者為妙乾者次之各貳兩）

晚蠶砂（壹兩）

右剉碎擂水和煮粽汁冷服熱極加芭蕉心小便不利加琉璃草又名耳環尾擂和前藥服之

七神散　治因剥割瘴死牛馬豬羊以中其[illegible]而有毒或因食瘴死牛馬豬羊之肉而中其毒者並因蛇傷之毒者

苦花子　紫金藤　金腰香

大小青　仙人薯　土木香

百丈光（即土人參）

右薄荷煎去相上碗調雄黃末服

萬全散　治瘴氣時毒疔瘡蛇犬咬等證

嫩柏根　水芀根　狸咬柴

烏芭根　青王又　生藍葉

溪楓根　穿山蹤

右薄荷煎服及調雄黃末服或合七神散更妙

七聖奪命錠　治疔瘡瘴氣[illegible]等證

土木香　苦花子　仙人薯（各[illegible]）

晚蠶砂　柑花（各壹）　硃砂

雄黃（各叁[illegible]）

右末糯米糊為丸以毛尿梯根磨水化下

硃墨丸　治疔瘡瘴毒

硃砂　京墨（[illegible]）

右末以蟾蜍汁為丸如[illegible]子大每服貳丸以葱白煎湯吞下日服[illegible]次

祛瘴散　治疔瘡瘴毒蛇傷熱服痛熱喉風並效驗如神

苦花子（又名[illegible]花梗）

右擂水服夏月冷服冬月溫服

天馬奪命丹　治疔瘡蛇傷犬咬鼠咬

青木香（[illegible]根俱[illegible]）

右末每服[illegible]錢蜜水調下凡治瘴氣蛇傷不可缺此藥也

又方

土青木香（根梗葉同用生者佳）

右擂水服夏月冷服冬月溫服

萬病解毒丸　治疔瘡癰疽發背腫瘍時毒狐狸毒鼠莽毒丹毒蠱毒瘴毒風毒熱毒所致牛馬豬羊毒蛇犬蜈蚣蜂蠍百蟲蛇咬湯火所傷中惡邪氣無名腫毒砒毒藥毒瘡毒光粉毒輕粉毒一切邪熱之毒悉皆治之

麝香（貳錢）　硃砂（二錢）　山豆根

雄黃　續隨子（取仁）　紫河車

獨脚蓮（各壹兩）　紅牙大戟（壹兩伍錢）　山茨菰（貳兩）

五倍子（叁兩）

右爲末秫米糊和勻杵擣壹千餘下印作錠子隨意大小每服壹錠井水磨化冬月用薄荷湯磨服日可進貳叁服

刷瘡散　治疔瘡癰毒服藥後可用此藥刷塗

生藍葉　地薄荷　紫金藤

右擂米泔水調刷患處次加紫花地丁凌霄花雞冠花二花如無以紫花代之

拔瘡散　治疔瘡癰毒潰爛成瘡

柏樹皮　側柏葉（各等分）

右細末以柏油先刷次摻末

洗瘡方

柏葉　朴葉　柳枝

連叉葉

右煎水淋洗之

羅氏托裏散　治一切發背疔瘡

黃芪　厚朴　川芎

防風　桔梗（各）　白芷

連翹　芍藥　官桂

甘草節　人參　木香

沒藥　乳香　當歸

右爲細末每服叁錢酒一大盞煎和查溫服

治十三種疔皆以此法治之

以緋帛壹片裹藥取匝爲限先用亂髮雞子大攤布帛上牛黃如桐子大又以棘刺針貳拾壹枚赤小豆柒粒爲末並布髮上捲緋綿作團外以髮作繩十字縛之置熨斗中急火燒灰研細以枸杞或子或根皮枝葉隨得爲末用枸杞末貳匕緋帛灰壹匕共成叁匕研勻分貳服空心溫酒調下

連翹黃芪湯　治疔瘡因食瘟死牛羊犬足生大疔如釘入肉痛不可忍者

金銀花　黃芪　當歸
連翹　甘草　蜈蚣（去頭足酒炙）
右生薑煎服
治疔瘡陰證脈沉四肢冷瘡不發
右用五香散去大黃加蒼耳蓮肉酸棗仁藿香茯苓黃芪肉桂當歸防風白芷附子生薑半水半酒煎服以發其毒　如潮熱煩渴受毒加生大黃柴胡地骨皮　如嘔逆脾胃受毒加丁香　如喘嗽肺經受毒加杏仁（去皮尖）知母秦艽紫菀　如[illegible]花心經受毒加硃砂雄黃麝香　如腳冷腎經受毒加木瓜牽牛（少許）　如發渴自汗肝經受毒加黃芩山梔　如大小便秘腹脹滿加枳殼木通苦葶藶大黃
治疔瘡陽證潮熱心間寒熱煩躁口渴六脈洪大
右用五香散（去木香?）不退而渴熱不一散蛇床子大黃為末以冷酒或冷水調貳錢止或只宜微利
羅氏保生錠子　治疔瘡背疽瘰癧一切惡瘡
金腳信　輕粉各貳　雄黃
硇砂各叁錢　麝香壹錢　蟾酥（半錢?）
巴豆（二十粒去殼另研?）

右為細末用黃蠟伍錢溶開將藥和成錠子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

滴滴金　治疔瘡
硇砂　輕粉　人言（少許）
雄黃　硃砂各壹錢　麝香（少許）
右為細末每用些少先以針刺開瘡頭擠去黃水出効

疔瘡錠子
硇砂壹錢　白芷　雄黃
蒼耳子　甘草各半錢
右為細末用蟾酥汁和作錠子如前法用須五月五日合

回瘡錠子　治疔瘡大効
草烏頭壹兩　蟾酥（半錢?）　巴豆（七個去皮）
麝香（少許）
右為細末麪糊和就捻作錠子如有惡瘡透丁不痛無血者用針深刺至痛處有血出以此錠子紙

之上用膏藥貼之疔瘡四畔紅之其疔三二日自然拔出此藥最宜緊用此證大抵與傷寒頗類其中亦有可針鑱砭射出血者亦有久而敗潰出膿者其間變異自端不可不慎也

神聖膏藥(邵氏) 治一切惡瘡

當歸　藁本(各半兩)　沒藥

乳香(各貳錢)　白芨　琥珀(各貳錢)

黃丹　黃蠟(各貳兩)　白膠香(三兩)

巴豆(去殼)　木鱉子(去殼)　粉霜

膽礬(各壹錢)　清油　槐柳枝(各壹百)

右件壹處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥熬勿至焦濾出卻將油澄清下黃丹再熬成膏用絹帛攤之立有神効

保命集治疔瘡奪命散

烏頭尖　附子底　蝎梢

雌黃　雄黃(各壹錢)　蜈蚣(壹條)

硇砂　粉霜　輕粉(各壹錢)

砒(一錢)　腦子　麝香(各少許)

右為細末先破瘡出惡血以草杖頭用紙帶藥末插入於內以深為度

邵氏小金錠子　治疔毒惡瘡

硃砂(貳錢)　黃丹　明礬(枯)

砒霜　輕粉　花鹼

白芨(各壹錢半)　蟾酥　腦子

麝香(各少許)

右研極細末糊和為錠子用之

邵氏拔丁錠子(又名追疔錠子)　治疔瘡危篤發昏無治療

雄黃　硃砂　青鹽

砒霜　白丁香

輕粉(各壹錢)　蟾酥　麝香(各壹錢)

黃蠟　蓖麻子(去殼)

右為細末於銀器內或磁器先將蠟溶開和前藥丸如桐子大捻作餅子用針刺破疔瘡放壹餅子於瘡頭上又刺四邊五七下惡血出為妙却用膜膏藥貼之立驗內服首功玄黑散或蟾酥丸

邵氏守効散　點疔瘡惡肉

砒霜(生)　白丁香　松香

輕粉　川烏　生礬

蜈蚣(壹條焙乾)

右為極細末鈹針刺破瘡口令血出唾津調藥貼之瘡上其根自消

麝香蟾酥丸　治一切癰疽發背疔瘡內毒如未破用針刺破撚藥在內膏藥貼之其瘡即消

蟾酥　輕粉　乳香各伍分

人言　雄黃各貳錢　巴豆拾箇去皮油

麝香少許　寒水石各貳錢

右為細末滴水為丸作錠子如小麥粒大量瘡大小用之寒食麵糊為丸

追毒丹　取黃去疔頭追膿毒立効

蟾酥　硇砂　白丁香

輕粉　雄黃　硃砂貳錢

蜈蚣　巴豆

右總為細末麪糊水為丸如丸不就用酒打麪糊為丸如麥大兩頭尖入於針破口內用水沉膏貼之後用膏藥及生肌追出膿血惡物又如不黑陷瘡者內關奴服肉下去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死肌肌肉生新肉愈矣小者用壹粒大者加用之病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上安此藥水沉膏貼之其瘡即時紅腫為度去其敗肉為妙

水沉膏

將白芨末放在盞內用水沉下去用紙貼之如用膏不可用生肌藥凡用拈點之藥用此膏蓋貼則不傷好肉

海馬拔毒散　治疔瘡大効兼治

海馬壹對　穿山甲　麝香

水銀各壹錢　雄黃叁分

右末針破瘡口點藥入內一日一點大有効

芫花根膏　治魚臍疔瘡又治不瘥者

芫花根壹兩　黑豆叁合　豬牙皂角伍錢

白礬研細

右用醋壹斗將前叁味先浸一日於釜中以火煎至貳升去柤却入鐺中熬令可丸入白礬末攪令勻去火成膏但是魚臍丹瘤瘡擦於帛上貼日二易之

治魚臍疔瘡

韭菜　絲瓜葉

右入石臼內搗爛取汁以酒和服以滓貼腋下如

病在左手貼左腋下右手貼右腋下在左脚貼左胯右脚貼右胯如在中貼心臍並用布帛紮住候肉下紅絲處皆白則可如有潮熱亦用此法却用人抱住恐其顛倒倒則難救

四聖旋丁散 治走黃疔生於四肢其勢微者先以好醋調敷塗上以紙封之次服內托裏之藥其疔自旋出根

巴豆 [illegible] 半分　白丁香 [illegible]　輕粉 [illegible]

硇砂 [illegible]

右為細末醋調用之

拔疔散 治疔瘡

蜈蚣 壹條　鹽白霜　粉霜

膽礬　硇砂 各壹錢 另研

右為末和勻先用竹骨針挑破頭點藥在上醋糊紙貼上其根一時自出

保生餅子 治諸疔等瘡

金脚信 壹錢　雄黃　硇砂 各壹錢

輕粉　麝香 各壹字　巴豆 [illegible]

右為末和勻用黃蠟 [illegible] 溶開和藥成錠水浸少時取出用時始捻作餅如錢眼大以竹角骨針挑瘡頭拔藥在上以醋糊紙貼之膏藥亦可貼不出為効

濟生金砂散 取疔瘡

道人頭 [illegible] 即蒼耳子

雄黃 [illegible]　蟾酥 [illegible]　硇砂 半錢

右將瘡內周圍刺破以少油調藥末置於瘡內絹帛封之數日疔自出如瘡入腹嘔逆者將蒼耳搗汁飲之 [illegible]

効

丹日本三救傳疔瘡方 江子肉拾粒 半夏壹大顆 研末 附子半枚 蜣螂壹枚 各為末四味 [illegible] 麝香 相和看瘡大小以紙繩子圍瘡口以藥泥上又用絹帛貼傳時換新藥以可為度此方活人甚多

鐵罐膏 治一切惡瘡肉毒此藥止痛追火肉

桑柴灰　蕎麥稭灰　石灰 [illegible]

炭灰 少許

右用瓦罐底傍鑽穴壹箇塞住將前項灰填在內用水注滿厚紙封固壹伏時用 [illegible] 在罐孔內淋之盡其水不用灰鑵將淋 [illegible] 慢火熬用鐵片續續攪休教煿定鍋稀稠滴在水內

不散爲度用鐵罐子盛之封了口或有諸般瘡及
臁瘡痔瘺暈瘡用之妙

蟾酥丹 治疔瘡取蟾酥以白麪黃丹搜作劑丸如
麥粒狀針破患處以一粒納之（取蟾酥法用癩蝦蟆眉稜上以手捻出酥於油紙上[illegible]）

又方用鈹刀鏇破疔頭以蟾酥傅之後用
野菊花　菠草根　胡菜葉
擂細以無灰酒盞量調服之酒醒疔化水即痛定
如熱除不必去疔亦自愈也

鐵粉散 專治疔瘡經久不効
多年生鐵（三錢炒過）　松脂（一錢）　黃丹
輕粉（二分半）　麝香（少許）
右爲細末用清油調搽瘡口立効

又方 治疔瘡
山茨菰　鍋銹　生薑
江茶　鹽（少許）
用銀針撥開疔瘡即以前藥搽作餅子如大棋子
放疔頭上甚者半月皮皺可驗不皺難治矣

雄黃散 治疔瘡
雄黃　硇砂　蒼耳草（燒灰）

右爲末醋調敷次將菊花搗爛取汁調清者服之
濃者傅之

追毒丸 治疔瘡發背
蝦蟇黃（□分）　蘇頭　雄黃
黃丹（各半錢）
右爲末水丸如米大將瘡撥開頭入藥在內以膏
藥貼之

三因蒼耳散 治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗
子但取一色便可用燒灰存性研細用好米醋
泔澱和如泥隨瘡大小傅之（乾即易之）
不過十度即拔根出須針破塗之（更加蟾酥黃丹尤妙）

治一切疔腫癰癤
右用蒼耳根莖苗但取一件燒爲灰醋泔澱和
如泥先以針刺瘡上及四邊數下令血出度藥氣
可以入針孔中即去血傅藥乾即易之不過數度
即拔根出其未結膿者即內消也已結膿破潰者
再不用針刺只以藥塗之余以忽日用上治疔腫
逃甘子張家母爲貼藥經十日不瘥予以此藥塗
之得愈常作此藥以救人無有不瘥者故特以傳
後嗣疔腫方殆有千首皆不及此雖齊州榮姥方

亦不能勝此物遊次易得也

治一切疔腫

右用蒼耳草又名令負來草只用根紅嫩者搗爛無灰白酒調勻服次用鹽梅肉研爛以豬膽汁和塗瘡項上其毒即散又先用好京墨以薑汁研爛用薑片蘸墨塗四圍腫熱處即効一方用蒼耳根葉童便絞取汁令服當升日三或燒灰和臘月豬脂傳一方用荷葉搗汁飲之一方用子或葉或根研爛以米醋脚調塗腫處立散仍研汁服以瘥爲度

治疔瘡

右於九月九日採芙蓉花葉陰乾研細用時以井花水調銀釵打成膏厚紙攤貼瘡上次日用蝣蜒螺即鬼丁螺剪開用銀釵麻打破依前調藥却將蝣蜒螺放在瘡上貼待過日揭起其疔自出立効其藥不要揭開

治疔瘡

右用多年牆內或泥土中銹釘洗淨以炭火內燒紅淬浴待冷用刀刮下銹又入火內燒紅入淬仍前刮下非收用淬用刮下末研爲細末用時將

瘡口撥開挑藥末在內以膏藥貼之少時如病深取疔如病淺即取出黑紫色血其瘡自愈

拔疔法

以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌又將乾與豨薟艸葉等分爲細末先用竹筒略頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上以線緊縛竹筒陷入肉内爲度以前藥末壹匙滴水和之放於筒內少時藥滚起則疔自拔起若壹次未効漸加度數其疔必拔也

拔疔方　治疔瘡不出者用此藥以拔出之

巴豆去殼半生半　磁石

右爲末用葱涎同蜜爲膏以傅瘡上疔瘡自出

神授瘡疔腫方

以緊磁石爲末用酸醋調封於患處少時力拔出疔神妙

世治疔瘡用麻內蚯蚓壹條研傅瘡上却用膏藥貼之一飯時去膏藥其疔自出

麻蟲膏　治疔瘡

右將麻蟲壹條搗爛入好江茶和作餅子如錢厚大以針角骨針挑瘡頭按藥在上醋糊紙貼之膏

妥亦可其毒出爲効

蜣蜋膏　治疔毒

蜣蜋（[illegible]）　黃𧍙蟲（[illegible]）

右二味搗勻撥破患處貼之如患在手足間有紅絲上臂絲盡處將針挑斷出血仍用前藥

愚按此方常用有効如無𧍙蟲亦効毒盛者更服敗毒藥蜣蜋即屎蚵蜋也

聖濟方　治疔瘡

蜣蜋（心腹下肉稍白者）

右捕取不以多少貼瘡上半日許未可再上之血盡根出神効

治疔瘡最有功効用蟬蛻殭蠶爲末酸醋調塗四圍留瘡口俟根出稍長然後拔去再用醋塗於瘡口

方單用殭蠶爲末津調塗亦佳

又方　治疔瘡

螵蛸爲末傳頭上四邊針刺令紅腫上用鐵銹末

紫花地丁草本圖經云即紫花鹿蹄草紅腫外好肉上用生薑自然汁調船灰末傳好肉上

又方　治疔腫

先以針撥破四畔中間用海螵蛸末水丸豆大傳於瘡頭上再用箭頭膏末傳四畔紅肉上外又用舊船灰燒末爲生薑自然汁調傳後再用濕綿貼中間用手指去疔蓋再將螵蛸末口調傳之

又方　治疔瘡

大黃壹大塊及東壁上汲新井水入於砂碗內磨濃厚塗腫上中心留一竅如錢眼大出熱氣經宿立愈如乾再用水潤之

又方　治疔瘡

雄黃壹錢就丸上煅焦黃爲末以病人尿調傳疔上一時拔出如發熱欲死者將大黃菊花研汁灌

上若久閉取根搗汁亦可

王山韓光方　治疔腫

右以艾蒿壹擔燒作灰於竹筒中淋取汁以壹錢合和石灰如麵漿以針刺瘡中至痛即點之點叁次其根自拔亦大神效□觀中用治灸拾餘人得瘥

衍義苦苣搗汁傅疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月爲末水調傅（本草云[illegible]）

疔瘡用白斂爲末水調傅之（[illegible]）

聖治疔瘡甚者用附子末醋和塗之乾再塗（[illegible]）

琥珀膏 方見癧瘡下雜方條

水沉膏　治疔瘡

白果根 [illegible]

右以米醋磨濃汁[illegible]以油紙[illegible]貼之[illegible]用酒[illegible]服

敷疔膏　治疔瘡及無名腫毒[illegible]

生藍葉 [illegible]

右以搗爛敷貼患處以[illegible]

又方

毛果佛葉

右生採新鮮者擂米泔[illegible]及以根磨米泔水

溲服

又方　治一切惡瘡瘡肉不出

用烏梅空味燒灰[illegible]傅上惡肉立盡矣

灸疔瘡法　取掌後橫紋後五指男左女右衆脈即

瘡癒効

初虞世云疔瘡[illegible]所爲經絡各處之　疔瘡者必發於手足之間生黃疱其中或紫黑色有條縷如紅線直上倉卒之際急宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等藥於正瘡上並之針時以病者知痛出血爲好否則紅線入腹攻心必致危困矣

百一　治疔腫以針刺四畔用石榴皮末著瘡上調麪圍四畔灸痛爲度調末傅上急裹經宿連根自出

松針法　取向北松枝上葉極硬者頓齊作一束乳令極緊緩緩以意消詳毒氣所經行虛輭處針之須令出血時先川酒潤下針處必小痛令病人稍忍仍用雄黃末入麝香少許以溫酒調下一二服與之服後方下松針針之

治疔瘡毒氣入腹多嘔吐欲效者即服內托香粉散

滴乳半兩另研真菉豆粉壹兩爲細末煎生甘草湯調與錢時時飲之常令滋潤胸膈 方用雄黃菉豆粉乳香等分為末水調服

百一散 [illegible]　治發疔瘡煩躁手足不住發狂者急宜服之

甘草節　菉豆粉　硃砂各等分

右爲細末每服與錢熱水調下

疔瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁　蟬蛻　貫仲各壹兩

丁香　乳香各[illegible]

右爲細末每服貳錢空心溫酒下（多滑物丁麥熬質葛服如萬公英如但萬公英開黃花此間有之開紫花）

瑞 治疔瘡危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房（壹個小窠全者亦可蜂房全者大小頭土上）　蛇蛻（全條）

右作一處罐皿中盛用黃泥封固火煆存性研爲細末每服壹錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已化黃水矣仍服五聖散

大黃　甘草（各壹兩）　生薑

皁角針　金銀花（各壹兩）　栝蔞（壹箇）

右㕮咀用好酒貳升同煎至壹升分去查不拘時服

治疔瘡最驗用蒼耳貝牡丹各壹大握搗爛新汲水或順流水調服壹碗瀉下黑水即愈

走黃

拔黃藥

用蟾酥飛羅麪爲丸如梧桐子大可將壹丸放在面前舌下即時黃出

破棺丹　治疔黃走亂不止

當歸　赤芍藥　山梔子

牽牛（各貳兩半）　連翹　牡蠣

金銀花　紫花地丁（各壹兩）　京三稜

甘草（各貳兩）　便秘加大黃（叁兩）

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食前用童便化開服忌飲酒及生冷硬物

立馬回疔丹　治疔瘡走亂不止

金脚信　蟾酥　血竭

硃砂　沒藥（各壹錢半）　輕粉

龍腦　麝香（各半錢）

右爲細末用生草烏頭汁和作錠如麥子大用時將瘡頂刺破將藥壹錠放瘡口內第二日瘡腫是効

治疔走了黃打滚將死者

牡蠣　大黃　山梔子

金銀花　木通　連翹

牛蒡子　地骨皮　乳香

沒藥　皁角刺　栝蔞

右各等分剉碎每服半兩氣壯者加朴硝用水壹碗酒半碗煎至服定愈

蟾酥走黃丸　治疔瘡走黃

硃砂（伍分）　雄黃（壹錢）　白丁香

右末取蟾酥與作劑丸如麥粒大先刺瘡口少安壹粒在瘡口內仍以水沉膏貼之又以五七丸葱

湯吞下發汗即愈

迴瘡蟾酥錠子　治疔瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若緊刺至心側近皆不痛無血者急針白會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之獨活三四兒瘡初發無有不効大抵疔瘡生於四肢及胸背頭項骨節間唯留背頭項最急初生痛癢不常中陷如釘蓋撼之有根壯熱發心是也

天南星　款冬花　巴豆仁

黃丹　白信各壹錢　獨活伍分

蟾酥各壹錢

右爲極細末用疔蟾酥和藥如黍米大撚作錠子每遇疔瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛即止其原瘡亦覺疼痛以膏藥貼之膿出自痊用錠子法度以銀作細筒子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細紙條子內藥於筒內推至痛處

射後犯疔腫垂死菊花葉壹握搗絞汁壹升入口即活此神驗亦用其根[illegible]

疔腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服壹升日三服甚驗

化毒丸　治內疔

硃砂　雄黃各壹錢　蟬蜕拾枚

硼砂生　輕粉各五分　麝香壹分

片腦半分

右末取蟾酥爲丸如菉豆大每用壹丸放舌上含化取涎化後以井水漱淨無此丸用單蟾酥代之亦可

浴瘡火　治內疔之蒸發汗之妙方也凡疔瘡始覺不曾服出汗之藥過數日間外證皆能或在胸腹或在腸肋亦能腫起此乃毒氣入裏內疔之所發也宜用此法出汗毒氣方能出也

先置水桶壹箇鐵銚壹箇令病人側卧於桶上四圍以衣衾蓋覆勿令泄氣却以燒卵石火燒極紅放銚內以銚安桶內以醋投於銚內淬之其氣衝汗未透再加火力再淬之須令腫處汗透不必縮身出汗也

瘡瘍集編卷之二終

金壇王肯堂輯　門人新安閔承詔校

癰疽部分

靈樞五臟身有五部　伏兔一　腓二（腓者腨也）背三　五臟俞四　項五　此五部有癰疽者死

王海藏云　腦　鬚　鬢　顋　亦為癰疽必死之處

鬼遺方不可患癰疽者七處　眼後虛處　頤接骨處　陰根上毛間胯與兒骨接處　耳門前後車骨接處　諸因小腹風水所成癰疽　頷骨下近耳後虛處　鼻骨中　不能害人但以諸法療之或有得

瘥背眼後虛處最險

背上九處不可病癰　第一入髮際為玉枕亦為舌本　第二顱項節　第三椎為崇骨　第四大椎為五藏　第五脊骨兩邊脾俞穴　第六夾脊兩邊肺俞及肝俞　第七脊骨兩邊腎俞二穴下　第八後心鳩尾　第九鳩尾骨穴

正面五處不可患癰　第一喉骨為垂膺　第二當胸為神舍　第三心鳩尾　第四當兩乳穴　第五臍下二寸為腸屈間

側面三處不可患癰　耳下近耳後牙車尖央陷中為喉脉一穴　當臍下一穴為存骨　承山上三寸一穴腨腸

上焦發癰為陽是熱實證宜解利溫涼湯散之其積熱上攻外即貼消腫追毒藥如已結定即用發穴藥候穴破出其膿去其膿平方貼生肉等藥然後從合瘡口亦慮外傷風水勿食發風熱毒麵毒物等忌房事

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是遊滯候亦乘虛而作不拘大小前起心鳩尾者最要緊近兩腋是虛處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬難潰膿為此等處俱難發穴穴後難合瘡口並須先用收肉藥服後用膏藥貼令軟和慢慢[illegible]之不得急破急破即潰久[illegible]不住候慢破穴

即一切出[illegible]　[illegible]一椎脾俞下四椎上為腎俞腎俞下[illegible]兩處起癰者防毒氣內攻為此處皆是至虛處凡作癰起[illegible]肉氣合實方可放破內[illegible]　內[illegible]腰腿兩處多成漏疾[illegible]下焦發為流注虛損候前陰[illegible]兩處起如雞卵大長

橫攔內仍起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青
黑先用和平藥內服三五日後用發軟散及罨藥罨
令軟即究究後其瘡口即隨相子內作長痂瘡口破
宜急用抽毒膏出膿膿盡使貼合瘡口藥爲此處無
肉可壞更不須長肉也

右靈樞鬼遺諸書所言部分甚悉今已散采入各
一條矣其經絡所屬及引經之藥已見首卷分經絡
篇其初中後內消外治之法及表裏虛實之別則
當於腫瘍潰瘍門求之今世專科方上所畫以爲
秘傳之書圖寫形像分別名目以立治法者多不

足憑此中亦有過采者如咸門之類姑以廣聞見耳不
必泥也

頭部一

○百會疽

或問百會穴生疽何如曰此名玉頂發初如麥米頓
增痛楚寒熱大作由虛陽浮之宜以鹽湯下八味丸
引火歸源甚則黑錫丹或元氣素厚六陽經受風邪
風火相扇臟腑熱毒上攻而然者宜黃連消毒飲兼
玉樞丹勝金丹更以附子切片置湯泉究灸五壯以
泄其毒七日無膿者死

○項門疽

或問頂門生疽何如曰此屬太陽經風熱所致一名

佛頂疽究名上是由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成
宜服活命飲加羌連梔子蒼朮消黑之劑及紫金丹
烏金散奪命丹汗之虛者十全大補湯加羌活稍遲
潰爛黑陷惡證多脉大神昏二便閉結者不治

○額疽

鬼遺方云左額右額發亦疽不拘大小狀如桃李急
宜藥貼破見膿無害若額角一處發毒疽及惡癰爲
近太陽穴如腫滿太陽則成虛損爲可究而難消不
可破如破後傷外風不即治者人亦宜用藥消膿後
速斂合瘡口如經冬月即成冷瘡緣此處近太陽究

上至額角都爲險處　或問當額生疽何如曰此屬陽明胃積熱宜服活命飲加升麻桔梗羌活水酒煎服壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯或千金散黄芪内托散托之過時潰爛膿髓出者死

○太陽疽

鬼遺云左右太陽穴或發疽癰及穿五七日不潰毒氣流入眼眶攻眼眼合不開用藥貼破破後須外風水所入即損其睛瘡損眼睛者不求人矣　或問兩太陽生疽何如曰此名勇疽亦名腦疽屬足陽明胃經狀如伏鼠寒熱併作而目浮腫宜活命飲加升麻桔梗烏金散下之　一日刺得黄白膿者生清稀黑血者及潰爛透腦者死

○鬢疽

鬢疽屬手少陽三焦相火是經少血多氣尤忌見膿若妄加針灸必至不起余見之屢矣　薛新甫以爲屬肝膽二經怒火或風熱血虛所致若發熱作渴者用柴胡清肝散腫焮痛甚者用仙方活命飲若大勢已退餘毒未散用參芪歸术爲主佐以川芎白芷金銀花以速其膿膿成仍用參芪之類托而潰之若欲其生肌收斂脾虛者六味丸血虛者四物加參芪或

血燥或水不能生木者用四物湯六味地黄丸氣虛者用補中益氣湯皆當滋其化源爲善

一老腫痛發熱服消作渴脈軟而澁此氣血俱虛也欲補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果口噤少食復求治投六君子湯四劑飲食漸進仍用補劑月餘而愈以上薛新甫　一人患此焮痛作腫發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉四劑而消　一人因怒後鬢際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉四劑根畔俱消惟疼處作膿以仙方活命飲二劑痛止膿潰針之更以托裏藥而愈　一人頭痛寒熱

腫患脈浮數以荊防敗毒散二劑表症悉退更以托裏消毒散潰之而安　一人焮腫發熱服下宜散愈焮診之脈數而實此表裏俱有邪也以荊防敗毒散加芩連大黄二劑少愈更以荊防敗毒散四劑而消　俞黄門年逾三十冬患此毒腫焮痛便秘脈實此膽經風熱壅上也馬氏曰瘡瘍熱實不利者大黄湯下之一劑便通瘡退更以荊防敗毒散二劑十宜散去桂加天花粉金銀花數劑而愈　一人頭面焮腫作痛時仲冬脈浮緊以托裏溫經湯汗之而消　趙宜人年逾七十鬢疽已潰焮腫痛甚喜冷

脉實便祕東垣云煩躁飲冷身熱脉大精神昏悶者
臟腑實也以清涼飲二劑腫痛悉退更以托裏藥三
十餘劑而平
一耳前疽雖出少陽血少之分然證與脉皆屬于實
故年壯者用瀉劑之重老年者用瀉劑之輕若拘
以年老或守其經禁而投補劑實實之禍難免矣
以上爲例
侍御朱南臯患前證腫痛發熱日晡尤甚此肝膽二
經血虛火燥也用四物湯加玄參柴胡桔梗炙草治
之而愈又因勞役發熱畏寒作渴自汗用補中益氣
湯去柴胡升麻加五味麥門炒蘗而瘥 州守胡廷
器年七十患前證腫焮作痛頭目俱脹此腎水不足
肝膽火盛而血燥也用六味丸料四劑瘡頭出水而
愈後因調養失宜仍腫痛煩熱喘渴脉洪大而虛此
脾胃之氣傷也用補中益氣以補脾胃用六味地黃
丸以補腎肝而痊（以上兩例）

柴胡清肝散 治鬢疽及肝膽三焦風熱怒火之證
或項胸作痛或瘡毒發熱

柴胡 山梔（炒各壹錢伍分） 黃芩（炒）
川芎 人參（各壹錢） 連翹
桔梗（各捌分） 甘草（伍分）
右水煎服

鬓際瘡

鬼遺云左右鬓際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺
此疾婦人患多丈夫患少始因風濕上攻鬓際亦宜
出膿無傷 或問鬓際生瘡何如曰此名鬓際瘡也
狀如火實沒腫寒熱或痛或痒者鬓際疽也此由風
熱上壅所致宜服防風通聖散紫金丹奪命丹汗之
以防風通聖散爲末酒浸焙乾凡三次食後白湯調
服日三服全頭有汗効

○癩頭瘡

世澡荊鹽湯洗三五日一洗用一上散傅之久年不
愈神効
丹用好紫背炭燒通紅入水淬之又燒又淬以水熱
爲度取所淬之水日洗之使熱毒宣發而愈外以
胡麻子伏龍肝懸龍尾（各等）黃連白蘗爲末調傅又
服酒炒通聖散効
一方單用黃連末傅之累効
或問頭上生瘡狀如葡萄痛甚又有無膿何如曰名
髮毛瘡治法上同必須詳辨其瘡若中陷而四畔高

起色如黃蠟者膿疥也

松脂膏　治頭瘡經年月不瘥

松脂　黃連　黃芩

苦參　蛇床子　大黃

白礬　水銀　胡粉

右為細末研勻用臘豬脂調傅瘡上大効

貝母膏　治頭禿瘡

貝母　半夏　南星

五倍子　白芷　黃柏

苦參　龍丹　雄黃壹錢

右為細末先以蜂房白芷苦參大腹皮荊芥煎湯熏洗拭乾即用蜜水調傅兩三次後乾摻藥

加味平胃散　治一切惡瘡頭上瘡

右平胃散入膩粉清油調傅之甚妙

螵蛸散　治頭上生瘡俗曰粘瘡

海螵蛸　白膠香　輕粉

為細末研勻先用清油潤瘡後摻藥只一上可

治頭極痒不痛生瘡方

鵓鴿糞伍合

右以好醋和前件煮三兩沸日兩三次塗之

○腦疽

「鬼遺」正腦上一處起為腦疽及腦疽腦鑠並在大椎骨上入髮際生腦疽皮起易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得破穴須急發内毒使破穴方可腦鑠一處初起如横木擁上起頂門下止大椎焮腫如火燒其色青黑如乾皮大硬不見膿即損外皮如犬咬去肉之跡難愈　靈樞云陽氣大發消腦溜項名曰腦鑠其色不樂腦項痛如刺以針煩心者死不可治

「薛」腦屬足太陽膀胱經積熱　或濕毒上湧　或陰虛火熾　或腎水虧損陰精消涸　初起腫赤痛甚煩渴飲冷脉洪數而有力乃濕熱上湧當用黃連消毒散并隔蒜灸以除濕熱　漫腫微痛渴不飲冷脉洪數而無力乃陰虛火熾當用六味丸及補中益氣湯以滋化源　若口舌乾燥小便頻數或淋瀝作痛乃腎水虧損急用加減八味丸及前湯以固根本引火歸經　若不成膿不潰消陽氣虛也四君加歸芪不生肌不收歛脾氣虛也十全大補湯　若色黯不潰或潰而不歛乃陰精消涸名曰腦鑠為不治若

以補得宜亦有可愈治者審焉
元好問記曰予秦役酒於九月中患腦之下項之上出小瘡後數日腦項麻木腫勢外焮潰醫遂處五香連翹湯至八日不下而云不可速療十八日待膿出用藥或砭刺三月乃可平四月如故予記醫經云凡瘡見膿九死一生果如醫言則當有束手待斃之悔矣乃請李明之診且謂膏粱之變不當投五香事已無及當先用火攻之策然後用藥以大艾炷如桃核許者攻之至百壯乃痛覺矣爲處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反治脉中得弦緊按之洪大而數

又且有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已必先歲氣無伐天和以時言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之鹹以軟之然受寒邪而禁鹹諸苦寒爲君爲用甘寒爲佐酒熱爲因用爲使以辛溫和氣血大辛以解結爲臣三辛三甘益元氣而和血脉滲淡以導酒濕扶持秋令以益氣瀉火以入本經之藥和血且爲引用既以通經爲主用君以黃芩黃連黃蘗生地黃知母酒製之本經羌活獨活藁本防風防已當歸連翹以解結黃芪人參甘草配諸苦寒者三之一多則滋營氣補土也生甘草瀉火補下焦澤瀉人參橘皮以補胃蘇木當歸尾去惡血生地黃補血酒製防已除膀胱留熱澤瀉助秋去酒之濕熱凡此諸藥必得桔梗爲舟楫乃不下沉投劑之後日當不痛不拆食進體健予如言服之投床大鼾日出乃寤以手捫瘡腫減七八至瘡痂都斂十四日而已世醫用技豈無取効者至於治効之外乃能歷數體中不言之秘平生所見惟明之一人而已方名黃連消毒飲見後

試舉治驗 一人素不慎起居飲食焮痛尺脉洪數以黃連消毒散一劑濕熱頓除惟瘡頭作痛以仙

方活命飲一劑而痛悉退但瘡頭不消投十宣去桂加金銀花藁本白术茯苓陳皮以托裏排膿彼欲全消自製黃連解毒散二服反腫硬不作膿始悟仍用十宣散加白术茯苓陳皮半夏腫少退仍去桂又四劑而膿成腫勢亦退繼以八珍湯加黃芪五味麥門冬月餘膿潰而愈　夫苦寒之藥雖治陰證尤當分表裏虛實次第時宜豈可始末悉用之然焮腫赤痛尺脉數按之則濡乃膀胱積熱風毒盛也故用黃連消毒散以解毒除濕腫硬作痛乃氣血凝滯不行而作也遂用仙方活命飲以散毒消毒破血也其

瘡頭不起蓋因熱毒熏蒸氣血凝滯而然也宜用甘溫之劑使益陽氣托裡以為潰之况此證原屬脾臟經因虛火盛而出若不審其因專用苦寒之藥消耗氣已傷何以腐化收斂幾何不致于敗耶凡瘡易消散易腐潰易收斂皆氣血壯盛故也　一人腦疽已十餘日面目腫閉頭焮如斗脉洪數煩躁飲冷此膀胱濕熱所致用黃連消毒飲二劑次飲槐花酒二碗頓退以指按下腫則復起此膿已成于頸額肩頰各刺一孔膿並湧出口目始開更以托裏藥加金銀花連翹三十餘劑而愈　一人患此勢劇脉實用黃連

消毒散不應以金銀藤二兩水二鍾煎一鍾入酒半碗服之勢去三四再服前藥又加黃蘗知母瓜蔞當歸甘草節數劑而潰止以黃芪川芎白芷桔梗數劑而愈　一婦年將七十形實性急好酒腦疽纔五日脉緊急又濡急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌人參炒入薑煎調一錢服過兩時再與得臥而上半身汗睡覺病已失此亦內托之意也此治因好酒熱因其興面劑用方藥參以其氣血也杜清碧病腦疽療之不愈丹溪往視之曰何不服防風通聖散曰已服數劑丹溪曰合以酒製之清碧乃自悟以為不及　一婦腦左腫痛左鼻出膿年餘不愈時或掉眩如坐舟車許叔微曰肝虛風邪襲之然也以川芎一兩當歸三錢羌活旋覆花細辛防風蔓荊子石膏藁本荊芥穗半夏麴乾地黃甘草各半兩每服壹兩一料而愈[illegible]　一老患此色赤腫痛脉數有力與黃連消毒飲二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消　一婦人冬月患此腫痛熱渴余用清熱消毒藥潰之而愈一人患此其首連大腦

身發疔如葡萄不計其數手足尤多乃脾胃受毒也先各刺出黑血隨服奪命丹七粒出臭汗瘡熱益甚便秘二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生甘草五分水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下體稍退乃以犀角磨汁再服后不及齒縫出臭血而消毒乃用犀角地黃湯而愈

以上治按消毒飲治太陽經熱邪挾風挾濕挾痰若其進退出入可以用黃連消毒散之活法也

黃連消毒飲

黃連伍分　黃芩伍分　黃蘗伍分酒洗

人參伍分　知母[illegible]

羌活壹錢　獨活伍分　防風伍分

藁本伍分　連翹壹錢[illegible]

黃芪壹錢　甘草炙伍分[illegible]

[illegible]　當歸身[illegible]　生地黃[illegible]

[illegible]　陳皮[illegible]　甘草梢[illegible]

[illegible]　澤瀉[illegible]

防己伍分酒洗去皮[illegible]　當歸梢伍分　蘇木伍分[illegible]

桔梗壹錢[illegible]　凡所用之藥用酒洗併

入酒煎者用酒熟為因為使

右俱作一服水參盞煎減半去滓入酒少許再煎食後溫服投劑之後不得飲水必再作濃劑仍患二日者服之立効凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二證而已東垣治瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散老人宜之亦名復煎散或加沒藥乳香各伍錢

右東垣論膏粱肉食之變宜苦寒不宜芳香者如傷於厚味內消升麻湯孫真人單煮大黃湯皆為膏粱肉食之輩設也

羌活當歸湯　治腦疽

黃芩　黃連各[illegible]炒　當歸身酒浸

炙甘草各壹　羌活　黃檗酒炒

連翹各伍錢　澤瀉　獨活

藁本各叁錢　防風　梔子仁各伍分

右㕮咀分作四服水壹大盞先浸　去許入酒壹匙煎至捌分去滓大溫服食後日二服和滓計陸服三日服盡去滓消藥調下後檳榔散

檳榔散　檳榔為細末將羌活當歸湯調下

陳錄判母年七十餘於冬至後腦出疽形可瓜面大衆醫診視俟瘡熱以鐵烙出[illegible]內陷四一斗葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復噦吐脈極沉細而遲[illegible]之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已[illegible]獨存變症之形加之察怒精神愈損故有此寒變也病與時同與醫議速製五香湯一劑加丁香附子各伍錢劑[illegible]瘡復大發隨證調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之宜也諸痛痒瘡瘍皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也因當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣按此係年老冬寒理宜溫補藥用五香湯

亦丁[illegible]以辛[illegible]何也蓋因其怒[illegible]肝膽[illegible]陽氣不得營運致疽[illegible]發故用五香以開結[illegible]以動[illegible]復而乃大發此亦因其[illegible]其脈而為治也

錦衣楊大人患腦疽口乾舌燥内服清熱藥致寒涼色黯不赳胸中氣喧潰屬陽氣虚[illegible]有火不受溫補葯以參芪各伍錢當歸肉桂各貳錢一劑[illegible]然腫潰又用大補藥而愈

一人腰將成疽[illegible]以[illegible]脈大[illegible]無力[illegible]虛火動之證彼謂心經熱毒[illegible]求治乃以四物湯加黄蘗知母[illegible]黄芪及加減八味丸湯止瘡潰更以托裏藥無[illegible]丸而愈

一婦人年踰八十腰[illegible]項如[illegible]許脈大無力此膀胱經濕熱所致脉無力[illegible]氣[illegible]進托裏消毒藥數服稍可更加參芪雖起而潰此血氣虚甚以參芪各壹兩當歸各伍錢[illegible]五味[illegible]錢數服潰止不潰加肉桂十餘[illegible]肉漸[illegible]徐徐脈大而[illegible]潰不[illegible]投十全[illegible]斂[illegible]遠志三十餘劑膿稠而愈設不[illegible]不去腐肉以[illegible]投以涼藥寧免死哉　瘡疽之證雖屬心火當分表裏虛實果元氣充實内有實火寒劑或可責效若寒涼過度使胃氣脾弱陽證變陰或結而不潰或潰而不斂陰陽乖戾水火交爭死無日矣　一人腦疽[illegible]渴脉雖洪按之無力[illegible]八味丸與之[illegible]不信自用滋陰等藥七[illegible]而發[illegible]云有熱皆因虛而得之愈後作渴或未潰後[illegible]用加減八味丸不能治　一人腦患疽[illegible]藥膿水益多發熱[illegible]小便淋痛晝夜不寐死在反掌[illegible]治之乃以加減八味丸料加參芪歸术麥冬甘草煎服之熟[illegible]甘覺[illegible]來諸證悉退不數劑而瘡愈薛曰病雖愈當固其本元彼不經意且不守禁忌大年患中風後患指疽而歿

一老人腰疽焮作渴脉數而滑[illegible]以為氣血俱虛用八珍湯加黄芪五味彼不信乃服降火之劑果反作嘔少食始信服香砂六君[illegible]湯四劑嘔止食進仍投前湯月餘而愈　一人[illegible]湯尺脉大而無力以四物湯加黄蘗知母[illegible]滅又與加減八味丸湯止瘡潰更用[illegible]丸而愈

一人頭項俱痛[illegible]大[illegible]腫痛[illegible]不[illegible]飲食少思且勢可畏[illegible]診其脉[illegible]二劑[illegible]痛退半與二神丸及六君子湯加五味麥門酸棗仁四劑[illegible]食少[illegible]進[illegible]少得[illegible]參[illegible]

末散數服飲食頗進又與十全大補湯加金銀花白
芷桔梗月餘瘥
鬼遺赤色疽發項額及胸前并手掌中十日不宄者
死七日可刺出赤血七日未有膿不可治也[illegible]
[illegible] 抒疽發贊須及肉并不宄十五日死可刺
其膿色黑如豆豉或見血者死

○發眉
鬼遺云左右眉後[illegible]為發眉[illegible]拘在頂尾宜療
未宄已前攻擊在眉頭即攻入眼損睛在眉後即攻
下太陽並宜戒愼　或問眉發[illegible]何如曰此[illegible]從
眉至頭生瘡黑色漸漸頭漫滿面瘡頭堅硬如石軔
之無膿惟出黃水痛不可忍[illegible]道是也由臟腑
積熱風毒上攻而然急服奪命丹[illegible]之活命
飲加黃連桔梗升麻或黃連消毒飲[illegible]消毒之類
六七日判待黃白膿[illegible]吐

逆煩躁神昏不食者死　或問眉心生疽何如曰是
名眉心疽一名面風毒屬足太陽膀胱經風熱結
陰陽相滯而生急服奪命丹或飛龍丸汗之或一粒金
丹下之若黑色痛甚或[illegible]仵作者死也
曰背湯[illegible]

○鼻疽
或問鼻柱上生疽何如曰是名鼻疽屬手太陰肺經
風熱及上焦鬱火所致宜千金漏蘆湯活命飲加梔
子木通薄荷桔梗

○發髭

鬼遺云鼻下一處人中兩處[illegible]因痛發外
入風而結攻作不常寒熱相併[illegible]人　或問兩
腮及鼻下疵腫生瘡惡血淋漓[illegible]曰此名疔瘡屬
陽明胃經三日口噤如瘀角弓反張按之如疔釘着
骨痛不可忍是也急服烏金散活命飲加桔梗升麻
梔子壯實者一粒金丹下之稍緩則毒攻心嘔吐不
食昏迷躁亂發渴者死　或問地角下生瘡何如曰
是名髭毒屬足陽明經風熱所致用活命飲加苓連
玄參梔子桔梗以清熱壯實者一粒金丹下之若攖
之有根肌肉不仁或麻或痒寒熱大作煩悶者逆者

疔也

○顴瘍

或問顴骨內卒然而痛經宿而痛甚寒熱大作何如
曰此顴骨肉疽也屬上焦與陽明經積火所致宜活
命飲加升麻桔梗乾葛水酒煎服仍[illegible]烏金散奪命
丹汗之可消　或問一人年五十忽顴骨上初覺如
松子漸大如胡桃不甚腫微赤微痒或一竅核或六
結痺(?)或作瘤治何如曰皆非也是名顴疽屬陽明經
積熱所致用紫金丹烏金散活命飲加桑通[illegible]服
之而消　按鍼經曰心病者顴赤又曰腎病者顴與

顴黑然則當[illegible]者宜以黃連安神丸降心火
補心丸養心血黑者宜以地黃丸滋腎水未可專委
之陽明積火也

○頬瘍

或問頬腮生瘡何如曰此名合腮瘡初如米粒漸大
如豆又而不治潰爛延頰屬陽明經初宜服奪命丹
活命飲加升麻桔梗黃連消毒散選用壯實者一粒
金丹下之治不得法潰爛不斂口中臭穢膿心神昏
者死

犀角升麻湯　治陽明經絡受風熱口唇頰車發
腫痛及鼻額間連頭痛不可開口雖言語飲食亦
相妨

犀角　川升麻　防風
黃芩　香白芷　白附子
川芎　羌活　甘草

右㕮咀都作一服水一盞煎至[illegible]食後[illegible]分作
叁服一日一服　蓋其[illegible]
足陽明胃經也經云六陽胃為市又云陽明多血多
氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有
也六經之中血氣俱多腐熟飲食之毒聚於胃故

此方以犀角爲主飲食之毒亦可解[illegible]扶曰
起於鼻交頞中循頰車上耳前過客主人循髮際
至額顱昔王公患此一經亦六[illegible]餘藥皆
滌除風熱升麻黃芩專入胃經故用[illegible]
發頤

或問腮臉生毒何如曰此名腮頷發肌肉浮而不赤
腮者名痄腮俱屬陽明風熱所致[illegible]服活命飲加玄
參芩連水酒煎服及紫金丹汗之　或問頤骨之下
頸頰之上耳前一寸三分發疙何如曰此名頤發古
云不治之證屬陽明經熱毒[illegible]升麻

桔梗黃連水酒煎服紫金丹[illegible]者一
粒金丹下之老弱者十全大補湯倍加肉托散人參
養榮湯若治不得法延及咽喉潰爛穿口不食者死
嘗見一婦人患此證經水適至一醫用[illegible]不食
而死又　人患此醫用[illegible]潰爛[illegible]以致虛火上
升吐血痰喘譫語而死　[illegible]痄腮屬足陽明[illegible]或外
因風熱所乘或內因積熱所致若腫痛寒熱[illegible]
胃風湯內熱腫痛者升麻黃連湯外腫作痛[illegible]
乾者犀角升麻湯內傷寒涼不能消潰者補中益氣
湯發熱作渴大便秘結者加味清涼飲表裏俱解而

仍腫痛者欲作膿也托裏散若飲食少思胃氣虛弱
也六君子湯膿出依然腫痛陽氣虛弱也補中益氣湯膿
毒既潰腫痛不減熱毒未解也托裏消毒散膿出而
反痛氣血虛也人參內托散發熱晡熱陰血虛也八
珍湯惡寒發熱氣血俱虛也十全大補湯若[illegible]痛
連耳下者屬手足少陽經當清肝火若連頤及耳後
者屬足少陰經虛火當補腎水患此而有不治者多
泥風熱執用尅伐之藥耳　按[illegible]腎[illegible]頭先
赤故頤屬足少陰腎經也[illegible]後一寸三
分發銳毒者名曰發頤則是少陽分野薛氏亦以爲

屬足少陰經當補腎水若何也[illegible]宅
究且問而火得[illegible]則治腎可以治少陽也此
證傷寒汗出不徹者多患之亦有雜證發熱久而不
散而發於頤者宜以[illegible]散[illegible]則發于
耳若又服尅伐之藥而不滋補[illegible]喉
而死　一人年逾[illegible]不
潰氣息奄奄飲食少思大便不[illegible]診脈如無[illegible]脈
息如無似有細而[illegible]者陽氣[illegible]濟氏曰欲食不入
大便滑利腸胃虛也以六君子加炮薑肉豆蔻破故
紙數劑泄稍止食稍進更加黃蘗當歸肉桂潰而膿

水清稀前藥每服加熟附子貳錢數劑泄止食進膿漸斂再以十全大補湯加酒炒芍藥月餘而愈

一婦臂陳用之服發散之劑其腫已潰痛不消此血虛滯而欲作膿也用托裏消毒散二劑膿成又用托裏散而潰但膿清作渴乃氣血虛也用八珍加麥門五味二十餘劑而愈

一舍人患此尺脈數屬腎經不足誤服消毒之劑致損元氣而不能愈令用補中益氣湯六味丸料而愈

一上舍燕推卻酒炙患之膿清體瘦遺精盜汗晡熱口渴痰氣上湧久而不愈脈洪大按之微細乃腎虛火炎用六味丸料并十全大補湯而愈

一婦人素內熱因怒耳下至頸腫痛寒熱此肝膽經火燥而血虛用柴胡梔子散而腫痛消用加味逍遙散而寒熱退用八珍湯加丹皮而內熱止

連翹敗毒散 治發頤初腫服此消之

羌活中 獨活 連翹上

荊芥中 防風 柴胡中

升麻下 桔梗 甘草下

川芎中 牛蒡子炒研用 各

當歸尾中酒洗 紅花下酒洗 蘇木下

天花粉中

右用水壹鍾半酒壹鍾同煎至壹鍾去滓徐徐溫服如未消加穿山甲壹錢蛤粉炒 腫至面者加香白芷壹錢漏蘆伍分 如大便燥實者加酒浸大黃壹錢半 壯者倍用之 其內有熱或寒熱交作者倍用柴胡加酒洗黃芩壹錢酒炒黃連壹錢

加味消毒飲 治搭腮腫

防風 荊芥 連翹

牛蒡子 羌活 甘草各等分

右為麁末水煎一兩服散毒然後以黍米粥塗腫處切不可先便用藥塗毒氣入喉中不救

內托消毒散 治發頤有膿不可消者已破未破服之

人參中 黃芪上 防風中

白芷中 川芎中 當歸中

桔梗中 連翹中 升麻中

柴胡中 金銀花中 甘草節中

右用水壹鍾好酒半鍾同煎至壹鍾去滓徐徐溫服瘡破者以玄武膏貼之 以膏亦貼不退者仍以後藥塗之兼服蠟礬丸最妙

消毒救苦散　消腫散毒用米醋調塗傅四圍留頭如乾即又傅

大黃叁錢　芨　黃連

黃蘗　芙蓉葉　大薊根

白芨　白斂　天南星

半夏　紅花　檀花

當歸尾　赤小豆　白芷各壹錢半

朴硝　雄黃[illegible]

一方用見腫消草生白芨白斂大黃芙蓉大薊根野苧麻根共搗成餅入井華水浸和勻貼患上留頭勿貼如乾另換之若更加山慈菇金線重樓根尤妙

百合散　治腮頰瘡一名羽毛瘡

百合　黃蘗各壹兩　白芨貳錢半

蓖麻子[illegible]

右為末用朴硝水和作餅貼之日三五次

一金散　治大人小兒蝕透腮頰初生如米豆名含腮瘡

雞內金　鬱金

右等分為末先用鹽漿水盥漱了貼之

芙蓉傅方　治腮頷腫痛或發成瘡

芙蓉葉不拘多少右搗爛傅之以帛裹定日一換

神效方　治痄腮及遍身瘡癤等瘡

赤小豆為細末　以新汲水調敷瘡上及四畔赤腫處甚則傅之

○面瘡

或問面遊風毒何如曰此積熱在內或多食辛辣厚味或服金石剛劑太過以致熱壅上焦氣血沸騰而作爲陽明經初覺微癢如蟲行搔損則成瘡痛楚難禁宜服黃連消毒散去人參加薄荷桔梗及防風飲加桔梗升麻紫金丹烏金散選用外用秋風潤肌之劑敷之

治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者惟此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面油用之數日間瘡癬處自平赤亦自消如風刺粉刺一夕見効但塗藥勿近眼處

生硫黃　香白芷　瓜蔞仁

膩粉各半錢　全蝎七枚　蟬蛻洗各五枚

芫青七枚去翅足

右為細末麻油黃蠟約度如合面油法火熬溶取

丁離火入諸藥在内每用少許塗面上

治面瘡水調平胃散塗之

治臉上熱瘡涎出以蒲黄傅上瘥

東洗面藥方治面有䵟黯或生瘡及粉刺之類并去皮膚燥痒垢膩潤澤肌膚

皂角[illegible] 糯米[illegible] 菉豆[illegible]

楮實子[illegible] 三柰子 縮砂[illegible]

白芨[illegible] 甘松[illegible] 升麻子[illegible]

白丁香[illegible]

右七味同為細末[illegible]以末一處攪勻用之効

面油摩風膏

麻黄[illegible] 升麻 防風各貳錢

當歸身 白芷各壹錢 羌活[illegible]

白檀香[illegible]

右以絲裹定前藥於銀石器中用油伍兩同熬得所澄清去杏以黄蠟壹兩再煎熬為度

[illegible]肌如玉散

白丁香 白蒺藜 白僵蚕

白芨 白歛 小椒各[illegible]

香白芷[illegible] 藁本 稍[illegible] 升麻各半兩

楮實子[illegible] 白茯苓[illegible] 白附子[illegible]

麻黄[illegible] 連翹[illegible]

右為細末每用半錢[illegible]化之塗䵟黯不入口中

猪苓 [illegible] 桂枝

白蒺藜 [illegible] 神麯

防風 香白芷 白蘇

當歸[illegible] 升麻根 白芨

右等分為細末[illegible]每用少許臨臥唾調少許塗面上

用藥面多奸黯如雀卵色以羖羊膽[illegible]酒[illegible]煮五沸每錢[illegible]三日[illegible]治面上粉刺[illegible]兔絲子絞汁塗之

[illegible]丹 治男子婦人面上黑斑點

白附子[illegible] 白芷 白歛

白茯苓 密陀僧 白石脂

定粉各等分

右為細末用[illegible]臨睡用人乳汁如無用牛乳或雞子清調和[illegible]洗用温漿水洗[illegible]傅之

白附子散 治面上熱瘡似癬或生赤黑斑點

白附子　茯苓

白芷　（輕粉各等分）

右為末先以漿水煎沸洗面淨後用羊乳調至夜敷患處次日洗去妙

祛風白芷散　治面上風癬瘡

白芷（一錢）　黃連　黃檗

黃芩（各二錢）　茯苓　輕粉（各一錢）

右為細末用油調搽癬瘡上或加黃檗兒茶各一錢麝香貳分亦可

○牙叉發

鬼遺云左右牙叉骨接處發癰名曰[illegible]腫攻骨及牙關張口不得因諸風熱上攻或多食燒炙之物所致或因患牙癰即從牙縫中破出膿血切忌外風水濕

按此係陽明經熱宜清胃散甘露飲防風通聖散之屬若表實裏熱用之若服寒涼過多火不歸源者服[illegible]中之屬佐以辛熱始安

○承漿癬

或問地角下生瘡何如曰是名頦癰屬任脈陽明經積熱所致用白芷升麻湯活命飲加升麻桔梗更服紫金丹汗之壯實者一粒金丹下之

八耳部三

○耳發

或問耳輪生瘡何如曰是名耳發屬手少陽三焦經風熱所致六七日漸腫如胡桃或如蜂房之狀或赤或紫熱如火痛徹心是也十日刺出黃白膿者生刺之無膿時出鮮血飲食不下神昏狂躁者死小兒耳竅旁生者相傳指月而生恐未必然大抵風濕熱毒成瘡故名月蝕瘡瘡

水銀膏　治月蝕瘡多在兩耳上及竅[illegible]

水銀（[illegible]）　胡粉（[illegible]）　松脂（[illegible]）

黃連（去[illegible]）　豬脂（[illegible]）

右先以豬脂合煎下松脂諸末及水銀攪令勻磁盒收先以鹽湯洗瘡塗之數日一二度

胡粉散　治月蝕瘡

胡粉（[illegible]）　白礬（[illegible]）　黃丹（[illegible]）

黃連（[illegible]）　輕粉（各[illegible]錢）　胭脂（[illegible]錢）

麝香（少）

右為末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油調敷

○耳內瘡

或問耳中生毒何如 曰耳中所患不同皆由足少陰手少陽二經風熱上壅所致其證有五 曰聤耳亦曰耳濕常出黃膿 有耳風毒常出紅膿 有纏耳常出白膿 有耳疳生瘡臭穢 有震耳耳內虛鳴 [illegible] 雖有五般其源一也 [illegible] 膿亦不寒熱外無腫痛但耳 [illegible] 令人耳聾活命飲黃連消毒 [illegible] 內外紅腫疼痛日增者為耳 [illegible] 紫金丹為餘散壯實者一粒 [illegible] 痛楚難禁者疔也作疔治之

東垣鼠粘子湯 治耳內痛生瘡

桔梗 [illegible]　柴胡　黃芪 [illegible]
連翹　黃芩　鼠粘子
當歸稍　生地黃　黃連各 [illegible]
蒲黃　甘草 [illegible]　草龍膽
昆布　蘇木　生甘草各 [illegible]
桃仁 [illegible]　紅花少許

右件剉如麻豆大作一服水二大盞煎至壹盞去查少熟服食後忌寒藥利大便

又治耳內生瘡者為足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脈入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也曾青散主之

曾青散 治耳內有惡瘡

雄黃 [illegible]　曾青 [illegible]　黃芩 [illegible]

右件搗為細末研勻每用少許納耳中有膿出即以綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連 [illegible]　白礬 [illegible]

右搗為細末每用少許綿裹納耳中

餘詳雜病第八耳門

又問耳根結核何如 曰是名耳根毒狀如痰核按之不動而微痛 屬足少陽膽經 [illegible] 經風熱所致用 [illegible] 命飲加升麻柴胡木通貝母 [illegible] 汁之壯實者一粒金丹 [illegible] 老弱 [illegible] 托之

一人勞倦耳下 [illegible] 作痛右脈大而軟當服補中益氣湯彼自用藥發散遂致嘔吐始信予用六君子湯更服補中益氣湯而愈 大抵內傷榮衛失守皮膚間無氣滋養則不任風寒胃氣下陷則陽火上衝氣滿發熱頭痛脈大此不足證也誤

作外感表實而以瀉之寧免虛虛之禍東垣云內傷
右脈大外感左脈大當以此別之按左脈大爲外傷六難其必須審察
形觀色審證參之以脈乃得不誤用藥治一老人飢寒作勞患頭疼發熱惡寒骨節疼無汗妄語時發共數
而左甚治以參芪歸术陳皮甘草每貼加附子壹片五貼而愈又一少年九月間發熱頭痛妄語大渴
形肥脈數大左甚以參术甘草芍藥芎芪佐附一片使盡人肥而脈左大于右事急矣非附則參芪無捷効
五十貼大汗而愈此皆三承氣及大柴胡湯以內傷治之若依東垣證作外感寧不殺人 一婦耳
下腫痛發寒熱與荊防敗毒散四劑表證悉退以散
腫潰堅湯數劑腫消大半再以神効瓜蔞散四劑而
平 一人肝經風熱耳下腫痛發熱脈浮數以薄荷
丹治之不消 一婦因怒耳下腫痛以荊防敗毒散
外科
加連翹黃芩四劑而愈 當治此證日不消者以益
氣和榮及伏遂志消之効無膿日消有膿日潰 一
婦因怒耳下微痛頭痛寒熱以荊防敗毒加黃芩表
證悉退但飲食少思日晡發熱東垣云雖有虛熱不
可大攻熱去則寒起遂以小柴胡加地骨皮芎歸芩
术陳皮十餘貼而愈次年春復腫堅不潰用八珍湯
加香附柴胡地骨皮桔梗服至六七貼以爲非後仍
服人參敗毒散勢愈甚又服流氣飲則盜汗發熱口
乾食少至秋復求治視氣血虛極辭退果歿 一人
每怒耳下腫或脇作痛以小柴胡湯加青皮紅花桃
仁四劑而愈 一女性急好怒耳下常腫痛發寒熱
肝脈弦急投小柴胡加青皮牛蒡子荊芥防風而寒
熱退更以小柴胡湯對四物數劑而腫消其父欲除
病根予謂肝內主藏血外主榮筋若恚怒氣逆則傷
肝肝主筋故筋攣結而腫須要自加調攝庶可免患
否則肝迭受傷不能藏血血虛則難差矣後不戒果
結三核屢用追蝕不斂而歿 一人遇勞傷發熱
脈大無力耳下患腫此勞損也宜補中益氣養榮湯
自然熱退腫消彼不聽服降火之藥及散其壯濕
不食而死 大勞傷損氣血衰則火上 上故
倦怠而熱此元氣傷也丹溪曰宜補形氣調經絡其
瘡自消不可汗下若不詳脈證經絡受病之異而輒
用峻厲之劑鮮不危矣

○耳後癰附耳後腫

或問耳後一寸三分生癰古云不治之證今有一人
年二十四歲耳後結塊如拳肉色不變亦不甚痛已
月不食何如曰此名耳後疽非瘰也隔蒜灸之活命
飲加柴胡桔梗升麻八陣散下之愈 張通府耳後
髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛彼謂痰結
脈軟而時見數經曰脈數不時見瘡也非痰也仲景

云微弱之脉主血氣俱虛形精不足又曰沉遲軟弱皆宜託裏遂用參芪歸术川芎炙甘草以托裏少加金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火消毒外貼涼藥覺寒徹腦患處大熱頭愈重食愈少復請治以四君子加藿香炮乾薑數劑食漸進膿成刺之更以十全大補湯去桂灸以豆豉餅又月餘而愈

羅宗伯耳後髮際患毒焮痛脈數以小柴胡加桔梗牛蒡子金銀花四劑而愈　一人耳後患毒脈證俱實宜用內疏黃連湯彼以嚴冬不服寒劑竟至不起

一人耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛寒熱口躁

喜冷此膽經積熱而然先以神仙活命飲一劑勢減二三時值仲冬彼恐寒不用另服[illegible]托裏之藥勢漸熾耳內脹痛[illegible]藥不能下而歿

○總論

耳瘡屬手少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱或肝經燥火風熱或腎經虛火等因若發熱焮痛屬少陽厥陰風熱用柴胡梔子散若內熱痒痛屬前二經血虛用當歸川芎散若寒熱作痛屬肝經風熱用小柴胡湯加山梔川芎若內熱口乾屬腎經虛火用加味地黃丸如不應用加減八味丸餘當隨證治之

一選姚海山耳根赤腫寒熱作痛此屬三焦風熱也但中氣素虛以補中益氣加山梔炒黃芩牛蒡子治之而愈　一儒者因怒耳內作痛出水或用祛風之劑筋攣作痛肢體如束此肝火傷血也用六味丸料數服而愈　舉人毛石峰子年二十耳內出水或作痛年餘矣脈洪數左尺益甚此屬肝腎二經虛熱也用加減八味丸料一劑而愈　一男子每入房耳內或作痒或出水常以銀簪探入甚喜陰涼此屬腎經虛熱也用加減八味丸而愈　一婦人因怒發熱每經行兩耳出膿兩太陽作痛以手按之痛稍止

怒則胸脇乳房脹痛或寒熱往來或小便頻數或小腹脹悶此皆屬肝火血虛也先用梔子清肝散二劑又用加味逍遙散數劑諸證悉退又以補中益氣加五味而全愈　一婦人經行後因怒氣勞役發熱寒熱耳內作痛余以經行為血虛用八珍湯加柴胡怒氣為肝火用加味逍遙散勞役為氣傷用補中益氣湯加山梔而愈　一婦人耳內外作痛或腫焮寒熱發熱面色素青黃經行則變赤余以為怒氣傷肝鬱結傷脾用加味歸脾湯加味逍遙散而愈　一婦人耳內腫痛寒熱口苦耳內出水焮連頸項飲食少思此

肝火甚而傷脾也用小柴胡湯加山梔牡丹皮稍愈用加味逍遥散及八珍湯加柴胡山梔丹皮調補肝脾而全愈　一婦人耳內外作痛或項側結核內熱晡熱月經不調吐痰少食胸膈不利余以爲鬱怒傷肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生開氣夕用加味逍遥散以清肝火生肝血而愈　太卿魏莊渠癸卯仲冬耳內作痛左尺洪大而澀余曰此腎水枯竭不能生肝木當滋化源彼不信仍雜用降火之劑余謂其侍陛時若曰莊渠不能生腎水來春必不能起至明年季春十八日復請治昏憒不語頸項之分已有膿

矣且卵縮便數方信余言求治辭不克用六味丸料壹劑陰莖舒出小便十減六七神思頓醒余曰若砭膿出庶延數日爲立嗣之計否則膿從耳出死立待矣或謂不砭可生者余因辭歸翌日果耳內出膿至二十一日巳未火日而卒　憲副姜時川癸卯冬右手寸口浮數而有痰口內若有瘡然余曰此胃火傳於肺也當薄滋味慎起居以御之甲辰秋尺脉洪數而無力余曰此肺金不能生腎水無根之火上炎也宜靜調養滋化源以治之彼云今喉耳不時燥痛肢體不時發熱果是無根之火殞無疑矣後會劉古峽

云姜公之病已如所料遂往觀喉果腫潰脉愈洪大又誤以爲瘡毒而以苦寒之劑卒於仲春二十八日乃巽火之日使其亡也則尚能延至仲夏

當歸川芎散　治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利腹脅痞痛

當歸　川芎　柴胡

白朮　芍藥各一錢　山梔[illegible]錢

牡丹皮　茯苓各[illegible]分　蔓荊子

甘草[illegible]

右水煎服　若肝氣不平寒熱加地骨皮　肝氣實加柴胡黃芩　氣血虛加參芪熟地　脾虛飲食少思加苓朮　脾虛胸膈不利加參芪　痰滯胸膈加朮半　肝氣不順胸膈不利或小腹痞滿或時攻痛加青皮　肝血不足胸脇不利或小腹滿痛加熟地黃　肝血虛寒小腹時痛加肉桂　日晡發熱加歸地

梔子清肝散 一名柴胡梔子散　治三焦及足少陽經風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒

熱往來
柴胡　梔子　牡丹皮各壹錢
茯苓　川芎　芍藥
當歸　牛蒡子炒各　甘草伍分
右水煎服　若太陽頭痛加羌活
加味地黃丸　治肝腎陰虛瘡證或耳內痒痛出水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澁等證
乾山藥　山茱萸　牡丹皮
澤瀉　白茯苓　熟地黃
柴胡　五味子各另為末等分
右將二地黃搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉蜜為丸桐子大每服百丸空心白湯送下不應用
加減八味丸

口齒部四
○口瘡附齦痛第八
丹上四叔公口瘡舌強多痰
白朮　甘草梢　人參
赤芍藥　木通　生地黃半錢
黃連炒壹錢　瓜蔞子拾貳枚
右作一貼煎
黃連升麻湯　治口舌生瘡
升麻壹錢半　黃連柒錢
右為細末綿裹含津嚥
丹　治口瘡黃蘗炙同細辛各等分為細末每用少許糝之時當滿口有涎吐之少刻又傳又吐如是五七次愈
綠袍散　治大人小兒口瘡多不能合
黃蘗壹兩　甘草貳兩　青黛壹兩
右先取二味為末入青黛同研勻乾貼
黃蘗蜜炙與青黛各等分同為末入生龍腦字許治心脾熱舌頰生瘡當揩瘡上有涎即吐之
蜜柏散　治口瘡久不愈者用黃蘗不計多少蜜炙灰色為細末乾摻上臨用忌酒醋醬犯之則瘡

類愈

丹 好酒煮黃連呷下立愈

本 治膈上熱極口舌生瘡

膩粉 一錢 上

右一味臨臥時用 涎出則吐之用温湯嗽口

未痊可又用

百 治口瘡以 打去汁蘸汁温含令

易之

三 五倍子 以末搽之便可飲食

王 治口瘡以膽礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可

痊八分 方用白礬湯漱口亦妙 凡口瘡用西

瓜漿水 以此徐徐飲之冬月無留皮燒灰噙

之

醫 口瘡以好墨研螻蛄極細傅之立效 胡氏 螻蛄走

小瘡胸膈其 力峻氣猛惟虛氣上攻瘡者

戒勿用惟 有熱在上焦者用之

子和治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗌下至

胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次

服黃連解毒湯不十餘日皆釋

丹 口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上宜

用理中湯甚則加附子

斗 治滿口生瘡此因虛火上攻口舌生瘡

草烏頭 一个 南星 一个 生薑 壹塊

右焙乾為細末每服二錢臨臥時用醋調作掩子

貼手足心來日便愈

丹 口瘡以遠志醋研

本 治口舌生瘡用生薑 臨臥時細嚼含 不得

開口出氣眠着不妨

保 半夏散 治少陰口瘡聲絕不出者是寒遏絕陽

氣不伸 半夏製 一兩 桂 水一盞

分作二服

甘礬散 治太陰口瘡

甘草 白礬 栗子大 右含化嚥津

乳香散 治赤口瘡

乳香 沒藥 各一錢 白礬 半錢 銅綠 少許 研末摻之

沒藥散 治白口瘡

乳香 沒藥 雄黃 各一錢 輕粉 半錢 巴豆霜 少許 為

末摻之

丹 治口瘡猪蹄殼燒為末傅之立止 方 治口瘡

與走馬疳 帶中木去皮燒存性入少白梅灰與少

搽細末傳之立安

羅紅芍藥散

心病口瘡　紫桔紅蒼　三錢四兩　五服安寧

右件紫菀桔梗紅芍藥蒼朮各等分為細末子肝肆兩批開摻藥末叁錢用麻紮定火內燒令熟空心食之白湯送下大効

聖惠小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白僵蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傳之立效

陳王口內熱瘡以古文錢貳拾文燒令赤投酒中飲之立瘥

口舌生瘡胸膈疼痛用炒豉細末含一宿便瘥

聖治口瘡用硼砂不拘多少火煅為末摻瘡即愈

又法用檳榔燒灰存性為末入輕粉傳之

又治口瘡取桑樹汁先以髮拭口卽以汁傳之

東垣化毒法凡口瘡無問新舊遇夜卧將自己兩丸以手擦緊左右交手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如此於虛陽濟而生者一夜愈久病諸口瘡三夜愈如鼻流清涕惡寒者擦二丸何上揉之數夜可愈

○牙癰

或問牙根主癰何如曰此名附牙癰屬足陽明胃經熱毒所致宜服[illegible]毒飲或刺出惡血則愈

清胃散　治積熱唇口[illegible]牙齒斷潰爛腫痛頭面或惡寒發熱

升麻貳錢　[illegible]連黃　牡丹皮

當歸　生地黃各[illegible]

右水煎服[illegible]

○骨槽風

或問牙根腫痛寒熱大作腐爛不已何如曰此名骨槽風也一名穿腮毒由憂思惡怒所致初起生於耳下及頸項間隱隱皮膚之內略有小核漸大如胡桃日增紅腫或上或下或左或右牙關緊急不能進食宜用鐵鋼探吐風痰服黃連消毒湯活命飲加玄參桔梗柴胡黃芩切不可用刀針有一人因用藥點破入風痰火上升嘔吐血瘀齒潰臭穢不食而死又一人上齒根連外腫痛後止根潰膿齒皆以牙癰治之久而不斂膿汁不絕其故乃曾生廣瘡即以結毒治之而愈

東垣神功丸　治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕齗肉將脫牙落血出不止

黃連去鬚淨酒洗壹兩　縮砂仁半兩　生地黃[illegible]
甘草[illegible]錢　藿香葉　木香
當歸身[illegible]錢　藿香葉如無以[illegible]葉代之
右爲細末水浸蒸餅爲丸菉豆大每服[illegible]丸加至[illegible]丸[illegible]白湯下食後服兼治[illegible]血不止[illegible]紫黑色及腸癖下行[illegible]心米飲送下其[illegible]而緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行腰間者

◎上腭癰

或問上腭生疽狀如紫葡萄何如曰是名懸癰屬手太陰足厥陰心包絡令人寒熱大作[illegible]不能伸縮口不能開閉欲伸而不能[illegible]出紅涎屬手足少陰經多三焦積熱所致宜黃連消毒飲加桔梗玄參急刺出惡血犀角地黃湯之壯實者一粒金丹下之過時不治飲食不入神昏脉亂者死

◎唇瘡

丹溪[illegible]以橄欖上消下汁傳之果効如神

羅多効散　治脣緊瘡及疹

訶子肉　五倍子各等分

右爲細末乾貼[illegible]効

丹 脣黃泡瘡烏頭炒灰研香油調傅之　胡氏方

脣上生瘡連年不瘥以八月藍葉壹斤搗取汁洗之不過三日瘥　千金方

脣上生瘡用白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即止

項部五

○百脉疽

鬼遺云百脉疽腫起環頸項疼痛身熱大渴不欲動止悄悄不能食此有大畏恐駭上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五日可刺導引不利導引見血八十日必死

○頸癰

靈樞云發於頸者名曰夭疽其狀大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脉内熏肝肺熏肝肺十餘日而死矣　或問頸上生癰何如曰是頸癰也屬

手少陽三焦經鬱火積憤驚惶所致宜先隔蒜灸服活命飲加玄參桔梗升麻及勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯若潰而不斂煩躁脹滿小便如淋嘔吐者死

一婦頸痛不消與神効瓜蔞散六劑少退更以小柴胡加青皮枳殼貝母數劑痛腫減大半再以四物對小柴胡數劑而平　一人神勞多怒頸腫一塊久而不消者藥不應予以八珍湯加柴胡香附每日更隔蒜灸數壯日飲遠志酒數盃漸消　一婦月水不行潮熱欬嗽肌體漸瘦胸膈不利頸腫一塊日久不消令服逍遥散月餘更服八珍湯加牡丹皮香附又月餘加黄芪白斂將月餘熱退腫消經行而愈　一人年踰二十每勞心過度頸腫發熱服敗毒散愈盛用補中益氣湯數劑而消　一人因暴怒項下腫痛胸膈痞悶兼發熱用方脉流氣飲二劑胸膈利以荊防敗毒散二劑而熱退肝脉尚弦數以小柴胡加芎歸芍藥四劑脉證頓退以散腫潰堅丸一料將平惟一核不消服遇神仙無比丸貳兩而瘳　一兒甫周歲項患胎毒予俟有膿刺之膿出而乳食如常用托裏藥月餘而愈又一兒患此待其自潰出膿至不救

大抵瘡淺宜砭深宜刺使瘀血去於毒聚之始則易消也况小兒氣血又弱膿成不針不砭鮮不斃矣

一人項下患毒膿已成因畏針欲延至胸赤如霞其脉滑數飲食不進月餘不寐甚倦予密針之膿出即睡覺而思食用托裏散兩月餘而愈又一人患此及時針刺數日而愈　一人素弱患此不針潰透頷頰血氣愈虛而死　一婦因怒頸腫後月水不通四肢浮腫小便如淋此血分證也先以椒仁丸數服經行腫消更以六君子湯加柴胡枳殼數劑頸腫亦消矣亦有先因小便不利後身發腫致經水不通名曰水分

宜芎歸丸治之良方云婦人腫滿若先因經水斷絕後致四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣宜服椒紅丸

○項中疽

或問頸後腦下發疽何如曰此即對口瘡也屬督脉陽獨盛氣有餘火炎上而發痈也急服烏金散勝金丹汗之壯實者一粒金丹下之俟潰出膿水入風入搐者難治有毒邪之盛鮮血聚溺而致毒攻心腹脹譫語者死 此證欲赤腫痛可治若根大精神昏憒即難治也量表裏虛實而為汗下內托內消外用大圍藥縮住中點六灰膏之類破泄其毒不可走失根脚若欲流兩肩脊名不可療也或云先服追疔奪命湯二貼後服活血化毒湯

治對口瘡妙方用新鮮茄蒂七箇秤若干重又用鮮何首烏秤同茄蒂重用水二鍾煎服一服出膿一服收口如無鮮茄蒂者亦可但不及鮮者有力此方輕劑不可以治重病觀者勿泥也

○天柱疽

或問天柱骨上極痒入骨惡心吐逆脊背拘急何如曰此名天柱疽急隔蒜灸痒止為度無蒜明灸可治服活命飲加羌活桔梗烏金散勝金丹選用灸而有泡者吉無泡者凶服之得汗可治無汗難治若潰爛神昏悶噦惡心血不止者死

○杼疽

或問頸上兩耳後生疽何如曰此名杼疽初不甚痛但痛痒不時而出清水漸漸長大如杯半紫黑者是也亦名此骨瘡急服八陣散奪命丹活命飲加桔梗柴胡若過時潰爛日久出骨者大惡之證也此證多生於積鬱之人惡多見犯禁者不治

○夾喉疽

或問結喉之兩旁生疽何如曰此名夾疽屬手少陰心經足太陰脾經足厥陰肝火熱毒上攻而然宜犀角犀甲宜黃連消毒飲活命飲加玄參桔梗黃連潰內者難治虛火上升痰壅飲食不進者死

○結喉癰

或問云瘍發于喉中名曰結喉癰不治化為膿塞不通寒熱作則穀食不日而已 或問結喉上何如曰是名又名猛疽以其勢毒猛烈可畏也屬任脉及手太陽手少陰經積熱憂憤所致急宜清熱攻毒用犀角

及黃連消毒飲紫金丹烏金散選用壯實者一粒金
丹下之若遇時不治須臾呼咽嗌者死

○瘰癧馬刀 結核連續者為瘰癧形長如蛤者為馬刀 在耳後耳前或在耳下連及頤頷下至缺盆皆謂之瘰癧在胸及腋之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之

集驗云大人瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異及結
核寒熱之殊其證皆由忿怒氣逆憂思過甚風熱邪
氣內搏於肝經蓋怒傷肝肝主筋故令筋縮結蓄而
腫也其候多生於頸項胸腋之間初發結核如豆
粒後若梅李累累相連大小無定初覺憎寒壯熱咽

外科三

項強痛腫結不消者便當服散腫潰堅湯或五香連
翹湯之類散之或用壯礪大黃湯疏利三兩行
後用十香膏之類貼之及諸淋洗敷貼等藥治
之宜得消散若不散可用內消丸之類消之或腐
潰之仍斷厚味息怒滌慮調理之不然恐日久變生
壞證多嗽而成勞瘵之疾不可治矣又有馬刀瘡亦
生於頸腋之間有堅硬寒熱刺痛其狀如馬刀赤色
如火燒烙極痛此瘡甚猛宜急治之不然多致危殆
也宜詳辨之　丹溪云夫瘰癧初發必起於少陽經
不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積

曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實
者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難矣
為可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少
婦人見此若月經不作寒熱可生稍久轉為潮熱
其危甚矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也
戴復庵云瘰癧之病皆與氣爭結核在頸多結於
頸項之間累累大小無定發作寒熱膿血潰漏或此
沒而彼起宜於隔宿用米飲調下其有青者只錢繳
動時進黑白散必有物如蝌蚪從小便出至數枚
其腫核則愈仍常服四七湯加木香或蘇子降氣湯

外科三

其延頸者俗名蟠蛇癧難治　薛新甫云瘰癧之病
屬三焦肝膽二經怒火風熱血燥或肝腎二經精血
虧損虛火內動或恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內
搏於肝蓋怒傷肝肝主筋肝受病則筋累累然如貫
珠也其候多生於耳前後項腋間結聚成核初覺憎
寒惡熱咽項強痛若寒熱焮痛者此肝火風熱而氣
病也用小柴胡湯以清肝火并服加味四物湯以養
肝血若寒熱既止而核不消散者此肝經火燥而血
病也用加味逍遙散以清肝火六味地黃丸以生腎
水若腫高而稍軟面色痿黃皮膚壯熱膿已成也可

用針以决之及服托裏之劑若經久不愈或愈而復發膿水淋漓肌體羸瘦者必純補之劑庶可收斂否則變成九瘻內經曰陷脉為瘻留連肉腠即此病也外用豆豉餅琥珀膏以祛散寒邪補接陽氣內服補中益氣湯六味丸以滋腎水培肝木健脾土亦有可愈者大抵肝膽部分結核不問大小其脉左關弦緊左尺洪數者乃腎水不能生肝木以致肝火燥而筋攣須用前藥以滋化源是治其本也外臺秘要云肝腎虛熱則生癧病機云瘰癧不係膏粱丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致止宜補形氣調經脉其瘡自消

散蓋不待汗之下之而已也其不詳脉證經絡受病之源者下之則犯經禁病禁虛虛之禍如指掌若脉洪大元氣虛敗為不治若面皝白為金尅木亦不治若眼內赤脉貫瞳人見幾條則幾年死使不從本而治妄用伐肝之劑則誤矣蓋伐肝則脾土先傷脾傷則損五臟之源矣可不慎哉 按脉經云人年五六十其脉大者脾俠背行若腸鳴馬刀俠癭者皆為勞得之可見瘰癧之證多起於虛也薛氏之論可為典要故詳言之

結核 初實證寒壯熱咽項強痛腫結不消者以羌活連翹湯又宜長服消癧丸却以鈹針刺破出血以拔毒湯熱淋洗日洗五七次針孔五七次放蟾酥末少許於針處上以琥珀膏貼之更以內消膏貼之久久自然而消也如不散者用鐵箭拔毒膏點破決以下品錠子取去惡肉用生肌散之用十宣散之類托裏若毒攻心嘔吐者用護心散托裏散發出毒此要癰針灸法同施若已潰不愈者宜益氣養榮湯八物湯加柴胡地骨皮夏枯草香附子貝母多服取効凡用錠子藥線必用托裏之劑服之 若赤腫痛脉沉數者邪氣實也宜泄之以化毒消腫和裏散加減

腫痛憎寒發熱或拘急脉浮數者邪在表也宜散表以荊防敗毒散加減 因怒結核或腫痛或發熱者宜疏肝行氣以小柴胡湯加青皮苦梗木香紅花桃仁 膿潰不斂者宜補氣血以益氣養榮湯 抑鬱所致者解鬱結調氣血以益氣舒鬱湯 潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補以益氣養榮湯及用十全大補湯加香附子貝母遠志 虛勞所致者宜補之先以補中益氣湯次以益氣養榮湯加減 因有核潰而不斂者屬而補之以針頭散腐之以益氣養榮湯補之 脉實而不斂或不消者下之以羌活連翹湯

腫痛發寒熱大便秘以羌活連翹湯次以神仙活命飲　耳下結核腫痛發寒熱宜荊防敗毒散表證悉退以散腫潰堅湯　潰後核不腐以益氣養榮湯更敷針頭散腐之　腫硬不消亦不作膿服散堅敗毒藥不應宜灸肘尖肩尖服益氣養榮湯而消氣血壯實之人脉沉實而大者亦不覺損方可進必効散遇仙無比丸下其毒若其毒一下即止二藥更服益氣養榮湯調理　瘡口不斂宜用豆豉餅灸之以琥珀膏十香膏貼之　潰後發熱煩躁作渴脉大無力此血虛也宜以當歸補血湯次以聖愈湯再入

物湯加貝母遠志　每勞心過度頭悶發熱服敗毒藥愈甚以補中益氣湯數劑而消

治驗　閣老楊石齋子年十七發熱作渴日晡頰赤左關尺脉大而浮此肝腎陰虛用補陰八珍湯五十餘劑又加參芪二十餘劑而潰但膿水清稀肌肉不生乃以參芪歸术爲主佐以芍藥熟地麥門五味膿水稠而肌肉生更服必効散一劑其毒去而瘡口斂　容臺張美之善怒孟春患此或用伐肝之劑不愈余以爲肝血不足用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源至季冬而愈　一儒者愈後體瘦發熱晝夜無定此足三陰氣血俱虛用八珍加麥門五味二十餘劑又用補中益氣加麥門五味及六味丸而愈　儒者張子容素善怒患此久而不愈瘡出鮮血左關弦洪重按如無此肝火動而血妄行證屬氣血俱虛用補中益氣湯以補脾肺用六味丸以滋腎肝而愈

一人耳下患五枚如貫珠年許尚硬面色痿黃飲食不甘勞而發熱脉數軟而濇以益氣養榮湯六十餘劑元氣已復患處已消一核尚存以必効散二服而平　一人先於耳前耳下患之將及項與缺盆三年遂延胸腹診之肝脉弦數以龍薈丸次以二丸治

之將愈肝脉尚數四年後小腹陰囊內股皆患毒年餘不斂脉診如前以清肝養血及前丸而愈　一人因怒耳下及缺盆患癧潰延腋下形氣頗實瘡口不合治以散腫潰堅丸而愈　一人因勞而患忽然發熱脉洪大按之無力宜用補中益氣湯彼不信輒服攻伐之劑吐瀉不止而死　大抵此證原屬虛損若不審虛實而犯病禁經禁鮮有不誤常治先以調經解鬱更以隔蒜灸之多自消如不消則以琥珀膏貼之候有膿則針之否則變生他證設若無寒無熱等症只宜加減症之劑不可下慢餘經或氣血已傷

而核不消却服散堅之劑至月餘不應氣血亦不覺
損乃進必効散以遇神仙無比丸其毒一下即止已
藥更服益氣養榮湯數劑以調理瘡口不斂豆豉餅
琥珀膏貼氣血俱虛或不慎飲食起居七情者俱不
治然此證以氣血為主氣血壯實不用追蝕之劑彼
亦能自腐但取去使易于收斂若氣血虛不先用補
劑而數用追蝕之藥適足以敗矣若發寒熱眼內有
赤脈貫瞳人者亦不治一脈者一年死二脈者二年
死　一人患之痰盛胸痞寒熱脾胃脈弦此脾土虛
肝木乘之也當實脾土伐肝木為主彼以治痰為先

乃服苦寒化痰藥不應又加破氣藥病愈甚始用六
君子湯加芎歸數劑飲食少思以補中益氣湯倍加
白朮月餘中氣少健又以益氣養榮湯四月腫消而
血氣亦復矣夫右關脈弦弦屬木乃木盛而剋脾土
為賊邪也虛而用苦寒之劑是虛虛也况痰之為病
其因不一主治之法不同凡治痰利藥過多則脾氣
愈虛虛則痰愈易生如中氣不足必用參朮之類為
主佐以痰藥　一人久而不斂神思困倦脈虛予欲
投以托裏彼以為迂乃服散腫潰堅湯半月餘果發
熱飲食愈少復求治投益氣養榮湯三月畧且讚寧

得以收斂　齊氏曰結核瘰癧初覺宜內消之如經
久不除氣血漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出
瘡口不合聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托
裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣
虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法
使瘡無變壞之證所以宜用也
一婦患瘰癧延至胸腋膿水淋漓日久五心煩熱肢
體疼痛頭目昏重心忪頰赤口乾咽燥發熱盜汗食
少嗜臥月水不調臍腹作痛下部血虛而然非瘵故
也服逍遙散月餘少可更服八珍湯加牡丹皮香附

子又月餘而經通再加黃芪白斂兩月餘而愈　一
婦久患瘰癧不消自汗惡寒此血氣俱虛服十全大
補湯月餘而潰然堅核雖取瘡口不斂灸以豆豉餅
仍與前藥加香附烏藥兩月而愈　一婦擬潰後發
熱煩躁作渴脈大無力此血虛也以當歸補血湯六
劑頓退又以聖愈湯數劑少健加以八珍湯加貝母
遠志三十餘劑而斂　一婦潰後核不腐以益氣養
榮湯三十餘劑更敷針頭散腐之再與前湯三十餘
劑而斂　一婦久潰發熱月經過期且少用逍遙散
兼前湯兩月餘氣血復而瘡亦愈但一口不收敷針

頭散更灸前穴而痊　一婦肝經積熱患而作痛脉沉數以射干連翹湯四劑少愈更用散腫潰堅丸月餘而消　一婦瘰癧與養氣血藥不應服神効瓜蔞散二劑頓退又六劑而消却與托裏藥氣血平復而愈　一婦年踰三十瘰癧已潰不愈與八珍湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉更與必效散二服瘡口遂合惟血氣未平再用前藥三十餘劑而平　一婦瘰癧不消膿清不斂用八珍湯少愈忽有背痛不能回顧此膀胱經氣鬱所致當服防風通氣湯彼云瘰癧膽經病也非經火動而然

自服涼肝降火之藥反致不食痛盛予診其脉胃氣愈弱先以四君子加陳皮炒芍藥半夏羌活蔓荊子四劑食進痛止繼以防風通氣湯一劑而愈　一女年十七患瘰癧久不愈月水尚未通發熱咳嗽飲食少思老嫗欲用巴豆肉桂之類先通其經予謂此證潮熱經不調者不治但喜脉不數且不潮熱尚可治須養氣血益津液其經自行彼欲効仍用巴推此[illegible]情之劑人助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則[illegible]虛更適而不止飲食愈少更加潮熱遂致不救　婦人瘰癧久不愈或以不旺之證用散腫潰堅湯[illegible]

之腫硬益甚乃以爲肝經氣血虧損當滋化源用六味地黃丸補中益氣湯至春而愈此證若肝經風火暴病元氣無虧宜用前湯若風木旺而自病宜用瀉青丸虛者用地黃丸若水不能生木亦用此丸若金來尅木宜補脾土生腎水大凡風木之病壯脾土則木自不能尅矣若行伐肝則脾胃先傷而木反尅土矣　一婦患之恐不起致少寐年餘瘰癧破膿水淋漓經水或五十日或兩月餘一至誤服通經丸晨寒暮熱午前惡寒午後發熱余以爲思慮傷損脾血用[illegible]脾湯作丸午前以六君送下午後以逍遥送下兩月

餘得寐半載後經行如期年餘瘡愈　一婦瘰癧後遍身作痒脉大按而虛以十全大補湯加香附治之而愈大凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若作風症治之必死　予所治一婦人病瘰癧延及胸腋皆成大瘡相連無好皮肉[illegible]人曰火淫所勝治以鹹寒命以[illegible]一[illegible]而看痂[illegible]用涼膈散解毒湯等劑皮肉反復如初

東垣連翹散堅湯　治耳下或缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇或已流膿作瘡或未破並皆治

之
當歸酒洗　黃芩生　連翹
黃芪酒炒　京三稜細剉同黃芪酒洗炒已上各半兩
土瓜根酒炒　草龍膽酒洗各壹兩　柴胡根壹兩貳錢
酒炒芩柒錢　炙甘草貳錢　黃連酒炒
蒼朮各叁錢　芍藥壹錢

右以一半為細末煉蜜為丸如菉豆大每服壹伯丸或壹伯伍拾丸一半㕮咀每服伍錢半兩水壹盞捌分先浸半日煎去滓熱服臨臥頭低八分高去枕而臥每口作十次嚥留一口送下丸藥服畢如常安臥

升陽調經湯　治瘰癧繞頸或至頰車此瘡出足陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎中來也是戊上傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦得

升麻捌錢　連翹　草龍膽酒炒
桔梗　黃連去鬚酒洗　京三稜細剉同廣茂酒炒
葛根　甘草炙各伍錢已上　知母酒洗炒
廣茂酒洗炒各壹兩　細黃芩酒炒陸錢　黃檗去粗皮酒炒二次貳錢

右秤一半作丸煉蜜丸如菉豆大每服一伯丸或壹伯伍拾丸一半㕮咀每服半兩若能食大便硬可旋加至柒捌錢止水貳盞先浸半日煎至壹盞去滓熱服臥身脚在高處去枕頭臨一口作拾次嚥之留一口作後送下丸子服藥畢臥如常此治法也

散腫潰堅湯　治馬刀瘡結硬如石在耳下至缺盆或至肩上或至脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頦或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破及流膿水並皆治之服藥多少臨病斟酌量病人飲食多少大便硬軟以意消息之

柴胡梢肆錢　草龍膽酒炒　黃檗去粗皮酒炒
知母炒　瓜蔞根酒洗　昆布去土
桔梗各半兩　甘草根炙　京三稜酒炒
廣茂酒洗炒　連翹　當歸各叁錢
白芍藥　葛根　黃連各貳錢
升麻陸錢　黃芩梢一半酒洗一半生用

右㕮咀每服陸錢或柒錢水貳盞浸半日煎至壹盞去查稍熱服於臥處伸脚在高處頭微低每噙一口作十次嚥至服畢依常安臥取藥在胸中停留故也另攢半料作細末煉蜜為丸如菉豆大

每服壹百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒

食後量虛實加減多少服皆倣此例

救苦勝靈丹湯　治馬刀挾癭者從耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其瘰癧在於頦下或至頰車者乃足陽明經之分野受心脾之邪而作也今將二證合治之

黃芪（貳錢護皮毛實表虛閉腠理又活血脈生血亦瘡家之聖藥也）

人參（叄分補肺氣如氣短不調及喘者加之）

真漏蘆（壹錢[illegible]以白[illegible]代之）

升麻壹錢　葛根（伍分足陽明）此三味俱本經藥

甘草（伍分能調中和諸藥瀉火益胃氣）

連翹（壹錢此一味十二經瘡中之藥不可無也能散諸血結氣聚此瘡家之神藥也）

牡丹皮（叄分去腸胃中留滯宿血）

生地黃（叄分）　熟地黃（叄分）　當歸身（叄分此三味諸經中和血生血涼血藥也）

白芍藥（叄分如夏月倍之其味酸其氣寒能補中益肺之虧損治腹中痛必用之冬寒則不可用）

肉桂（二分大辛熱能散結積陰證瘡瘍須當少用之此寒因熱用之意又為寒陰覆蓋其瘡用大辛熱[illegible]）　柴胡（[illegible]分功同連翹如瘡不在少陽經去之）

黍粘子（叄分無腫不用）　昆布（貳分其味大鹹若瘡堅硬甚者用之鹹能軟堅）

京三稜（煨貳分）　廣茂（叄分[illegible]若堅硬甚者用之）

羌活　獨活　防風（各壹錢上三味必已關手足太陽證脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者是也其防風辛溫若瘡在膈已上雖無手足太陽經證亦當用之為能散結去上部風邪也）

益智仁（貳分如唾多者胃不和也或病人吐沫吐食胃上寒者加之無則去之）

麥芽（壹錢[illegible]）　神麴（炒[illegible]為食不消化故也）　黃連（去須貳分以治煩悶）

厚朴（[illegible]貳錢貳分如腹脹者加之）　黃檗（炒叄分如有熱或腿腳無力加之如有煩躁欲去衣者腎中伏火也更宜加之無此證勿用）

右件為細末湯浸蒸餅和丸捻作餅子日乾搗如米粒大每服叄錢白湯下　如氣不順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實臨時斟酌與之無令藥多妨其飲食此治之大法也　如只在陽明分為瘰癧者去柴胡黍粘子二味餘皆用之　如在少陽分為馬刀挾癭者去獨活漏蘆升麻葛根加瞿麥穗叄分　如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病變之權也加黃芩黃連黃檗知母防己視邪氣在上中下而用之假令在上焦加黃芩（一半酒洗一半生用）在中焦加黃連（一半酒洗一半生用）在下焦加酒製黃檗知母防己之類選而用之　如大便不通而滋其邪盛者加酒製大黃以利之　如血燥而大便乾燥者加桃仁泥大黃　如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之　如風澁而大便不行

加燒皂角仁大黃桊丸以利之 如脉洪覺身有
氣溢而大便不通者加郁李仁一大黃以除風燥
如陰寒凝爲寒結祕而大便不通者以局方半硫
丸或加炮附子乾薑煎候冰冷服之
大抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣實壯
弱者當以苦寒之劑多加人參黃芪甘草之類以
瀉火而補元氣餘皆倣此

柴胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬
刀亦治瘰癧

柴胡 當歸尾 生甘艸
連翹 黃芩 牛蒡子
京三稜 桔梗各伍錢 黃連壹錢
紅花少許

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服此足攻裏內
消之劑

柴胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡

柴胡 連翹 知母酒製
黃芩炒各半兩 黃檗酒製 生地黃
甘艸炙各參錢 當歸尾壹錢 桂參分
牛蒡子貳錢 瞿麥穗陸錢

右剉如麻豆大每服參錢或伍錢水貳大盞煎至
一盞去滓食後稍熱服臨卧服之

消腫湯 治馬刀瘡

柴胡 黃芩生用各 黃連
牛蒡子炒各半錢 黃芪 瓜蔞根各壹錢
連翹參錢 當歸尾 甘草各壹錢
紅花少許

右㕮咀每服半兩水貳大盞煎至壹盞去滓食後
稍熱服忌酒濕麵

羅謙甫云曲陽縣劉禪師善治瘡瘍瘰癧其効更捷

役于四方太乙膏玉燭散尅効散翠玉膏用之每每
見効

太乙膏 治瘰癧瘡神効

沒藥肆錢 清油壹斤 黃丹伍兩
腦子研各 麝香 輕粉
乳香各壹錢

右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪入用慢慢熬柳枝
旋旋加下熬得爲度下火不住手攪至滴水不散
却入乳沒腦麝輕粉等味攪勻以磁器內盛用

尅効散

斑蝥肆拾玖箇去翅足炒不　櫻實肆拾玖粒
赤小豆肆拾玖粒　官桂　硇砂各半錢
右五味研爲細末初服壹字次服半錢次服叁字
又次服肆字煎章柳根湯送下空心服以小便淋
瀝併行消爲効惡心嘔吐黄水無妨其瘰癧自日
自消矣

玉燭散　治瘰癧自消和血通經
當歸　芍藥　大黄
甘草　熟地黄　芒硝
黄芩　川芎各等分
右爲粗末每服叁錢水壹盞生薑叁片煎至柒分
去滓温服日進一服七八日効

翠玉膏方見瘰瘡

羌活連翹湯　治瘰癧初發寒熱腫痛
防風　羌活　連翹
夏枯草　柴胡　昆布洗
枳殼　黄芩酒炒　川芎
牛蒡子　甘草　金銀花
右薄荷水煎服　次以追毒散行之以化堅湯消
之大効

内府藏本

防風羌活湯　治瘰癧發熱者
防風　羌活　連翹
升麻　夏枯草　牛蒡子
川芎　黄芩酒炒　甘草
昆布洗　海藻洗　殭蠶
右薄荷水煎服　虚者加人參當歸　實者加黄
連大黄

荊防敗毒散　治風熱上乘頸痛或因怒氣瘰癧寒壯
熱如服四五劑不退宜服益氣養榮湯

楊氏家藏治瘰癧方
荊芥　白僵蠶　黑牽牛各貳錢
斑蝥貳拾捌箇去頭翅足用糯米炒
右爲末臨臥時先將滑石末壹錢用米飲調服半
夜時又一服五更初却用温酒調藥末壹錢或貳叁
錢看強弱用服訖如小便無惡物行次日早再進
一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯
再進前藥一服更以燈心湯下調琥珀末壹錢重
服以小便内利去惡物爲愈如小便痛用青黛壹
錢以甘草湯調送下即止

嚴氏三聖丸　治瘰癧

丁香伍拾粒　斑蝥拾個　麝香壹錢另研

右為末用鹽豉伍拾粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸如菉豆大每服伍柒丸食前温酒送下日進三服五七日外覺小便淋瀝是藥之効或便下如爛筋膜之狀是病之根也忌濕麪毒食

保命連翹湯

連翹　瞿麥各壹斤　大黄叁兩　甘草壹兩

右㕮咀每服壹兩水貳椀煎至壹椀半早食後巳時服在項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸貳柒壯服藥不可住至五六十日方効

一方加大黄木通貝母知母一作各伍兩雄黄柒分檳榔半兩減甘草不用同前藥為細末熟水調下叁伍錢

三因必勝丸　治瘰癧不以年深月近及腦後兩邊有小結塊連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鯽魚壹個去腸肚了　雄黄壹錢另研　硇砂壹錢已上三味在鯽魚腹內仰安魚於炭火上燒煙盡取出　蜈蚣壹條酥炙　蓬朮半兩　梔子伍枚　皂角貳挺去皮燒存性

草麻子伍拾粒去殼　黄明膠叁文

右為末少用皂角貳挺去皮搥碎以水叁碗揉去滓煮精羊肉四兩爛搗入乳汁半兩同研成膏和前藥末丸如菉豆大以朱砂為衣温酒侵晨下拾丸一服至晚看肉泛搭子若真有伍箇則以五服藥取之視其所生多少以為服數既可更進數服

白花蛇散　治久漸瘰癧發於項腋間增寒發熱或痛或不痛

白花蛇酒浸去皮骨焙乾貳兩　犀角屑

青皮　黑牽牛半生半炒

右為末每服貳錢加膩粉半錢研勻五更糯米飲調下巳時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌發風壅熱物如已成瘡一月可効神効

小犀角丸　常服除去根本伐其源流應効如神諸瘰癧並宜服之

犀角　青皮　黑牽牛半生半炒

陳皮各壹兩　連翹半兩

右為細末用皂角貳挺去皮弦子泡捶以布絞取汁壹椀許又用新薄荷貳斤研取汁同熬成膏以

前藥末為丸如桐子大每服參拾丸連翹煎湯食
後服間以薄荷茶湯服

是齋立應散　治瘰癧神効已破未破皆可服

連翹　赤芍藥　川芎
當歸　甘草炙　滑石研各
黃芩　白牽牛生取末　川烏尖七箇　地膽去頭翅[illegible]
土蜂房[illegible]
黃[illegible]為[illegible]末[illegible]

右為細末每服抄一大錢匕濃煎木通湯調下臨
卧服毒根從小便中出澁痛不妨毒根如粉片塊
血爛肉是也如未効再服繼以薄荷丹解其風熱
且地膽性帶毒濟以烏尖或衝上麻悶不能強制
嚼葱白一寸茶清下以解之如小便澁燈心湯調
服五苓散疼處用好膏藥貼若癰疽用此宣導惡
毒本方去黃芩不用

雌雄散　治瘰癧

斑蝥[illegible]　貫衆貳錢
鶴虱　甘草

右細末作兩服飽飯後好茶濃點一盞調下

遇仙無比丸　專治瘰癧

白朮　檳榔　防風
黑牽牛半生半炒　密陀僧　郁李仁湯泡去皮
斑蝥去翅足用糯米炒　甘草[illegible]各

右為細末麪糊為丸如梧子大每服貳拾丸早晚
煎甘草檳榔湯送下服至一月覺腹中微疼於小
便中取下瘰子毒物有如魚目狀已破者自合未
破者自消

射干連翹湯　治瘰癧寒熱

射干　連翹　玄參
赤芍藥　木香　升麻
前胡　山梔仁　當歸
甘草炙各壹兩　大黃炒貳兩

右㕮咀每服參錢水壹盞煎柒分去查入芒硝少
許食後溫服日再服

栝蔞子散　治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧

栝蔞子　連翹　何首烏
皂角子仁　牛蒡子微炒　大黃微炒
白螺殼　梔子仁　漏蘆
牽牛微炒　甘草炙各半兩

右為細末每服貳錢匕食後溫酒調下

枳殼丸　治瘡疽瘰癧腫毒瘰癧

枳殼（麩炒去穰）　牽牛（頭末）　木香

青皮（各壹兩）　甘草　大黃

右為細末用皂角長壹尺許者叁挺（[illegible]）炮熟搥碎以好酒煮軟挼取汁於沙鍋內熬和前藥末為丸如梧桐子大每服叁伍拾丸食後臨臥茶下日進二服

內消丸　治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消矣大効

青皮　陳皮（[illegible]）　牽牛（[illegible]）

薄荷葉（[illegible]兩）（極軟揉汁去滓熬成膏）　皂角（[illegible]不蛀者去黑皮[illegible]水壹升煮令[illegible]）

右將青皮陳皮末併牽牛末和勻用前膏子和丸如菉豆大每服叁拾丸食後荊芥茶清溫水皆可下

必効散　治瘰癧氣血雖無虧損內有癧核未去而不能愈

南硼砂（[illegible]錢）　輕粉（壹錢）　麝香（伍分）

巴豆（伍粒去[illegible]）　白檳榔（壹個）　斑蝥（肆拾枚去足翅同糯米炒）

右同研極細末取雞子[illegible]去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯甑候熟取出曝乾研末虛者每服半錢實者壹錢用炒生薑酒五更初調服如覺小腹痛用益元散一[illegible]其毒俱從大便出胎婦勿服毒去後多服益氣養榮湯瘡口自合

（精要云治瘰癧用必効散[illegible]服神効後有不問[illegible]不[illegible]發性猛大毒利水破血[illegible]之而投補劑或可愈[illegible]之劑亦肉[illegible]而瘡口不合又致不救）

雞鳴散　治瘰癧疼痛及熱毒所結核或久不消熱而不寒者

牽牛（[illegible]）　膩粉（[illegible]）　大黃（蒸壹錢）

朴硝（煉成粉[illegible]錢）

右為細末每服叁錢雞鳴時井花水調服以利為度如未利再服

法製靈雞彈　治瘰癧惡瘡刀傷久不生肌者

斑蝥（[illegible]）

右將雞子壹箇頂上敲開些小入藥在內紙封固了於飯上蒸熟取出去殼切開去藥左邊空心用米飯嚼服候小便通如米泔水狀如脂即驗也如大便小便不通却服琥珀散三二貼催之然後嘗

服後二藥尤佳

妙靈散　服前藥後却將此散與連翹丸相間常服

瘡愈方止

木香 各參錢　沉香 貳錢　牛膝

何首烏　當歸　海螵蛸

桑寄生 各壹兩　海藻 壹兩　海帶

青葙子　昆布　甘草節 各[illegible]

右爲末每服參貳錢食後溫酒調下

內消連翹丸

連翹 參兩　漏蘆　胡桃仁

夏枯草　土瓜根　射干

澤蘭　沙參　白芨 [illegible]

右爲末入胡桃仁研勻酒糊爲丸如桐子大每服

參伍拾丸空心食前鹽酒下

玉脂妙靈散

滑石 飛研　蠡粉

右每服壹錢煎川木通湯調下

六丁神散

苦丁香 陰乾　白丁香 壹錢　苦參末 伍分

磨刀泥 青石者佳 [illegible]　赤小豆

白僵蠶 去絲嘴炒　大蟠蝥 去頭足炒

右六味共爲細末每服壹錢重空心用無灰酒調

下

海荷丹　解瘰癧風熱之毒自小便去[illegible]後常須

服

杜薄荷　皂角 不蛀者 [illegible]　連翹

何首烏 米泔[illegible]　蔓荊子　京三稜 [illegible]

荊芥 各[illegible]

右爲末好豉貳兩半以米醋[illegible]豉爛令軟研

如糊和丸桐子大每服參拾丸食後熟水下日三

服病雖愈常服之

四聖散　治瘰癧服白花蛇散轉利後服此藥調之

永去其根

海藻 [illegible]　石決明　羌活

瞿麥穗 [illegible]

右件共爲細末每服貳錢用米湯調下清水[illegible]爲

度

瞿麥散　治瘰癧馬刀

瞿麥穗 [illegible]　連翹 [illegible]

右爲粗末水煎臨卧服此藥經効多不能速驗宜

待歲月之久[illegible]

海藻丸　治瘰生於頸項上交接名蛇盤瘰癧宜早治之

海藻[illegible]　白[illegible]

右等分為末用海藻菜[illegible]湯泡[illegible]梅取肉搗半用內泡[illegible]為丸如梧桐子大[illegible]服陸柒拾丸食後臨卧米飲送下[illegible]大便內泄出[illegible]爽淡菜連服為[illegible]於海藻上亦治[illegible]忌豆腐雞羊酒[illegible]六般

檳榔散　治氣[illegible]癧心[illegible]

檳榔　前胡[illegible]　赤茯苓

牛蒡子[炒各壹兩]　人參[illegible]　枳殼[illegible炒]

沉香　防風[illegible]　甘草[炙][illegible]

右㕮咀每服肆錢以水壹盞入生薑[illegible]分煎至[illegible]分去柤空心及晚食前溫服

[illegible]丸　治風毒瘰癧

皂角[illegible]

何首烏[illegible]　海荷葉[各肆]

右為細末以皂角汁煮[illegible]同煉蜜為丸如豌豆大每服叁肆拾丸食後溫湯送下

伏原丸[一名何首烏丸]　治風毒瘰癧

何首烏[蒸]　乾薄荷葉　玄參[各肆兩]

精羊肉[半斤]　皂角[illegible]

[illegible]

右以皂角水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐子大每服貳拾丸空心溫酒或薄荷湯送

絳宮丸

大黃[酒蒸]　白朮[illegible]　山查

連翹　川芎　當歸[illegible]

麥芽　桃仁　蘆薈

甘草　芸薹子[illegible]　黃連[酒炒]

南星[illegible]　海藻[illegible]　升麻

羌活　桔梗　防風[illegible]

黃芩[酒炒半兩]

右為末用神麯糊為丸已破加人參壹兩煎膏用甘草節[illegible]同煎

治瘰癧結核丸藥

黃芪[捌分]　玄參[捌分]　苦參

牛蒡子[各玖分]　枳實[炒]　大黃

羚羊角屑　麥門冬[去心各伍分]　連翹

人參去蘆 青木香 蒼耳子
升麻 茯苓 甘草炙
桂心 朴硝各肆分

右為細末煉蜜和丸如梧子大以酒下拾丸日夜三四服加至貳拾丸以知為度忌生冷豬肉海藻菘菜生葱酢莊物陳臭等物

水紅花飲 治瘰癧腫核結硬不消及膿汁傷穿不瘥

水紅花不拘多少半生用半炒

右粗搗篩每服貳錢水壹盞煎柒分去滓溫服食後臨卧日參好酒調亦可

又方

牡蠣不以多少用炭深火上以炭火燒通赤盞取半斤爲細末
甘草末取末六兩

右研勻每服貳錢食遠以建茗同點服一服忌魚酒鮓等油膩海味等物

治頸上塊動者

貝母去心 甘草壹錢

右各另為末和勻每服壹錢茶清調下食後

許學士云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功而經不言觀其能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効此草三四月開花夏至邊便枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之

本事方治氣瘰癧

生附子壹枚 食鹽 小便

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮焙乾為末用黑豆煮研為膏丸附子末如梧子大每服拾丸酒吞下早晚二服

治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一稱煅通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取肆兩玄參參兩并搗羅為末以麪糊為丸如梧桐子大早晚食後臨卧各服參拾丸酒下小將其癧亦除根

肘後治頷下瘰癧如梅李大宜速消之海藻壹斤酒壹升漬數日稍稍飲之

又方取貝參子微炒研為細末薄荷酒調貳參錢服治瘰癧久則効

初虞世治瘰癧用夜合草遇夜則其葉閉合本草名

合明俗名海錢所出水田中貼水面生取其葉搗
自然汁服之仍敷患處効
保命文武膏　治瘰癧用桑椹黑熟者貳斗以布袋
絞取汁石器中熬成膏每白湯化下壹匙日三服
紅者晒乾爲末湯調服
聖惠治瘰癧腫痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥炙
黃搗羅爲散每日空心粥飲調下壹錢匕
破結散　大治石癭氣癭血癭肉癭馬刀瘰癧等證
海藻洗淨　龍膽草　海蛤粉
通草　貝母　礬石
昆布酒洗淨　松蘿各叁錢
麥麪炒　半夏麴
右爲細末每服貳錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚
雞肉五辛生菜　有人於項上生瘰大如茄子潮
熱不食形瘦日久百方不効後得此方去松蘿加
真桑寄生一倍服五日後其瘡軟而散熱退而愈
屢試數人皆効
益氣養榮湯　治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項
等處患腫不問軟硬赤白腫痛或潰而不斂
人參　茯苓　陳皮

貝母　香附子　當歸酒拌
川芎　黃芪鹽水拌炒　熟地黃酒拌
芍藥炒各壹錢　甘草炙　桔梗各伍分
白朮炒貳錢　柴胡陸分
右薑水煎服
附散腫潰堅丸　治瘰癧馬刀瘡服益氣養榮湯不
能消散者宜服此丸五日又服益氣湯五日如此
相兼服之不應以針頭散傅之
知母　黃蘗各酒拌　瓜蔞根酒拌
昆布酒洗炒　桔梗　蓬莪酒拌炒
連翹　黃連炒　京三稜酒拌炒
葛根　白芍藥各柒錢　升麻
當歸尾酒拌　柴胡　甘草各壹兩
草龍膽酒拌肆兩　黃芩壹錢伍分一半酒炒一半生用
爲細末煉蜜爲丸如菉豆大每服壹伯丸或壹伯
伍拾丸滾湯送下
又治瘰癧
人參　白朮　當歸
陳皮　芍藥酒浸各壹錢　川芎
香附子　茯苓　半夏各伍分

甘草少許
右作一服薑貳片以金銀藤煎湯壹鍾半煎前藥
食後就呑絳宮丸伍拾粒方見前
補陰八珍湯　治瘰癧等瘡屬足三陰虛者
當歸　川芎　熟地黃
芍藥　人參　白朮
茯苓　甘艸　黃檗酒炒黑
知母酒炒各壹錢　右水煎服
夏枯草湯　治瘰癧馬刀不問已潰未潰或日久成
漏用夏枯草陸兩水貳鍾煎至柒分去柤食遠服

此生血治瘰癧之聖藥虛甚當煎濃膏服并塗患
處多服益善兼十全大補湯加香附子貝母遠志
尤善
初虞世云瘰癧多生肩項或赤或白或沉或浮初生
如豆久似核年月浸久其大如梅或如雞卵排行成
列或生二三或生六七俗云蟠蛇癧是也用性努力
思慮過久則疾痛亦腑繼之早治爲上
流注癧婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着
初生在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不瘥
自破孔竅相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注癧也

又名千歲瘡宜服托裏救苦神應丸
川烏附去皮臍生用　當歸酒浸壹錢　沒藥
白芷　陳皮　甘草節各壹兩
烏頭伍兩　蒲黃生壹兩　蟬蛻水洗壹兩
大皂角米醋炙去皮弦子
右用皂角敲碎水肆大椀煎至貳大椀濾去柤用
汁一同煮烏頭川烏候烏頭軟切作片焙如泥其餘
諸藥即另爲末和烏頭泥爲丸如桐子大每服陸
拾丸飢飽皆用薄荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴其
處必生腫肉如指大或黑或白乃風與氣搏宜驅

風行經散氣之劑以化氣調經湯主之
化氣調經湯　與神應丸間服治流注癧
香附子酒浸壹宿日乾　羌活　白芷各壹兩
牡蠣火煅　甘草　天花粉
皂角刺各半兩　橘皮去白壹兩
右爲細末每服貳錢用白湯不拘時調下日二次
如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應
丸
辰砂　血竭各壹錢　麝香研細
大黃　大甘草節各半兩為末

右各㕮咀河水壹鍾煎至半鍾濾前末子臨卧服
之
瘰癧者生一箇也發於頭項最難治但宜如前煎
服之日久自消或發於頸骨亦難治用毒藥療之爲
久浸漬日久　蓮子癧　[illegible]數枚生於項之左
右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬按不動
者乃不可生憎寒發熱煩渴凡遇此證至難治雖神
聖亦無如之何也已
重臺癧生於項頸或左或右初則单窠結在上或在
下重疊見之是名重臺癧此證藥不可療不可針灸
[illegible]瘰癧　八　外科一　八十六
若是癧行其肺痛發渴生瘡萬死一生害人極速初
覺有之急用小竹角丸粉金散治之　燕窠癧形似
燕窠不可治
程石香治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏
於中外用綠雲膏貼之三日後取去核中膿血腐爛
取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源膜去
後出者皆愈或不肯收如銀杏者蓋皆開了用藥生
之其自潰者猶如木弊之腐熟肉雖潰而核猶存故
膿水淋漓久難得愈治者用鐵烙燒赤烙去其破核
猶存者併肉潰處又用金寶膏龍珠膏等藥追去舊

惡之根遂能長肉平愈隨經絡證候服除風熱無引
經之藥以除根本可獲全功也

蟾酥膏
蟾酥[illegible]　寒水石[illegible]
巴豆[illegible]
右各另研細作一處再研煉蜜爲丸如菉豆大每
用一丸或二丸三丸入針竅中如膿未盡再用數
丸以膿盡爲度

綠雲膏
黃連　大黃　黃芩
玄參　黃蘗　木鱉子去殼各壹錢
八　外科三　八十七
右細切用香油壹兩同煎焦色去藥入淨松香伍
兩再煎成膏濾入水中扯拔令色白入銚再熬放
温入後藥　猪膽汁[illegible]　銅綠壹錢醋浸壹宿細濾去粗
右用竹篦攪温攪勻然後如常攤貼無治瘡口不
乾加乳香沒藥輕粉尤妙

金寶膏　去腐肉朽肉不傷良肉新肉
桑柴灰[illegible]
穿山甲[illegible]　信砒[illegible]　杏仁[illegible]
山甲研細　生地黃[illegible]　辰砂[illegible]錢

粉霜另研　麝香各半錢

右將灰汁濾過，鍋煎濃，下末候焦乾一半，下麝香末[illegible]粉霜[illegible]下[illegible]假成膏，下炒布灰[illegible]罐[illegible]收[illegible]所子內勿見風

龍珠膏

龍骨　[illegible]　枯礬[illegible]　海藻[illegible]

蘇木[illegible]

桑柴灰　石灰　蒼耳草灰[illegible]

右細切[illegible]水貳[illegible]煎至[illegible]濾去滓，又用以草紙兩層皮紙兩層放籮底，灰置在紙上，用熱湯熱淋取灰汁十碗許，澄清入鍋內煎成膏，用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉硇砂子收貯，取膏[illegible]上，再傳即去傳藥，併前件上所藥，其核即潰而愈。根小者但只塗藥於根上，其核自潰。

蝸牛散　治瘰癧潰與未潰皆可治

蝸牛[illegible]

右為末，入輕粉少許，豬骨髓調，用紙花量瘡大小貼之。一法以帶殼蝸牛不拘多少，用取去肉，入丁香七粒於七殼內，燒存性，與肉同研成膏，用紙花貼之。

粉金散

黃藥　草烏[illegible]　為末蜜調傳之

東垣龍泉散　塗瘡

瓦粉　龍泉粉[illegible]

廣茂　京三稜[illegible]　昆布[illegible]

右件同為極細末，煎熟水調塗之，用此去疾尤速。

奇功散[illegible]治瘰癧馬刀頑惡等瘡

野蜂房[illegible]　蜜陀僧　無名異[illegible]

皂角　乳香　沒藥[illegible]

右[illegible]用鹽泥封固，炭火煆[illegible]取出，同藥五味研為末，加麝香少許，用清油調勻搽敷上，濕即乾摻，其功神効。

蝙蝠散　治瘰癧多年不瘥

蝙蝠[illegible]　貓頭[illegible]

右同燒作灰，撒上黑豆[illegible]其灰骨化碎為細末，濕即乾摻，乾則油調傳，內服五香連翹湯。

螺灰散

大田螺[illegible]燒

右為細末，破者乾貼，未破者香油調傳。

治瘰癧未破者如神，白藥不應者累効。

杏樹葉(陰乾為末伍分) 萬年霜(即人中白火煆為末貳分)
蝙蝠(去□火焙乾) 白花蛇蛻(煆為末存性各□分半)
蜜蜂(燒存性為末)
右將杏樹葉末用青水調却入前四件藥末調勻傅患處即將皮紙一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就紙上潤之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼之飲子數帖其熱自退
取散瘰癧經驗神効
白礬(一兩) 海螵蛸(□□□□土氣者□)
右等分為末敷患處外以水紙掩之一夕而退

已破者
蜜蜂(窠□壹錢) 蛇蛻(各□分□) 蜈蚣(□□□收者)
右用香油肆兩將前三藥入油內用文武火煎成入光粉貳兩用桑枝柴條如筯大者急攪候冷出火氣七晝夜方可用帛攤作膏貼患處(傅已上二方)
(醫林□□驗不過服藥上五七日便消)
丹貼瘰癧方用大烏頭伍個火炮伍個生用並去皮臍大皂莢貳條半以好米醋貳鍾炙醋乾為度一半焙乾並去黑皮又用炒糯米一合□□同研末以好米醋於火上略頻微煖傅貼患處入蜜少許尤佳
不問有頭無頭大蟢伍枚日乾細研酥調如麵日兩度貼之(出聖惠方) 蟢
或破或不破項以下至胸前者皆治之用九真藤如雞卵大洗生嚼常服之取葉搗傅瘡上數服即(出□□□方)
治瘻用鯽魚裝芫花煅灰存性水調傅 治鼠瘻不歛鼠未出毛者焙乾蝙蝠黃小麥炒鬼箭根焙乾各為末和勻油調傅乾摻傅之
□治鼠瘻瘰瘻刺蝟皮瓦上炒存一味研為末加水銀粉乾傅
□治瘰癧經年不瘥者生玄參搗碎傅上日一易之
外治瘰癧燒狼屎灰傅上

治諸瘻疾(□本)
硃砂 硇砂 硼砂 馬牙硝(各等分)
右乳鉢內研細如麪用紙撚如香引子狀視瘡口大小作之蘸藥入瘡口中然腫甚用薄荷研細塗之待收口卻將大藥皮□□□為末摻入孔中如□□不乾卻用江子去殼不拘多少用麻油煎令黑去火氣後去江子入臘合如膏看瘡口大小塗之將白芨末水調塗上立効
治漏瘡用蛇蛻不拘多少瓦上焙乾為末用紙撚

蘸藥入瘡口立効（此孫子未詳恐即蛇莓子）

神聖換肌散（邪氏）去瘰癧頑瘡（此方乃足劫死肉蝕疳瘡有須急勿用）

白僵蠶（貳錢）　白礬（壹錢半）　砒霜（生）

蟹螯（三、翅足）　草烏頭　青鹽（各壹錢）

麝香（少許）

右研極細末乾摻此少許於瘡口內用膏藥蓋護其惡肉化膿水

生肌乾膿散　治瘰癧馬刀膿汁不乾者

黃連　貝母　降眞香（燒存性）

白芨　海螵蛸　五倍子（炒黑）

芸香（各伍錢）　輕粉（伍分）

右為末用藥水洗次摻此末外貼膏藥

如神散　治瘰癧已潰瘡肉不去瘡口不合者

白礬（煆枯壹錢）　松香（上壹錢）

右末摻少許於瘡口上外貼膏藥

【藥】三品錠子

上品　治一切痔漏

白礬（貳兩）　信石（壹兩伍分）　乳香

沒藥（各叁錢半）　雄黃（叁錢）

中品　治五漏六瘤氣核瘰癧

白礬（貳兩）　信石（壹兩叁錢）　乳香

沒藥（各叁錢）　雄黃（貳錢）

下品　治瘰癧氣核惡瘡六瘤

白礬（貳兩）　信石（壹兩伍錢）　乳香

沒藥（各貳錢半）　雄黃（壹錢）

右三品俱同製度先將信石打碎如豆大置甘鍋內上以礬末蓋之先用瓦盞蓋上以炭火煨令煙盡取出候冷為末用秫米糊為條候陰乾隨瘡大小深淺長短臨時裁度先以鈹鍼拔毒膏點破方以藥線紙入瘡內膏藥貼之藥線日換人要換藥一四次年深者五六次其根自腐潰如瘡露在外更用蜜水調搽瘡則乾上亦可

紫霞錠子　治瘰癧瘡瘤惡瘡

信石（煆）　白礬（煆）　硇砂（各壹錢）　膽礬

雄黃　硃砂（各伍分）　乳香　沒藥（各貳錢）

麝香　片腦（各少許）

右末糊糊為錠子如豆大帶偏些及作藥線隨瘡大小深淺長短臨時裁度先以拔毒膏點破方以藥錠放在瘡口膏藥貼上一日一換藥待肉腐之時藥線插入瘡口膏藥貼上直候腐肉去盡為度

三才絳雲錠子 治瘰癧疳漏八瘡惡瘡

天才 初開瘡口緊拔之藥

白礬煅伍錢 雄黃三錢 信石二錢 硇砂生

朱砂各一錢 膽礬一錢 乳香 沒藥各錢半

麝香 片腦各少許

地才 次去死肉略緩之藥

白礬煅三錢 雄黃三錢 信石煅過 朱砂各貳錢

硇砂生 膽礬生 乳香 沒藥各壹錢半

兒茶 血竭 輕粉各伍分 麝香

片腦各少許

人才 又次生新肌去腐肉緩慢之藥

白礬煅三錢 雄黃煅 赤石脂煅 兒茶

硃砂各一錢 硇砂水煮 膽礬煅 乳香

沒藥 輕粉 血竭各一錢 麝香

片腦各少許

右末用秫米糊為錠子如豆大帶扁些陰乾又作藥線如麻黃樣先用[illegible]骨點破頭令黑次紝此錠骨貼上三日[illegible]腐肉不盡出者可更用下品錠子及針頭散取盡腐肉止有膿汁不乾者用生肌乾膿散摻瘡口膏藥貼上如要生肌速用生肌散摻瘡口上膏藥貼之

碧玉錠子 治瘰癧惡瘡

銅青各錢 膽礬 白丁香

信石煅 硇砂 雄黃 朱砂

乳香 沒藥 輕粉 麝香

片腦各少許

右末糊為錠子如豆大帶扁此及作藥線陰乾先用拔毒膏點破瘡口上貼膏藥直至腐肉去盡只貼膏藥以肉生滿為度

有一老嫗亦治此證[illegible]其方法乃是

下品錠子紝瘡內以膏藥護之至根自腐未盡再用去盡更搽生肌藥數日即愈人多異之予見其治氣血不虛者果驗若氣血虛者潰亦不愈

項後側少陽經中瘡疼不辨[illegible]不問大小及月日深遠或有赤硬腫痛用

生山藥 蓖麻子

右研爛攤貼之如神[illegible]

清涼散餅

山慈菇生用 [illegible]

右俱搗爲餅去汁醫之能散去寒熱或以山慈菇磨酒服大妙（此藥大能散毒如神）

香附餅　治瘰癧腫核或風寒襲於經絡結腫或痛

香附子（不拘多少）

右末酒和爲餅覆患處以熱熨斗熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒用薑汁作餅

治瘰癧不問有頭無頭者

右用大蜘蛛伍箇晒乾細研酥調如面脂日二度傅之蜘蛛用屋簷頭結網者其他不可用

又方　用黃顙魚破開入蓖麻子（去殼）於魚肚內以綿纏定於廁坑內放冬三月春秋二月夏一月取出洗淨用黃泥固濟文武火煨帶性爛研爲末香油調傅及治臁瘡

荔枝膏　治瘰癧

荔枝肉（壹兩）　輕粉　麝香　白蘞

川芎　砒仁（各一錢）　硃砂　龍骨

血竭　乳香（各壹錢）　全蠍（去毒）

右將荔枝肉擣爛軟米飯杵爲膏看瘡大小攤貼如有三五箇者只去貼爲頭者妙

蛇頭膏　治頸項瘰癧初發如梅子腫結硬強漸若連珠或穿穴膿潰肌汁不絕久不痊漸成瘰癧皆治之

琥珀（壹兩細研）　丁香　木香　桂心（半兩）

硃砂　白芷　當歸　木鼈子（去殼）

防風（去蘆）　木通　黃丹　垂柳枝

松脂（貳兩）　麻油

右除琥珀丁香桂心硃砂木香爲細末餘藥細剉以油浸一宿入鐺中以慢火煎候白芷焦黃濾出次下松脂末澄去滓再澄清却入鐺中慢火熬下黃丹以柳木篦不住手攪令黑色滴水中成珠不散看軟硬得所入琥珀等末攪勻磁器盛用時看大小用火熔紙上勻攤貼

蜂房膏　治熱毒氣結成瘰癧

露蜂房（炙）　蛇蛻（炙）　玄參　蛇床子

黃芪（各半分）　杏仁（去皮尖）　亂髮　鉛丹

蠟（各貳兩）

右先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即綿濾更下鐺中然後下丹蠟又煎五七沸即瀉出於磁盆中盛取貼瘡上一日一換

鐵筒拔毒膏　治癰疽發背瘰癧大瘤疔瘡頑癬等
瘡疥癬惡瘡腫瘍　切惡肉惡核等毒已成者點
破膿潰即去未成者自然消散其毒雖不能全消
亦得以殺其毒也

蕎麥稭灰　各斗火　礦石灰各斗灰　真炭灰壹斗

右將四灰和勻用滾湯淋將棕皮塞住缸底用水
於鍋內熬滾淋灰汁將汁復熬滾復淋過取淨汁
方慢火入磁罐煎熬以紙數重閉口熬至膏稠為
度其膏止存一碗入石灰末攪勻如糊稀入黃丹取如
微紅之色入磁罐封閉罐口候冷次日將厚實磁罐收

貯密塞其口每用少許塗毒頂之上即時咬破不
黑大點以黑為度如藥乾以唾調塗如要急用只
將曉大柴灰九碗石灰三碗淋灰汁熬濃汁如前
製用其石灰點膏俱可陳宿治法俱同

黑虎膏　治瘰癧結核神效

大黃　黃連　黃芩　黃蘗
當歸各一兩　木鱉子二十箇　穿山甲五錢　亂髮壹兩
蛇蛻壹條　麻油一斤　黃丹以水飛炒黑為度如無真的好黃丹粉代之妙
乳香一錢　沒藥各一錢　阿魏一錢

右將前九味剉碎入油浸五七日煎熬微黑濾去
查入黃丹投火熬成膏俟冷入乳香沒藥阿魏末
攪勻油紙攤貼

十香膏　治五發惡瘡結核瘰癧療瘡痔瘻

沉香　麝香五分　木香　丁香
乳香　甘松　白芷　安息香
藿香　零陵香各五錢　當歸
川芎　黃芪　木通　芍藥
細辛　升麻　白芨　獨活
川椒　藁本　菖蒲　厚朴
商陸根　木鱉子　官桂各五錢　桃仁
柏子仁　松子仁　杏仁各二錢　槐枝
桑枝　柳枝　松枝各三兩　沒藥
輕粉　雄黃　硃砂　雲母石
生犀角　亂髮灰　白芨灰各一兩
真酥　羊腎脂　豬脂各二兩　黃丹壹斤
清芝麻油三斤

右先用木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并
四枝四仁熬至黑色出火濾去相入酥脂煎十
餘沸再以新綿濾過油澄清拭鍋令淨再入火上
煎油沸下丹用濕柳枝作箆子不住攪熬一日滴

在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入些丹等粉入味輕煎令沸出火不住攪一食時於磁器內密封收每用量瘡口大小緋帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒送下

人方治瘰癧已破核不消致瘡口不斂或貼琥珀膏不應用時效針頭散傅之以去腐肉以如神散傅之更服益氣養榮湯若氣血虛者先服益氣養榮湯待氣血稍充方用針頭散傷瘰癧湯

治瘰癧 右先於瘡上灸二三壯然後用藥潰作瘡日用新活鯽魚截長一指大批開就按在瘡口上少時覺瘡內癢急拔起魚觀之魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如損二三五次取盡蟲子後用藥於瘡口擦

龍腦　乳香　麝香　粉霜

雄黃　輕粉

右為細末水糊為丸如小麥大每用一丸兩丸絍在瘡口內覺腫痛是効

洗方拔毒湯 治瘰癧有潰爛腫者能內消

防風　荊芥　羌活　獨活

細辛　藁本　川芎　白芷

大黃　黃芩　當歸　赤芍藥

威靈仙　玄參　何首烏　黃蘗

甘草　蜂房　甘松　藿香

蒼朮　石菖蒲　零陵香　枸杞子

右㕮咀用椒煎水熱洗又用絹布二帖煮熱蒸熨

針灸

靈樞寒熱篇黃帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠瘻之本皆在於臟其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內著於肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已

右經一篇皆從經脈取藏腑之本以治瘰癧之本也其末出於耳下或耳後下頸或行上或入缺盆中者當於手足少陽經取之或針或灸如後穴

治瘰癧 天井　肩井　操瘰癧天井

頸腋下腫馬刀挾癭若自潰者　人迎　中腫寒熱

臨泣　任脈　太衝　腋下頸項

天池　如頸腫加後谿

腫馬刀挾癭喉痺　陽輔　中脈　腋下

甲胸中滿腋下腫馬刀瘻善自齧舌頰天牖中腫淫濼脛痠頭眩枕骨頷腮痛目澀身痺洒淅振寒季脇支滿寒熱脇腰腹膝外廉痛所過皆痛　馬刀腫瘻胸腋肩門支溝主之　此穴須下或至臨中者當於手足陽明經取之或針或灸如後穴　三里足陽明　合谷手陽明

一瘰癧生胸際者至臍子置於瘰癧上艾炷灸餅子上三即易之灸三十餅

一當瘰癧上貼肉灸十四壯神効

一惠瘰癧馬刀將先出一瘰用四楞鐵環定住不令出移破作口子以油紙撚紙之勿令合了以絕其瘡之源其効至速如瘡不破或病人不肯破更以藥塗之三日一易之以龍泉散上之方見前

肩尖肘尖二穴圖

診

此穴治瘰癧之秘法蓋瘰癧屬肝膽二經故患在耳前後項腋之間男子多因恚怒亦損肝經之血陰火內作或不慎起居飲食不化生而血婦女多因恚怒傷肝火動血燥或鬱結傷脾亦筋血耗或患於胸孔間亦屬前經此皆若因恚怒傷肝氣血乖違而不愈者宜灸此穴疏通經絡若因久鬱恚怒元氣虧損而不愈當推其所屬而調補化源如取其穴當以指甲掐兩肘兩肩四所患處覺酸痛方是其穴

又方灸瘰癧未成膿者用大蒜切片如三錢厚安患處用艾壯於蒜上灸之每三五壯換蒜每日灸十數蒜片以拔鬱毒如破久不合內有核或瘀肉此因血氣不足不能腐潰以銅錢挺輕輕連衣膜取去縱取重亦不痛不必畏懼更用江西豆豉為末唾津和為餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼琥珀膏或太乙膏瘡口自合

靈樞黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈不下貫瞳子可治也　肺脈微濇為鼠瘻在頸支腋之間下不勝其上其應善痠

〇肩疽

靈樞云發於肩及臑名曰疵疽其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五臟癰發四五日逞焫之　鬼遺云丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成丁疽五日驚人令人目瞪寒戰十二日可刺不治二十日死　肩胛骨疽發兩肩及兩大臂連胛骨二七日痛不息亦不可刺五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死

或問肩上生疽何如曰此處手足三陽交會之所名曰肩中疽由風熱經絡所致或因負重損傷而作服烏金散勝金丹活命飲加柴胡桔梗壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯托之

〇肩胛疽

或問肩胛內痛漸至潰爛成瘡何如曰此名太陰疽即肩胛疽也手太陰肺經積熱所致宜活命飲加桔梗黃芪紫金丹服金丹黃芪木香散選用壯實者八陣散一粒金丹下之赤色者可治黑黑者不治喘嗽大渴者不治錢紊者死

〇左右串

或問左右搭串何如曰左右俱生串中溃串於右者可治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說何謂亦然攻法左右皆氣血不調所致宜結也宜勝金丹活命飲加羌活桔梗壯實者八珍散一粒金丹下之七惡並少何慮難痊元氣虛者補之治少何慮哉

〇缺盆疽

或問一人年六十肩前陷中生疽其寒熱大作飲食少進肩背拘急小水不利形體羸弱何如曰是名缺盆疽又名鎖骨疽屬足陽明胃經手少陽三焦經宜隔蒜灸先服紫金丹奪命丹而後小水不利投以六一散而利後服十全大補湯安否治之稍緩必致潰爛是經少血多氣不合危多矣

〇肩後疽

或問肩膊後骨上生疽何如曰此名上膊疽即上搭也怒氣積鬱所致屬大腸兼小腸經初發宜隔蒜灸活命飲加羌活桔梗柴胡勝金丹紫金丹奪命丹選用既潰十全大補湯黃芪木香散人參養榮湯

〇過肩疽

或問肩後夾脊兩邊腫硬疼痛何如曰此名筋疽亦名過肩疽初得寒熱似癰但腫硬無頭急隔蒜灸服活命飲加羌活勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金

丹藥病症對症丹選用

一瘰癧癰

或問頸項兩乳旁結核或因拘攣勿覺生腫塊何如

曰是名瘰癧屬手少陽三焦經其發緩慢是冷證

非熱證也宜用回陽玉龍膏熱藥敷貼服內補十宣

散何首烏散勝金丹選用

○腋發

靈樞云發于腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲

細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而

不潰者為馬刀挾癭急治之　鬼遺云內疚癰發兩

腋下及臂并兩手掌中振寒熱血嗌乾飲多即嘔煩

心惕惕脈盛六七八日診如此可汗不汗死

一夾肢癰

或問肩膊下腋內生癰何如　曰是名夾肢癰屬手少

陰心經手厥陰心包絡風熱所致宜服內托黃芪柴

胡湯壯實者八陽散一粒金丹下之及紫金丹勝金

丹選用老弱者黃芪木香散人參養榮湯十全大補

湯主之

一臂疽

是道人臂兩處發按骨下肉上起如雞鴨卵大

者何如　曰是名臂疽肉所為也治非其宜而不速內亦宜急

消或發完寺療　兩臂肘都在接骨下引手至小臂

之下發癰痛此處雖實大小筋骨動不便痛

手多隨疼如緊深沉深陷內從[illegible]脈絡不舒攝

宜急以緩慢筋脈藥調治之　又機云在臂外為癰

在臂內為魚肚發在臂上節腫連肩髃為臂氣癰宜

活命飲加羌活獨活桔枝桔梗[illegible]

命丹紫金丹勝金丹選用壯實有表證皆一粒金丹

八陣散下之若漫腫無頭服敗毒[illegible]不能消者宜

十全大補湯加桂枝桔梗托之有嘔吐而數日不食

者潰出膿則愈

治驗　一人年將六十五月患臂疽[illegible]盛上至肩下

至手指脫皮寶涼六脈沉細而[illegible]脈證俱寒乃

附骨疽也潰發已遲以燔針[illegible]之[illegible]清稀解矣且耐

下再開之加吃逆不絕與丁香柿蒂散兩服稍緩又

且吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿食減時發昏憒灸

左乳下黑盡處二七壯又處托裡溫中湯一兩半與

附或曰諸痛瘡瘍皆屬心火又將當[illegible]用[illegible]附
子乎曰經云脈細皮寒泄利前後飲食不入是為
五虛況吃逆胃中虛寒此為內外俱虛須當治其從
溫補之諸證悉去飲食漸進[illegible]湯溫補[illegible]從用
五香湯數服月餘而愈[illegible]
一年[illegible]羅[illegible]劉[illegible]
一擇使[illegible]一塊不痛不赤[illegible]食漸減以六君
子加藿香酒炒芍藥[illegible]止[illegible]再以八珍湯二十餘
劑膿成刺之又以十全大補湯而愈[illegible]傷寒後發
後腫微痛乃傷寒餘毒也然無表證但虛弱耳先用

十宣散四劑取參芪芎歸扶助元氣防風桔梗白芷
厚朴行散腫結肉桂引經破血腫退三四再用八珍
湯膿潰而愈至冬[illegible]復作[illegible]服[illegible]風藥及筋攣痛
甚此血虛不能養筋筋虛不能束骨用加味十全大
補湯百帖而愈　一人[illegible]久不斂寒熱交作
五心煩熱飲食少思[illegible]不[illegible]以[illegible]按月餘少可
更服八珍湯加丹皮香附又月餘經通再加黃芪白
斂兩月餘而愈　一人[illegible]作[illegible]服寒涼[illegible]
少大便不實[illegible]用[illegible]中[illegible]二服更以六君子加砂仁
藿香再以托裏[illegible]而愈　凡瘡痛甚者若[illegible]府有

近五十左脚外側紅腫如栗[illegible]勿輕[illegible]
數斤乃作數[illegible]而止[illegible]大[illegible]按木瘡上起一如
綠豆[illegible]背[illegible]有[illegible]一人[illegible]以[illegible]湯加芎术[illegible]而月[illegible]
安　一[illegible]
良由[illegible]所[illegible]氣[illegible]血脈經絡[illegible]筋
不榮[illegible]用[illegible]牡[illegible]
皮澤[illegible]白术而愈亦有臂痛不能舉[illegible]作痛
由中脘伏痰[illegible]滯不行宜茯苓丸[illegible]之
一人手臂結核如栗延至頸項狀似[illegible]此風濕
流注用加味小續命湯及獨活寄生湯更以托裏藥

倍加參芪歸术百貼而愈[illegible]
[illegible]所見也後用[illegible]百貼[illegible]愈是[illegible]不[illegible]也　一兒二三歲臂患毒腫痛服
解毒丸[illegible]神功散而消[illegible]當治[illegible]毒便
閉煩躁服五福化毒丹亦效若膿成急刺用紙撚蘸
麻油紙[illegible]瘡內以[illegible]藥貼之若兒安靜不必服藥候有
膿取去仍用紙撚　一人臂患[illegible]脈數飲槐花酒一
服勢頓退再與金銀花黃芪甘草十餘服而平[illegible]
[illegible]　壯[illegible]家[illegible]形[illegible]
毒冬于手陽明大腸經分出[illegible]第四日[illegible]外皆
腫痛在手陽明左右經中其脈俱弦按之洪[illegible]有力

火宜苦寒藥若毒未潰者宜補中益氣湯加芩連之類
在下加黃蘗人肥加制防獨活之類取其風能勝濕
也　一婦左臂臑從部分結腫一塊年許不潰堅硬
不痛肉色不變脉弱少食月水過期日晡發熱遇勞
或怒則痛此不足證也與參芪歸术芎芍藥貝母
遠志香附桔梗丹皮甘草百餘貼而消　一人臂患
漏口黯發熱膿水清稀脉來遲緩灸以豆豉餅服
八珍湯加麥門五味故柴胡地骨皮三月餘而愈後
因房勞復潰膿出清稀大熱不治果歿　河間曰凶病
致虛爲以益瘍病勢尚淺元氣未虛也若病初愈或飲

食勞役或入房以傷損此因虛致潰則爲重病勢已
過元氣已索故也　一兒臂患瘡毒作炒拔之復起
此膿脹痛也刺之以托裏藥愈　一婦臂結一塊已
潰不斂灸以豆豉餅更服托裏藥而愈　一人年踰
三十素怯弱不能食冷臂患一毒脉虛弱予以托裏
藥而消但飲食少思或作脹或吞酸日漸羸瘦參苓
等藥不應右尺脉弱此命門火衰不能生土遂以八
味丸補土之原飲食漸進而愈　一媪左臂結核年
餘方潰膿清不斂以十全大補湯外用附子餅灸又
貼補藥膏調護得宜百貼而愈　一人多慮神勞年

此得自八風之變以脉浮[illegible]邪氣在表飲食如常大
小便如故腹中和口知味知不在裏也不惡風寒只
熱躁脉不浮知不在表也表裏俱和邪在經脉之中
故曰凝于血脉爲癰疽也癰出身半已上故風從上
受因知爲八風之變而成其在經脈之中法當却寒
調和經脉中血氣使無凝滯而愈矣宜以白芷升麻
湯 [illegible]　一人年踰二十臂患癰潰而
不痛膿稀脉弱丹溪曰瘡潰深而不痛者胃氣大虛
不知痛也東垣曰膿水清稀瘡口不合氣血俱虛也

理宜大補彼不聽服消毒藥氣血愈虛遂不救　丹
溪曰纔見腫痛參之脉證虛弱便與滋補氣血
可保終吉又曰潰瘍內外皆虛補接爲主兹則見善
不從自用已智寧免死乎　一人年逾四十臂患毒
焮痛作嘔服托裏消毒藥愈盛予用涼膈散二劑頓
退更以四物湯加芩連四劑而消 [illegible]
也　一人兩臂腫痛服托裏藥日盛予謂腫屬濕痛
屬火此濕熱流注經絡也用人參敗毒散加威靈仙
酒炒黃芩南星數劑而愈更以四物湯加蒼术黃蘗
桔梗二十餘劑而消　按此托裏藥日盛故以作濕熱治也　一尚書左

臂肘起一紫泡根畔焮赤大痛求治予謂此[illegible]
或積血公曰血痢未療以芍藥湯一劑更以人參敗
毒散二劑瘡痢並愈[illegible]
[illegible]

白芷升麻湯 治臂上生癰
白芷 壹錢 升麻 桔梗 各壹錢
酒黃芩 肆錢 小黃芩 [illegible] 紅花
甘草 炙各[illegible]
右作一服水一鍾酒半鍾煎至捌分食後服

○肘癰 俗名[illegible]

肘之內生癰屬三陰經乃心肺包絡肝火引經黃連
升麻柴胡肘之外生癰屬三陽經乃胃大小腸積熱
引經蒼朮升麻柴胡並用當歸消毒飲活命飲或烏
金散紫金丹勝金丹玉樞丹選用壯實有表證者一
粒金丹八陣散下之老弱者黃芪木香散十全大補
湯千金內托散托之

芙蓉膏 治手臂膊腦肘等處結毒焮赤腫痛
山布瓜 根 芙蓉葉 紫金皮
凌霄根 皮 天南星 天布瓜
雞屎根 取皮 背子蜈蚣

右砍爛入些醋湯塗敷患處

赤葛膏 治病藕節及臂臑等處結毒
赤葛根皮 山布瓜根 山蘇木
山樟根皮 紫金皮 赤牛膝
赤芍根 赤瓜花根
右用皮砍爛糟炒敷患處

敷瘍肌石輪藥
山樟子葉
右砍爛糟炒縛之又用根煎酒服之

○臑癰 俗名藕包

臑骨長其狀推痛赤色惟肘節處至小故名藕包以
內外分陰陽俱如上法

泥油膏 治藕包
塘泥 壹分 桐油 [illegible]分
右和勻以鴨毛掃時時塗勿令乾

三瓜散 治[illegible]
山布瓜根 天布瓜根
右砍爛入米醋少許和緩塗之

或問手臂陽明經分生癰初如粟米漸大如赤豆痛
不可忍旬日大如胡桃枯紫色何如曰此名骨螻疽

若毒遊遍身拘急發搐嘔噦不食令汗自出滑泄煩躁脉亂者死犯房勞怒氣者死。人患此證一月之後遍身攻串口吐黃水穢氣滿室既而嘔吐膿血旬日而亡其人。四日前尚進飲食人與沐浴扶起皮肉俱爛患者不信醫者不識以致隕身此由七情不和積怒積憂積熱所致眞元虛敗不能勝邪故也縱有九丹天命而已惟智者防患於未然急服黃連消毒散勝金丹烏金散活命飲加羌活還用治之稍緩七惡證多者必死也　按此證發之暴死之速乃陰虛極而火獨光之故前藥不滋化源而揚湯止沸其能濟乎

八手部

○手發背 俗名蜘蛛背

見遺云兩手背發癰疽初生如水刺無頭腫硬然滿手背腫滿後聚毒成瘡深入至骨而為發手背此係五種背發毒之類也　手背腫者乃三陽經風熱鬱滯而發宜服活命飲加芩連山梔桔梗升麻使加桂枝熱加黃芩木酒煎服有表證者紫金丹烏金散奪命丹汗之有裏證者一粒金丹八陣散下之老弱者宜大補之劑

柿根膏　治蜘蛛背

紫背草　狐柿根皮

右砍爛糟炒縛之又方加岩松子或單用亦可

○手心毒

手心結毒焮赤腫痛俗名病穿掌又名穿窟天蛇又名角負子孟若偏於掌邊者名穿邊天蛇又名穿埂人蛇此手厥陰心胞絡積熱所致初宜隔蒜灸之以泄其毒服活命飲加桂枝當歸黃耆量表裏為汗下於紫金丹奪命丹烏金散一粒金丹選用既潰參芪大補之劑

蜈蚣散　治病穿掌

穿山蜈蚣　花心蜈蚣　竹子蜈蚣
山蘇木　飛天蜈蚣　金頭蜈蚣
酒蹥子根　赤牛膝　見不得根
紫花草　紫金藤
右酒煎服不飲酒人米泔水入少酒和服又用過路
蜈蚣淡交滲米泔浸洗
又方
穿山蜈蚣　雞屎子　金腦香
紫金藤　右水煎入酒和服

仙人掌根　雞屎根皮　赤藥根皮
葛仙根　山布瓜根　竹子蜈蚣
山樟根皮　赤牛膝　落得打根
天布瓜根　山枇杷根皮　紫河車
紫金皮　右搗爛入糟少許和塗患處
又方
仙人掌根磨米醋搽塗傳又用黎蘆子煎醋搽又
用芸香子煎水浸洗
浸洗方
石楠藤　赤牛膝　赤麻黃

八角茴香　赤薔子　九節香
豬屎藤　穿山蜈蚣　鐵菱角
含笑葉　鐵梗子　落得鉛
山蓼葉　右煎水蒸熏後淋洗之
潰爛者用搽末
苦楝葉燒存性為末用菜油調搽患處又搽末或用生
肌散亦大効　飯須要用農家者取其日日蒸飯
拔氣者効
虎口疔
虎口結毒在虎口名合谷疔又名丫口毒又名擘
蟹人名丁又發又名病蟹又此手陽明大腸經風
熱積毒之所致也初覺宜用之服藥欲加桂
枝當歸黄桔梗升麻木酒煎服為汗下
老弱者十全大補湯十宣散托裏散中選用　五指
又處結毒者俗名獨叉
草靈散　治病蟹叉
薜叉草　右研爛酒炒傳之
又方　山馬蹄根皮研爛白炒縛之
又方　宿地蓮根葉研爛酒炒縛之
又方　榔子葉研爛糟炒縛之又以小葉淨泥子煎

水盡洗亦効
又方 蛇莓草莖葉砍爛酒炒縛之又以根煎水淋洗
落鴉鎗散 治鴉叉
落鴉鎗 大金錢 羊蹄菜
水楊柳根 右砍爛糟炒縛之
又方
落鴉鎗 紫金皮 山布瓜根
天布瓜根 右砍爛糟炒縛之
又方 落鴉鎗根搗爛糟炒縛之
又方 落鴉鎗根天布瓜根砍爛糟炒縛之

○腕癰
手腕之處結毒焮赤為手屈發俗名手牛押但此手
三陰經風熱聚毒之所致也治法同前 一人年四
十手腕生疮面目手背俱浮腫飲食不進者七日
矣惟飲水數升神思昏憒小水不利□候求者鍼系
滿人□□□是不應用藥稍以下攝升加螵蛸塗之
山朔合前服升許□□□□□倘食而愈
紫金牛膝散 治手牛押瘡及脚上一切腫痛堆核
㿉痛者
紫金皮 赤葛根皮 赤毛桃根

山布瓜根 赤牛膝 魚桐根皮
天布瓜根 落鴉鎗根
右砍爛糟炒熱縛患處
又方
魚桐皮根 落鴉鎗根 紫金皮
右砍爛糟炒縛之
又方
落鴉鎗 落合根 馬蹄香
天布瓜 山蘇木 紫金皮
赤毛桃 赤牛膝 芙蓉葉

山布瓜 赤葛根 魚桐根
李子根
右搗爛糟炒縛之久不退加山楂子葉及根皮
○手大指疽
手大指頭發小點如粟漸大如豆或如桃李或青或
紫或黃或黑或白或痒或麻木不痛或大痛徹心此
名捌疔乃手太陰肺經積毒所發名曰敷其毒四日
刺得血服者生得黑血者死急服烏金散紫金丹汗
之出實者一粒金丹下之毒氣攻心嘔吐不食膨脹
者死斷縫出血者死 一人患此色黑不痛其指已

死今悟占之速服補藥恐黑上臂下治彼不信方服
敗毒散手竟黑遂不救

○天蛇頭

手中指頭結毒焮赤腫痛或不拘何指名天蛇頭若不早服
裂開有口唇如蛇頭狀是以名焉係手厥陰心包絡
積熱所致宜服活命飲加柴胡羌活桔梗黄連消毒
飲紫金丹烏金散選用雖黑色頑麻潰爛臘指者亦
不死

再溪云蒲公英草清明時節如……一名花
交菊花者取莖……不拘多少……搗爛

煎湯洗即愈

蒲公英忍冬酒治天蛇頭……

世治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查
傅患處累効

治天蛇頭用　野落蘇　金銀花藤　天蕎麥
右細切用好米醋濃煎先熏後洗

又方用人糞雜黄泥搗之裹在患處即愈

拔毒散　治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼為發指
徹骨疼痛不可忍者
乳香少許研　泥蜂窠研

右為末用醋調搽乾則以醋潤之痛即止

治蛇指蟓石天蛇頭
蜈蚣　右以燭熏病指一次即安

治蛇消腫散　治蛇咬及蛇節疔蛇腹疔蛇頭疔蛇
背疔等證
蛇頭菰　天蔡藤　木蓮葉
仙人掌　土木香　紫金藤
大小青　右搗酒温服以查敷之

消痛散　治蛇頭子及一切蛇瘴
紫金藤　右搗酒……大効

又方　金腰香草搗酒服以渣敷之

又方　蛇頭草……又名……一麻　麻有一
箇根即一麻有二箇根名二麻
右砍爛酒炒縛之

又方　紫金鐘　六月雪　一味砍爛糟炒縛之

又方　溪次了葉　滿路蜈蚣　砍爛糟炒縛之如
痛不止用雄黄末燒烟熏之不拘已成未成即退
取効或加蜈蚣等分亦妙

又方　紫金鎚　紫金鎚　野芋子　香附子
右砍爛糟炒縛之

又方　片邊[illegible]砍爛酒炒縛之
又方　山布瓜根磨醋刷以去捶蜈蚣過路蜈蚣穿山蜈蚣飛天蜈蚣煎水煮洗亦効
又方　狗龍鬚根（即大茶白藤根）　砍爛糟炒敷之
地茜茜散　治病蛇頭子
耳環虎（又名燈籠草又名[illegible]花[illegible]又名[illegible]）
右擂酒服又以砍爛酒炒縛之
敷毒方　治蛇頭子一切蝮蛇瘡
地蓆茜　金腦香　紫河車
飛大蜈蚣　紫蜈蚣　金鳳尾

金雞舌　右砍爛酒炒縛之
又方　地蜈蚣葉　深波樹葉　砍爛冷縛之
又方　飛天蜈蚣葉　砍爛冷縛之
又方　金腦香葉（一名仁茶）　砍爛冷縛之
又方　雞卵壳枚開竅傾出以指浮數浸之
又方　狀骨草　赤麻黃　金鎖草　耳環虎
右砍爛鹽酒炒縛之
又方　山蔘葉　田麻黃　地蓆茜　田螺
右搗爛鹽酒炒縛之
又方　山布瓜根　金腦香葉

右搗爛酒炒縛之
[illegible]毒散　治前證並効
毛藤子　石楠藤　鐵交箭
穿山蜈蚣　背子蜈蚣　赤麻黃
金腦香　檬婆子根　飛天蜈蚣
赤使過路蜈蚣
右煎水入些醋和[illegible]淡洗
治蛇頭瘡　其形生時在手足上瘡頭一塊剖如蛇口之狀痛而流血不止宜[illegible]治之
雄黃　蜈蚣　[illegible]

右為細末看瘡大小開入藥擦在瘡上却以小油抹裁帛拴住如乾小油調搽
凡指頭生疽名為蛇疽係臟腑積熱所致不可緩宜內服黃連湯紫金[illegible]外以[illegible]汗下之
○手指節發
手指節結毒焮赤腫痛人名手指節發人名蛇節疔人名釘節大蛇又名蛇節治法與[illegible]大同小異
金雞舌散　治前證
金雞舌根磨酒服　或磨井水[illegible]搽塗之
又方　落鵝觴根擂酒煉服以查敷患處

〇代指

代指者先腫焮熱痛色不黯緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落但得一物冷藥汁溻漬之佳爪者筋之餘筋賴血養血熱甚注於指端故指腫熱結聚成膿甚則爪甲脫落此病類於指疽然無蘊毒故色不黯黑雖久亦不殺人　內服方聖濟總錄有漏蘆湯藍花湯中用漏蘆藍花升麻大黃黃芩玄參朴硝既無蘊毒何爲用硝黃下藥輕病重治能無過乎故今不取

升麻湯

升麻　甘草各半兩

右細剉水貳升煎至壹升去滓下芒硝末半兩攪勻温浸指七數十遍冷即再煖以差爲度　一方用梔子仁甘草各壹兩　一方單用甘草　一方單用芒硝　一方單用麻黃　並如上法煎浸

千金治指痛欲脫用豬脂和鹽煮令消熱內指中一食久住　千金翼和乾薑　一方用䐗汁　一方醬合蜜煎沸稍熱傅日五七上

丹治手指忽腫痛名爲代指以烏梅入醋研浸患處立瘥

治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷即易

胸部　九

井疽

靈樞云發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不治七日死矣　或問心窩生疽何如曰此證初起如黃豆肉色不變名曰井疽又名穿心冷瘻若冷氣攻心精神恍惚嘔吐冷痰惡聞食臭冷症氣內陷腹脹滿者不治若心躁如焚肌熱如火不時盜汗唇焦舌乾黃色渴飲冷水者是正候也急服活命飲加黃連桔梗勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹下之惡證多治稍遲多致顛危宜服犀角解毒

甘疽

靈樞云發於膺（膺胸兩旁高處也胃之脘）名曰甘疽色青其狀如穀實𤓰蔞常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十日死死後出膿

〇膻中疽

或問心窩上兩乳間生疽何如曰此膻中發疽也蓋膻中爲氣之海氣所居焉能分布陰陽若臟腑陰陽不和七情不平則發此證宜活命飲加紫蘇薄荷葉汗之奪命丹勝金丹紫金丹選用稍遲則潰爛惡症

多者難治

○脾發疽

或問心窩下旁生疽何如曰此名脾發疽毒由多食煎煿醉飽入房以致毒聚脾經宜仙方活命飲加桔梗升麻紫金丹勝金丹汗之壯實者八陣散下之老弱者十全大補湯精進則潰傷脾臟膿如蟹沫者死服藥而嘔飲食不進者死

或問一人年三十餘胷前脇上堅硬如石者何以許寒熱大作飲食不進遍身疼痛煩躁不寧胷膈填脹何如曰凡在胷及胸之側或是肩前下延及臂形長如蛤皆爲馬刀瘍屬手少陽三焦經足陽明胃經手厥陰心包絡鬱火怒氣積痰所致宜灸宜汗攻補兼施則消宜服勝金丹烏金散壯實者一粒金丹下之活命飲加柴胡過時則潰爛徹骨久而不斂者死未潰而譫語神昏泄利嘔吐者不治

一夫人性剛多怒胸前作痛肉色不變脈數惡寒經月洪數脈應發熱反惡寒瘡疽也今脈洪數則膿已成但體虛所故色不變似乎無膿以痛極始肯針入數寸膿數碗以托裏消毒藥治之而愈設泥其色而不用針無可救之理 一人年踰四十胸患瘡成月出膿碗許尋飲食如常用十全大補湯加遠志貝母白斂續斷灸以附子餅漸漸少瘥漫歲餘而愈 一少婦胸脇間潰一竅脈中所欲拂應而出以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈或曰此因膿潰所致 一人胸腫一塊半載不消令灸百壯方潰服大補藥不斂灸附子餅而愈 一尚書劉患毒腫高焮赤發熱脈數大小便澁飲食如常齊氏曰腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱頭目昏重氣血實也又曰大小便澁飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛身熱脈大精神昏塞臟腑實也 一劑諸證悉退更以荊防敗毒散加黃芩 一劑損愈再以四物加芩連山梔桔梗甘草金銀花數劑而消

此項治法雖係瘡毒皆實而用此法然醫家又有先後次序先攻邪後補虛最後又用和解前後背疽不可不以此為法

○乳癰乳巖

乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍

軟吮令汁透自可消散矣此不治必成癰癤治法疏厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行污濁之血以生甘草節消腫導毒以瓜蔞實或加沒藥青橘葉皂角針金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其效尤捷彼村工喜於自衒便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱悶昕夕積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如棋子不痛不癢十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此證察其形脈稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安　此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有拗怒氣激滯而生者煅石膏燒樺皮瓜蔞實甘草節青皮皆神效藥也婦人此病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無月經時不可輕易看也　[薛]男子房勞恚怒傷於肝腎婦人胎產憂鬱損於肝脾若焮痛寒熱當發散表邪

腫焮痛甚當清肝消毒並宜隔蒜灸不作膿或膿成不潰托裏散為主不收斂或膿清補脾胃為主若膿出反痛或作寒熱氣血虛也十全大補湯口乾少食中氣虛也補中益氣湯晡熱內熱陰血虛也八珍湯加五味子欲嘔作嘔胃氣虛也香砂六君子湯食少作嘔胃氣虛寒也前湯加藿香炮薑食少泄瀉脾氣虛寒也前方加木香若[illegible]勞後腫痛氣血未復也八珍湯倍用參芪歸朮若發寒熱腫痛肝火傷血也八珍加柴胡山梔若肝火血虛而結核者四物湯加參朮柴胡升麻若肝脾氣血虛而結核者四君子加芎歸

柴胡升麻鬱結傷脾而結核者歸脾湯兼逍遙散若鬱怒傷肝脾而結核不痛不癢者名曰乳巖最難治療若能戒七情遠厚味解鬱結養氣血亦可保全

內托升麻湯　治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼并乳癰初起者亦治

升麻　葛根　連翹
當歸身　黃蘗各貳錢　黃芪叁錢
牛蒡子　甘草炙各壹錢　肉桂伍分

右作一服水壹鍾酒半鍾煎至壹鍾食後服

又方　治婦人乳中結核

升麻　連翹　甘草節
青皮各貳錢　瓜蔞仁叁錢
右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後細細呷之

乳癰

青皮　瓜蔞　橘葉
連翹　桃仁留尖　皂角刺
甘草節　如破多加參芪

神効瓜蔞散　治乳癰乳巖神効丹溪云妙捷恐
貧賤之家未能辦集者用後藥亦可尤妙
瓜蔞壹枚去皮焙為末　生甘草
用子多者有力

當歸酒洗焙乾各半兩　乳香另研　沒藥另研各一錢半
右為末用無灰酒叁升於銀石器內慢火熬取壹
升清汁分作三服食後良久服如有乳癰便服此
藥可杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未
成即於大小便中通利如疾甚再合服以退為度
立効散與此方間服尤妙但於瓜蔞散方減去
當歸加紫色皂角刺壹兩陸錢是也

究原五物湯　治癰疽發背乳癰通用
括蔞研爛　皂角刺半燒帶生　沒藥各半兩
乳香　甘草各貳錢
右為末以醇酒叁升煎取貳升時時飲之痛不可
忍立止

連翹飲子　治乳癰
連翹　川芎　瓜蔞
皂角針　橘葉　青皮
甘草節　桃仁各貳錢
右作一服用水貳鍾煎至壹鍾食遠服　已破者
加參芪當歸未破者加柴胡升麻

清肝解鬱湯　治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血
乳內結核或為腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之
症皆宜用此藥

人參去蘆　茯苓　貝母去心
山梔炒　熟地黃　芍藥炒各壹錢
白朮　當歸各壹錢　柴胡
川芎　陳皮各捌分　甘草伍分
牡丹皮　右水煎服

復元通氣散　治婦人發乳癰疽及一切腫毒
木香　茴香　青皮
穿山甲酥炙　陳皮　白芷
甘草　漏蘆　貝母去心薑製各等分

右爲細末每服叁錢好酒調下

消毒散　治吹乳乳癰并便毒如增寒壯熱或頭痛
者宜先服人參敗毒散一二服方可服此藥如無
前證即服此藥二三劑或腫不消宜服托裏藥

青皮去白　金銀花　天花粉
柴胡　僵蠶炒　貝母
當歸酒洗　白芷各貳錢

用水壹鍾煎至壹鍾食遠服如便毒加煨大黃壹
錢空心服

本草蒲公英草　味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁
飲之及封之立消
丹溪云蒲公英在處田間路側有之三四月開黃花似菊
味甘解熱毒散滯氣可入陽明太陰經洗淨細研以
忍冬藤濃煎湯入少酒佐之腫于便欲睡睡覺也云
少差

丹溪手集方　治奶乳硬欲結膿服此即消
用鹿角於麁石上磨取白汁塗之乾又塗不得近
手并以人嘲用黃木一日許即散或用鹿角刮爲
極細末酒調貳錢服亦效　乳婦已服

乳癰初發方
貝母爲末每服貳錢溫酒調下即以兩手覆按於
桌上垂乳良久自通

時康祖爲廣德宰事張二甚謹後授溫倅左乳生癰
繼又胸臆間結核大如拳堅如石荏苒半載百療莫
効已而牽掣臂腋徹于肩痛楚特甚亟禱王祠下夢
閩語曰若要安但用萱草根外汁製香附服之覺呼其
子檢本草視之二物治證相符訪醫者亦云有理遂
用香附去毛薑汁浸一宿爲末煎萱米飲調方數服
瘡潰流出膿硬漸消自是獲愈　一婦人年四十餘

素抱久鬱左乳內結一核按之微痛以連翹飲子二
十餘劑少退更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十
餘劑而消

張氏橘皮湯　治乳癰未結即散已結即潰極痛不
可忍者神効因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之
用陳皮湯浸去白晒乾麪炒黃爲細末麝香研酒調貳錢初發
覺赤腫疼痛一服見効
丹溪乳癰初發腫硬一服效用真橘皮去白末酒服方寸匕
睡醒已失　出靈苑方

[illegible]金丹　治婦人吹乳極有神効用白[illegible]
右一味不拘多少用無根水爲丸如梧桐子大每

服灸九倒流水送下食後令病左乳者左[illegible]右乳者右
右[illegible]於溫處汁出愈[illegible]
圖經治婦人妬乳痛不可忍用穿山甲[illegible]木通[illegible]
自然銅生用半兩三味搗細末每服貳錢溫酒調下無時
簡易獨聖散 治婦人吹妳
白丁香[illegible]每服壹錢匕溫酒調服無時
袖珍治婦人吹乳皂角散歌曰
婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和[illegible]
壹字 須間揉散笑呵呵
又方
乳香[illegible] 瓜蔞根末壹兩 右研勻溫酒調服貳錢
治乳彪以大麥芽壹兩炒研煎湯飲之自消
丹陽婦人乳腫痛
青皮 石膏煅研 連翹
皂角刺 瓜蔞子 當歸頭
木通各壹錢 甘草生叁分
作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗[illegible]
義二孺人平時乳內有結核不為痛忽乳汁又有一
腫核却頗有些痛
黃芩 川芎 木通

陳皮各肆錢 人參[illegible] 大腹皮[illegible]
炙甘草 生甘草 當歸頭
芍藥各壹錢 右分[illegible]
一孺人但經將行而乳腫先一日[illegible]而不渴食
少減脈左弦帶數右却平治用四物[illegible]加陳皮白朮
茯苓帶熱下與點丸叁拾粒
一後生作勞風寒夜熱左乳痛有核如掌脈細澀而
數此陰滯於陽也[illegible]已得酒[illegible]以[illegible]黃[illegible]膏乾
葛台芎白芷蜂房生薑同研入[illegible]而安
一婦人內熱脇脹兩乳不[illegible]者
則而起急則[illegible]小柴胡加青
皮黃連山梔[illegible]
甚兩乳忽腫肝脈洪數[illegible]用加味小柴
胡湯熱止腫消
[illegible]通氣湯 治[illegible]乳癰
連翹 牛蒡[illegible]
玄參 芍藥 白芷
防己 射干 大黃
甘草 杏仁[illegible]
右㕮咀以水[illegible]煎[illegible]分二服

一儒者兩乳患腫服連翹飲反堅硬食少內熱胸脅作痛日晡頭痛小便赤澁此足三陰虛而兼鬱怒前藥復損脾肺先用六君加芎歸柴胡山梔四十餘劑元氣復而自潰仍作痛惡寒此氣血虛也用十全大補湯六味丸而愈 一男子左乳內結一核月餘赤腫此足三陰虛兼怒氣所致用八珍加柴梔丹皮四劑赤腫漸退內核漸消又用清肝解鬱湯而愈時當仲秋兩目連劄肝脈微數此肝經火盛而風動也更加龍膽草五分并六味地黃丸而痊若用清熱敗毒化痰行氣鮮不誤者 一儒者因怒作脹兩乳作痛服流氣飲瓜蔞散半載後左脅下結一塊如核肉色不變勞則寒熱此鬱結氣傷而為患也益而未能潰也八物加柴胡遠志貝母治之漸色赤作痛膿將成矣又服月餘針之出膿碗許頓然作嘔此胃氣虛而有痰也令時時口含生薑服六君子嘔止加肉桂而瘡愈彼後出宰復傷勞怒瘡仍作痛發寒熱用補中益氣加炒山梔愈 一婦人久鬱右乳內腫硬用八珍湯加遠志貝母柴胡青皮及隔蒜灸兼服神效瓜蔞散兩月餘而消 一婦人左乳內腫如桃不痛不赤發熱漸瘦用八珍加香附遠志青皮柴胡百

餘劑又兼服神效瓜蔞散三十餘劑而愈 一婦人因怒左乳作痛發熱表散太過肉熱赤腫脈洪大用益氣養榮湯數劑熱止膿成不從用針待其自潰針膿大泄仍以前湯月餘始愈此證若元氣不足破瘡薄皮剝起者用代針之劑其膿自出不若及時用針不致大潰若膿血未盡輒用生肌反助其邪反害之 一婦人乳潰腫硬面黃食少內熱晡熱自汗月經不行此肝脾氣血俱虛用十全大補加遠志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨患處而瘡亦愈 一婦人膿成脹痛欲針之不從數日始針出敗膿三四碗許虛證蜂起幾至危殆用大補兩月餘而安若元氣虛弱不作膿者用益氣養榮湯補之膿成即針若腫痛寒熱怠惰食少或至夜熱甚用補中益氣兼逍遙散補之為善 一婦年二十有五素虛弱多鬱怒時疫後脾胃愈虛飲食愈少又值氣忿右乳脅下紅腫應內作痛用炒麩熨之腫雖稍散內痛益甚轉側胸中如物懸墜遂與加減四物湯內腫如鵝卵外大如盤胸脅背心相引而痛夜熱勢甚時治者皆以攻毒為言薛云此病後脾弱而復怒傷肝治法惟主於健脾氣平肝火則腫自消而病自愈矣定方以

八物加陳皮黃芪柴胡山梔白芷服八劑漸減六七去白芷加青皮木香桔梗又六劑而全愈若用攻毒之劑病胡能瘳

爲雅川方　治婦人乳癰

人牙齒　燒存性

右為極細末以酥調塗貼癰上

敷乳方

天南星　生半夏　皂角刺燒存性各等分

白芷　草烏　直殭蠶焙各等分

右細末多用葱白研取汁入蜜調敷若破傍口作

乳巖　丹溪云一婦人年六十厚味鬱氣而形實多妬夏無汗而性急忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食味經半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一日夜五六次至五七日消矣此乃妬岩之始不早治隱至五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰一竅如巖穴出膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五内乃死惟不得於夫者有之婦以夫為天失於所天乃能生此謂之嵓者以其如穴之嵌岈空洞而外無所見故名嵓患此者必經久淹延惟此婦治之早止消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

隆慶庚午予自秋闈歸則亡妹已病盈自七月乳腫痛不散八月用火鍼取膿醫以十全大補湯與之外敷鐵箍散不效反加喘悶九月產一女潰勢益大而乳房爛盡延及胸腋膿水稠粘出膿幾六七升略無斂勢十一月始歸就醫改用解毒和中平劑外摻生肌散龍骨寒水石等劑膿出不止流濺所及即腫泡潰脫兩旁紫黑瘡口十數胸前腋下皆腫潰不可動側其勢可畏余謂產後氣血俱虛而攻之以黃芪

解毒補血益氣生肌而醫不敢用十二月中旬後益甚瘡口廿餘諸藥盡試不效始改用予藥時膿猶粘滯煎豬蹄湯沃之頓爽乃治一方名黃芪托裏湯黃芪之甘溫以排膿益氣生肌為君甘草補胃氣解毒當歸身和血生血為臣升麻葛根漏蘆為足陽明本經藥及連翹防風皆散結疎經瓜蔞仁黍粘子解毒去腫皂角刺引至潰處白芷入陽明敗膿長肌又用川芎三分及肉桂炒檗為引用每劑入酒一盞煎送白玉霜丸疏膿解毒時膿水稠粘方盛未已不可遽用收澁之藥理宜追之以翠青錠子外以明月

膿水頓稀痛定穢解始有向安之勢至辛未新正患處皆生新肉有紫腫處俱用葱熨法隨手消散但近腋足少陽分尚未斂乃加柴胡一錢青皮三分及倍川芎膿水將淨者即用拔膿散摻之元宵後遂全安

萬曆癸卯二月時侍御趙蓋菴提學南畿托敝縣令致意約會于茅山予以館誼不容辭特往見之則有病欲求治也但其胸左乳側瘡口大如碗惡肉紫黯嶙峋嶄深宛如巖穴之狀臭不可近予甚訝問何以得此曰館試屢下意不能無鬱鬱又時以手揉乳頭遂時時有汁出或曰是真液也不可泄因覆之以膏藥

汁止而乳旁有核從南來攻劂勞神乳核漸長初一甚小頗知其為滯汁欲出而為膏藥所阻又不得歸經故滯為核聞婦人血上為乳汁今汁亦血類也宜飲芎歸酒行其滯血核自消矣吾以為然而飲之核如故而吐血吐衄血人作飲京口張醫藥吐衄止而腸風作張矜自功謂血從下出者順然體更重困又復飲他醫藥使血亦止乳核之勢日益張遂至於潰潰後澤醫藥陳說治痔漏私計此亦漏瘡也納藥其中痛欲死潰不可支故至此予意在法為不治而見其精神尚王飲噉自如無甚惡候尚可延引歲月為之定方而別後校士廣陵不相聞問遂改用它醫藥至八月初以滯下發噦死夫男子患乳巖者少矣其起又甚微眇而三為庸醫所誤遂至此砒跂不可納也芎歸何罪乎不可不書之以為後鑒

蒲公英草搗爛盦患處神妙　天南星末以溫酒調塗之　治婦人乳痛成癰以益母草為末水調塗乳上一宿自瘥生搗爛傅之亦得　婦人吹乳用桑樹

飯搗成膏貼之　乳頭裂破丁香末傅之

癰　乳中穴在乳下中對入皮向後宜針灸沿　甲乳癰寒熱短氣臥不安膺窗主之　乳癰淒索寒熱痛不

可按乳根主之　大驚乳痛梁丘主之　乳癰有熱三里主之乳癰諸藥不能止痛者三里針入伍分立止　女子乳癰驚巨虛下廉主之足下廉路余不云次臀跟前　乳癰大衝及復溜主之　妬乳太淵主之　婦人乳餘疾肓門主之

瘍科證治準繩卷之四

金壇王肯堂輯　門人新安陶承𤋮校

〇脇部十

脇肱也脇肋骨也有骨曰脇無骨曰胠

〇脇疽

靈樞云發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之剉䔖翹草根各一升以水一斗六升煮之竭為取三升即強飲厚衣坐於釜上令汗出至足已（一作䔖翹草赤根洛一升）　鬼遺云侠熒疽腫起發脇及兩肩附頭二十日不穴死九日可刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治　又云兩脇起癰名為發脇初腫盛至十數日不穴攻即腫大如杯椀高如鐵背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而成者多人有斯患忌以針刺出膿血則免內攻傷內矣　或問脇上生疽何如曰是名脇疽屬手厥陰心包絡足厥陰肝火熱毒怒氣相併而作活命飲加柴胡紫金丹為金散選用壯實者八陣散一粒金丹下之此證宜速治不然潰爛不斂多致危困　一人患此如胡桃微痛微腫月餘漸大如杯膺作痰治或作肝積或云痞塊竟莫能効數月遂大如盆堅硬如石不甚疼痛微紅漫腫復得惱怒胸腹脹滿小水不利脈弦而微投以化氣丸六一散小便利胸次寬繼投烏金散奪命丹間服八陣散月餘漸消　一人年踰五十脇下患毒瘡口不合右關脈數而渴此胃火也用竹葉黃芪湯而止再用補中益氣湯而愈嘗治午後發渴或發熱用地骨皮散効　一人性急味厚常服燥熱之藥左脇一點痛輕診弦而且孔知其痛處有膿與四物加桔梗香附生薑煎十餘貼痛處微腫如指大針之少時屈身膿出與四物調理而安

一夫人左脇內作痛牽引胸前此肝氣不和尚未成瘡用小柴胡加青皮枳殼四劑少可加芎歸治之愈

一人連年病瘧後生子三月病熱右脇下陽明少陽之分生一癤甫平左脇下相對又一癤膿血淋漓幾死醫以四物湯敗毒散數倍人參以香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月而愈逾三月忽腹脹生赤䵟如霞片取剪刀草汁調凉藥沙傅隨消又半月後脹入囊為腫黃白裂開兩丸顯露水出以紫蘇葉盛疑炙未托之何餘而合此胎毒所也　一婦因忿懟脇下結一核二十餘年因怒加腫痛完穀不化飲食

少思此腸胃虛也以六君子加砂仁肉桂乾薑肉豆蔻泄雖止而膿清瘡口不合用十全大補湯月餘而愈（機按前項二條腸癰一因其性多躁急或用利物湯陰柔之劑以安靜之一因其性不下故用小柴胡疏理之劑以和解之諸證又其性拗為治不特專于攻毒也）張通北人年踰四十夏月腹下患毒潰後不斂膿出清稀小寒脈弱腸鳴切痛大便溏泄食下即嘔此寒氣而內陷也宜大辛溫之劑遂以托裏溫中湯二劑諸證悉退更以六君子加炮乾薑肉桂數劑并以十全大補湯而愈　一人腸癰一塊日久不潰按之微痛脈微細而濇此形氣俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉宜用人參養榮湯彼不信乃服流氣飲虛證悉至方服前湯月餘少愈但腫尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘日膿成以火針刺之更灸豆豉餅又服十全大補湯百貼而愈　蓋流氣飲通行十二經諸經皆為所損況膽經之血本少又從而損之寧不傷乎東垣曰凡一經受病止當求責其一經不可干擾餘經苟泛投克伐之劑則諸經被戕寧無危乎　一人年三十餘素患右脅腫如覆瓢轉側作水聲脈數經曰陰虛陽氣湊襲寒化為熱熱甚則肉腐為膿即此證也及按其腫處即起足膿成遂濃煎黃芪六一湯令

先飲二鍾然後針之膿出數碗虛證並至遂用大補三月餘而愈　大抵膿血大泄血氣俱虛當峻補之雖有他病皆宜緩治蓋元氣一復諸病自退老弱之人不問腫潰尤當補也　一人因勞發熱腹下腫痛脈雖大按之無力此氣血虛腠理不密邪氣襲于肉理而然也當補之以接虛怯之氣以補中益氣湯加羌活四劑少可去羌活又百餘貼而愈　一人面白神勞脇下生一紅腫如桃欲用補劑不信乃用流氣飲十宜散血氣俱憊而死　一人年踰二十腹下患毒十餘日腫硬不潰脈弱時嘔予謂腫硬不潰陽氣虛嘔吐少食胃氣弱宜六君子湯加砂仁藿香彼謂腫瘍時嘔作毒氣攻心潰瘍時嘔作陰虛宜補予曰此丹溪大槩言也若腫赤痛甚煩躁脈實而嘔為有餘當作毒氣攻心而下之以寒藥若腫不潰脈弱時嘔為不足當補之亦有宿傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖腫瘍尤當助胃壯氣益腫瘍毒氣內侵作嘔十有一二潰瘍濕氣內傷作嘔十有八九彼不信飲攻伐藥愈甚復請診脈微弱而發熱予謂熱而脈靜及脫血脈實汗後脈躁皆難治果歿

○內發丹毒

或問膀下至腰胯間腫痛赤色如霞何如曰此名內發丹毒治之稍緩毒攻於內嘔噦昏迷胷腹膜脹者死二便不通遍身青紫者死急砭出惡血服防風通聖散去白木甘草紫金丹勝金丹汗之服汗劑得汗則生無汗則死悶吐不食譫語者死

○臍上疽

或問臍上寸許發疽何如曰此名衝疽又名中發疽一名赤腎瘡由心火熾盛流入腎經所致皆高腫紅色亦可治宜流氣飲活命飲勝金丹奪命丹選用若平塌黑色膨脹惡心膿水清稀臍突腸洒甚瀉利無度譫語直視者死潰久不斂之之其後所言危證只是虛耳如能大補不死亂

○臍癰

或問當臍生癰何如曰此即臍癰也由心經積熱流於大小腸二經所致宜何首烏散活命飲加升麻及紫金丹二十散選用壯實者一粒金丹下之　按臍為神闕穴禁針之所只消散之免使見膿為上

○小腹疽

鬼遺云衝疽發小腹疼痛而振寒熱兩目惝惝五日變色可刺不刺及導引出膿毒不治九十餘日死

或問臍下發疽何如曰此即小腹癰臍下一寸五分為氣海二寸為丹田三寸為關元皆屬任脈由七情不和所致急服活命飲紫金丹奪命丹壯實者一粒金丹八陣散下之老弱者黃芪木香散內補十宣散十全大補

湯選用若潰而倂膿水清稀或潰爛久不斂者死。
或問一人年十九患瘡於小腹之左數月堅硬如石
寒熱間作飲食減少漸至羸尪何如曰是名緩疽屬
足太陰經積熱所致由醫不得法邪正相持耳投以
紫金丹活命飲間服十全大補湯半月而愈

○總論

薛曰腹癰謂瘡生於肚腹或生於皮裏膜外屬膏粱厚
味七情鬱火若漫腫堅硬肉色不變或脈遲緊未成
膿也四君加芎歸白芷枳殼或托裏散腫軟色赤或
脈洪數已成膿也托裏消毒散膿成而不外潰者氣

血虛也即針而刺之腫焮作痛者邪氣實也先用仙
方活命飲隔蒜灸以殺其毒後用托裏以補其氣若
初起欲其內消當助胃壯氣使根本堅固而以行經
活血之藥佐之若用尅伐之劑欲其消散則腫者不
能潰潰者不能斂若用疎利之藥下其膿則少壯者
多為難治老弱者立見危亡

一人年踰三十腹患癰腫脈數喜冷齊氏曰瘡瘍腫
起堅硬者實也河間曰腫硬脊悶煩躁飲冷邪在內
也用清涼飲倍大黃三劑稍緩次以四物湯加芩連
山梔木通四劑而潰更以十宣散去參耆桂加金銀
花天花粉彼欲速効自服溫補藥肚腹遂腫小便不
利仍用清涼飲膿潰數碗再以托裏藥治之而愈

一人腹癰焮痛煩躁作嘔脈實河間曰瘡瘍火屬須
分內外以治其本又云嘔噦心煩腫硬脊悶或皮肉
不變脈沉而實毒在內也當疎其內以絕其源用內
疎黃連湯利二三行諸證悉退更以連翹消毒散而
愈　一人腹癰膿熟開遲脈微細膿出後瘡口微膿
如蟹吐沫此內潰透膜也瘡瘍透膜十無一生雖用
大補亦不能救此可為待膿自出之戒也　一人素
嗜酒色小腹患毒脈弱微痛欲求內消予謂當助胃

壯氣兼行經活血佐之可消彼欲速効自用敗毒等
藥勢果盛瘡不潰膿飲食少思滿月餘復請診脈愈
弱盜汗不止瘡腫不潰泄瀉肉冷自汗色脫此氣血
俱虛故不能發腫成膿以十全大補湯三十餘劑膿
成針之反加煩躁脈大此亡陽也以聖愈湯二劑仍
以前湯百劑而愈　司馬李梧山患此腹痛而勢已
成用活命飲一劑痛頓止用托裏消毒散腫頓起此
膿將成也用托裏散補之自潰而愈　舖天掌堂劉
廷器正德辛未仲夏腹患癰潰而膿清熱渴腹脹作
嘔不食或以為熱毒內攻皆用芩連大黃之劑病愈

甚薛曰當捨時從證投以參芪歸朮等藥一劑喘止
食進再用托裏等劑而瘡愈　進士邊雲莊腹痛惡
寒脉浮數薛曰浮數之脉而反惡寒瘡疽之證也不
信數日後復請視之左尺洪數薛曰內有膿矣仍不
信至小腹痛脹連及臍腹始信薛曰膿潰矣氣血
俱虛何以收斂急服活命飲一鍾臍間潰一孔出膿升
許氣虛甚作渴用大補藥一劑神思方醒每去後糞從
瘡出痛不可當小腹間如有物上挺即發痙不省人
事煩躁脉大舉按皆實省而診之脉洪大按之如無
以十全大補倍用參芪至四斤更加附子二枚煎膏
服而痙止又用十全大補湯五十餘劑而瘡斂　上

舍周一元腹患癰三月不愈膿水清稀朝寒暮熱服
四物黃檗知母之類食少作瀉痰涎上湧服二陳枳
實之類痰涎愈甚胸膈痞悶謂薛曰何也薛曰朝寒
暮熱血氣虛也食少作瀉脾腎虛也痰涌胸痞脾肺
虛也悉因真氣虛而邪氣實也當先壯其胃氣使諸
證有所稟而邪自退矣遂用六君加黃芪當歸數劑
諸證漸退又用十全大補湯肌肉漸斂更用補中益
氣湯調理而瘡　上舍毛體仁素陰虛春初咳嗽胸
中隱痛腎脉數而無力肺脉數而時見此腎氣虧損

陰火爍肺用六味丸料一劑服之病勢雖減內癰已
成蓋因元氣虛而未能發出火令可畏不信服痰火
之劑兩月後乳間微腫脉洪數而無力薛曰膿內潰
矣當刺出其膿以免內攻之禍不信又月餘請視但
針得一孔膿撓不利仍復內攻唇舌青赤薛曰臟腑
已壞吾何能治之後果歿　從姪孫年十四而畢姻
乙巳春年二十四腹中作痛用大黃等藥二劑下血
甚多胸腹脹滿痰喘發熱又服破氣降火藥一劑汗
出如水手足如冰薛往他適之左關洪數右尺
尤甚乃腹癰也雖能收斂至夏必變而成瘵症用參

芪各一兩歸朮各五錢陳皮茯苓各三錢炙草炮薑
各一錢二劑諸證少退腹始微赤按之覺痛又二劑
作痛又二劑腫痛脉滑數針出膿瘀更用大補湯精
神飲食如故因遺精患處色黯用前藥加五味山茱
山藥骨脂吳茱等劑瘡口漸斂瘵證悉具其脉非洪
大而數即微細如無唯專服獨參湯人乳汁少復良
久仍脫余曰當備後事以俟火旺乃祈鬼神巫者歷
言往事如見更示以方藥皆峻利之劑且言保其必
生敬信服之後果歿經曰拘於鬼神者不可以言至
德而況又輕信方藥於邪妄之人耶書此警後

背部十二

(一)發背

或問背發疽有發〔於〕上中下三發俱在脊中屬督脈上發者傷於肺發於天柱骨下中發者傷於肝爲對心發下發者傷於腎爲對臍發皆由積熱怒氣所致初如粟米或麻或痒或拘急或不痛或大痛初覺便宜隔蒜灸之或汗或下或托量其虛實施治腦發背發在上者不可用木通恐導虛下元故也老弱者尤宜戒然二發背總要之地與他處不同尤所當謹後有痛痒宜速治之活命飲加羌活紫金丹勝金丹奪命丹選用壯實者一粒金丹八陣散等下之老弱者黃芪木香散十全大補湯托之

凡遺云蜂窠發脾背起心俞及心包絡俞若有一二十日不穴死十日可刺其色赤黑膿清者可治 或問一人年六十背患疽狀如蜂房十日而平塌焮熱痛楚殊甚飲食少進膨脹淋瀝何如曰此蜂窠發也診其脈微而遲四肢厥冷爲不足詢其先前過服打氣之劑又得暴怒用活命飲加參芪歸术無以爲樂青皮木香間與紫金丹服之起發膿潰服十全大補湯而愈

特疽發肺俞及肝俞不穴二十日死八日可刺其色紅赤內隱起如椒子者殺

陰陽二氣疽腫闊滿背或大或小不常腫熱脹大十日可刺導引出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治 或問背上麻木不常時腫時消忽軟忽硬乍寒乍熱何如曰此名陰陽疽由七情內乖陰陽不和也此證必大渴神清脈定者可治宜活命飲加羌活或勝金丹奪命丹選用昏迷躁亂飲食不進者死十日得黃白膿者可治數日無膿者死

筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有癰在

肥腸中九十日死

禽疽始發者如疹數十處如拳打之狀發寒齒噤如此者十四日死十日可刺導引膿出即愈 或問背忽麻木拘急不痛十數處肉紫色如拳觸狀何如曰此名禽疽七日內寒熱日晡者死急服活命飲加羌活獨活勝金丹奪命丹得汗可治無汗不治神清脈和可治神昏脈躁或微或代者死漫腫不潰宜服臺閣紫微丸

或問背疽兩頭小四邊散何如曰此名兩頭發又名滿天星一名廣編背發由積熱所致活命飲加

羌活紫金丹勝金丹壯實者[illegible]陰症一粒金丹下之
腫高紅潤者生低陷黑暗者死
或問背脇之間[illegible]兩處發疽何如曰此名老鼠攢[illegible]
名遊走血脚搯山怒氣積熱所致多發于足少陽足
厥陰[illegible]經宜順氣清熱之劑服黃連解毒湯活命飲
加黃連梔子及服紫金丹壯實者一粒金丹下之老
弱者黃芪木香散內補十宣散兼用七日不見膿黑
陷及躁亂者死
或問背上生疽肉色不變麻木微痒頂如牛領之皮
二三尺許何如曰此名竟體發[illegible]因盛若

時空腹感觸穢氣及憤怒[illegible]飲宜活命飲加羌
活或黃連解毒湯勝金丹烏金散選用壯實者八陣
散一粒金丹下之七日內未成膿宜[illegible]而起
發神清脉和者可治發而不起腹脹神昏脉微或促
或代者死服汗劑得汗者生無汗者死服補劑紅潤
起發知痛者生膨脹不食乾語黑陷者死
或問背當心而痛麻木不常累累如彈如拳堅硬如
石痛徹五內遍身拘急何如曰此名酒毒發疽由飢
飽勞傷炙煿厚味所致宜服黃連解毒湯加羌活乾
葛或神効消毒散內疏黃連湯紫金錠勝金丹選用

神昏脉亂大渴[illegible]有妨飲食者死[illegible]便閉結者死
有因寒變而內陷者用托裏溫中湯
或問背上細癗無數浸淫[illegible]只如湯火傷頭焦多
渴何如曰此丹毒發疽也因服丹石剛劑所致紅潤
者生紫黯者死黑證少者宜服黃連消毒散勝金丹
因老膏黑證多神昏脈躁膨脹嘔噦者死
或問背側生疽高[illegible]寸長尺許狀如黃瓜色不變
何如曰此名黃瓜癰[illegible]名內癰疼痛引心四肢麻木
是也此證多不可治急服紫金丹勝金丹活命飲加
羌活柴胡及奪命丹[illegible]

語者死平塌黑色者獨聖散上之[illegible]微死
或問第九椎兩旁忽腫痛而紅赤寒熱大作何如曰
此名散疽即中搭也屬太陽經由七情不和憤怒積
熱所致壯實者急服一粒金丹或八陣散下之活命
飲加柴胡羌活黃芩水酒各半煎服老弱者黃芪木
香散內補十宣散[illegible]潤澤
者可治色黑低陷惡心脉遲大便滑泄小便如淋譫
語者死
鬼遁方六人生最可[illegible]一曰
陽毒因風熱而有或患瘟疫消渴或久患傷寒餘有

胛骨處漸漸積起於背脊兩間不問椎數但從兩夾脊起止腰上滿背焮熱如炊之狀赤紫或紅如焰膿毒難成成後不止止後痛不除發忽數日之間復平如舊將謂腫消此是內攻肉陷不可療矣　二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快背脊而痛直應前心心忪頭目昏重寒熱如瘧五七日後始發引攻腫開闊難收內積有膿深沉遲緩未透宜急以補氣湯藥內托外以抽膿藥貼之宜急見膿無膿即不愈不期　三曰有人多服金石燒煉之藥毒惡流滯成發背者初起如丹疹之狀後漸開如湯火瘡面色如朱心膈煩躁多渴此其瘡難起起即驚人猶勝於陰陽二毒者緣此名因金石藥毒湯散治其內兼有根底分明亦須急療方安　四曰人有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久積乘飢乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滑肥鮮熾膩未下胸膈停積不消夾熱當風取快脾臟氣虛不能受乘發毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰頭如小彈子後大如拳堅如石痛連胸吸如之拘急口苦舌乾腹急大小便澀十數日後頭面手足虛腫及臟腑通泄如利內急痛者是其發也宜方服引急用收

腫發穴潰膿毒常內實外泄膿水不可放縱遲緩則皮肉腐壞傷骨爛筋難以復舊多內而感邪內敗者亦矣　五曰人有因一時虛憂氣發背毒氣先在臟腑年月浸遠氣血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑硬痛深附筋骨似刺搔之不知未有引手加深方覺痛重處今五七日方見不淡微黯而色變青白有時攻打心氣寒戰似瘧及有風候頭動口痛手足厥逆眼黑小便不利多而慢此內有邪氣相傳急破出膿方　五曰方有黃膿色汁相和發而其少不覺不慢亦急服補藥不住直至色退瘡好方除亦宜急急服之與十宣散外出膿毒

生

初患腫三日內灸者生　八日內膿成針烙導引者生　未療慎勞力者生　慎忌食者生　慎喜怒者生　攣腫飯療者生　急療者生　不諱發背者生

死

待膿自出不導引者死　未內攻而針烙用藥導引者生內攻後導引針烙者死　腫焮熱痛方盛已前療者生如過此後已內攻者死　膿成後不出不導引但傳藥者死　如赤白痢氣急者是已內攻臍療無益必死　癰不救十得九生疽不療十全死　輕腫怕痛者必死　不遇良方者死　節飲不依法者

[illegible]

必死　愚執恣意用性逆情者死

有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火焚者名千敗壞初發即可如黍米粒大三兩日漸赤引腫如手掌面大五七日如碗面大即易為攻焮熱赤引如火燒之狀浮面漸潰爛闊開内發腫如炊之狀外爛皮肉如削去紫瘀膿汁多而腫不退疼亦不止發渴發逆飲食不下嘔吐氣急浮淺開闊者尤宜發膿托毒湯藥用之必愈（陽證實也）

其間有只如蠡面大者此非不大[illegible]為毒氣深沉内虛毒氣近膜也此必内攻近入臟腑却外入四肢先攻頭面虛浮後攻于面次攻胸[illegible]名曰毒氣散入四肢其人聲嘶氣喘眼睛黑小十指腫黑乾焦不治（陰證虛也）

陰陽

精要云凡癰疽初發雖硬高者而毒氣却淺此乃六腑不和為癰其證屬陽勢雖急而易治若初發如粟粒甚則如豆許與肉俱平或作赤色時覺痒痛痒時慎勿抓破此乃五臟不調為疽其證屬陰蓋毒氣内畜已深勢雖緩而難治

内外

始發一粒如麻豆大身體便發熱生疽處腫大熱痛此為發於外雖大如盆治之百可百活（陽證實也）　或身體不熱自覺倦怠生瘡不[illegible]數日後漸大不疼不痛低陷而壞爛此為發於内雖神仙無如之何（陰證虛也）

發背屬膀胱督脉經皆由陰虛火盛或醇酒厚味或鬱怒房勞所致若腫赤痛甚脉洪數而有力熱毒之證也為易治漫腫微痛色黯作渴脉洪數而無力陰虛之證也為難治不腫不痛或漫腫色黯脉微細陽氣虛甚也尤為難治　若腫焮作痛寒熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘用[illegible]方[illegible]敗毒散後用托裏消毒散解之（[illegible]）

（金銀花散或槐花酒神効托裏散[illegible]欲腫痛甚脉實以清涼飲仙方活命飲[illegible]其焮腫便秘[illegible]大便秘利[illegible]）

漫腫微痛或色不赤[illegible]少思此形氣病氣俱不足也用托裏散調補之　不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪　膿出而反痛成膿清稀氣血俱虛也八珍湯　惡寒形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯　晡熱[illegible]或不收斂陰血虛也四物加參朮　作渴飲冷[illegible]不收斂胃氣虛也六君加炮薑　食少體倦或不收斂脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏　肉赤而不斂血熱也四物加

山梔連翹　肉口而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥
木香　小便頻數者腎虛損也加減八味丸　右
初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也
仙方活命飲口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托
裏消毒散飲食少思肢體倦怠脾胃虛弱也六君子
湯如未應加薑桂其有死者乃邪氣盛真氣虛而不
能發出也在於初餘之間見之　若已發背用托裏
消毒散不腐潰用托裏散如不應急温補脾胃其有
死者乃真氣虛而不能腐潰也在於二旬之間見之
若已腐潰用托裏散以生肌如不應急温補脾胃
其有死者乃脾氣虛而不能收斂也在於月餘間見
之

外治法　初起焮痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜
灸之痛者灸至不痛不痛者灸至痛毒隨火而散再
不痛者須明灸之但未潰以前皆可灸也更用
鍼藥圍之若用烏金膏或援生膏點患處數點尤好
開用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處
倘有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏紙入瘡內
若有膿為脂膜間隔不出而作脹痛者宜用鍼引之
腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用豬蹄湯洗如膿稠
或痛飲食如常瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服
之仍用前二膏塗貼若腐肉已離好肉宜速去之如
膿不稠不稀微有疼痛飲食不甘瘀肉腐遲更用桑
柴灸之多用托裏藥若瘀肉不腐或膿清稀不焮痛
者急服大補之劑亦用桑柴灸之以補接陽氣解散
鬱毒常觀患癰疽稍重未成膿者不用蒜灸之法及膿
熟不開或待腐肉自去多致不救大抵氣血壯實或
毒少輕者可假藥力或自腐潰怯弱之人熱毒中隔
內外不通不行針灸藥無全功矣然此證若膿已成
宜急開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨輕者延潰
良肉難於收功因而不斂者多矣　大抵發背之患
其名雖多惟陰陽二證為要若發一頭或二頭其形

焮赤腫高頭起疼痛發熱為癰屬陽易治若初起一
頭如黍不腫不赤悶痛煩躁大渴便秘睡語咬牙四
五日間其頭無數其瘡口各含一粟形似蓮蓬名蓮
蓬發積日不潰按之流血至八九日或數日其頭成
片所含之物俱出通結一衣揭去又結其口共爛為
一瘡其膿內攻色紫黯為疽屬陰難治脈洪滑者尚
可沉細尤難如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有効
凡人背近脊并髀皮裏有筋一層患此證者外皮

雖破難潰以後內膿不出令人脹痛若差氣血轉虛變證百出若待自潰多致不救必須開之並以托裏之劑常治此證以利刀剪之尚不能去以此堅物待其自潰豈不反傷乎非氣血壯實者未見其能自潰也

羅謙甫治一人年踰六旬冬至後數日瘡發背五七日腫勢約七寸許痛甚瘍醫曰膿已成可開發矣病者恐不從三日醫曰不開恐生變症遂以燔針開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變症果生覺重如負石熱如焫火痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時從證可也急作清涼飲子加黃連秤一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除月餘平復

虞少府郎背中發小瘡不悟只以藥調補數日不疼不痒又不滋長延之呼外醫灸二百壯已無及此公平生不服藥一年來唯覺時時手腳心熱疾作不早治又誤服補藥何可久也蓋發背無補法瘡家甘無好瘡但發于正中者為真發背

按四明發背無補大熱非通論也蓋瘡有補有熱有寒者又不可不知

揚州名醫楊吉老其術甚著有一士人狀若有疾厭厭不聊莫能名其為何若往謁之楊曰君熱疾已極氣血銷鑠且盡自此三年當以疽死不可為也士人不樂而退聞茅山觀中一道士醫術通神但不肯以技自名未必為人致力士人心計交切乃衣僮僕之衣詣山拜之願執役左右道士喜留寘弟子中誨以誦經日夕成事頗指如意經兩月餘覺其與常隸別呼扣其所從來士人始再拜謝過以實告之道士笑曰世豈有醫不得之病當為子脈之又笑曰汝便可下山吾亦無藥與汝但日日買好梨啖一顆如生梨已盡則取乾者泡湯飲之仍食其滓此疾自當平士人歸謹如其戒經一歲復往揚州楊醫見之驚其顏貌腴澤脈息和平謂之曰君必遇異人不然何以至此士人以告楊立具衣冠焚香望茅山設拜蓋自咎其術之未至也

程明佑治提充胡嫗年六十患發背大如盂頭如蜂窠嘔逆咽不下瘍醫藥之毒熾氣向胃不滋程曰治必分陰陽虛實胃傷于寒令人嘔逆瘍作則不衛氣而氣血周貫則瘍隨膿出瘍肉漸生依方投藥四五劑咽遂下嘔止已潰潰漸平　陳斗嵓治王卜

政福建人背患一癰痛甚發咳逆十餘日水漿不下脈伏如絕醫皆不治陳見之曰此寒涼過甚中氣下陷以四君加當歸二進而病如失癰亦漸愈　一男子年五十餘形實色黑背生紅腫及脾骨下痛其脈浮數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附瓜蔞子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此亦內托之意也　周評事瞿患背癰瘡口久不合召瘍醫徐廷禮療治俱以托裏十宣二散與服不效徐謂周曰吏部龍用美來共事料理吾技窮矣既而盛至按之[illegible]人參

五錢附子稍行功耳服後兩足俱暖自下而上謂其子曰今之藥餌非戰頓覺神爽快服之旬日而宿口平復　御醫王介之之內年四十背疽不起泄瀉作嘔食少厥逆脈息如無屬陽氣虛寒用大補劑加附子薑桂而不應再加附子二劑瀉愈甚更以大附子一枚薑桂各三錢參芪歸朮各五錢作一劑腹內始熱嘔瀉乃止手足漸溫脈息遂復更用大補而潰托裏而斂十年後終患脾胃虛寒而歿

丹溪治一人背癰徑尺穴深而黑急作參芪歸朮膏飲之三日略以艾芎湯洗之氣自卷卷然可飲食每日作多肉餛飩人碗與之盡藥膏五六斤餛飩三十碗瘡漸合肉與餛飩補氣之有益者也　一老人背發疽徑尺已與五香十宣散數十貼嘔逆不睡素有淋病急以參芪歸朮膏以牛膝湯入竹瀝飲之淋止思食盡藥四斤膿自涌出而愈　一人發背癰疽得內托十宣多矣見膿嘔逆發熱又用嘉禾散加丁香時天熱脈洪數有力此潰瘍尤所忌然形氣實只與參膏竹瀝飲之盡藥十五六斤竹百餘竿而愈後不戒口味夏月醉坐水池中經年餘左脇旁生軟塊二年後成疽自見脈證嘔逆如前仍服參膏等而安　汪

石山治一老人患背癰診視之其脈洪緩而濡癰腫如碗皮肉不變按之不甚痛微發寒熱乃語之曰若在膂脾經絡交錯皮薄骨高之處則難矣今腫在脾骨下當許乃太陽經分尚可治遂用黃芪伍錢當歸羌活甘草節各壹錢先令以被蓋暖處熱服令微汗寢熟腫消一暈五服遂安　薛已治進士張德弘背胛微腫赤飲食少思用托裏藥膿成而潰再用大補湯之類肉生瘡斂忽寒熱作嘔患處復腫其脈浮大按之若無形氣殊倦脾胃虛之甚此胃氣虛寒瘡毒也彼不信復伐則嘔穢始作仍用補藥而斂

一人大背患疽年餘瘡口甚小[illegible]肉下形氣怯弱脈浮緩而濇此氣血虛寒也用十全大補加附子少許數劑而元氣漸復却去附子又[illegible]十餘劑全愈
一婦年五十餘四月初背當心生疽如粟[illegible]三日漸大根盤五寸許不腫痛不寒熱薛[illegible]其脈微而沉[illegible]脈病而形不病者忌也[illegible]作膿則痛[illegible]所由分也不發不治潰而不斂亦不治乃與大補陽氣之劑色白而黯瘡勢如故至十二日復診其脈沉瘡勢不起神疲食減小便淋濇乃與大補氣血加薑桂二劑瘡亦不起十五日[illegible]怒嘔瀉並作服大補藥

一劑瘡仍不起[illegible]藥[illegible]不服或勸之者悟依方進[illegible]劑十六日瘡起而潰[illegible]而瘍腰亦如之十九日[illegible]瘡已蹈險處[illegible]氣消鑠尚可望也與大補[illegible]餘劑五月十一日瘡者因勞[illegible]汗口乾舌強太陽[illegible]腦頂俱脹復延薛至診之[illegible]此氣血俱虛肝[illegible]火[illegible]炎用補中益氣湯加山梔芍藥頂[illegible]內熱少睡手足發熱不時霍然用逍遙散加山梔熱退復用歸脾湯瘡乃愈計瘡發及斂四十二日 內翰楊[illegible]少參史南湖之內[illegible]並見陽氣脫陷

一儒者年幾六旬仲冬背疽初起入房患處[illegible]五寸[illegible]尺餘[illegible]作渴小便頻數兩耳重聽[illegible]而初右手為甚便秘廿七日計進飲[illegible]如常欲通之薛曰所喜者此耳急用大[illegible]加茴附肉桂二劑瘡始潰痛[illegible]後空心用前藥[illegible]以六味丸料加參芪歸朮五劑[illegible]用活命飲[illegible]出黑血甚多[illegible]利薛他往四日神思復[illegible]為殞薛以參芪歸朮各[illegible]錢服之即索飲食并鴨子[illegible]二劑

肉腐膿潰而愈 操江都[illegible]後大熱誤為實火用苦寒藥一鍾寒熱[illegible]欲冷水浴身脈浮大按之全無薛曰此陽氣[illegible]在肌表無根之火也急用六君加附子一劑即愈 一男子背瘡不斂[illegible]肺發熱小便赤澁口乾[illegible]數而無力[illegible]芪歸朮[illegible]地黃[illegible]冬五味炙甘草肉桂[illegible]氣引[illegible]火歸經[illegible]藥力不能及也[illegible]退却大肉桂[illegible]數劑而愈此[illegible]因前失補元氣[illegible]
憲副陳魯山年[illegible]勞傷元氣[illegible]口乾舌燥後至丙午仲夏發背疽漫腫中央色黯四畔微

赤微痛脉洪之浮大按之微細左寸短而右寸若無
十餘日肺木令旺時也此屬脾氣虛寒當捨時
從證朝用參芪歸朮陳皮半夏炙草以補其陽
夕用加減八味丸滋其肝腎各二劑而膿潰但寒不
止稀涼汗自汗內熱晡熱脉浮而數改用八珍湯復
發熱而夜陽舉此腎虛而火妄動仍用加減八味丸
料煎服而安又因怒動肝火瘡出鮮血二盞許左關
弦數右關弦弱此肝木侮脾脾不能攝血脾不能統
血也用十全大補兼用前藥料各二劑而血止再用
前藥調理而愈 一人仲[illegible]背有

小頭如鋪黍狀四日矣此真氣虛而邪氣實也外用
隔蒜灸內服活命飲二劑其邪稍退仍純補其氣又
將生脉散代茶飲瘡邪大退薛因他往三日復視之
飲食不入中央肉死大便秘結小便赤濁曰此間斷
補藥之過也蓋中央肉死乃脾氣虛大便不
通胃氣虛而腸不能送小便赤濁脾土虛而火下陷
治亦難矣急用六君加當歸柴胡升麻飲食漸進大
便自通外用烏金膏塗中央三寸許四圍紅腫漸消
中央黑腐漸去乃敷當歸膏用地黃丸料與前藥間
服將百劑而愈 中翰鄭朝用背瘡發熱吐痰飲食

無味肌肉不生瘡出鮮血薛曰此脾氣虛不能攝
血歸源也法當補脾胃彼不信用消毒涼血加惡寒
嘔吐始信其言用六君加炮薑半夏茯苓數劑諸症
悉退又令用十全大補瘡口漸斂後因飲食稍多泄
瀉成痢此脾胃虛寒下陷用補中益氣下四神丸而
痢止繼以六君子湯而瘡愈 府庠衣懷雪背瘡發
熱作渴脉數無力用四物加黃蘗知母玄參山梔連
翹五味麥冬銀花脉症漸退又加白芷參芪腐肉悉
潰因停藥且勞熱渴仍作乃與參芪歸芷炙草山藥
山茱茯苓澤瀉肉桂而安又以[illegible]及十全

大補而愈 都憲周弘岡背患[illegible]大而
痒此陽氣虛弱而邪氣壅滯也用托裏散倍用參芪
反內熱作渴脉洪大鼓指此虛火也用前散急加肉
桂脉症頓退仍用托裏而愈若以為瘡毒而用寒藥
則誤矣 太僕王[illegible]前瘡初起因大勞又用十宣散之
類加喘渴內熱脉大無力此陽氣自傷不能升舉下
陷於陰分而為內熱也[illegible]以補中益氣加酒炒芍藥
麥門冬五味子治之而愈 上舍張克恭患此內服
外敷皆寒涼敗毒遍身作痛欲嘔少食晡熱內熱惡
寒畏寒薛曰遍身作痛榮衛虛而不能營於肉裏也

欲嘔少食脾胃虛寒而不能消化飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌膚也此皆由脾胃之氣不足所致遂用補中益氣湯諸證漸退又以十全大補湯腐肉漸潰又用六君子湯加芎歸肌肉頻生而愈　一儒者周兩峰怯弱久鬱背脊患疽肝脈弦洪脾脈浮大按之微細以補中益氣湯加桔梗貝母少用金銀花白芷二劑肝脈頓退脾脈頓復乃以活命飲二劑膿潰腫消肝脈仍弦此毒雖去而胃氣復傷仍用補中益氣湯加茯苓半夏而愈　一上舍蔡東之患此皆用托裏

之藥而潰瘡口尚未全斂時值仲冬兼咳嗽余曰瘡口未斂脾氣虛也咳嗽不止肺氣虛也法當補其母一日與其同宴見忌羊肉余曰補可以去弱人參羊肉之類是也故宜食之遂每日不徹而瘡斂嗽亦頻愈矣　憲副俞九峰仲冬患此色黯漫腫作渴便數尺脈洪數此腎水乾涸當發於火旺之際不信更用苦寒之藥復傷元氣以促其殁　京兆柴黼菴仲夏患之色黯微腫發熱煩躁痰涎自出小腹陰囊手足逆冷右關浮澀兩尺微細余曰此虛寒之證也王太僕云大熱而不熱是無火也決不能起懇求治

之以用大溫補之藥一劑流涎雖止患處不起終不能救　顧包泉老者年六十有五因感怒發於頸大如盂四圍色黑召瘍醫治之用冷藥敷貼數已深約寸七八日後爲用刀去瘀肉頗候其去口四寸色黑乃血滯更加冷藥非其治也乃更治熱敷藥去腐藥數之次早痒終夜明日色鮮紅微腫亦消惟中有數十孔如蜂房一日許又覺惡心作嘔覘一人頭瘡兩人頭自診曰此虛極證也用參附大劑進三服患已止矣不數日竟愈

一婦因得子遲服神仙聚寶丹背生癰甚危脈散大而澀急以加減四物湯百餘貼補其陰血幸其質厚易于收斂

〇腰疽

或問：下四椎旁腰腎之間發疽何如？曰：此名通[illegible]疽發，即下[illegible]椎也，由房勞太過，致傷腎水，令人口苦寒熱，大作自汗，似瘧焮痛，急服勝金丹、黃芪內托散、活命飲，加羌活、黃芪治之。稍緩潰爛透膜者死。若見咳嗽嘔噦，腰間似折，不能俯仰，飲食不納者死。潰而膿水清稀，腐爛臭穢，迷悶不醒，厥逆者不治。　一婦人年七十，腰生一癰，作癢異常，疑蟲蝕所毒，診脈浮數，齊氏曰：脈浮數反惡寒者瘡也。翌日復診，脈乃弱，于背未潰，而脈先弱，何以收斂？況大便不通，則真氣已竭，治之無功。固請不得已，用六君子加藿香、砂仁，飲食漸進，大便始通，更用峻補之劑，潰而膿清作渴，再用參芪歸朮麥門五味，而渴止。喜曰：可無虞矣。予曰：不然，不能收斂，先入之言也。彼疑，更醫，果歿。　一人年十九，腰間腫一塊，無頭不痛，色不變，二月不潰，飲食少思，肌肉日瘦。此氣搏腠理，營氣不行，鬱而為腫，名曰濕毒流注。元戎曰：若人飲食疏，精神衰，氣血弱，肌肉消瘦，榮衛之氣短促而澀滯，故寒搏腠理，閉鬱為癰者，當補以接虛怯之氣。遂以十全大補湯加香附、陳皮，三十餘劑始針出白膿二碗許，仍用藥倍加參芪，仍灸以豆豉餅漸愈。彼乃惑于速効，內服敗毒，外貼凉藥，反致食少膿稀，患處色紫，復請予治，[illegible]仍以前藥加肉桂，更以附子餅，[illegible]而愈。此症久而不愈，或膿水清稀，當服內塞散及灸附子餅，然後可愈。　一婦年逾二十，腰間突腫寸許，肉色不變，微痛不潰，發熱脈大，此七情所損，氣血凝滯，[illegible]道而然，當益氣血、開鬱結，更以香附餅熨之，使氣血充暢，內自消散。若腐雖潰，亦無危。不聽，乃服十宣流氣之藥，氣血愈虛，潰出清膿，不斂而死。　一婦年六十，[illegible]此瘀血滯于經絡而然，不早治，必作膿，遂以桃仁湯二劑，稍愈，更以沒藥丸數服而愈。　亦有瘀血未盡，臍腹刺痛，或流注四肢，或注股內，痛如錐刺，或兩股腫痛，此由冷熱不調，或思慮動作，氣乃壅遏血蓄經絡而然，宜沒藥丸治之。　亦有或因水氣所觸，經水不行而腫痛者，宜當歸丸治之。　凡患此停滯為患，即輕治之稍緩，則多成流注，緣骨疽，多致不救。　有[illegible]患腰疽，服寒涼敗毒之藥，色黯不痛，瘡頭如鋪黍，背重不能安寢，耳聵目白，面色無神，小便頻澁，作渴迷悶，氣粗短促，脈浮數，重按如無。余先用滋

腎水之藥一劑少頃復刺四止背即輕鬆乃徑其於
紅以丈半觔許明癸退後外敷烏金膏內服參芪歸
术肉桂等藥至數劑元氣稍復自能飲食甘辛熱一日
不用手足並冷大便不禁仍加肉桂及補骨脂貳錢
肉豆蔻壹錢大便如常其肉漸潰更用當歸膏以生
肌肉八珍湯以補氣血而愈　舉人顧東溪久作渴
六月初腰患疽不慎起居瘡潰尺許色黯敗臭小便
如淋發熱舌刺七月終請治左尺洪數左關浮濇余
謂先渴而患疽者乃腎水乾涸虛火上炎多致不起
然膿水敗臭色黯不痛瘡口張大乃脾氣敗而肌肉

死也小便如淋痰壅喘促口乾舌裂乃脾肺敗而腎
水絕也左尺洪數腎無所生也左關浮濇肺剋肝也
況當金旺之際危殆遂矣一日後果歿此證既發
於外尚月方發者乃元氣虛不能收斂也若豫爲調
補使氣血無虧亦有得生者

或問一人患疽於腰胯之間肉色不變堅硬如石經
月不潰者何如曰此名石疽屬少陽陽明二經積熱
所致邪毒固結元氣不足故不能起發活命飲加獨
活羌活柴胡黃芪及紫金丹汗之壯實者八陣散一
粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯托之

若黑陷不起麻木不痛嘔噦不食精神昏亂脉散或
代者死神清脉和服寧嗽紫微丸

○纏腰火丹

或問遶腰生瘡累累如珠何如曰是名火帶瘡亦名
纏腰火丹由心腎不交肝火內熾流入膀胱纏於帶
脈故如束帶急服內踈黃連湯壯實者一粒金丹下
之活命飲加芩連黃栢外用清熱解毒藥敷之此證
若不早治纏腰已徧則毒由臍入膨脹不食而死

治蛇纏瘡

右用雄黃研爲末以醋調塗仍用酒調服[illegible]蛇
傷及蜂蠆蜈蚣毒蟲顛犬所傷皆可用

○便毒

鬼遺云腿胯兩處起爲便毒跨下兩傍夾下大道旁小道後成懸癰皆是虛極人患此癰近穀道左右亦名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥仰用發托散破後用抽膿管膿盡用合瘡口散合之慎勿過冬卽成冷漏難治　大便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎爲作強之官所藏者精與智也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結爲便毒矣蓋經隧者小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣　孫按此證因思慮無窮所願不遂者設此此因、以血淤結未定果如此論當僧尼寡婦宮人曠夫多有此證然予目擊者商賈中野合不潔淫妓使構此疾或兼疳瘡或楊梅者少由慾火淫熾一旦交合不潔爲淫火冲動精敗而道是以受毒初發之時愼不宜以敗毒之藥瀉之何也

毒邪非虛不入若復虛中氣則毒邪下陷治之非經年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膀胱所感之邪汗易散也陰囊腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若曾已發汗利小便膿將成而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之矣毒氣宜通隨以補劑托之亦不失先後着也　凡便癰屬厥陰肝經內熱外寒或勞倦過度或房慾不節或慾心不遂或強固其精或肝經濕熱而致治法內熱外寒者雙解散勞倦過度者補中益氣湯房慾不節者六味丸料慾心不遂者先用五苓散加大黃疎其精滯後用地黃丸以補其肝腎強固其精或濕熱雍滯者宜用龍膽瀉肝湯疎肝導滯夫便癰血疝也屬厥陰肝經之絡脉衝任督脉之隧道故婦人患此多在兩拗腫痛或腹中結塊小便澀滯苟治者得法患者又能調攝何難斂之有若概用大黃等劑以求其內消或令膿從便下損其氣血及不愼起居飲食者皆爲不治

案一人腫痛發熱以荊防敗毒散二劑而止以雙解散二劑而消

四八方敗毒散治便癰發寒熱或忽然疼痛方見癰瘍

一人賊腫作痛大小便秘結有力以玉燭散二劑頓退更以龍膽瀉肝湯四劑而消

子和玉燭散 即四物湯調胃承氣湯各等分

又方

劉寄奴　王不留行　大黃
金銀花　木鼈子

右等分酒水煎露一宿五更服

治便毒初起

射干 貳寸　生薑 如指大壹塊

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠醋煮塗患處 射干等件見紅花條并

治已結成膿者

大黃　枳實　厚朴 各貳錢
甘草節 壹錢　連翹 半兩　桃仁泥 貳拾壹枚

右分二服每服薑叄片水煎服

又治便毒

青皮　白芷　柴胡
赤芍藥　檳榔　朴硝
烏藥　木瓜　大黃
殭蠶　瓜蔞　生地黃
甘草節　黃芩　三稜
蓬朮　犀角　皂角刺

右為㕮咀以水叄碗煎至壹碗候大飢服以瀉為度

三物湯 治便癰

牡蠣　大黃　山梔子 各等分

右為末以酒水壹大盞煎至柒分露壹宿空心溫服

四神散 治便毒初起寒熱欲成癰疽服此神効

大黃　木鼈子　僵蠶
貝母 各壹錢

用酒水各壹鍾煎至壹鍾食前熱服若得汗下為妙

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

川大黃 叄錢　澤瀉　牽牛
白芍藥　桃仁 去皮尖各貳錢　桂
甘草 各壹錢

右作一服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食前服

補骨脂散
破故紙炒研　牛蒡子微炒　牽牛炒
大黃酒拌炒各等分　右爲末每服壹兩酒調下
消毒五聖湯　治便毒腫疼神效
五靈脂　白僵蠶炒　鬱金
貝母　大黃各壹錢
右酒水各半煎服連服三貼立愈
消毒飲　治便毒初發一二四日可消
皂角針　金銀花　防風
當歸　大黃　甘草節

瓜蔞實各等分
右㕮咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮
立效
又方　木鼈子大黃瓜蔞桃仁草龍膽㕮咀濃煎露
一宿清晨溫服立愈
止痛妙絕飲　治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此
方一服立能止痛
人參　大黃各伍錢
右用酒水各壹鍾煎至壹鍾入乳香沒藥各壹錢
空心食前服

牡蠣散　治血疝即便毒
當歸酒拌　甘草節　滑石煅
牡蠣煅各壹錢　大黃叁錢　木鼈子伍枚杵
作一劑用水貳鍾煎壹鍾露宿五更頓服冬月
火溫服已未潰膿血從大便出
謹按此方乃鹹寒滑濇之劑若久曠房室大小便
秘發熱焮痛或交感強固精氣致精血交錯壅結
疼痛便秘者宜用若勞倦之人不甚焮痛大小便
如常或小便赤色發熱不作膿及潰而不歛宜用
十全大補湯蓋此證多起於勞役不足及勞役過

度精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日後可
愈也若大補氣血不旬日而愈何用百日蓋瘡之
收斂在乎血氣之盛也嘗治眾人凌待之虛而服
尅伐藥幾致危殆予用托裏健脾藥而消秀才王
文遠勞苦患之服小柴胡湯而表證散後用托裏
藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脈弱以大補
之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致潰
瘌不止竟致不救可見此證屬不足多矣非補不
可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七
日後當赤軟膿成故也若尚堅硬乃元氣不能腐

瓦往往人見脛硬只欲內消又服攻散藥多致虛虛之禍前所治者即其驗也

又方

山梔 大黃 乳香

沒藥 當歸各一錢 瓜蔞仁二錢

代赭石各五分

右作一服水煎

治驗 一人不慎房勞患此腫痛以雙解散二服其病即止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味麥門柴胡三十餘劑 大抵便毒者血疝也俗呼為便毒言於不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及衝任督脉亦屬肝之旁絡也是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先疎利以開其滯更用托裏之劑此臨證制宜也

防風通聖散 治癰瘍便秘內實若溏去芒硝大黃能解表裏熱毒或遍身頭面患瘡

芍藥炒 芒硝 滑石煅

川芎 大黃煨 桔梗

石膏煅 荊芥 麻黃去節

山梔 白朮 連翹

當歸 薄荷 甘草

防風 黃芩炒各八分

作一劑水二鍾煎八分服

愚按此方非表裏俱實大小便秘者恐不可用宜審之 通聖散合益元散名雙解散

蘇方散 治便毒

木鱉肉 當歸尾 芍藥

白芷 粉甘草 川芎

射干 忍冬藤即金銀花 大黃

沒藥 蘇木 穿山甲炮焦各等分

右細切作一服水酒各一盞煎八分食前服

流氣活血 東垣青皮湯 治便毒

青皮 防風 當歸身 甘草梢生各等分

右㕮咀分作四服水一盞小碗煎至八分去柤大溫服空心日進二服

復原通氣散 便毒初發用此

南木香 延胡索 天花粉 舶上茴香炒

白牽牛炒 白芷 當歸 甘草各壹兩

青木香半兩 穿山甲酒浸炙焦貳兩

右為細末每服貳錢食前溫酒調服木香湯亦可

補虛　府庠沈尼文年二十，左拗患之，余以腎經陰虛，先用托裏藥潰而將愈。因入房發熱作渴，右邊亦作痛，膿水清稀，虛證悉至，脈洪大而無力，勢甚可畏。用十全大補加附子一錢，脈證頓退，再劑全退。後用大補湯三十餘劑而痊。　一男子腫而不潰，余謂此因陽氣虛弱，用參芪歸朮以補托元氣，用白芷、皂角刺、柴胡、甘草節以排膿清肝，數劑而潰，以八珍加柴胡補其氣血，數劑而愈。　一人患便毒，膿稀脈弱，以十全大補湯加五味、麥門、白斂三十餘劑，稍愈，更以參芪歸朮膏而平。因新婚復發，聚腫堅硬，四肢冷，脈弱皮

寒，飲食少思，此虛極也。仍用前藥加桂、附三劑，稍可，彼欲速愈，自用連翹消毒散，泄利不止，因殁。　一人年踰四十，素勞苦，患便毒，發寒熱，先以小柴胡湯加青皮，一服表證悉退，次以補中益氣湯加穿山甲二劑，腫去三四，更以托裏藥五六服，膿成，刺去，旬日而斂。　一人腫而不潰，以參芪歸朮甘草節、皂角針、白芷、柴胡數劑而潰，以八珍湯加柴胡數劑愈。　一人潰而腫不消，且不斂，診之脈浮而濇，以豆豉餅灸，更以十全大補湯月餘而愈。

消毒清火　一儒者腫痛，便澀，用八正散一劑，清肝火導濕熱而腫痛愈，再以小柴胡加芎歸、澤瀉、山梔二劑，清肝火，補脾血，而小便利。　一男子潰而腫痛不止，此餘毒未解，用活命飲一劑而痛止，再劑而腫消。　一男子痛甚發熱，用前飲一劑痛止，再以神效瓜蔞散加山梔、柴胡二劑而消。　一男子已潰而痛不止，小便秘澀，此肝火未解也，與小柴胡湯加黃蘗、知母、芎歸，痛止便利，更以托裏當歸湯而瘡斂。若毒未解而痛不止者，須用活命飲。　一人腫未潰大痛，服消毒托裏內疏藥不應，脈洪大，毒尚在，以仙方活命飲一劑，痛止，又劑而消。　一人潰而痛不止，諸藥不

應，診之脈大，按之則數，乃毒未解也，以仙方活命飲而止，又一劑而消。　一人腫痛日久，發熱，以小柴胡加青皮、天花粉四劑，痛止熱退，以神效瓜蔞散四劑而消。

瓜蔞散　治便癰及惡瘡

瓜蔞一個　金銀花　牛蒡子炒各一錢

生薑　甘草各半兩

右將藥不犯銅鐵器搗碎，用酒一大升煎數沸，空心溫服。

威靈仙散　治便毒

威靈仙　貝母　知母各壹

右二味為末每服二錢空心溫酒調下如不散再服

薛按此方通經大腸消毒補虛益氣蓋此證多患於陰虛之人此方乃是　一兒道亦有欲痛小便數者宜先用加減龍膽瀉肝湯大小便秘欲腫作痛宜八正散增寒發熱荊防敗毒散然後用此方若不作膿或膿不潰宜用大補之劑潰而不斂者更用豆豉餅灸之

小便不利　一老婦腫痛膿未作小便滯肝脉數以加減龍膽瀉肝湯加山梔黃蘗四劑而消

加減龍膽瀉肝湯

龍膽草酒拌炒　澤瀉　車前子炒

木通　生地黃　當歸尾

山梔炒　黃芩炒　甘草各五分

作一劑用水二鍾煎八分食前服如濕盛加黃連大便秘加大黃

大便不實　一人服剋伐藥以求內消致瀉利少食以二神丸先止其瀉以十全大補倍加白朮茯苓數劑而消　一人年踰四十患便毒剋伐太過飲食少思大便不實遺精脉微細垣云精滑不禁大便不利腰腳沉重下虛也仲景曰微弱之脉主氣血俱虛以六君子加破故紙肉豆蔻煎服泄止食進更以十全大補加行經藥十餘劑而消

婦人　一婦素清苦因鬱怒患前症或用敗毒寒涼之藥及晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱氣傷脾因藥復損先以當歸數劑後兼逍遙散各五十餘劑而諸證皆愈　一婦小腹內如有所梗兩拗與人門俱腫小便淋澀經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵而漸大此誠為肝虛左關弦其屬肝脾鬱結之症也用加味歸脾湯并火逍而脾土健間以逍遙散下蘆薈丸而愈　一婦內拗腫痛腹內一塊不時上攻月經不調小便不利余以為肝脾氣滯以四君加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前證復作却兼胸脇脹滿盜汗此肝木甚而傷脾土用加味歸脾湯下蘆薈丸而痊　一婦小腹內成作痛或痞悶兩拗腫痛內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦此肝氣滯而傷脾氣朝用補中益氣湯夕用六味丸漸愈更用蘆薈丸而全愈　一婦兩拗腫痛小腹痞脹小便時數白帶時下寒熱往來小水淋

濕余謂肝氣滯而血病用龍膽瀉肝湯漸愈又用加味逍遙散六味丸而全愈　婦人患前陰腫脹悶或小便不利或時作痛大便澀滯小腹氣結等證其余謂肝火氣分之病用龍膽瀉肝湯以清肝熱又用加味逍遙散以生肝血六味丸以滋腎水而愈　婦患前證余謂此肝經鬱怒之證不信別服化痰利氣之劑胸腹脹悶又服峻利疏導之劑變脾虛發腫之證而殁　一婦兩拗腫痛內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中作癢小便赤澀[illegible]脾經虛濕熱用加味歸脾湯而愈後因怒患作小腹腫脹小便不利用小柴胡加山梔芎歸以清肝調血火脹痛頓止又以加味逍遙散調補肝火而痊　一婦人兩拗腫痛寒熱內熱小便赤澀胸脇不利此肝火動而脾氣傷用補中益氣湯加茯苓數劑少愈又與加味歸脾湯諸證悉退再用加味逍遙散而全愈　一婦小腹痞悶小便不利內熱體倦懶食此氣血虛而兼肝火用八珍湯加柴胡梔子治之而安　一婦陰中如梗兩拗腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以為肝脾鬱結所致先以補中益氣湯加山梔茯苓車前芍藥以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯二十餘劑

[illegible]劑而愈

雜方

退[illegible]散　治便毒癰結

穿山甲（[illegible]）　木鼈子（[illegible]）

為末每服二錢食前老酒調下以醋煮肥皂研膏敷之妙（木鼈子[illegible]）

立消散　治便毒腫如卵

金蝎（炒）　核桃（[illegible]）

等分為末空心酒調下八錢下午再服三日全愈

又方　白僵蠶槐花為末酒調服二三[illegible]大黃

神效敷藥方　治便毒腫痛

雄黃　乳香（各五錢）　黃柏（[illegible]）

右為細末用新汲水調敷腫處乾則再敷

又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白枯礬赤石脂作用鐵[illegible]敷瘡不治用之効

乳香　沒藥（各[illegible]）　大黃

黃連　黃柏　南星

半夏　防風　羌活

皂角刺　木鼈子　瓜蔞

甘草節　草烏尖　阿膠

右為細末醋調成膏入石器內火熬黑色[illegible]

傳之

○毛際瘍

或問小腹至陰之下毛際之後痒極沸湯沃之稍止而復作有三四竅出黃水淋漓何如曰此肝經濕毒也詢之幼時曾生惡瘡旬日後大痛腫甚飲食少進作結毒治之

○囊癰

〔附〕外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將以為屬少陰腎經邪干睾丸見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫

睾丸懸掛可畏者皆不死但不知下虛年老者如何耳

囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開睾丸懸掛水出以麩炭末傅外以紫蘇葉包裹仰臥養之　大抵此證屬陰道虧濕熱不利所致故滋陰除濕藥不可缺常治腫痛小便秘澀者用除濕為主滋陰佐之腫痛已退便利已和者除濕滋陰藥相兼治之欲其成膿用托裏為主滋陰佐之候膿成即針之仍用托裏滋陰若濕毒已盡者專用托裏如膿清或多或飲食少用大補之劑或附子併灸之　前囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若小便澀滯者先分利以泄其毒繼補陰以令其自消若濕熱退而仍腫痛宜補陰托裏以速其膿膿潰而便秘者熱毒蘊閉也先用托裏消毒散後用針以泄之膿出即解若膿大而腫痛不減者熱毒未解也用清肝養榮湯口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸內熱晡熱者肝經血虛也四物加參朮體倦食少者脾氣虛熱也補中益氣湯膿水清稀者氣血俱虛也十全大補湯此證雖大潰而睾丸懸露治得其法旬

日肉漸生而愈若專攻其瘡陰道益虛則腫者不能潰潰者不能斂少壯者多成痼疾老弱者多致不起亦有患痔漏久而串及於囊者當兼治其痔切忌寒藥克伐傷損胃氣

一人囊癰未作膿而腫痛以加減龍膽瀉肝湯一劑少愈更以四物加木通知母黃柏而消　一人腫痛發熱作脹致小便不利急針以小柴胡加黃柏白芷金銀花四劑少愈更以托裏消毒散數劑而消　一人年踰五十陰囊腫痛得熱愈盛服蟠葱散不應肝脈數此囊癰也乃肝經濕熱所致膿已成急針之進龍膽

瀉肝湯膿潰悉退更服托裏滋陰藥外敷杉木炭紫
蘇末月餘而愈　一人年踰六十陰囊潰痛不可忍
睪丸露出服龍膽瀉肝湯敷炭紫蘇末不應薛意
此溼氣熾盛先飲槐花酒一碗次服前湯少愈更服
托裏加滋陰藥而平設以前藥不應加之峻劑未有
不損中氣以致敗也　一弱人腫痛未成膿小便赤
澁以製甘草梢青皮木通黃蘗當歸麥門四劑少愈以
清心蓮子飲四劑而消　一人焮腫痛甚小便澁發
熱脈數以龍膽瀉肝湯倍車前木通澤瀉茯苓勢減
半仍以前湯加黃蘗金銀花四劑又減二三便利如

常惟一處不消此欲成膿再用前湯加金銀花皂角
針白芷六劑微腫痛脈滑數乃膿已成針之腫痛悉
退投滋陰托裏藥及紫蘇末敷之而愈　一人病勢
已甚脈洪大可畏用前湯二劑腫少退以仙方活命
飲二劑痛少止脈洪數膿已成須針之否則陰囊皆
潰彼不信更他醫果大潰睪丸懸掛復求治脈將靜以
八珍湯加黃芪黃蘗知母山梔更敷紫蘇末數日而
痊　一人連日飲酒陰挺并囊溼痒服滋陰等藥不
應薛謂前陰肝脈絡也陰氣從挺而出素有溼繼以
酒爲濕熱合于下焦而然經曰下焦如瀆又云在下

者引而竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯而愈此或
不應宜補肝湯及四生散治之　儒者陳時用考試
不利一夕飲燒酒入房妻不納翌日陰囊腫脹焮痛
遣人求治薛以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及
歸服翌早報云夜來陰囊悉腐玉莖下面貼囊者亦
腐此肝火挾濕而蓄熱熾發也仍以前藥加參芪
歸朮四劑腐肉盡脫睪丸懸掛大補氣血并塗當
歸膏囊莖全復而愈
一人患此腫痛發熱以小柴胡湯加黃連四劑少
愈更以龍膽瀉肝湯而消　一人[illegible]莖長痛

小便澁滯寒熱作渴此肝經濕熱下注也當清
肝火除溼毒遂用柴胡[illegible]炒黃連當歸
銀花皂角刺赤芍藥防風木通甘草節二劑腫痛漸
退少加防風木通川芎茯苓作飲下滋腎丸以補陰
其熱腫俱退但內有一條筋不消此肝經血氣虛損
也當滋腎水用六味丸料去茯苓加五味二劑再用
補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸而筋頓消而愈
加味瀉肝湯　治肝經濕熱不和陰囊腫痛或潰爛
皮脫睪丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛並皆
治之

龍膽草炒　當歸尾　車前子炒
澤瀉　生地黃　芍藥炒
黃連炒　黃蘗酒拌　知母酒拌
防風各壹錢　甘草稍伍分

作一劑水貳鍾煎捌分食前服外敷烏金散

京兆朱二峰陰囊腫痛彼以為疝薛診其脉數而滑此囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服之活命飲一劑而潰更用補陰托裏而愈　一富商之客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍膽瀉肝湯加黃蘗知母黃連牛膝四劑而愈後用

下部　囊癰　八　外科樞要

補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前證復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因勞發熱自用四物黃蘗知母之類虛證悉具瘡口開大薛謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君子加當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補而愈　府庠李達卿素腎虛欲無子久服黃蘗知母之類形體漸瘦遺精白濁睡中痰聲口此腎水枯損虛火內熾用補中益氣之類加五味麥門前症將愈又別用清熱涼血之劑飲食少思唾痰不止薛以為脾肺復虛不能攝涎歸源仍用前湯加茯苓半夏而愈後入房頭暈吐痰腰骨作痛大小便道牽痛薛曰此精已耗而復竭所致危殆之症也遂朝用前湯加麥門五味夕用六味丸料加五味子兼服五十餘劑諸證頓退後又入房陰囊陰莖作痛別用淡滲之劑陰囊內潰薛用補陰托裏之劑出膿甚多喜腫消痛止竟不善調養以致大便不通小便如淋痰涎上涌薛曰腎虛之證復作矣誠為可慮有保其可生者用礞石滾痰丸牛黃清心丸之類其痰愈加薛曰非惟無以保其生而反促其危矣固辭不治後果歿　一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋

下部　囊癰　八　外科樞要

赤發熱口乾痰涎壅甚此膏粱積毒所乘也用六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸證頓退再加五味麥門一劑而愈却以補中益氣加麥門五味調理而康若用淡滲復損真陰決致不起

加味小柴胡湯　治囊癰腫痛或飲食少思日晡發熱

柴胡　人參　黃芩炒　川芎
白朮炒　黃芪鹽水拌炒　當歸酒洗　黃蘗酒拌炒
知母酒拌炒　甘草各壹錢　半夏伍分

作一劑水貳鍾煎八分食前服　痛甚加黃連

小便不利加木通

知州王汝道先晡熱發熱腹脹倦怠入房則腿足痠軟足心熱至腿膝六脉洪數兩尺爲甚余以足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊脹用治疝之藥腫脹益甚形氣愈虛服温補之劑腫痛上攻小便不利兩尺脉洪滑按之虛甚余曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山藥山茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前牛膝柴胡山梔一劑小便頓通乃用活命飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裏消毒散六劑膿少又用托裏散數劑膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補湯五十餘劑而痊　一人年踰五十患此瘡口不斂診之微有濕熱治以龍膽瀉肝湯濕熱悉退乃以托裏藥及豆豉餅灸而愈次年復患濕熱頗盛仍用前湯四劑而退又以滋陰藥而消若潰後虛而不補少壯者成漏老弱者不治膿清作渴脉大者亦不治　一人患此久不斂以十全大補湯加五味麥門灸以豆豉餅月餘而平　一弱人膿熟脹痛大小便秘急針之膿出三椀許即鼾睡覺而思食少健但針遲故用托裏藥至

三十餘劑始差若服解毒藥則潰甚矣

似是而非　一人囊腫狀如水晶時痛時癢出水小腹按之作水聲小便頻數脉遲緩此醉後飲水入房汗出遇風寒濕毒乘聚于囊名水疝也先以導水丸二服腹水已去小便如常再以胃苓散倍白朮茯苓更用氣針引去聚水而差　一人年踰四十陰囊腫痛以熱手熨之少緩服五苓散不應尺脉遲軟此下虛寒邪所襲而然名曰陰疝非瘡毒也宜以蟠葱散少可更服葫蘆巴丸而平　一人年踰二十陰囊痒壅出白物如膿舉則急痛此肝疝也用龍膽瀉肝湯而愈陰疝或腫或痛或挺或癢皆宜此藥治之

治腎癰用石蝌蚪水磨服

石灰散　治腎癰陰囊先腫後穿破出黄水瘡如魚口能致命

右用陳石灰炒黄色去灰攤地出火毒砂合肉研細末不犯銅鐵乾摻上五七次可

治外腎癰瘡

抱雞卵殼　鷹爪黄連　輕粉各等分

右爲細末用煎過清油調塗

烏金散

麩炭　紫蘇葉各等分

右爲末香油調搽

○陰瘡

陰器屬足厥陰肝經任脈之會衝脈亦厥陰之脈各陰器繫於肝衝脈亦筋皆聚於陰器而脈絡於肝上肝者筋之會也又屬督脈素問曰督脈者其絡循陰器合篡間是也至於足太陽外合清水內屬膀胱合通水道手太陽外合淮水內屬小腸而水道出焉則又屬手足太陽也經云木則又爲足少陰也經陰人於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則又屬于太陰也前陰又謂前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合則又屬脾與胃矣癰瘡生其間須細心求而治之不可專主一厥陰肝經而惟清肝導濕之爲事也看此又穴　隱處癢者成瘡挾有爪隱目痒鼻赤齒[illegible]等症爲腎臟風瘡生於陰頭爲陰頭癰　生於竅口爲下疳瘡　合但生於[illegible]者作爲下疳治之

腎臟風瘡　乘虛使之癩風以精不調外爲風濕所襲從陰囊濕汗作癢起流注四肢手叉白色遂生瘡瘍俗謂之腎臟風四生散兩以竹刀細切豬腰當對

銀石器中酒泥若煅研細和藥爲丸如梧子大婦不可丸入酒醋少許每服五六十丸鹽酒空心下又用花蛇散和消風散酒調服或升麻和氣飲調或頭蓋鹽湯下及烏荆丸或花蛇丸若腎臟風瘡淋洗則以蛇牀子一味煎湯用之

三因四生散　治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四肢[illegible]生瘡及婦人血風等症

白附子　蒺藜炒　黃芪　羌活各等分

爲末每服二錢鹽酒調下空心以豬腰子破開入

藥在內煨亦妙癩風宗筋陽明養之故有是證

治腎臟風　凡諸經[illegible]服效

黃芪　木香　甘草

黑牽牛各一兩

右四味細剉用盤盛炒令焦黑大黃餘爲末蒸餅糊爲丸如梧子大每服心鹽湯下癸拾丸

本事烏頭丸　治腎臟風上攻下注生瘡疥癬

川烏頭　草烏頭去皮臍

天麻　地龍去土　白附子炮各半兩

右為末酒糊為丸如桐子大每服三五十丸空心
食前鹽酒鹽湯任下
腎臟風甘草節煎湯洗
腎臟風痒不可當者以茶與蛇床子等分煎湯淋洗
効。治腎臟陰汗小瘡用蒼术柏葉燒灰存性研
細抓破傅之一夕愈又蒼耳草蛇床子煎湯洗之良
全蠍散 治腎臟風發瘡疥
全蠍 [illegible] 生硫丹 [illegible]
輕粉 [illegible] 雄心檳榔 [illegible]
麝香少許研
右為細末 [illegible] 收用少許油調抹兩掌
先以鼻嗅男以兩掌掩外腎女以兩掌掩兩乳各
睡至醒次日依前再用藥屢効
牡蠣散 治陰囊兩旁生瘡或陰濕水出其痒甚
夜則抓之無足後必自潰 [illegible] 湯洗脚汗心汗濕
無可奈何此藥 [illegible] 年得
此方隨用 [illegible] 如法擦之 [illegible] 餘年不發真為
神効
牡蠣 黃丹 枯白礬
右為細末遇夜睡時用手 [illegible] 藥於陰囊處擦之

不一時又擦之三四次後頓減次夜再擦雖大減
又擦後自然平復如瘕亦有頓擦方可脚汗先
擦後裝藥靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裹之亦
可
浴腸湯 治小腸風陰瘡痒痛
木通 蒼术 [illegible]
貫衆 荊芥 甘松
薄荷 白芷
右剉碎用藥五兩水五升入鹽三兩煎熟乘熱
去滓熱洗浴瘡

陰瘡膏 治男女陰瘡
米粉 [illegible] 芍藥 黃芩 牡蠣
附子 白芷 [illegible]
右六味為㕮咀以不入水豬脂一斤微火上煎三
上三下候白芷黃膏成絞去滓內白粉和取傅瘡
上
小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡
川椒 苦參 蛇床子 [illegible]
香附子 白礬 白芷 狗脊
細辛 [illegible] 桂心 [illegible]

右㕮咀每用藥壹兩以水叁升煎至貳升去滓傾入盆子內但乘熱氣坐盆子上熏之良久通身便洗患處甚者不過三兩度

沐浴長春散　治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則喜住之則痛成瘡流水爲害甚苦此藥見効及治婦人下部陰濕胎元久冷

牡蠣　蛇床子　破故紙　紫梢花

官桂　乾荷葉各等分

右㕮咀每用壹兩半水一碗半葱白數莖煎至八分去滓先熏後洗却用後藥

枯礬　黄丹　蛤粉各等分

右件共研爲細末熏洗了後以手指撚末擦濕痒處

銅綠散　治男婦陰部濕淹瘡

銅綠少許　白礬壹錢　乳香半錢　輕粉一字

五倍子半兩細研

右爲細末洗淨摻之

治有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬爪他處並無熱痒而痛大小便濇出黄汁食亦減身面浮腫瘡作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黄丹之類塗瘡上愈熱痛甚治不對故也細問之此人嗜酒食啗喜魚蟹發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋馬齒莧肆兩研爛入青黛壹兩再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此二日減三分之一五日減三二自此二十日愈究恐乃問日此瘡何緣至此下中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰内痔仍須禁酒及發風物後不能禁酒果患内痔

腎臟風瘡　血郄

腎臟風瘡　血郄即百蟲窠針入一寸半灸二七壯　三陰交

疳瘡　下疳瘡屬肝經濕熱下注或陰虛火燥治法腫痛發熱者血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔腫痛寒熱者肝經濕熱也小柴胡湯加龍膽草黄連腫痛便澀者濕熱壅滯也龍膽瀉肝湯腫痛潰者氣血虛而有火也八物湯加山梔柴胡日晡熱甚者陰血虛而有熱也小柴胡湯加參朮芎歸日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補中益氣湯其經久不愈而發寒熱者腎水不能生肝木也用六味丸若筋縮縱或爲痒痛或出白津此筋疝也用龍膽瀉肝湯氣虛者補中益氣加炒山梔炒龍膽陰虛火燥者用六味丸

莖中痒出白津用補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋此證肝經陰虛爲本腫痛寒熱等證爲標須宜六味丸以生肝血如脾土虛不能生金水而致者則肝證者當佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源．所治男子莖腫或痛在莖之發或痛在莖之根皆肝足太陽不利熱毒下傳入于足厥陰故發紫黑色作蝕瘡蝕其莖而死宜以子和濬水丸散逐之濕熱無不愈者若已成瘡先泄其熱次從[illegible]以[illegible]汁淋洗拭乾以黃連木香[illegible]細末搽之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和泄水

丸如後發膿少可用黃連木香胭脂[illegible]搽之 一隣人年三十性狡而[illegible]下疳潰或[illegible]初患自痛臍上微悶醫與甘草湯四貼皆悶若死片時而甦予脈之兩手皆濇重取略弦似數予曰此下疳瘡之深重者與當歸龍薈丸[illegible]減與小柴胡去芩加黃連丸[illegible]作[illegible]六痛而安一男子近三十歲有下疳瘡腫[illegible]治以其不能忌口却之忽一日頭痛發熱自汗衆作傷寒陽證治之反劇予診其脈弦甚七至重按則澁予曰此證在厥陰藥與證不相應遂作小柴胡湯加草龍膽黃連山

黃連帶熱服四劑而病脫然 劉宗厚治一男子下疳瘡每恣飲酒則發醫與小柴胡湯加黃連數貼不效又與玉燭散下之又劇予以甘草節小建中湯各半煎服之下咽痛止後以四物湯建中甘草等分與之遂安 薛[illegible]劉[illegible]甫或[illegible]中作痛或發出白津或小便秘澁先用小柴胡湯加山梔澤瀉黃連木通膽草茯苓二劑以清肝火導濕熱諸證漸愈後因勞倦忽然寒熱此元氣復傷也用補中益氣湯而安又用六味丸生肝血滋腎水而全愈 州守姜節甫患前證膿水淋漓作渴吐痰午前[illegible]午後發熱余曰

午前惡寒屬陽氣虛弱午後發熱屬陰血不足不信反服二陳黃蘗知母之類飲食益少大便不實又日晡熱渴小腹重墜患處痛腫用四物黃蘗知母之類飲食亦不思余以脾氣虛而下陷先用補中益氣湯調養脾胃以升陽氣諸證漸愈又用六味丸滋補腎水以生肝血而痊 一小兒十五歲患前證雜用消毒之藥虛證悉具二年餘矣詢之乃稟所致用補解湯月餘諸證漸愈又用補陰八珍補中益氣二湯而痊 一儒者莖中作痒發熱倦怠外皮浮腫二年矣用八珍加柴胡山梔及六味地黃丸而愈有熱陰

毛間生蟲作痒者用桃仁研爛塗之 一儒者因
而患燃痛寒熱體倦頭疼小便赤澁用補中益氣湯
加車前牛膝山梔而愈 一儒者下疳腫痛不
止日晡熱甚口乾體倦食少飲湯此肝脾血虚也先
用六君子加柴胡升麻脾胃健而諸證退更以補中
益氣加炒山梔肝火退而腫痛痊
子和泄水丸（一名大戟丸）
大戟 芫花 甘遂
海帶（二錢） 海藻（洗） 郁李仁
續隨子（各半兩） 樟柳根（一兩）

右為細末水煮藥肉為丸如小豆大每服伍柒拾
丸熟水下 按此藥太峻用者慎之
治下疳瘡先用漿子和泄水去根後用此藥乾上
黃連 滑石（各一兩） 定粉（二錢）
輕粉（少許） 乳香（壹錢） 密陀僧（貳錢）
右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔
大蘆薈丸（蘆薈丸 各丸叶） 治肝火下疳潰爛或作痛[illegible]
腫或治小兒疳膨食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等症
并蟲蝕肛門痒痛
胡黃連 蘆薈 黃連
木香 白蕪荑 青皮
白雷丸 鶴蝨草（各五錢） 麝香（二錢）
為末蒸餅糊丸桐子大每服一錢空心米飲下
八正散 治下疳便毒小便淋漓脈證俱實者
大黃 車前子 瞿麥
萹蓄 山梔 木通（各一兩）
滑石（煆一兩） 甘草（五錢） 右水煎服
洗毒湯 治陰蝕瘡
苦參 防風 露蜂房
甘草（炙各等分） 右㕮咀水煎濃汁洗瘡

金銀花散 治下疳瘡
金銀花 荊芥 朴硝
蛇床子 甘松 白芷
檳榔（各等分）
右㕮咀每用伍錢水伍椀加葱白三根同煎數沸
盆盛水先熏後洗却上藥
洗藥 黃連 黃蘗 當歸 白芷 獨活 防風
朴硝 荊芥（各等分） 入錢伍拾文烏梅伍箇鹽一匙
入水同煎溫洗日五七次敷下項藥
敷藥 木香 檳榔 黃連 銅青 輕粉 枯礬

海螵蛸 麝香[illegible] 為末洗後乾搽上
千金治丈夫陰頭癰[illegible]不能瘳用鼈甲[illegible]燒末以雞子白和傅良
丹 下疳瘡
蛤粉 臘茶 苦參
青黛 蜜陀僧
右用河水洗瘡淨腊猪脂調敷亦治臁瘡
又方 青黛 海蛤 蜜陀僧 黄連共為末 敷上
治一切熱毒惡瘡及下疳瘡用蜜陀僧黄蘗各[illegible]分
半膩粉[illegible]錢麝香少[illegible]為末[illegible]乾傅之甚者三

四次
治下疳瘡雄黄黄連等分為末濕者乾摻乾者油調傅先用荊芥射干煎湯洗却傅之妙 一方用地骨皮末傅之神効
追膿錠子[illegible] 膿內潰不出[illegible]之
雄黄 貳錢 巴豆[illegible] 輕粉[illegible]
外臺秘要云陰頭瘡蜜煎甘草傅之安
又方用頭髮用鹽水洗去垢膩淨再用米泔洗過又用清湯洗晒乾燒灰傅瘡上便結靨
又方 蒼耳葉為末傅之

治下疳瘡黑形兎 [illegible]為末[illegible]神効
七寶檳榔散 治下元[illegible]陰頭[illegible]有瘡漸至蝕透久不愈者
檳榔 雄黄 輕粉
蜜陀僧 黄連 黄蘗
朴硝
右為細末和勻先以葱白漿水洗淨拭帛拭乾如瘡濕乾摻如乾小油調傅
玉粉散 治下陰瘡疼不止
滑石 蜜陀僧 寒水石[illegible]
膩粉 麝香[illegible]

右為細末油調傅或乾貼患處
蚯蚓散 治陰莖瘡
蚯蚓[illegible] 貝粉[illegible]
右用水研塗上乾又傅之 一方用[illegible]分
丹胞散 治下疳[illegible]
右以猪胞[illegible]尿[illegible]用新磚兩[illegible]
炭火煆將猪胞連尿於磚上[illegible]不住手[illegible]
放於兩口磚上輪流不歇與火煆着胞待尿乾
為度研為末入黄丹壹錢先用葱湯以鵝毛抹洗

以舊帛拭乾此藥摻之一五次立見効

地連散 治玉莖上生瘡

右用地骨皮煎湯洗以訶子連核燒存性爲末乾

摻

川連散 治下部注瘡

右以宣連爲細末槳水調成餅攤於碗內上用

艾叉穿山甲炙片燒烟覆碗直候黑色再取下如

是者五次以黃連餅黑色爲度地上出烟毒再研

細濕則乾摻乾則清油調塗三四次并用黃檗湯

香茵蔯煎湯溫洗

神妙方 治莖頭二五孔小瘡出血微膿

右用血髮燒作灰存性研細傳之乾則津唾調傳

仍以米飲調髮灰食前服

麝香散 治婦痾瘡痒而濕者

麝香 黃礬 青礬各等分

右爲細末小便後用少許傳之

治陰濕生瘡黃水流汁

用白礬不以多少右研爲末以冷水洗瘡淨後傳之

津調散 治婦痾瘡膿汁淋漓臭爛

黃連 款冬花各等分 麝香少許一方不用

右爲細末先以地骨皮蛇床子煎湯洗拭帛拭乾

以津調傳之忌生湯洗

胭脂散 治陰瘡

坏子胭脂 真菉豆粉各等分

右同研勻傳之

鷄蘇散 治陰濕欲蝕瘡痛甚者

鷄蘇 兒茶

右同研細每用少許傳瘡上日三四次

截疳散 治年深疳瘻瘡不斂

白及 白斂 黃丹

密陀僧 黃連 輕粉

水片 麝香

右爲細末和勻研用或摻或紙花中以膏藥貼之

甘石散 治下部疳瘡

爐甘石 密陀僧各等 輕粉壹分

橡斗子燒灰存性 龍骨 麝香少許

右爲細末先用荊芥札椒川椒煎湯放溫洗

用藥少乾貼

梔子散 治下疳瘡

右用梔子一枚去穰入明礬末麵糊封合口火燒

存性爲末乾摻上隨効

鉛粉散　治下疳陰頭生瘡

右用墻上白螺螄殼不以多少火內煅酥為末水內飛過先去有石灰者次用輕粉隨分兩入在其內每以少許乾貼在瘡上

治下疳瘡

右以孩兒茶研為細末先洗瘡[illegible]小油調傅濕則乾摻之神効

博金散　治下疳瘡臭爛痛

白礬[illegible]入罐內煅[illegible]　密陀僧 已上各伍錢

白[illegible]　黃丹　輕粉 已上各[illegible]錢

乳香[illegible]分　麝香[illegible]字

右爲細末先須以川椒根枝葱白鹽甘草炙湯淋洗一二時把乾摻上項藥每用藥先須洗淨然摻藥其者三五次瘥

勝金散　治下疳潰爛或疼痛

黃連　黃蘗　輕粉

銀硃　孩兒茶 各伍分　冰片 壹分

爲細末香油調搽內服加味瀉肝湯

治下疳瘡久不愈橡斗子兩個各盛黃丹令滿[illegible]

耳鼠之讀义

以亂髮纏定燒烟盡爲度同研為末先以[illegible]漿水洗瘡腰盞大[illegible]不過三次如神

療人陰生瘡膿出成臼取[illegible]白礬麻仁等分伍[illegible]豬脂相和成膏搗白皮煎湯洗瘡拭乾卽塗之[illegible]後以楸葉貼其上不過五度瘥

下疳瘡用五倍子末傅之

○婦人陰瘡

運氣陰瘡皆屬寒[illegible]中分陵陰而不利治以苦熱是也

仲景云少陰脈滑而數者陰中卽生瘡陰中蝕爛者狼牙湯洗之用狼牙三兩以水四升煮取半升以綿纏筯如繭浸湯瀝陰中日四遍

洗搨散[illegible]　治陰蝕瘡

甘草　乾漆 各[illegible]兩　黃芩

當歸　地黃　芍藥 各貳兩

龜甲 伍兩

右細切以水七升煮取半升去滓以綿帛內湯中用搨瘡處良久卽易日二度每搨湯可作十里久卽擿乾撚取甘濕薄傅瘡上使[illegible]可經半日又以湯搨搨訖如前傅藥

甘濕散

蚺蛇膽(眞者) 青木香 石硫黃

鐵精 麝香(各等分)

右各等分為末更研細有患取如三棋子大…丸花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取藥如棋子安竹管裏內下部中日再度老少量減其藥法每日一度不用再

桃枝熏法 取東南桃枝伍柒枝輕打頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝燒著熏之

蛇床子散 濕陰中生瘡

用蛇床子(一兩)白礬(二錢)右為末以少許和令相得如棗大綿裹內之自然溫暖

補遺治陰瘡搗新桃葉綿裹內陰中日三兩易

餘詳女科前陰諸證

○穿襠疽 銳疽 涌泉疽

或問背之下極發疽何如曰此名穿襠發屬督脈及太陽經由勞傷憂思積慎所致治宜飲加羌活黃蘗內托羌活湯主之及勝金丹神仙追毒丸壯實者八陣散一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯此證宜速治稍緩則潰潰則不治…黑陷泄瀉嘔噦疲倦者不治

尻…發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣

鬼遺云涌泉疽腫起發太陰…如伏鼠二十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白者可治

○臀癰

或問臀上生癰何如曰…為疽俱屬足太陽經濕熱所致宜服內托羌活湯內托

復煎散加羌活…壯實者一粒金丹八陣散下之老弱者十全大補湯人參養榮湯先賢云此證當服補養之劑若無補養之功其禍多在結痂之後治之難痊須戒謹勿輕大補之劑腫而不潰者服當歸…臀癰腸脫經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本為主若腫硬作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒散主之微腫微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之欲作膿用托

羌活湯若痛甚用仙方活命飲大勢既退亦用托裏消毒散若脾虛不能消散或不潰不斂者六君子加芎歸黃芪若陰虛不能消散或作渴[illegible]加五味子陽虛不能潰或膿清不能斂者補中益氣湯氣血俱虛者十全大補湯[illegible]硬未成膿者隔蒜灸活命飲潰後豆豉餅補中益氣十全大補二湯皆[illegible]灸後大勢已退餘毒未消猶用[illegible]而善

一巡撫陳和峰脾胃不健服消導之劑左腿股及臀患腫余曰此脾氣虛而下注[illegible]當用補中益氣倍加白朮彼[illegible]以散腫消毒爲主而腫反益甚[illegible]余用[illegible]一味煎飲而消

一儒者楊啓元左臀患此數貼敷涼藥腫[illegible]內股腫連腿消毒散左體皆痛余以爲足三陰虧損用補中益氣湯以補脾肺六味丸加五味子以補肝腎股內消而臀間潰又用十全大補湯而瘡口斂

一儒者腫焮痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未能復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈

一男子漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼[illegible]針而欲內消誤用攻伐之劑損

加惡寒發熱自汗等證余用十全大補湯數劑[illegible]色赤仍外針內補而愈

一吳輔之父患此內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

一人年三十脈如[illegible]滿[illegible]啄腫硬色夭[illegible]水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損[illegible]復陽也余用六君加歸芪附子[illegible]一劑膿潰色赤又減附子伍分數劑元氣復而瘡愈

一男子腫痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散[illegible]十餘劑而斂

一上舍患痔外敷寒涼內服消毒攻潰於臀膿水清稀脈洪大而數寒熱作渴余辭不治果歿此足三陰虧損之證失滋化源以致真氣益虛邪氣愈甚矣不死何俟

內托羌活湯 治尻臀生癰堅硬腫痛大作

羌活 黃檗酒製各二錢 防風
當歸尾 藁本 連翹
蒼朮 陳皮 甘草炙各壹錢
肉桂參分 黃芪壹錢半

右作一服水壹鍾酒半鍾煎至捌分食前服

○懸癰

懸癰生於篡間謂前陰之後後陰之前屏翳處也即會陰穴屬任脈別絡俠督脈衝脈之會每生其間人起立則若懸然故名懸癰屬足三陰虧損之證輕則爲漏瀝盡氣血而亡重則內潰而卽陷若初起濕熱壅滯未成膿而作痛或小便澀滯用龍膽瀉肝湯肝效痛甚仙方活命飲並以製甘草佐之如此雖患亦輕雖潰亦淺若不能成膿或膿成不潰者八珍散補之若膿巳成者急針之欲其生肌收斂腎虛者六味地黃丸血虛者四物加參朮[illegible]歸脾虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯或十全大補湯若用寒涼消毒則誤矣 薛按懸癰原係肝腎二經陰虛雖一于補猶恐不治況膿成而又尅伐不死何待常治初起腫痛或小便赤澀先以製甘艸一二劑及蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡加車前黃蘗芎歸膿巳成卽針之巳潰用八珍湯加製甘草柴胡稍酒炒黃蘗知母小便澀而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘艸小便澀而脈無力者用清心蓮子飲加製甘艸膿清不斂者用大補劑間以豆豉餅或久而不斂者亦用附子餅灸並效 尚寶飽希傳足發熱服四物黃蘗知母之類年餘患懸癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加芩連二陳熱痰益甚謂余曰何也余曰此足三陰虧損水泛爲痰寒涼之劑傷胃而甚耳遂先用補中益氣夕用六味丸間佐以當歸補血湯半載乃愈 趙州守患此發腫作痛五月餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脈浮數而無力此足三陰氣血虧損用補中益氣加製甘艸五味麥門三十餘劑食進勢緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘡斂後因怒作痛少食脇痛發熱仍用前藥賴其稟實慎疾而愈 通府黃敘之患此久不愈日晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃蘗知母之類前症益甚更體倦少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之症前藥復傷而然也遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進諸症漸愈更加麥門五味調理乃痊經云脾屬太陰爲陰土而主生血故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等證用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認爲陰虛輒用四物黃蘗知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣況黃蘗知母乃瀉陽損陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也 一

儒者患此服坎離丸及四物黃蘗知母之類不應脈浮洪按之微細余以為足三陰虛用托裏散及補陰花夷散漸愈又用六味丸補中益氣湯滋補化源而載而瘥大凡瘰癧等症若腎經陽氣亢盛致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能寫水中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺則陰自生況此證屬腎經精氣虧損而患者十有八九屬腎經陽氣亢盛而患者十無一二然江南之人患之多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升陽補氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損真水者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多誤以為腎經火症用黃蘗知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉　上舍劉克新潰後作痛發熱口乾小便赤澀自用清熱消毒之藥不應左尺洪數余以為陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯加黃蘗知母等二劑其陽氣使陰自生服數劑諸證漸愈後用補中益氣湯六味地黃丸補脾肺滋腎水而瘡口愈　一儒者小便赤澀勞則足軟腫痛發熱口乾舌燥食少體倦日晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥門山藥倍用炙甘草數劑諸證悉退但患處腫痛此膿內焮也又五劑膿自涌出又五十餘劑而瘡口將完又因勞役且停藥寒熱作渴腫痛膿多用補中益氣湯加炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥門五味百餘劑腫漸悉去喜其慎起居飲食常服補劑而安但勞則出膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕必其收斂致患處大潰發熱不起仍補而痊

甘草膏　治水穀道前後生癰謂之懸癰乃肛門前陰囊後生核子如瓜核或如梅李狀初不作痛至旬月漸熱不早治潰膿血出日數盆至有腸腐而大便從瘡口出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦須是作核未痛以前治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子後日後如覺赤腫如桃李即破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣投兩服亦無害林院判康朝嘗患此疾已破服此藥兩服瘡即合甚妙

右用粉草半斤內用無節者四兩如算子樣

取泉石間長流水以甘草入水中浸透以炭火將
甘草蘸水慢炙以一盌水盡為度不可急性須用
却將所炙甘草另用泉水三盞煎取好酒五盞用
瓦礶煎至三之一如骨節一起服之立愈另用白節
甘草四兩仍用泉水隨礶大小煎湯淋洗患處三
遍其効如神水冷再溫洗
丹溪驗馬癰用大粉草帶節四兩長流水一盌以炊浸
水盡為末入皂角灰少許作四服湯調頓服立効
薛大抵此證係陰虛故不足之人多患之寒涼之
劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血
不動臟腑其功甚捷

加味小柴胡湯 方見前

清心蓮子飲 治懸癰勢退惟小便赤澀
黃芩 炒 黃芪 蜜炙 石蓮肉 去心
人參 赤茯苓 各一錢 車前子 炒
麥門冬 去心 甘草 炙 地骨皮
製甘草 法見前
每服五錢用水二鍾煎至八分食前服 如發熱
加柴胡薄荷

加味托裏散 治懸癰不消不潰
人參 黃芪 鹽水拌炒 當歸 酒拌
川芎 麥門冬 去心 知母 炒酒拌
黃檗 炒酒拌 芍藥 炒 金銀花
柴胡 製甘草 各一錢
作一劑用水二鍾煎至八分食前服

加味十全大補湯 治懸癰潰而不斂或發熱飲食
少思
人參 黃芪 鹽水拌炒 白朮 炒
茯苓 熟地黃 自製 當歸 酒拌
川芎 芍藥 炒各一錢 肉桂 五分
麥門冬 去心 五味子 搗碎 甘草 炒各五分
作一劑用水二鍾煎至一鍾食前服 若腫加青皮 小
熱加黃芩柴胡 日晡熱加柴胡地骨皮 小
便赤加酒製知母黃檗 小便澁加車前子山梔
子俱炒

雞內金散 治穀道邊作痔久不愈者
雞肫胵
右件燒灰存性研為極細末每用少許乾摻之如
神

治穀道中痔 以水中荇葉細搗綿裹內下部日三

治肛內生癰腫痛方

蜈蚣　穿山甲(蛤粉炒)　血餘

帶血管鵝毛　生鹿角

已上各藥俱煅存性研細等分和勻每服一錢空心好酒下

股部十五

股陰疽（[illegible]）

靈樞云發於股陰名曰赤施不急治六十日死在兩股之內不治十日死　鬼遺云有發腿髀及陰股始發腰強數飲不能多七日發聲腫脹惡疾心煩躁死不治

或問大股之內陰囊之側生疽何如曰在左爲上馬癰在右名下馬癰在肚門傷名肚門癰俱屬足太陽經濕熱七情不和憂憤所致宜服內補黃芪湯內托羌活湯十全大補湯選用[illegible]金丹狀在中壯實者一

粒金丹八陣散下之嘔吐不食麻木黑陷膨脹六脈微或代冷汗不止煩躁狂妄小水不利泄瀉者不治未潰之先宜服[illegible]閣紫微丸　按足三陽之脉在外皆自髀足三陰之脉在內皆自股今曰大股之內陰囊之側則屬三陰經而敍陰爲多明矣乃以爲足太陽不亦謬乎　一人腿內側患癰未作膿而腫痛以內托黃芪柴胡湯二劑稍愈又一劑而消　一人腿內患癰漫腫作痛四肢厥冷咽噎寒發熱諸治不應乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退又服大便行二次諸證悉退而愈　一人年二十餘

股內患毒日久欲求內消診脈滑數知膿已成因氣血虛不潰刺之膿出作痛用八珍湯稍可但膿水清稀用十全大補湯三十餘劑而斂凡膿出反痛者虛也 一僧股內患腫一塊不痛不潰治托裏二十餘劑膿成刺之作痛予謂膿而潰潰而反痛此氣血虛甚也宜峻補之彼云氣無補法予曰正氣不足不可不補補之則氣化而痛自除遂以參芪歸朮熟地治之兩月餘而平 大抵瘡瘍先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故多痛膿潰之後腫消肌寬痛必漸減而痛愈盛者氣血不足也即丹溪所謂膿出而反痛者也

○股陽疽

靈樞云發於股陽名曰股陽疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨不急治三十日死矣

或問腿外側髀下五六寸生疽何如曰此名伏兔發寒熱大作疼痛徹心欲腫無頭是也屬足陽明胃經先發出不治之證早覺早治為上急隔蒜灸灸而起起者可治無膿者難治服活命飲加牛膝木瓜漢防已然金丹勝金丹汁之壯實者八神散一粒金丹下之 一人股外側患癰漫腫大痛以內托黃芪湯酒煎二劑少可更以托裏數劑潰之而愈 一人年踰二十歲弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅灸月餘而痊 一婦腿癰久而不愈瘡口紫陷膿水清稀予以為虛彼不信乃服攻毒之劑虛證蜂起復求治灸以附子餅服十全大補湯百餘貼而愈 一人腿癰內潰針之膿出四五碗許惡寒畏食脈診如絲此陽氣微也以四君子加炮附子畏寒少止又四劑而止以六君子加桂數劑飲食頗進乃以十全大補及灸附子餅兩月愈 一老腿癰膿自潰忽發昏瞀脈細而微此氣血虛極也以大補之劑而甦

一人腿癰焮筋攣痛脈弦緊用五積散加黃檗柴胡蒼朮而瘥 一婦左腿痛不能伸脈弦緊按則濇以五積散二劑痛少止又二劑而止以神應養真而愈[illegible] 一人右腿赤腫焮痛脈沉數用當歸拈痛湯四肢反痛乃濕毒壅遏又況下部藥力難達非藥不對證遂砭患處去毒血仍用前藥一劑頓減又四劑而消 一人年踰五十冬患腿癰脈數煩躁飲冷便秘腫痛焮甚此熱淫于內也宜用苦寒之藥投清涼飲倍加黃芩其勢頓退更以四物湯加黃芩而愈 一人年三十連得憂患作勞好色

左腿外側患紅腫如栗醫以大黃實與承氣兩貼下
之又一醫與大黃朱砂血竭三貼而脈大實後果死
此厥陰多氣少血經也　一人腿癰膿成針之出膿
一碗許欲托裏藥一劑大發熱更用聖愈湯二劑而
止其日惡寒不食脈細如絲以人參一兩熟附三片
薑棗煎服而愈但食少不甚更以內補黃芪湯而平
一人腿腫發熱惡寒以補中益氣湯治之彼以爲
緩乃服芩連等藥熱愈盛復請予治以人參養榮湯
二十餘劑而潰更以參芪歸朮炙甘草肉桂月餘而
斂　一人年踰三十左腿微腫痛月久肉色如故不

思飲食東垣云發痛痛下而堅者發于筋骨此附骨
疽也乃真氣虛濕氣襲於肉理而然若脾胃虛者宜下
胃食少則胃弱當助胃壯氣以六君加藿香當歸
數劑飲食漸進更以十全大補湯而愈　一人遍身
走痛兩月後在腳面結腫未幾腿股又患一塊脈輕
診則浮重診浮緩此氣血不足腠理不密寒邪襲虛
而然以加減小續命湯四劑及獨活寄生湯數劑疼
痛頓去更以托裏藥倍加參芪歸朮百貼而愈　南
司馬王荊山腿腫作痛寒熱發渴飲食如常脈洪數
而有力此足三陽經濕熱壅滯用檳蘇敗毒散一劑

而寒熱止再劑而腫痛消更用逍遙散而元氣復兩
月後因怒腫痛如錐赤暈散漫用活命飲二劑而痛
緩又用八珍湯加柴胡山梔丹皮而痛止復因勞役
倦怠懶食腿重頭暈此脾胃氣虛而不能升舉也用
補中益氣湯加蔓荊子而安　一儒者兩腿腫痛肉
色不變惡寒發熱飲食少思肢體倦怠此脾氣不足
濕痰下注也以補中益氣加半夏茯苓芍藥二劑寒
熱退而腫痛消又十餘劑脾胃壯而形體健　一男
子患此入房兩腿硬腫二便不通余謂腎開竅於二
陰乃肝腎虧損也用六味丸料加車前牛膝而二

便利用補中益氣湯而腫硬消喜其年少得生　一
上舍內痛如錐肉色如故面黃懶食痛甚作嘔此痛
傷胃也用六君子以壯其脾胃用十全大補以助其
膿而針之更用前湯倍加參芪芎歸麥門五味遠志
貝母而瘡斂　一男子因負重飲食失節胸間作痛
誤認爲瘀血服大黃等藥右腿股腫肉色如故頭痛
惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣藥傷胃
氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數
劑喜其年少而愈

○附骨疽

丹溪云：蹦跳穴痛，防生附骨疽，以蒼朮佐黃柏之辛行，以青皮，冬加桂枝，夏加黃芩，體虛加杜牛膝，以生甘草為使，大料煎，入生薑汁，食前飲之。痛甚者，恐十數貼發不動，少加麻黃。一二貼又不動，恐疽將成，急掘地成坎，以火煅紅，沃以小便，赤體坐其中，以席圍下體，使熱氣熏蒸，腠理開，氣血暢而愈。　或問：附骨疽何以別之？曰：凡患流注，表未盡，則餘毒附骨而為疽。在股外屬足太陽陽明經，在股內屬足厥陰足少陰經。又云：風濕折熱，熱結而附骨成疽。蓋骨者，腎之餘，腎虛則骨冷，而遂附着於骨也。骨冷則氣愈滯而

血愈積，但能為腫，不能為膿。流注者，傷寒之餘毒，骨疽者，流注之壞證也。流注非傷寒之罪，乃醫者表之未盡也；骨疽非流注之過，乃庸醫涼藥之誤也。又云：久得厚味及醉後涉水，或履冰霜雪，寒入髀樞，積痰瘀血相搏而成疽。初時骨痛無時，乍寒乍熱而無汗，久則痛深入骨，而不移處，按之痛不止者是也。初覺即隔蒜灸之，以多為上，宜勝金丹、烏金散汗之，壯實者一粒金丹下之，或入陣散。久則極陰生陽，寒化為熱，肉腐而成膿。膿成則宜烙，十全大補湯加牛膝、木瓜補之。有久潰敗結，留連展轉，經歲不已，腐出朽骨

者，骨雖出而不愈，有終身之咎。視其白膿清稀者，碎骨初脫，肉深難取；膿白而稠者，碎骨將出，肉淺可取。大抵久腐出骨，不論強弱老幼，必須補益，使氣血和暢，正氣漸復，邪氣漸退，自然收斂。十全大補湯、人參養榮湯在所當用。未成膿者，以沖和膏貼之，蓋有獨活能動蕩氣血也。已潰者，宜服何首烏散，此藥能調和陰陽也。　薛附骨疽有因露卧風寒深襲於骨者，有因形氣損傷不能起發者，有因尅伐之劑虧損元氣不能發出者，有因外敷寒藥血凝結於內者。凡此皆宜灸熨患處，解散毒氣，補接陽氣，溫補脾胃為主。

若飲食如常，先用仙方活命飲解毒散鬱，隨用六君子湯補托榮氣。若體倦食少，但用前湯培養諸臟，使邪不得勝正。若膿已成，即針之，使毒不得內侵，帶生用針亦無妨。如用火針，亦不痛，且使易斂。其隔蒜灸能解毒行氣，葱熨法能助陽氣行壅滯，此雖不見於方書，余常用之，大效，其功不能盡述。惟氣血虛脫者不應。　一女髀樞穴生附骨疽，在外側廉少陽經分，始末用五香湯、十宣散，一日惡寒發熱，膈滿，猶大服五香湯，一夕喘死，此升散太過，孤陽發熱於上也。一人年踰四十，夏患附骨癰，予以火針刺去瘀血，更

服十全大補藥而愈至秋忽不飲食痰氣壅盛勞則口舌生瘡服寒藥腹痛彼疑爲瘡脾胃脈輕取似大按之無力此真氣不足虛火炎上也治以八味丸彼不信自服二陳四物湯幾殆復請予仍以前丸治之而愈　一人附骨癰畏針不開臀膝通潰脈數發渴煩躁時嗽飲食少思齊氏曰瘡瘍煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋此惡證也膿出之後若脈洪數難治微濇遲緩易治刺之膿出四五椀即服參芪歸朮大劑翌日脈稍斂更服八珍湯加五味子麥門肉桂白斂三十餘貼脈緩膿稠三月乃愈　一老嫗

患附骨疽腫硬大按方痛口乾脈弱腫聚不潰飲食少思予謂腫下而堅者發於筋骨肉色不變者發於骨髓遂托以參芪等藥二十餘劑膿熟不穿予謂藥力難達必須針刺不聽至旬日方刺涌出清膿五六碗然衰老氣血不足瘡潰又久竟不救　大抵瘡疽旬日不退宜托之有膿刺之有腐肉取之虛則補之此十全之功也　一人患貼骨疽腿細短軟瘡口不合以十全大補湯外灸附子餅貼補藥膏調護得宜百貼而愈　一人環跳穴患附骨疽彼謂小瘡服敗毒藥外以寒藥敷貼因痛極針之膿瘀大泄方知

爲瘤請治其脈右關浮大此胃氣已傷故瘡口開張肉紫下陷捫之不熱彼謂瘡內更覺微冷自謂必成漏矣灸以豆豉餅飲六君子加藿香砂仁炮薑數劑胃氣漸醒飲食漸進患處漸暖肌肉漸生更以十全大補湯而愈　一人亦患此內痛如錐外色不變勢不可消喜其未用寒劑祇因痛傷胃氣而不思食以前藥去炮薑治之飲食稍進更以十全大補湯二十餘劑膿成針之仍以大補湯倍加參芪歸朮數劑膿潰久不止更加麥門五味貝母遠志服數月而瘡愈　二證蓋因濕熱滯於肉理真氣不能運化其治宜除

濕熱實脾土和氣血則濕自消散若腫不消以隔蒜灸之立効　一婦四十餘近環跳生腫久不潰不能伸縮日脾移寒於肝痛則筋攣蓋脾主肉肝主筋肉濕則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸少愈更以助胃壯氣血藥二十餘劑而消　一人因劇躁流環跳穴作痛與四物湯加黃柏蒼朮紅花牛膝木瓜枳殼黃芩柴胡丹皮生地十餘劑稍可更刺委中出黑血而愈　一後生股微痛以風藥飲酒一年餘以防風通聖散大黃加生附子治百餘貼成一疽近皮膚膿出而愈後五六年其處仍痛予曰昔病作

無能為矣蓋發於新娶之後多得香味肉味若能效
淡遠房勞猶可生也出膿血四五年近又發背瘡
又三年而死此純乎痛熱者　一少年天弁梅瘡微
骨痛兩月後生疽深入骨邊　令取刺骨而安此
寒搏熱者也取以猛久且受寒之氣　用消火煅紅地上出火毒去
毒去用骨熱以猛透入數內更消毒　大　萬曆乙亥余方
閉關作孰了一叢適姻家虞懋吞股內側痛久矣醫作
痛風治月餘不效膿熟肉疗不得穿穴出內潰入腹
精神昏憒粥藥不入醫不能措手請教於余余特破
倒為診之脈細如蛛絲氣息奄奄然絕曰無傷也可

瘍部　八　外科四　七十二

以鈹針刺其腹膿大泄數升然皆清如米瀋且若蟹
吐沫醫疑其透膜不可治余曰無傷也可以參芪附
子加厥陰引經藥大劑飲之為製八味丸食前嚥吞
百丸食大進日啖飯升餘肉數觔何日而下所以知
可治者潰瘍之脈洪實者死微細者生今脈微細形
病相合知其受補故云可治也所以刺其腹者恐不
瀉必有內攻之患且按之而知其創深可刺之無害
也所以信其不透膜即透膜無損者無惡候也所以
服八味丸者八味丸補腎腎氣旺而上升則胃口開
而納食故食大進也況膿既多刀圭之藥其何能濟

遲延延久且變生故進開胃之藥使多食羹肉以補
之肌乃速生此治潰瘍之大法也

內服黃狗下頦方　治肚癰少腹癰及腿上出骨癰肺癰
又云可治發背大抵此方治下部瘡疽妙
用黃狗下頦連舌連皮毛劈下入磁罐鹽泥封固鐵
蓋蓋口煅一炷香覺烟清即止務宜存性不可過
過則無用矣視其骨灰正黑色若為妙若帶白色
其性已過勿用用時研細　白歛末　豌豆粉名小粉豆生用
右三味等分以各伍錢為率酒調空腹
服外又以三味等分為敷藥香油調傳患處其驗

瘍部　八　外科下　七十四

以服藥後出臭汗及熟睡為準史館方太史親見
顧天宇室人驗過
按此方世多用之萬氏家抄亦已收載然但知其
可為敷藥散腫止痛而不知其可以內服為下部
癰疽內消之聖藥也予有鄰夫環跳穴痛甚如雞
啄火灼適製有藥以酒調參錢飲之未愈更進一
服霍然如失明日昇轎如故了無苦矣
三生散　治肚癰大痛不辨肉色漫腫光色名附骨
癰如神
露蜂房　蛇退　頭髮各等分

右件各等分為細末酒下參錢
內托黃耆柴胡湯 治附骨癰
黃耆（貳錢） 柴胡 土瓜根（酒洗各壹錢）
羌活（半錢） 連翹（叁分） 官桂
黃蘗 生地黃（各壹分） 當歸（柒分半）
右㕮咀作一服水參盞酒壹盞同煎至壹盞去滓
熱服宿食消盡服一服而愈 若貴德茂男年十歲
丁未四月十一日於左腿近膝股內出附骨癰不
辨肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左腳乃肝之
脾土也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經
之分其脈左三部細而弦按之緩而微有力此藥
此方主治 一方無黃蘗
內托黃耆酒煎湯
黃耆 當歸梢（各貳錢） 柴胡（壹錢半）
升麻（柒分） 連翹 肉桂
黍粘子（炒各壹分） 黃蘗 炙甘草（各半錢）
右㕮咀好糯米酒壹盞半水壹大盞半同煎至壹
大盞去滓空心宿食消盡溫服待少時早膳壓之
使不令大熱上攻中上二焦也丁未季春蒲度主
老年七十因寒濕地氣得附骨疽于左腿外側足

少陽膽經之分微侵足陽明分闊六七寸長一尺
堅硬漫腫不辨肉色皮澤深但行步作痛以指按
至骨大痛與藥一服立止再服堅硬腫消
當歸散 治附骨癰及一切惡瘡
當歸（半兩） 甘草（壹兩） 山梔子（拾貳枚）
木鼈子（壹枚去皮）
右為細末每服參錢冷酒調服
漏蘆湯 治附骨疽
漏蘆（去蘆） 升麻 連翹
麻黃（去根節各壹兩） 防已 木香
白斂 沉香（各壹兩） 大黃
右剉碎每服伍錢水壹盞半入竹葉柒片煎至柒
分入芒硝壹錢攪勻去滓空心溫服取利三二行
未利再服
應痛丸 治走注疼痛疑是附骨疽者
蒼朮（去皮） 當歸 黑牽牛
草烏頭（炮各壹兩）
右為細末醋糊為丸如小豆大每服叁拾丸空心
醋湯下
黃連湯 治附骨癰生股上伏肉間淋漓

苦參　地骨皮　蒺藜炒
枇杷葉蜜炙去毛　荊芥去梗　蜀椒去目并合口者已上各壹兩
右擣篩以水叁升煮取貳升和滓淋洗離布揩拭
之

蜜陀僧散

蜜陀僧　自然銅各一兩　杏仁去皮尖雙仁
右用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨候
筒黃色取出研極細看瘡大小用藥以新汲水調
勻用雞翎掃塗瘡上甚者不過二七日効

○腿遊風

或問腿股忽然赤腫何如曰此名腿遊風風熱相搏
而然屬足太陽經宜從出惡血服防風通聖散去白
朮加黃蘗牛膝防己主之

○委中毒

或問一女年十四往來寒熱膝後膕內約紋中堅大
如石微紅微腫何如曰此名委中毒此穴在膝後膕
紋中屬太陽膀胱經由臟腑積熱流入膀胱而發用八
陣散下瘀血升許而消若治之稍遲則筋縮而成
廢疾

○鶴膝風

癰疽　發於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱[illegible]
堅勿石石之者死須其柔乃石之者生[illegible]
之物　諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽
者百日死發於陰者三十日死[illegible]
[illegible]外也　或問兩膝腫痛股漸小何如曰此名
鶴膝風一名鼓槌風起於中濕或因痢後脚弱緩痛
不能行履名曰痢風或傷寒餘毒不能發散風寒濕
氣結於經絡血脉不流以致筋骨[illegible]足
少陽足陽明經宜用下[illegible]散退下以住痛回
陽又宜冲和膏塗足附以引氣行血服大防風湯追
風丸倍加乳香以住痛舒筋亦宜隔蒜灸之　或問
膝上腫痛何如曰此非一端要須明辨若兩膝內外
皆腫痛如虎咬之狀寒熱間作股漸細小膝愈腫大
名鶴膝風急隔蒜灸服大防風湯但一膝痛外上下
不甚腫而微紅名膝遊風宜服聖授丹換骨丹防風
通聖散加牛膝木瓜但膝之兩傍腫痛增寒壯熱晝
夜偏劇腫處手不可近爲膝眼毒膝蓋上腫痛者爲
膝癰此二證宜服勝金丹或紫金丹八陣散活命飲

六八膝　薛　鶴膝風乃調攝失宜虧損足三陰經風
邪乘虛而入以致肌肉日瘦内熱減食肢體攣痛久
則膝大而腿細如鶴之膝故名之若傷於脾胃者補
中益氣湯為主傷於肝腎者六味丸為主若欲其作
膿或潰後十全大補湯為主皆佐以大防風湯初起
須用葱熨可以内消若津涸口乾中氣不足也補中
益氣湯加五味子頭暈頭痛陽氣不升也補中益氣
湯加蔓荊子發熱晡熱陰血虛弱也用四物湯參芪白
术畏寒憎寒陽氣虛弱也用十全大補湯飲食少思
胸膈膨脹脾胃虛痞也用四君子湯面色痿黃飲食

少思脾胃虛弱也用六君子湯[illegible]肌肉不生
氣血俱虛也用八珍湯熱來復去有時而動無根虛
火也用十全大補湯形瘦嗜卧[illegible]痰盛作渴
小便頻數五[illegible]用六味丸[illegible]夜多漩
溺脾腎無力頭暈吐痰腎氣[illegible]用八味丸發熱
大渴不欲近衣面目赤色[illegible]血虛發躁也用
當歸補血湯或有痢後而患者亦治以前法餘當臨
證制宜

鶴膝風 又名[illegible] 兩大小腿瘦如蘆[illegible]有膝[illegible]大者
行履不得用小續命湯料内加草薢川練子獨活

乾木瓜 㕮咀不用生薑用水煎熬於碗底外放麝
香少許去滓傾於碗内服之服至數十貼後加五
積散同煎服水痊　一方用紫荊皮老酒煎飲之
常服

羅氏蜘蛛丸　治鶴膝[illegible]風痛之疾

蜘蛛 頭尾全[illegible]　　　白附子
阿魏　　　　桂心　　　安息香
白芷　　　　乳香　　　沒藥 各[illegible]
川[illegible]　　　乾蠍[illegible]　　當歸
白芍藥　　　牛膝　　　羌活

地骨皮　　　威靈仙 各[illegible]

右煉蜜丸彈子大空心溫酒化下壹丸胡楚望博
士病風痙手足指節皆如桃李痛不可忍服之悉
愈

丹溪治一丈人年七十患腳膝疼稍腫

生地黄　　　當歸頭　　　白芍藥
蒼术　　　　炒蘗 冬[illegible]錢　　川芎
桂 [illegible]錢　　　木通 [illegible]錢半

分四貼煎取小盞食前熱服

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間髀樞左

右一男發痛延及於膝其痛夜則甚或熱或不
痛或不痛醫多用風藥兼用補血六七年矣其
膝消腫痛飲食漸減形瘦骨立惟膝腫如桃不
可屈伸診其脈左弦大右微弱尤濇其大率皆數知其
小便必數而短遂作飲食痰積在太陽陽明治之炒
黃柏酒浸一兩半甘草稍犀角屑炒各叁錢鹽炒各叁錢川芎
二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇暄熱加條芩三
錢為細末每叁錢重與生薑自然汁同研細多少以
水盪起煎令沸帶熱食前飲之一晝夜四次與至半
月後數脈漸減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩

當歸半兩如前服又與半月腫漸減食漸進不惡寒
惟腳膝痿軟未能久立久行去犀角加苓朮黃芩時當夏熱
加炒黃柏至一兩半依本方內加牛膝春夏用莖
葉冬用根杵取汁用之效尤速須斷酒肉濕麵胡椒
當仲夏加生地黃半兩冬加茱萸桂枝

換骨丹 通治風濕流注鶴膝風

防風 牛膝 當歸 虎骨酥炙各一兩
枸杞一兩 羌活 獨活 敗龜板
秦艽 萆薢 松節 蠶沙各一兩
茄根洗一兩 蒼朮四兩

酒浸或酒糊丸皆可

腳筋急痛者木瓜令爛研作粥裹痛處冷即
易一宿三五度無裹便差煮木瓜時入一半酒煮之

子和治嶺北李文卿病兩膝髕屈伸有聲剝剝然
或以為骨鳴戴人曰非也骨不戾皆筋也此筋濕也
濕則筋急緩者不鳴急者鳴也若用予之藥一涌一
泄上下去其水則自無聲矣文卿從之既而果然

州守張天澤左膝腫痛胸膈痞滿飲食少思時欲作
嘔頭暈痰壅日晡益倦此脾肺氣虛用葱熨法及六
君加炮薑諸證頓退飲食少進用補中益氣加蔓荊

子頭目清爽間與大防風湯十餘劑又用補中益氣
二十餘劑而消 通府劉國威先筋攣骨痛右膝漫
腫用化痰消毒之劑腫痛益甚食少體倦加祛風消
毒等藥寒熱作嘔大便不實用二陳除濕之類腫起
色赤內痛如錐余診其脈滑數而無力此膿已成元
氣虛而不能潰也用十全大補湯四劑佐以大防風
湯一劑而潰又百餘劑而痊 一儒者腿筋弛長月
餘兩膝腫痛此陰虛濕熱所乘也用六味丸為主佐
以八珍湯加牛膝杜仲間以補中益氣湯三月餘而
消 一男子腿痛膝腫脈浮按之弦緊此肝腎虛弱

也用大防風湯二劑已退彼惑於附子有毒乃服治瘡之藥日漸消瘦虛症漸至復求治余曰倦怠消渴脾胃衰而不能營運也小便不禁腎氣虛而不能約制也煩熱虛痞胃氣弱而不能化也惚恍健忘精神失而憒亂也惡證蜂集余辭之後果歿　此方多起于不足之人故以加減小續命大防風二湯有効若用攻毒藥必悮　一婦膝腫痛遇寒痛益甚月餘不愈諸藥不應脉弦緊此寒邪深伏於内也用大防風湯與火龍丹治之而消　大抵此證雖云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛弱而邪得以深襲故附骨癰疽及鶴膝風證腎虛者多有之前人用附子者以温補腎氣而又能行經絡散寒邪也亦有體虛之人秋夏露臥爲冷氣所襲寒熱伏結多成此證不能轉動乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也若被賊風所傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛少止須大防風湯火龍膏治之又有攣曲偏枯堅硬如石謂之石疽若熱緩積不潰肉色赤紫皮肉俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪以補虛托裡也

大防風湯　治足三陰經虧損外邪乘虛患鶴膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰二五劑後更用調補之劑

附子　牛膝[illegible]　白朮　羌活

人參　防風[illegible]　川芎[illegible]　肉桂

黃芪　白芍藥　杜仲　熟地黃

甘草（炙各五分）　右水煎服

還少丹　治足三陰經虛損患膝風等證又補脾胃進飲食之良劑也

肉蓯蓉（酒浸）　遠志（甘草湯煮去骨）

茴香（炒）　巴戟（去心）　枸杞子　山藥

牛膝　石菖蒲　杜仲　熟地黃

五味子　白茯苓　楮實子　山茱萸

右爲末用紅棗肉和煉蜜爲丸桐子大每服五十丸温酒下日三服

經進地仙丹　換骨丹

[illegible]寒膝伸不屈治其[illegible]

坐而膝痛治其[illegible]　立而膝痛治其髀關[illegible]

[illegible]

痛痛及拇指治其腧[illegible]

坐而膝痛如物隱者治其關[illegible]

立而膝之動[illegible]膝痛不可屈伸治其背內[illegible]

連胻若折治陽明中俞髎[illegible]

膝痛若別治巨陽少陽榮[illegible]

淫濼脛痠不能立久治少陽之維在外上五寸[illegible]

右提機骸關諸穴更參訂之

[靈]膝中痛取犢鼻以員利針之發而閒之針大如犛刺膝無疑 雜病篇

[千]鶴膝風腫及腿痛 髖骨 在膝蓋骨上一寸梁丘穴兩旁各五分針入五分灸之 膝關 [illegible] 三里

[集]又法 膝關 委中 三寸半但禁出血為妙 三里 取不已 穴 陽陵泉 中脘 豐隆

[通]膝腫 行間

[撮要]陽陵泉 横透陰陵泉補生瀉成 陰陵泉 横透陽陵泉補生瀉成

膝關 [illegible]

[世]脚拘痛 委中 出血

[參]脚膝痛筋急 風池 三間 三陰交 三里

腿部十七

○腿疽

[靈樞]曰發於脛名曰兔齧其狀如赤豆至骨急治之不急治害人也

○腿陰癰

或問足小肚內側微紅微腫堅硬如石三四日許可痛楚難忍何如曰此名黃鰍癰屬足太陰脾經濕熱又積憤所致宜服五香湯流氣飲加牛膝木瓜防己黃蘗壯實者一粒金丹下之或萬病解毒丹不足者十全大補湯加牛膝木瓜若過時潰出清水虛火上升嘔吐不食者不治

○三里發

鬼遺云三里兩處起癰疽初發如牛眼睛青黑便五七日破穴出黑血汁膿腫攻膀肚連腿裏拘急冷疼此因傷筋氣勞力所成宜用湯藥注射其外毒自平息矣

○接骨發

鬼遺云兩脚接骨近上膀肚下一處起丹疽如胡桃大硬如物打磕之狀不苦疼但腫急脹恐其損筋亦須早出膿方可保平安也

○驪馬墜

鬼遺云乘跌左右兩處起癰為驪馬墜初起大小不定此處微實皮肉薄紋緊口亦難合潰破起宜以消散藥貼令內消此處亦易成漏潰唯宜消散之硬館恐後慢難為功矣又云交腨一處近稜緣上亦為驪馬墜防漏（一名騎馬墜地）

○青蛇便

或問足肚之下結塊長二三寸許寒熱大作飲食不進何如曰此名青蛇便屬足少陰經足太陽經由腎經虛損濕熱下注所致頭向上者難治頭向下者刺

醫部　外科四　有七

出惡血服活命飲加木瓜牛膝黃柏或烏金散紫金丹選用老弱之人嘔吐腹脹神昏脈躁者死

青蛇便生小腹上下頭生空上攻走入腹者不可治頭生向下尾在上即為順可治祖急服二十六味托裏散外用神方鐵箍散蒜汁陳醋豬膽同調敷之上望下提蛇頭上用三稜針針入二寸出黑紫血出針後下保生散用紙撚蘸藥送入

○瓜藤纏

或問足股生核數枚腫痛久之潰爛不已何如曰此名瓜藤纏屬足太陽經由臟腑濕熱流注下部所致

用防風通聖散加檳榔牛膝防已主之

○濕毒流注

或問足脛之間生瘡狀如牛眼或紫或黑膿水淋漓止處即潰爛久而不斂何如曰此名濕毒流注瘡風疾由寒濕著氣侵入腠理而成宜服防風通聖散加木瓜牛膝防已之類或當歸拈痛湯加牛膝

○下注瘡

或問腳膝間膿水不絕連年不愈何如曰此名下注瘡亦名濕毒瘡因脾胃濕熱下注以致肌肉不仁而成瘡也在外屬足太陽少陽經在內屬足厥陰足太

醫部　外科四　百八

陰經宜服防風通聖散加木瓜防已牛膝之類外用祛風等湯藥洗裂久貝藥貼之

○內踝疽

靈樞云發於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其輸而止其寒熱不死　或問足內生疽何如曰此名內踝疽由寒濕滯於足陽明與足厥陰肝經血滯所阻所致初宜隔蒜灸之服流氣飲加牛膝木瓜防已壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯內托黃芪柴胡湯主之

○外踝疽

或問足外踝生疽何如曰此名御拐毒屬少陽膽經足太陽膀胱經濕熱下注宜服內托羌活湯黃連消毒散內托復煎散選用勝金丹烏金散紫金丹皆可用

○多骨疽 附見

或問足脛生疽既潰甚久而不愈腐爛出骨者何如曰此名多骨疽亦名剩骨又名朽骨蓋因毒氣壅盛結成此骨非正骨也宜服勝金丹十全大補湯加牛膝防已紫金丹烏金散人參養榮湯加木瓜牛膝防已網問服此疽因未潰之前補劑太過致生毒而不散耳宜授仙紙黃龍膏貼之

○腓腨發

或問足小肚生疽寒熱煩躁何如曰此名腓腨發疽屬足少陰腎經由腎水不足積熱所致古方云不治宜活命飲加牛膝木瓜黃柏已潰者八珍湯加牛膝壯實者一粒金丹下之虛者難治以腎氣丸十全大補湯下之潰出血膿者生潰出清水者死

○臁瘡

鬼遺云兩曲脷腨肚下內外兩踝前有廉刃兩淫瘡裏外廉上結癰腫此處近骨難瘥宜用收斂散外貼四肢中心即用活血肉藥貼無害　或問足內外臁生瘡連年不已何如曰此由濕熱下注瘀血凝滯於經絡以致肌肉紫黑痒痛不時久久名爲風碑口瘡即臁瘡也最難克效蓋以內有瘀風濕盛故也宜服獨活寄生湯防風通聖散加牛膝木瓜防已外用隔紙膏或製久良藥貼之　臁瘡生於兩臁初起赤腫久而腐潰或浸淫搔痒破而出水淋漓蓋因飲食起居虧損肝腎或因陰火下流外邪相搏而致外臁屬足三陽濕熱可治內臁屬足三陰虛熱難治若初起惡寒壯熱腫焮作痛者屬濕熱用檳蘇敗毒散

若漫腫作痛或不腫不痛者屬陰虛用補陰八珍湯若膿水淋漓體倦食少內熱口乾者屬脾虛用補中益氣加茯苓酒炒白芍藥若午後熱或作痛頭目不清者屬陰火前湯加酒炒黑黃蘗及六味地黃丸若午後發熱至子時分方止是血虛前湯加芎藭熟地若鬱結傷脾而甚用歸脾湯加柴胡山梔若怒動肝火而甚用補中益氣湯加川芎山梔黃芩內熱口乾肢體倦怠或痰涎上升或口舌生瘡屬脾腎虛熱用六味地黃丸補中益氣湯若患處黯黯肢體畏寒飲食少思或脾腎虛敗用八味丸若誤用攻伐復損胃

氣絶且化源治亦難矣　鴻臚翟少溪兩臁生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也用六味丸不月而痊憊其二月元氣不復　一男子左臁腫痛色如故寒熱惡心飲食少思此脾氣不足而爲外邪所感也用六君加藿香桔梗川芎而寒熱止又用補中益氣湯而腫痛消　咾懋誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似臁瘡用發表之劑兩腿腫黯熱氣如霧欲發痙脉皆洪數兩尺尤大余曰屬足三陰虛酒濕所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山茱萸附子

一劑脉證頓退却去附子又二劑全愈　一男子先患下臁後及遍身生瘡似疥非疥時或臖水淋漓兩腿爲甚肢體倦怠作痒日晡熱甚余作腎經虛火用加減八味丸而痊

二妙丸　治下焦濕瘡　潛行散木香末
各等分爲末糊丸梧子大

海藏愈風丸　治兩臁濕熱生瘡服此安

川烏頭 炮去皮臍　川楝子

藁本 炒　杜蒺藜 炒去刺　赤小豆

防風 去蘆　黃芪　烏藥

右爲細末酒煮麪糊爲丸如桐子大每服拾伍丸溫酒下婦人醋湯下並空心服

治臁瘡極妙地骨皮壹斤黃蘗皮貳兩剉爲粗末用香油壹斤半煎濾過藥油六七兩入淨松香貳拾兩黃丹貳兩同煎候黃丹微黑色却入輕粉漆角光粉貳兩煎法皆如煎膏法用長條紙拖過掛乾用若瘡紫黑先用三稜針去惡血以冷水洗淨隨瘡大小剪膏藥掩上用絹帛紮緊候　周時再換膏藥換時須用冷水洗瘡不過數換不問新久即愈須忌口及火氣陽氣備換膏藥再看如有黑腫未盡可再出血以

紫黑血盡爲度

治臁瘡用糯米泔漱口過洗瘡拭乾却以地骨皮爲細末蜜調傅瘡上又以油紙縛之

又治臁瘡

白膠香　黃蘗　軟石膏 各另研

青黛　龍骨

右爲細末以香油調傅患處

又方用猪羊脂貳分石膏壹分赤石脂半分爲細末香油和之以黑油傘紙作隔膏縛之除根

翡翠玉膏治臁瘡

瀝青（壹兩） 黃蠟 銅綠（各五錢） 沒藥
乳香（各壹錢）
右件先將銅綠為細末入香油調勻又將黃蠟瀝青火上溶開次下油銅綠火上攪勻將沒藥等二味旋旋入攪勻用河水當碗將藥傾在內用手扯拔勻油紙裹看瘡大小分大小塊口嚼捻成餅子貼於瘡上紙封三日易之
丹臁瘡用砂糖木香冬青葉三五沸撈起任臁瘡將葉貼在瘡口上一日換二遍 腳痛成瘡米泔湯洗瘡候乾自安

臁瘡用韭汁洗淨拭乾刷虎骨傅上
乳香散（經驗） 治諸斑瘡浸蝕日久不愈下注臁瘡內外踝生瘡頑瘡並驗
枯礬 白膠香 赤石脂（各半兩）
黃丹 乳香 沒藥（各一錢）
輕粉（一錢）
右為細末加膩粉少如瘡濕乾摻乾則香油調敷
輕粉散（驗方） 治下注臁瘡蝕臭腐爛疼痛不可忍者
黃柏（蜜炙） 密陀僧 黃丹
高末茶 乳香（各叁錢） 輕粉（壹錢半）

麝香（少許）
右為末用葱湯洗瘡次貼此藥兼治小兒頭瘡
治臁瘡方
鼠糞 苦參 桃枝 杉樹刺
柳枝 松枝 [illegible] 雞子殼
皂角 雀糞 芍藥 木鱉子
芝麻 桑枝 蛇殼 鍋底煤
杜當歸 續斷（各肆錢） 松明（多少不拘）
右為細末先將松明捶碎和前藥於瓦銚中拌勻一地坑將藥銚安坑中四圍用火熬鎔取出再研令勻傅瘡自然痊可忌一切發氣熱物

隔紙膏 治內外臁瘡
當歸 白芷 黃連 五倍子
雄黃 沒藥 血竭 海螵蛸
白及 白斂 黃柏 厚朴（已上各半兩）
黃丹（壹兩） 乳香（另研） 輕粉（一分）
右為細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥傅瘡上絹帛縛定有膿水解開刮去不潔再貼藥如此數次即愈須先用燒鹽湯洗淨片帛拭乾待片時水氣乾然後貼藥

治臁瘡久不愈

龍骨半錢 輕粉少許 檳榔半兩 乳香

沒藥各一錢半 乾猪糞半兩燒存性

右爲細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清油調傅瘡濕則乾摻之

治臁瘡下注

白石脂 龍骨各半兩 白礬半兩飛 五倍子半兩燒存性

黃丹半兩炒 雄黃少許

右爲細末先將葱鹽湯洗瘡見赤肉然後將前藥傅瘡上用藥如法厚者却用帛子包縛若不要動

直候乾自脫去瘡皮

治臁瘡

黃丹 輕粉 白芨 樟腦

敗船灰各等分

右研細末以桐油調成膏攤在油紙袋內先煎溫葱湯洗淨以帛拭乾將藥置瘡上紮住用了一面番轉如前洗貼一方無輕粉若用糞船灰亦妙

治臁瘡方 詹武子年三十時曾患此用之便効

白芨 白斂 黃檗 黃丹等分各研

右爲極細末入輕粉少研勻以煉蜜和成劑捏作餅貼瘡上深者與滿以帛片包紮一日一換後來瘡漸乾或有裂處只須以藥摻以瘥爲度

治血注脚

桑樹菰 牛糞菰又名白灰菰生泥上如有白灰起者研其中有灰起

肥株樹菰 胎髮男用女女用男各一箇

右將三菰焙乾各伍錢胎髮燒灰存性叁錢並爲細末研勻濕則乾摻乾則清麻油調塗

治臁瘡方

冬青葉 臘猪膽 百草霜研末

右將冬青葉與本人嚼爛先以葱椒湯洗淨瘡口以臘猪膽傅後却傅嚼葉在上三四次即可

奇妙梔子散 治遠年日久內外臁瘡

山梔子不拘多少燒作灰研爲細末 乳香另研各半錢

輕粉少許

右研勻以磁器收貯用時先以葱白花椒煎湯洗淨瘡稍歇再以溫漿水入洗一次候惡水去盡再將白水煎百沸候溫再洗但瘡口無膿水血絲清水各盡又用粉帛片拭乾然後傅藥如乾者香油調傅濕者乾摻但將瘡口貫滿軟絹帛護之堅硬不作膿者未可用膇如軟有膿者依前法再洗後

傳貼之三二次即愈乃一藥二洗之功也

治臁瘡方　先以葱白藥水熬湯洗淨拭乾後以輕粉末摻上瘡口却用五倍子黃柏各等分為細末涼水調敷瘡上紙蓋定三五次即愈

腎臟風屬腎虛風邪乘於臁脛以致皮膚如癬或漸延上腿久則延及遍身外登則搔痒成瘡膿水淋漓眼目昏花內登則口燥舌乾腰腿倦怠吐痰發熱盜汗體疲治法用六味丸為主佐以四生散若脾胃虛弱者用補中益氣湯為主佐以六味丸四生散為善

欽天薛衙齋六十有一兩臁生瘡[illegible]吐

府本　癭部　外科四　頁七

痰四年矣此腎臟風證也與六味丸四生散而瘥年餘復作延及遍身日晡益甚痰渴盜汗唇舌生瘡兩目昏赤此腎經虛火而水泛為痰用加減八味丸而愈三年後小便淋漓莖中澀痛此思色精不出而內敗也用前丸及補中益氣湯加麥門五味而愈

治男子兩足瘙痒生瘡延年不愈[illegible]此為腎風瘡宜服此藥

黃芪　牛膝各半兩　羌活

獨活　川芎　防風

木香　白附子各貳錢　白蒺藜壹兩去刺

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三拾丸空心鹽湯送下仍以後方藥傳之

檳榔　木香　防風

白芷各貳錢　白芨壹錢　龍骨伍分煅

麝香壹字另研　蛇退壹條燒灰　膩粉拾伍筒

右為細末研勻先以[illegible]槌碎石器內切碎以麻油[illegible]以油調搽瘡口即傅末藥上以油紙蓋之三日一換每上藥時先用柳枝甘草煎湯溫洗淨拭乾傳藥

驢蹄散　治腎臟風瘡下注生瘡

府本　癭部　外科四　頁八

驢蹄貳拾片燒灰　密陀僧壹錢研　輕粉壹錢

麝香半錢七

右研細末以油調搽或乾摻日三四次瘥

○風疳

凡腳腨及曲脷中痒搔則黃汁出名風疳治之方以青竹筒一枚徑一寸半長二尺當中著大豆一升以杖塞一物於[illegible]為火當竹筒中燒之以器承兩頭取汁先以泔清和鹽洗瘡了即塗豆汁不過三度極效

又方　將胡麻傳以綿裹之日一易神良

防風湯 治風毒中人[illegible]不[illegible]相搏結
成風疽或髖[illegible]腫熱疼骨體痛
防風去叉 柴胡去苗 白芷
木通剉 當歸切焙 羌活去蘆
麻黃去根節煎掠去沫焙 附子炮去皮臍 桔梗炒
甘草炙各壹兩
右剉如麻豆大每服伍錢水一盞半煎至捌分去
滓食後臨卧各一服如欲出汗空心併兩服後以
葱薑稀粥投蓋覆取汗慎外風

海桐皮散浸酒方 治熱毒風結成疽痹痛不得安

腰部 卷五 內外科四 百九

海桐皮 五加皮各剉 獨活去蘆
薏苡仁炒 防風去叉 乾蠍炒
杜仲去粗皮 牛膝去苗酒浸 生地黃焙各叁兩
右㕮咀生絹袋盛以好酒壹斗伍升浸瓷瓶中密
封秋夏三日春冬七日取食前溫酒飲一盞或肆伍
合不拘時其者當氣相續

○脚發

靈樞云發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之
百日死 發於足傍名曰厲癰其狀不大初從小指
發急治去之其狀黑者不可消輒益不治百日死
醉脚發之證屬足三陰經精血虧損或足三陽經濕
熱下注若色赤腫痛而潰膿者屬濕熱下注爲可治
若色微赤微腫而膿清者屬陰精血虧損爲難治若黑
黯不腫痛不潰膿煩熱作渴小便淋漓者陰敗末傳
惡證也爲不治其法濕熱下注者先用隔蒜灸活命

足部 卷五 內外科四 百廿

飲以解其毒次服益氣湯六味丸以補精氣若色黯
不痛者着肉灸桑枝灸以行壅滯助陽氣更用十全
大補湯八味丸壯脾胃滋化源多有復生者若專治
其瘡復傷元氣者未見其生者 閣老靳介菴脚指
縫作痒出水腫焮脚面數日痒痛不應服除濕之
劑益甚余以爲陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中
益氣湯愈 大參李北溪右足赤腫作痛兩足二指
縫濕熱下注先用隔蒜灸活命飲一劑其痛頓止灸
患處出水赤腫頓消次用托裏消毒散四劑灸患處
出膿而愈 儒者楊舉元患此微腫痛微赤焮此足

三陰經陰虛濕熱下注用隔蒜灸托裏散而起發
十全大補湯而膿成又爽知減八味丸料百劑而斂
一儒者患此赤硬色白兩月餘矣此足三陰經虧損
損爲外寒所侵用大防風湯及十全大補湯服而消
後場屋不利飲食勞倦而復作盜汗內熱飲食不
化便滑肌瘦此脾土虛寒而命門火不能相生用八
味丸益氣湯百餘劑喜其年壯得愈　一男子腳心
發熱作渴引飲或用四物芩連黃蘗知母而腹痛作
嘔煩熱大渴此足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用
六君加炮薑數劑而脾胃醒

半夏而脾胃健乃以加減八味丸兩服而愈
一儒者腳心發熱作癢以滾湯浸漬而出水肌體
骨立作渴吐痰此脾腎虛而水泛爲痰也服益氣湯
八味丸年餘元氣復而諸證愈　少宗伯顧東江面
發作渴余曰此腎經虧損當滋化源以杜後患彼猶
然之而終不服大年九月內左足面患疽色黯不痛
腳腿沉重用隔蒜灸三十餘壯足腿即輕瘡出血水
數日而消瘡色仍黯時公將北行賀　萬壽余診之
曰脾脉衰憊陽氣虛極不宜遠行公曰余得溫履驗
向夢羣仙待我此壽徵也至河間驛聚仙堂病篤歎

曰立齋豈能留我果卒於此亦異數也

一 脫疽

脫疽發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死
赤黑者不死治之不衰急斬之否則死矣
疽敦疽發兩足指五日不穴死四日可刺其色紫黑
疽者不堪木過節者可治　足指生疔重者潰而自
脫故曰脫疽或曰惟足大指患之餘疽其餘足指
患之曰敦疽湯治雖脫疽難治　結毒焮赤腫
痛者以五神散及以紫河車金線釣葫蘆金雞舌金
腦香搗爛敷及以汁塗傳

塗之　未成焮痛者除濕攻毒更以隔蒜灸之至不
痛用十二經消毒散加引經藥若未得緊急
者宜作蛇傷治之及作癬瘋治之効　未成焮痛或
不痛或大痛者宜隔蒜灸更用解毒以消毒萬金湯
溫消加減　未成若色黑急割去速服補劑庶可救
若黑延上不可治　未成若色赤焮痛者托裏消毒
更兼灸以人參敗毒散去桔梗加赤牛膝銀花
大黃漏止大以上宜散加天花粉金銀花赤牛膝
未成欲成若色紫不痛隔蒜灸五十壯尚不知痛又
明灸之　活命飲次以托裏散潰膿而愈　未成欲

成大瘡色赤而痛隔蒜灸至痛止以加味荊芥敗毒
散加赤牛膝銀花白芷大黃灸以活命飲 脫疽症
因醇酒炙煿膏粱傷脾或房勞損腎故有先渴而後
患者有先患而後渴者若色赤作痛自潰者可治色
黑不潰者不治色赤作痛者元氣虛而濕毒壅盛也
先用隔蒜灸活命飲托裏散再用十全大補湯加減
八味丸色黯不痛者腎氣敗而虛火盛也隔蒜灸桑
枝灸亦用十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上
侵元氣不致虧損庶可保生亦有因修手足口咬等
傷而致者若元氣虛弱或犯房[illegible]者[illegible]長[illegible]服桂

伐損傷脾胃也若不潰若黑黯上延亦多致死更有
須當以利刀轉解周界輕拽去之則筋通骨出而毒
得洩亦不痛否則毒筋內斷雖去而仍潰且偏僻之
處氣血罕到藥難導達況攻毒之劑先傷脾胃不若
灸法為良重者須解去為善故孫真人云在肉則割
在指則截蓋親之遺體雖不忍傷而遂至夭殁則尤
傷矣況解法無痛患者知之 一人足指患此焮痛
色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒散去桔梗加金
銀花白芷大黃二劑痛止又十宣散去桔梗官桂加
天花粉數劑而平 一人年逾四十左足大指赤腫

焮痛此脾經積毒下注而然名曰脫疽喜色赤而痛
以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大黃二
劑更以金銀花甘草節瓜蔞四劑頓退再以十宣散
去桔梗桂加金銀花防己數劑愈 一人患此色紫
亦不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸百壯方知
乃以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈 一膏粱年
逾五十亦患此色紫黑脚焮痛孫真人曰脫疽之證
急斬之去毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其
飲食如故動息自寧為治善證遂以連翹敗毒散六
劑更以金銀花甘草節瓜蔞 十餘劑患指潰脫更

以芎歸牛膝連翹金銀花[illegible]十餘劑而愈次年
忽發渴服生津等藥愈甚服八味丸而止 大抵此
症皆由膏粱厚味或房勞太過丹石補藥所致其發
于指微赤而痛可治治之不愈急斬去之庶可保否
則不治色紫黑或發于腳背亦不治或先渴而後發
或先發而後渴色紫赤不痛此精氣已竭決不可治
一[illegible]左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日
延足黑冷不知疼痛脈沉細此脾胃受毒所致進飛
龍奪命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始
痛可救治以十全大補湯而愈蓋死肉乃毒氣盛拒

截然癥氣所致況至陰之下血氣難達經云風淫末疾是也向若攻伐之則邪氣乘虛上侵必不救矣　一人足指患之大痛色赤而腫隔蒜灸之痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而痊　一人足指患之色黑不痛令明灸三十餘壯而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上蓋致不救　一人足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裏藥潰脫而愈　一人足指患之色赤焮痛作渴隔蒜灸數壯以仙方活命

飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈若早用前法不至於此　一膏粱之人先作渴足熱後足大指赤痛六脈洪數而細力乏尺爲甚余謂此足三陰虛當滋化源爲主因服除濕敗毒等藥元氣益虛色黯延足余乃朝用補中益氣湯夕用補陰八珍湯各三十餘劑及桑枝灸潰而膿清作渴不止遂朝以前湯送加減八味丸夕用十全大補湯三十餘劑而痊是時同患此證服敗毒之藥者俱不救

附方

五神散　搽一切瘴毒蛇傷蝎螫大効

金線釣蝦蟆　紫河車各貳錢　續隨子去殼

雄黃各壹錢　麝香少許

右末醋調塗患處蛇傷以刀割去損肉以末乾搽或以唾調搽或加騎蛇獅子根葉同煎搗用亦妙

洗瘴方

水苦蕒　槐枝葉　柳枝葉

嫩桐葉　小青葉　連又大青

右煎水淋洗

〇腳氣瘡

夫腎主於腳若腎虛爲風濕所乘攻於腳膝則名腳

氣因其氣血壅滯濕毒氣攻在於腳膝不得宣通故令腳上生瘡也若風毒不散其瘡漸生黃水腫痛或壯熱經久難差也

犀角散　治腳氣風毒生瘡腫痛心神煩熱

犀角屑　天麻　羌活各一兩

枳殼麩炒　防風　黃芪各去

白蒺藜　黃芩　白鮮皮各半錢

檳榔各一兩　甘草炙各半兩　烏蛇酒浸去皮

右㕮咀每服捌錢以水壹中盞半生薑伍片煎至壹大盞去滓溫服不拘時

漏蘆丸　治脚氣肝腎生瘡久不差膿血長流疼

漏蘆　秦艽各去蘆　蒺藜

枳殼去穰麸炒　檳榔　川大黃各壹兩

防風　獨活　黃芪各去蘆

黃芩　五加皮　赤芍藥各柒錢半

烏蛇酒浸去皮

右為細末煉蜜和搗二三百下丸如梧子大每服

叁肆拾丸溫酒送下不拘時

鹿茸丸　治脚氣腿腕生瘡

鹿茸酥炙　五味子　當歸各壹兩

熟地黃焙

右等分酒糊和丸梧子大每服叁肆拾丸溫酒或

鹽湯食前下次服後方

又方

川芎　當歸去蘆各

右為細末每服貳叁錢煎荊芥湯調下食後空心

日進二服

治脚氣脚上生風毒瘡腫疼痛

漏蘆　白斂　槐白皮

五加皮各柒錢半　蒺藜子炒

右為㕮咀每用伍兩水壹斗煮取陸升去滓看冷

熱於無風處淋洗之

甑灰散　治脚爛瘡

竹蛀屑　甑燒灰　紅棗燒存性

黃丹　白礬枯　韶粉

各等分為細末摻之

龍骨散　治脚疳瘡久遠惡瘡他藥無効者

白龍骨煅研　輕粉各叁錢　檳榔壹錢研

豬糞

右研令匀先以口含虀水或溫鹽湯洗令瘡瘡見

肉却以真麻油調藥隨瘡大小傅之未愈再傅三

五日可

○甲疽嵌甲

足三陰經皆起於足指氣血泄而不行結於指甲之

間能成甲疽爪以經絡之所流注非特肌肉之病也

或得於剪甲傷肌或得於甲長侵肉或得於履狹之

不適使氣血沮遏而不通腐潰為疽久則爛指上引

於腿膝之間而瘡疱者是已然病在四末不必治其

內惟洗傅滌淨其患而除攖及節其行履則愈矣

按足指在人體最下氣血易沮藥力難到虛弱之人

小有破損亦成瘡瘍久而不斂況其大者非大補氣
血豈能易愈此云病在四末不必治内非通論也
一婦修甲傷大指成膿不潰焮痛至手以敷藥以
致通潰飲食少思彼爲毒氣内攻胗脈沉細此屬傷
胃氣而然遂刺之服六君子加藿香當歸食進更以
八珍湯加黃芪白芷桔梗月餘而愈　一人傷拇指
色紫不痛服托裏藥及灸五十餘壯作痛潰膿而愈
一幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞令取之服
大補藥而愈　一女患嵌甲傷指年餘不愈日出膿
數滴予謂足大指乃脾經發源之所宜灸患處使瘀

肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼忽之不早治後
變勞症而殁　蓋至陰之下血氣難到女人患此多
因裹縛致血脉不通或被風邪所襲則無血氣榮養
遂成死肉惟當壯脾胃行經絡生血氣則愈有成破
傷風以致牙關緊急口眼喎斜者先玉眞散一二服
後投以生血通經則可　一男子修傷足指色黑不
痛而欲脱余曰此因陽氣虚不能運達於患處也急
去之速服補劑以壯元氣否則死肉延足必不救矣
不信果黑爛上腿而殁大抵手足氣血罕到之地或
生瘡或傷損若戕其元氣雖未愈甚潰爛延上必殁

不潰而色黯者亦死若骨斷筋皮但連者宜剪去之
【精要】治甲疽因剔甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫
痛復緣窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫相染五
指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡　日
夜倍增醫方所不能療者用綠礬伍兩形色似朴硝
而綠色置於鐵板上聚炭封之吹令火熾其礬即沸
流出色赤如鎔金汁者是眞也候沸定汁盡去火待
冷取出研細色似黄丹收之先以鹽湯洗瘡帛裛乾
用此末傅之愈

【聖惠】蝦蟆散　治甲疽皮浮腫痛

蝦蟆灰　黃連研末　膩粉各半分
麝香細研　雄黃研　枯白礬研各半錢
杏仁研如泥　鹿角細研　蚺蛇膽半錢

右相和研勻以臘豬脂調如膏先以甘草蛇床槐
白皮煎湯洗瘡拭乾傅藥以油單紙裹外更着綿
帛裹之二日其刺肉剩甲皆當自落三日一换

豬蹄湯　治甲疽及指爛甲疽惡瘡有息肉

豬蹄一雙　白歛　白芷
狼牙　芍藥各二兩　黃連
黃芩　大黃　獨活各貳兩

右㕮咀先以水叁斗煮豬蹄至壹斗伍升去蹄入藥更煮至伍升候溫洗瘡日三次

白礬散 治男女血風毒氣攻手足指生甲疽瘡久不瘥者努肉裹甲疼痛出血不定用此藥肉乾瘡

白礬 石膽各半兩 麝香

騏驎竭 朱紅各壹分

右將白礬石膽於銀器内以炭火煅過入後三味同研令細勻用少許乾貼瘡上以帛子纏定日兩度換之

白礬散 治甲疽

白礬燒灰 麝香 蘆薈

蚺蛇膽研細各半分

先以漿水洗瘡乾傅之洗瘡日三兩上以差為度

馬齒散 治甲疽

墻上馬齒莧陰乾壹兩 木香

丹砂研細 鹽研細炙各貳錢半

右除丹砂鹽外剉碎拌勻於熨斗内以皮灰火燒過取出細研卽以丹砂鹽末再炒勻旋取傅瘡上日三兩度

藺茹膏 治甲疽日夜培增赤肉生甲邊裹甲者

藺茹 黃芪各[illegible] 豬脂

右㕮咀苦酒浸一宿與豬脂一處微火上煎取三合絞去粗以塗瘡上日三兩度其赤肉卽消散

綠礬散 方 治甲疽

綠礬[illegible] 蘆薈貳錢半 麝香[illegible]

右絹袋盛藥納所患處指袋中綿紮定差為度

蛇黃散 [illegible] 治甲疽腫爛生脚指甲邊赤肉努出時差時發又治嵌甲生入肉常血疼痛

雄黃半兩 蛇蛻皮燒壹分

右同研如粉先以溫泔洗瘡上軟以尖刀子割去

甲角拭乾藥傅上用軟帛裹半日許藥溫卽易一日卽除痛便止 一方用漿水洗淨以鍼刺破 一方有黃芪無雄黃

乳香傅方 治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不差

乳香 膽礬各等分

右研細時時傅之 大凡此疾須是剔去甲不藥亦愈或已成瘡久不差卽用此方 一方[illegible]為末傅之 一方用礬燒灰傅瘡

牡蠣散 治甲疽

右用牡蠣頭煅研末每服貳錢研靛花酒調下一

日三服

烏梅散　治甲疽多年不差努肉膿血疼痛

右用烏梅拾枚燒灰研爲散傅瘡上日三易　一方用鹽梅燒灰傅爛搗裹亦可

丹巖甲陷甲割甲成瘡久年不瘥者用黄蘗烏頭尖等分爲末洗淨貼之

華佗治嵌甲累効方

硇砂　乳香（各一錢）　膩粉（半錢）

橄欖核（燒存性）　黄丹（各一字）

右爲末以生麻油調先以鹽湯洗淨拭乾傅之　三次効

砂糖方　治嵌甲

右用琥珀糖是砂糖熬成小毬兒者燒存性入輕粉麝香麻油傅指甲嵌入肉者不過一兩日自爛陳仲山之方云治嵌甲別生好者不痛者無所損神効

乳沒散　治嵌甲

用紫鑛三塊各齊布一片包了於新瓦上炭火煆存性研細末每半兩入沒藥拾分膩粉拾分麝香少許先以葱椒湯洗拭乾口含甘草水吐在瘡上再洗拭淨傅藥濕者乾摻乾者生油調塗初貼一夜極痛不過三次即去根不出有人患此二十五年百藥不効傅而安

烏倍散（醫鑑）　治嵌甲

草烏頭（半兩）　白礬生（壹兩）　五倍子（壹兩全者）

龍骨（貳錢半）

右先將三物搥碎同炒五倍子令焦黑色去三物不用只取五倍子爲末瘡乾用麻油調塗濕即乾貼

黄連散　治嵌甲

黄連　韶粉　黄蘗

軟石膏（各等分）

右爲細末用水洗瘡令淨軟帛揾乾以新汲水調塗瘡上兩日一易妙

香脂散（醫鑑）一名　治嵌甲作痛不差

五倍子（一枚燒存性）　染烟脂（各等分）　麝香（少許）

右研細末濕則乾摻乾則油調亦得

雄蟬散　治嵌甲

雄黄（通明者）　蟬退（各一枚酥炙另研細末）

右研和勻濕者乾摻乾者用津入輕粉少許調塗

陀僧散　治割甲侵肉不差

白礬（飛過）　密陀僧（各等分）

右為末乾搽不定一方以密陀僧搽之亦治脚臭一方用硇砂不用陀僧搽裹之

黃芪方　治陷甲生入肉常有血疼痛

黃芪　當歸（各等分）

右為末貼瘡上若有惡肉更研少許硇砂末同貼

蓬术駐車丸　治嵌甲痕出痛不可忍

右蓬术口嚼淨洗却用駐車丸研細傳之（方見痢[illegible]）

又方　治嵌甲用乳香研細搽之

又方　治欲去甲者用綿纏定搯入甲內漸漸添之數起欠用剪子去之

治嵌甲　以雞腸膽焙為末搽之

乳香散　治嵌甲痛不可忍有妨步履

紫藤香（十兩）　乳香（一兩?）　古半兩錢（十錢?）

輕粉（少許）　麝香當門子（少許）

右為末細細研勻臨用少許先以甘草湯洗患處用舊絹揾乾然後傅藥末以燈草塞之

訶子散　治嵌甲流膿經久不差

訶子（五枚）　降真香　青黛（各[illegible]錢）

五倍子（一兩）

右為末炙人青黛一處研勻先用蔥湯洗淨剪去指甲用藥乾貼縫內或用麻油調傳

膽礬散　治嵌甲

膽礬（[illegible]）　麝香（[illegible]）

右先以蔥鹽湯洗淨患處拭乾傅藥少許

神應散　治足大指角為甲所入肉便刺作瘡不可着靴履脚指濕爛婦人有此

右白礬燒汁盡取末着瘡中食惡肉生好肉細細割去甲角旬日即瘥加雄黃少許同研糝之

〇脚指縫爛瘡

治脚指縫爛瘡以鵝掌皮燒灰存性為末傅之（[illegible]）

〇足跗發

鬼遺云陽疽起足趺及足下二十日不死死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上痒及赤黑者死　跗亦作趺足面也其處結毒腫痛亦名足發背屬足厥陰肝陽明胃經之會多因濕熱乘虛而下法宜服活命飲加木瓜肉桂牛膝及隔蒜灸之繼以十全大補湯托裏溫中湯膿稠可治膿清紫陷者死　一人脚背患此赤腫作痛隔蒜灸三十餘壯痛止以活命飲四

劑而潰更以托裏消毒藥而愈 一人腳背患之色黯而不腫痛煩躁大渴尺脉大而虛此精氣已絕不治後沒 進士周母劉氏年六十左足面一瘡下連大指上延外踝以至腿骨殊痛寢不能安必兼旬累月昏暮作苦抓搔移時出血如泉流叫號痛楚殆不可忍夜分即漸已明日復然殊一更集則痛轉大而劇百試不驗如是二十餘年淳熙甲午仲冬之末先生感太夫人疾之久毋病大作相對悲泣無計因極就睡夢四神僧出一寶有一長物示以因而發嘆二僧問其故以圖答之以寶付之可服牛黃金

虎丹又一僧以硃砂亦可服碗讓僧謁異試取藥半粒強服之良久大痛舉家相泣且悔俄而下腦魂物如鐵石若數升是夕痛但後外不痛而無血數日成痂自此遂愈硃砂之說竟不復試先生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹出和劑局方本治中風痰涎壅塞乃用牛黃龍腦輕粉金箔之類皆非老人所宜今乃取奇效意熱積臟腑而發於皮膚歲久根深未易洗滌故假涼劑以攻之不可以常論神僧之靈蓋孝感云

牛黃金虎丹

牛黃研 兩半	龍腦研 五兩半	膩粉研 貳拾
雄黃研飛 壹百拾兩	白礬枯 拾伍兩	金箔為衣 八百片
天雄炮去皮臍 拾貳兩半		天竺黃研 貳拾兩
天南星湯洗焙為末 用臘月牛膽汁和作餅陰乾再研 拾伍兩		

為細末煉蜜搜和每壹兩半作拾丸以金箔為衣

每服一丸新汲水化下有孕婦不可服

牛膝散 治足瘡發背

雞屎子	[illegible]死子	兩面針
赤牛膝	紫金皮	山蜈蚣
凌霄根	脫殼藤	赤葛根
天布瓜根	背子蜈蚣	

右水煎入酒和服

敷藥方

天蕎麥	鹿葱根	紫金皮
山布瓜	凌霄根	藜蘆子
天南星	赤葛根	雞屎子
苦薄荷	天布瓜	背子蜈蚣

右砍爛入些醋暖塗敷

又方 地燈心砍爛縛之

又方 金雞舌砍爛縛之

又方　臭藤天布瓜根砍爛酒炒敷之

又方　紫蘇蘇梗酒服以查敷患處

百草膏　治脚面惡瘡如桐油浸淫延漫及治一切惡瘡不問乾濕痛痒日近年深百藥不瘥者

右用羊糞弍拾粒留瓦上四畔炭火燒烟住火節鉗下地上以盞覆存性罷成白灰研細以紗片篩去沙土麻油調敷痒入輕粉痛入麝香少許効

足跟疽

或問足跟生疽何如曰是名兔齧以其狀若兔嚙故以為名偏足太陽經穴名申脉在足跟骨下此處乃陰陽二蹻發源之所由臟腑積熱所致其毒深重最忌毒藥敷貼宜隔蒜灸之及服活命飲加牛膝肉桂或勝金丹烏金散紫金丹選用若黑陷麻木神昏脉亂者不治過時潰爛者有妨飲食一使不調或涉房勞怒氣逆悶者死　薛曰足跟乃督脉發源之所腎經所過之地若飲食失節起居失宜虧損足三陽經則成瘡矣若漫腫寒熱或體倦少食屬脾虛下陷也用補中益氣湯若晡熱作痛頭目不清屬脾虛陰火也前湯并六味丸若痰涎上升或口舌生瘡屬腎水乾涸也前湯并加減八味丸凡此皆當滋其化源若治

其外則誤矣俗云兔嚙瘡若□□人被兔咬足跟久而不斂氣血瀝盡而死　大尹陳汝鄰兩腿酸軟或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛而或如無皮忽如皺裂日晡至夜脹痛焮熱用補中益氣湯加八味丸料補其肝腎而愈　一男子足跟作痛熱渴體倦小便如淋□用敗毒散致頭痛惡寒欲嘔不食吐痰咳嗽此足三陰虧損而藥復傷余用十全大補湯加減八味丸各五十餘劑而愈　一男子素不慎起居內熱引飲作渴體倦兩足發熱後足跟作痛或用清熱除濕之劑更加發腫又服敗毒之藥焮赤痛甚恪用祛毒清熱潰裂若張狀如赤榴熱痛如錐內熱晡熱此因足三陰虧損朝用十全大補湯夕用加減八味丸外敷當歸膏兩月餘而愈其服消毒等藥而沒者不能枚舉　一男子亦患此服消毒散搽追蝕藥虐症蜂出其形體骨立自分必死余用十全大補加山茱山藥兩月餘而愈　一膏粱之人兩脚發熱作渴左尺脉數而無力余謂此足三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之藥更加晡熱頭暈又服四物黃蘗知母日晡熱甚飲食漸少脚小面發疽余用補中益氣六味地黃丸百餘服而愈其不信患疽以致不起

婦人

者多矣　一人脚跟生毒如豆許痛甚狀似傷寒以還少丹內塞散治之將可矣因納寵作痛反服攻毒藥致血氣弱腿膝軟痿而死蓋足跟乃二蹻發源之處腎經所由之地若口不合則蹻氣不能發生腎氣由此而泄故為終身之疾况彼瘡先得于虛復不知戒雖大補氣血猶恐不及安服攻毒暴悍之藥以戕賊乎

海藏云足跟瘡久不愈毒氣攻注用附子末一味為細末先以鹽漿水温洗乾貼之二日一換可以負重涉險、

足跟瘡　足跟瘡

婦人足跟足指腫痛足心發熱皆因胎產經行失於調攝虧損足三陰虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸為主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散晡熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡亦用前二藥以滋化源大凡發熱晡熱內熱自汗盜汗等證皆陰虛假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也男子酒色過度者多患此證　一婦人素血虛因大勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物芩連飲食少思胸痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛余曰足熱晡熱月經過期肝脾血虛也胸痞吐痰飲食少思脾胃氣虛也蓋胃為五臟之根本胃氣一虛諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸補脾腎不兩月而痊　一婦人經候不調發熱晡熱胸膈不利飲食少思服清熱寬中消導之劑前症益甚更兼肢體酸痛服除濕化痰等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足跟足指作痛其熱如炙余以為足三陰虧損用補中益氣六味逍遙兩月諸證漸退又用前湯并八珍湯兩月而康　一婦人足跟患腫兩腿酸軟或赤或白或痛或痒後如無皮或如皺裂日晡至夜脹痛焮熱此為足三陰虛損用加減八味丸及逍遙散加熱地川芎百餘劑而愈　一婦人勞則足跟熱痛余作陰血虛用八珍而愈痊後徧身瘙痒服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天麻膝足為丸用四物麥門五味芩連炙甘草山梔柴胡煎送而痊　一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚余謂腎肝血虛用逍遙散六味丸五十餘劑諸證悉愈

琉璃疽

或問足跟之旁生瘡何如曰此名琉璃疽屬足太陽經其色黃腫如琉璃多由行路崎嶇勞傷筋骨脉而

成實丸併作元氣不足嘔吐昏迷者難治急服五香
湯活命飲勝金丹烏金散選用壯實者一粒金丹或
八陣散下之

○足心疔

鬼遺云兩脚心發徵骨者不治如脚心微皮破不至
深發腫不多者可治　足心發疔瘡亦名涌泉疽
俗名穿板又名穿窩天地俱少陰腎經虚損所致
宜隔蒜灸之實者服活命飲送六味地黃丸有表裏
證量爲汗下虛者十全大補湯八味地黃丸大劑不
問晨夜投之潰爛嘔逆迷悶脉微代者死

五寶散　治痢穿板亦治穿掌

　新羅子　金腦香　山蜈蚣
　雌菰藤　紫金藤

右水煎入酒和服

敷穿板藥

　地燈心　楮樹根

右醋蒸熏之併敷上

又方　滑菜根砍爛縛之

又方　仙人掌根水楊梅根二味砍爛縛之

浸洗藥　赤梗紅花蜈蚣煎水煎洗之

○肉刺

肉刺者生於足指間形如硬胝與肉相附隱痛成刺
由靴履窄相摩而成

松脂膏　治肉刺

　松脂　白膠香各一兩　黃蠟半兩

右於火上熔成膏冷貼用物紮定

無食膏　治肉刺

　無食子二枚　肥皂角一个

右燒令烟盡細研以釅醋於砂盆内研皂角如
糊和末敷之立效

薰硫散　治肉刺

　薰陸香　石硫黃

右等分研勻塗肉刺上以燒鐵烙之效

蟾酥膏　治肉刺

　蟾酥伍片湯浸　膩粉二錢

右將蟾酥於盒子中以膩粉同和令勻先用針撥
破頭邊然後塗藥密裹之

瘍科證治準繩卷之四

瘍醫準繩卷之五

金壇王肯堂輯　門人新安閔承詔校

諸腫

無名腫毒者不拘於頭面手足胸腹等處焮赤腫硬結核疼痛又名腫瘍又名虛瘍也但腫無頭無面者俱是也腫勢盛者以棱針刺去惡血切不可以火針烙之　惡寒發熱或頭疼或拘急宜表散之以荊防敗毒散　腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯　無表裏證腫勢盛者以兩面鏡散　若暴發赤腫切不可以針破只宜以洗腫方淋洗以入仙膏解毒丸等藥涂之　易忌切即用金腦香葉同茶柏搗爛焮服以渣敷患處以汁搽患處　凡狀若發紅如桃李之大紅赤焮痛不能行動此名痴瘊用芙蓉葉搗酒炒縛爛者以蝦尾發火攢存性為末用麻油調搽即愈大效　紅游疔瘍用魚芭子根煎水入酒和服又以木芙花葉赤子藥搗爛有熱者以追疔奪命湯加雞屎子雞腸根　手背腳背臍大有赤腫如斑之狀名痴猴發也用油炒鹽糟令香以熱湯淬之泡湯乘熱淋洗之即消要服排毒藥　膝內膝近腿縫一處結核腫痛但核形長如魚之狀名上水魚以棱針亂刺去惡血以杉枯雷廷藤山梔子葉搗糟炒縛之又用山雷廷藤亦作腫山蘇木杉枯搗鹽糟炒縛又方雷藤鷄屎藤根皮搗糟炒縛之又方魚芭子杉枯搗糟炒縛之又方山雷廷根皮杉枯搗糟炒縛及用七厘膏敷之却以九金六馬散服之　遍身起如風疹疥丹之狀其色白不痛但搔痒抓之起白泡名曰蛇虱用油搽吊肥株山梔子葉柳樹葉柏葉煎水入些醋洗之又方只用柏葉一味煎水洗更速也要服苦參丸蠟礬丸金銀皂角丸　腳背或腳趾腫痛不可忍以腳高懸起其疼方止些若以腳垂下其疼不可當也名曰御枚腫瘍先用兩面鏡一味煎酒服次服兩面鏡散如不應以蛇蓿磨酒服大效　耳中疼痛不可當者名曰腦果虛瘍宜以金腦香根或葉搗爛入井水少許濾去渣入片腦半分研勻滴入耳中即效又用根磨薄荷湯入少酒和服又用金雞舌苦參青木香金鳳尾搗水入片腦少許和勻濾淨滴入耳中又服兩面鏡散及以木瓜子根煎水入酒和服　紫遊風用紫茶根皮搗水刷又方加紅心蜈蚣小金錢草馬蹄草金鶯葉尾搗水入些醋爆刷之

附方

兩面龜散　治一切腫瘍焮赤無名腫毒疼痛者

兩面龜　雞屎子　雞肶根

詐死子　真珠美　山烏豆

紫金皮　脫殼藤　魚𣏌根

山淡豉　連叉大青　浴地雞肶

右水煎入酒和服　發熱加水圹根吉面消　骨裏痛加紫金藤馬蹄金鉄馬鞭　又方加白木待根山芙蓉根山芋根川山蜈蚣

雞屎子散　治虛瘍

雞屎子　詐死子　冬青根

楊香根　右水煎入酒和服

退熱消毒散　治無名腫毒發熱者

雞屎子　雞肶根　水圹根

臭木待　白根子　山烏豆

苦花子　紫金藤　金腦香

吉面消　連叉大青　落鵶爪藤

大葉小青　過山龍梗　大葉金凉傘

右薄荷煎服

天花刮毒散　治一切腫毒焮赤疼痛

天花粉　黄檗各叁兩　南星

亦勻藥　黄芩叉各壹兩

為末井水調入些醋和煖刷患處夏月冷刷亦可

退腫消核散　治一切無名腫毒及結核亦腫者

艮脚根肆兩　紫金皮　樟柳根各壹兩

右為末用毛屎梯葉末取汁調黄芩薄荷金腦香金鳳尾地薄荷赤贇子屍池葉不拘一二味取葉擂米泔水入醋少許調勻煖刷　又方單用艮脚一味為末以生赤樟柳根磨米泔調塗更妙

消腫切毒散　治一切無名腫毒虛瘍等毒

毛屎梯葉柒分　雞屎子葉叁分

右末用米泔水調溫刷

又方　生樟柳根為末米泔水調溫刷或以毛屎梯葉同刷亦妙

丹卒腫起大痛芫青根大者杵之和苦酒如泥煮三沸帛上包之葛氏　風毒腫三年苦酒濃煎葱白以布包熨腫上外臺秘要　治一切熱毒腫商陸根和鹽少許傅之日再易孫真人食忌　治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻仁傅之立效肘後　治[illegible]炒黄杵細以香油和如泥再炒令焦以故布如腫之大小攤之貼腫上勿開頭搭上外臺秘要　治惡刺及狐狸刺

上如腫取蒲公英草根自汁傅之多年之瘡余七月十
五日夜左手中指背指着庭木痛不可忍十日後瘡
日深漸高大痛欲死用此而安 方孫
經患熱腫水研山豆根濃汁塗乾再塗
行臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝貳升投湯中
攪散掛北簷下俟硝滲出罐外刮收之以人乳汁調
半盞掃一切風熱毒氣攻注目瞼及發頭面四肢腫
痛應手神効
山腫毒或疼痛處以赤小豆爲末水調傅頻換或用
香白芷水調傅尤妙　又方白芙蓉葉晒乾同皂角

爲末水調傅
凡治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調傅以帛裹於
痛處火灸皮鞋底熨之妙 方經驗
治一切赤腫但癰毒結未成者並可消
右用黃蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得
所將絹帕子裹定旋挹所餘汁撲腫所四畔數撲
之
犀角飲　治諸風腫
犀角壹錢鎊　玄參　連翹
柴胡去苗各半兩　升麻　木通各錢半

芒硝生用　麥門冬去心各　沉香
檀香　射干　甘草炙各貳錢半
右剉碎每服伍錢七水壹盞半煎八分去滓食
後溫服及夜食後各一服利多卽減一名犀角湯
無檳香
發風散　治諸瘡因風致腫
羌活　防風　白芷
吳茱萸　細辛　當歸
芍藥　芫花　官桂各等分
右爲麁末作壹劑赤皮葱連鬚細切半斤同醋
拌勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之稍冷卽換藥再

熨之上下痛止
蠶沙熨方　治風腫
晚蠶沙　鹽各不拘多少
右相和炒熱布裹熨之冷卽再炒各入醋少許尤
佳
水沉膏　治熱腫痛大効
大黃　黃蘗　鬱金
天南星　白芨　朴硝
黃蜀葵花各壹兩

右爲細末每用新水壹盞半藥末貳錢攪調勻候
澄底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如急
燥津唾潤之此藥除熱毒赤腫神効如皮膚白色
者勿用之

○石癰石疽 謂癰疽腫鞕如石久不作膿者是也

犀角湯 治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角鎊 木香各壹錢半 連翹
梔子仁 射干 當歸切焙
升麻 赤芍藥 玄參
枳殼麩炒 甘草生各壹兩 大黃炒貳兩

右剉碎每服叄錢水壹盞煎至陸分去滓不拘時
溫服

黃連散 治石癰結硬發熱紫赤色毒氣攻衝未定
日夜疼痛宜用此消腫化毒止痛

黃連 川大黃生 白歛
馬牙硝 黃蘗各壹兩 麒麟竭
青鹽各半兩 赤小豆半合炒熟 杏仁肆拾玖粒湯浸去皮

右爲細末蜜水調塗乾即易之

大黃散 治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣暢

川大黃壹兩炒 川芒硝 黑豆皮
枳殼去瓤麩炒各半兩 牛蒡子微炒 當歸
芎藭各貳錢半 甘草半兩生剉

右剉碎分作三服每服水壹盞煎至伍分去滓不

拘時温服以利為度

治石癰堅如石未作膿者

右用生商陸根不拘多少熟搗傅之乾即易取軟為度及治濕漏諸瘡癤等城人用此方取効者多

沉香湯　治石癰腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急不得臥

沉香　防風去叉　木香各柒錢半

麥門冬去心　當歸切焙　枳殼麩炒

獨活去蘆　羚羊角屑　升麻

玄參　地骨皮　赤芍藥

甘草炙各半兩　大黄剉炒各一兩

右剉碎每服四錢水一盞煎至柒分去滓不拘時温服

瘭疽　瘭疽

瘭疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久使四面悉腫皰黯熟紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐脉入臟殺人南人名為搨著毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黄龍湯諸單方治專去其熱取瘥其病喜著十指故與代指相似人不識之呼作代指不急治之亦逐脉上入臟殺人南方人得之皆斬去其指初指頭先作黯疱後始肺赤黑黯瘆痛入心是也

治瘭疽秘方

射干　甘草　枳實

升麻　乾地黄　黄芩各壹兩

麝香貳分　前胡叁分　犀角陸分

大黄拾分

右十味㕮咀以水玖升煮取叁升下大黄一沸去滓內麝香分三服瘥止不限劑數此方世所不傳神良無射干以白薇代無犀角以升麻代黄芩

射干散　治瘭疽及肉中忽生點子如麻豆大或如

桃李腫痛不可忍

射干　川升麻　貫衆 剉炒

川大黃 剉炒　甘草 炙 各壹兩

前胡 去蘆 各半兩　羚羊角屑 半兩　麝香 細研 貳錢半

右剉碎入麝香令勻每服肆錢水壹中盞煎至陸

分去滓不拘時溫服

丹砂膏　治瘰癧

丹砂 細研　射干　大黃 剉炒

犀角屑　前胡 去蘆　升麻

芎藭　黃芩 去黑心　沉香

木香 各壹兩　生地黃 貳兩　麝香 貳錢半 研

豬脂 貳斤

右除丹砂麝香豬脂外剉碎以酢半升和勻浸一

宿先熬豬令沸次下諸藥煎候地黃赤黑色以綿

絞去滓入丹砂麝香末以柳篦攪勻瓷盒盛傅患

處日三五上又取棗大以溫酒調空心日午服一

方溫水調下半匙

治瘰癧潰指頭破成瘡痛痒方 千金翼名豬蹄湯

白芷　大黃　芎藭

黃芩　黃連　甘草

細辛　藁本　當歸 各

蒺藜　莽草 各壹兩

右十一味㕮咀以水貳斗先煮豬蹄壹具取壹斗

煮藥取伍升洗瘡即差

又方

竈屋塵　竈突墨　釜下土 各壹升

右三味合研令勻以水壹斗煮三沸取汁洗日三

四度

治瘰癧著手足肩背忽發累累如赤豆剝之汁出者

方

鯽魚 長五寸去腸　亂髮 雞子大　豬脂 壹升

右三味煎為膏傅之

又方　蕪菁子擣碎布裹展轉傅上良

又方　以麻子熬作末傅上良

又方　以豬脂傅之良

又方　亂髮灰服方寸匕日三亦治發背

又方　煮蕪菁菜取汁壹升服之并食乾熟蕪菁數頓

少與鹽醬冬月研子水和服之

又方　枸杞根升葵根葉煮汁煎令如糖隨意服之

治瘰癧潰後方

以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良
又方　牛耳中垢傅之良
又方　梁上塵和車缸中脂傅之
又方　以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出
治瘑似癬而小有異膿如小豆汁今日去明日滿者方
芸薹熟擣濕布袋盛之埋熱灰中更互熨之不過再三度處瘥冬用乾者
又方　皂莢煎湯洗瘡拭乾以蘗皮爲末傅之勿令作痂

治瘑卒着五指筋急不得屈伸者方
灸踝骨中央數十壯或至百壯

反花瘡

翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致或瘡口胬肉突出如菌大小不同或出如蛇頭長短不一治法當滋肝補氣外塗藜蘆膏胬肉自入須飲元氣漸復膿毒將盡塗之有效不然雖入而復潰若誤用刀針蝕藥灸火其勢益甚或出血不止必致寒熱嘔吐等症須大補脾胃爲善　判官張承恩內股患癰將愈翻出一肉如菌余曰此屬肝經風熱血燥當清肝熱養肝血彼謂不然乃內用降火外用追蝕而復翻翻而復蝕其肉益大元氣益虛始信余言遂內

用柴胡清肝散外用藜蘆膏而瘥　一上舍素膏粱善怒耳下結一核從潰而瘡口翻張如菌焮連頭痛或胸脇作脹或內熱寒熱或用清熱消毒之藥年餘未瘥余用補中益氣湯六味地黃丸而尋愈　一男子背瘡斂如豆許翻出肉寸餘用消蝕割繫法屢去屢大此肝經血虛風熱余用加味逍遙散三十餘劑塗藜蘆膏而消又用八珍散倍用參芪歸朮而斂
一婦人素善怒臂患癤瘡口出肉長二寸許此肝脾鬱怒氣血虛而風內動用加味逍遙散塗藜蘆膏而愈後因怒患處脹悶遍身汗出如雨此肝經風熱風

能散氣故耳仍用前散并八珍湯而愈　一男子項患腫痰涎涌甚用散堅行氣等劑腫硬愈甚喘氣發熱自汗盜汗體倦食少余曰此屬足三陰虧損當滋化源不信反追蝕患處開翻六寸許嘔吐血赤日出鮮血三月餘矣肝脈弦洪緊實余用大補湯加麥門五味五十餘劑諸症漸愈血止三四復因怒飲食頓少其血湧出此肝傷不能藏脾傷不能攝也用補中益氣湯為主加五味麥門其血頓止再以六味丸加五味子常服瘡口斂至寸許遂不用藥且不守禁而歿

反花瘡

黎蘆膏　治一切瘡疖胬肉突出不問大小長短用黎蘆一味為末以生豬脂和研如膏塗患處周日易之

臘脂散　治反花瘡

臘脂　貝母　胡粉各壹分

硇砂　沒藥各半分

右研細先以鹽漿水洗拭後傅藥

甘草傳方　治反花瘡

甘草半生半炒　禁石灰　人中白

密陀僧兩各一

右為細末以童子小便半盞以無灰火熬用竹篦攪成膏取塗瘡上日五次

惡實根塗傅方　治反花瘡並諸惡瘡積年不瘥者

惡實根淨洗木臼搗　豬脂

右調和如糊塗瘡上日三四次

諸瘡胬肉如蛇頭出數寸者硫黃末傅之即縮

瘡有肉突出烏梅燒灰為末傅之立盡　又以白梅肉杵細入蜜捏成餅如錢大貼之妙

一治反花瘡馬齒莧一斤燒灰細研豬脂調傅

一瘡凸出寸許根如小豆或大如梅者用花脚蜘蛛絲纏其根則漸乾而自脫落

反花瘡

多骨疽

【薛】多骨疽者由瘡瘍久潰氣血不能營於患處邪氣陷襲久則爛筋腐骨而脫出屬足三陰虧損之症也用補中益氣湯以固根本若陰火發熱者佐以六味丸壯水之主以鎮陽光陽氣虛寒者佐以八味丸益火之源以消陰翳外以附子餅葱熨法祛散寒邪補接榮氣則骨自脫瘡自斂也夫腎主骨若腎氣虧損其骨漸腫荏苒歲月潰而出骨亦用前法若投以剋伐之劑復傷真氣鮮有不誤者　舉人于廷器腿患流注年餘出腐骨少許午前畏寒午後發熱口乾唾

痰小便頻數余以為足三陰虧損朝用補中益氣湯夕用六味丸料加黃芪當歸五味子各三十餘劑外用豆豉餅諸症漸愈又以十全大補之類喜其慎疾而愈　一儒者患附骨疽失於調補瘡口不斂日出清膿少許已而常出三腐骨其脈但數而無邪此氣血虛瘡結膿管而不能愈經以烏金膏日服十全大補湯而愈　上舍王廷璋患前症三年未愈股體消瘦飲食難化手足並冷大便不通手足陰冷余謂此陽氣虛寒用補中益氣湯八味丸仍灸其患處而瘡　一男子腰腳腫年餘左潰內熱作渴股體消瘦

六脈洪大左手尤甚用補中益氣湯六味丸出腐骨一塊仍服前藥而症悉去瘡口亦斂　一男子十六歲足跗腫潰而露骨體瘦倦怠發熱口乾用十全大補湯六味地黃丸各五十餘劑而愈不然多變瘵症或遺毒氣血而亡　一男子自十四歲腳足腫痛服流氣飲外敷寒涼藥潰而至十八歲口開張足背漫腫黯黑骨露出形體消瘦盜汗不止發熱口乾燥天真已喪用十全大補湯六味地黃丸各五十餘劑元氣漸復患處漸赤脫落骨一塊又各五十餘劑始愈　一婦人年三十餘先左手背漸腫二年後

潰出清膿腫黯作痛內熱晡熱自汗盜汗經水兩月一至此肝脾氣血虧損朝用歸脾湯夕用逍遙散腫處頻用葱熨法兩月餘諸症漸愈瘡出腐骨仍服前藥前後共六百餘劑得愈

時毒

時毒者，為四時邪毒之氣感之於人也。其候發於鼻面耳目，焮赤腫痛，頭面咽喉頸項亦腫，或漫腫無頭，或結核有根，令人憎寒發熱頭痛，或肢體痛，恍惚不寧，咽喉閉塞，時人不識，謂之傷寒，便服解熱之劑，一二日間，腫勢及益增，始知藥誤。原夫此疾古無方論，初發狀如傷寒，五七日間乃能殺人，若延至十日之外者，不治自愈也。五日以前精神昏亂，咽喉閉塞，語聲不出，頭面益腫，食不知味者，必死之候，治之無功矣。然此疾有陰有陽，有可汗有可下，粗工不識，但云熱毒，只用寒涼之藥，殊不知病有微甚，治有逆從，不可不審也。

脈浮數者，邪在表也，用葛根牛蒡子湯、犀角升麻湯、升麻牛蒡子散之類以發之。脈沉實而便秘者，邪氣在裏也，宜梔子仁湯。脈沉澀者，邪氣入深也，宜漏蘆湯、大黃湯。表實而不解者，散之以芩連敗毒散。裏實而不利者，下之以五利大黃湯。表裏俱實而不解者，解表攻裏以通聖消毒散。表裏俱解而不消者，和之以劫瘡消毒飲。腫甚焮痛者，砭去惡血，更用消毒之劑，以普濟消毒飲，次用七神散。頭面耳目赤腫作痛，咽乾發熱，脈浮數，以荊連敗毒散，次以劫瘡消毒散、七神散。腫痛發熱作渴，脈實便秘者，以五利大黃湯，次以消毒犀角飲。又次以水邊嫩柏根水煎入酒和服。腫痛發熱脈浮數，以芩連敗毒散，次以退熱消毒飲，又次以七神散。焮腫脹痛，作渴寒熱，便秘脈數，按之尤實，以通聖消毒散，次以芩連消毒散，又次以七神散。腫勢已成，大熱脈實者，先宜砭去惡血，次以洗瘡散洗之，消腫散刷之，却以蛇不見根同白梅搗傅牙斷，含去涎，初服追疔奪命湯，次服七神散、萬病解毒丸。表邪已解，腫尚不退，脈滑而數，乃欲作膿也，以托裏

消毒散潰之。若脈浮數或洪數者，不可托之，只宜消之，以馬藺子根水煎服，又方以苦楝根水煎服，及用鐵箍散服之。又宜於鼻內搐通氣散，取十餘嚏作效。搐藥不嚏者不可治，如嚏出膿者，治之必愈。左右之人每日用嚏藥搐之，必不傳染，其病人亦每日用嚏藥三五次，以泄熱毒，此治時毒之良法也。經三四日不解者，不可大下，猶宜和解之，犀角連翹散之類。至七八日大小便通利，頭面腫起高赤者，可服托裏散、黃芪散。

醫案

一人頭面腫痛，服消毒攻毒之劑愈甚，診之脈

浮數邪在表尚未解用荊防敗毒散二劑勢退大半更以葛根牛蒡子湯四劑而痊經云身半已上天之氣也身半已下地之氣也乃邪客心肺之分上攻頭目而為腫此感四時不正之氣也與膏粱積熱之證不同硝黃之劑非大便秘實不可用若不審其因及辨其虛實表裏概用攻之必致有誤常見饑饉之際芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之不可不察　一人腫痛發寒熱脈浮數以荊防敗毒散二劑少愈再用人參敗毒散二劑勢減半又二劑而痊　一人耳面赤腫作痛咽乾發熱脈浮數先以荊防敗毒散二劑勢退大半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一人冬月病頭面赤腫耳前後尤甚痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥醫從腫上四五十針腫赤不減痛益甚予診其脈浮緊按之洪緩知為寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫且夫天令寒凜之時腠理閉汗不出血氣強肉堅濇善用針者不得取四厥必待天溫又云冬月閉藏用藥多少針石也宜以苦溫之劑溫經散寒所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之方名

托裏溫經湯

麻黃（苦溫發之為君　去根節　貳錢）　防風（辛溫散之　去蘆　貳錢）

升麻（肆錢）　葛根

白芷　當歸身

蒼朮

人參（去蘆　壹錢）　甘草　白芍藥（酸微寒）

氣使托其裏……佐各壹錢半

右剉每服壹兩水貳盞先煎麻黃令沸去沫再下餘藥同煎至壹盞去相滓熱服訖以薄衣覆首厚被覆身卧於暖處使經血溫腠理開寒乃散陽氣升大汗出腫減七八分再服去麻黃防風加連翹鼠黏子腫痛悉愈經言汗之則瘡已信哉

郭氏升麻牛蒡子散　治時毒瘡疹脈浮洪在表者瘡發於頭面胸膈之際

升麻　牛蒡子　甘草

桔梗　葛根　玄參

麻黃（各壹錢）　連翹（貳錢）

右㕮咀每服叁片水貳盞作一服

又方　治時毒

升麻　赤芍　乾葛

青木香　甘草　防風
白芷　荊芥　牛蒡子
桔梗　金銀花　玄參
麻黄　連翹　藍葉
右薄荷煎服
芩連敗毒散　治時毒腫痛發熱左脉浮數者
防風　荊芥　黄連
黄芩　連翹　羌活
獨活　柴胡　前胡
川芎　桔梗　藍葉
玄參　牛蒡子　升麻
赤芍藥　金銀花　白芷
甘草　乾葛　青木香
右生薑薄荷煎服　發熱無汗加麻黄
葛根牛蒡湯　治時毒腫痛而便利調和者
葛根　貫衆　甘草又名國老
豆豉　牛蒡子半生半炒各貳錢
右水煎服
返魂丹　治時毒瘡氣疔瘡惡瘡
朱砂　雄黄　血竭

黄丹　穿山甲炮　白礬少
銅青　乳香　没藥
輕粉　蟾酥各壹錢　麝香[illegible]
右爲末酒煮麪糊丸如胡椒大每服貳丸葱白壹根嚼爛裹丸溫酒吞下
攷案　一人患此腫痛發熱作渴脉實便閉以五利大黄湯下之諸證悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊
一人表散藥愈熾發熱便秘診脉沉實此邪在裏也以大黄湯下之裏症悉退以葛根牛蒡子湯浮腫亦消惟赤腫尚存更以托裏藥潰之而愈
漏蘆湯　治時毒頭面紅腫咽喉閉塞水藥不下若素有臟腑積熱發爲腫毒疙瘩一切腫瘍惡瘡便實者
漏蘆　升麻　大黄
黄芩　甘草　藍葉
牛蒡子　玄參　桔梗
連翹　青木香　苦參
右薄荷煎服
五利大黄湯　治時毒焮赤腫痛煩渴便秘脉實數者大効　加連翹玄參大青甘草名梔子仁湯

大黃　黃芩　升麻
梔子　芒硝
右薄荷煎服
加減解毒丸　治時毒疔瘡疽氣瘡疽發背無名腫毒解砒霜毒光粉毒風犬毒惡虵毒惡犬毒蜈蚣毒百蟻毒蜂蠆毒蘭菸毒惡瘡等可以磨服可以磨塗大效如神
五倍子（炙兩）　山茨菰（去毛兩）　大戟（去蘆兩半）
朱砂　雄黃（三錢）　麝香（半錢）
續隨子（去殼去油一兩）

右為末糯米粉為糊杵擣為丸印作錠子陰乾每服一錠井花水磨化服冬月薄荷湯磨化服一切腫毒米泔水磨塗或用芙蓉葉擣汁磨塗更妙凡修合此藥要端午七夕重陽日或遇天德月德日天醫日最佳合時要淨室焚香至誠修製勿令孝婦雞犬見之効驗不可具述
羅　時毒疙瘩漏蘆散　治臟腑積熱發為腫毒時疫疙瘩頭面洪腫咽嗌堵塞水藥不下一切危惡疫癘
漏蘆　升麻　大黃

黃芩（酒洗）　藍葉　玄參（各二兩）
右為粗末每服貳錢水煎腫熱甚加芒硝貳錢半
消毒丸　治時毒疙瘩惡證
大黃　牡蠣（煆）　白僵蠶（炒各一兩）
右為細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時內加桔梗芩梔子湯尤妙
發表攻裏　一人頰腫腮痛作渴頭疼便秘脈數按之沉實用防風通聖散一劑諸證頓退以荊防敗毒散加玄參牛蒡黃芩二劑而瘥　一老人冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脈實此表裏俱實之證用防風通聖散

不應遂砭患處出黑血仍投前藥即應又以荊防敗毒散而瘳蓋前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達故也惡血既去其藥自効或拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而用托裏與夫寄宿消毒之劑或不砭泄其毒專假藥力鮮不危矣　海藏云疫毒頭腫者甘桔湯加鼠粘子大黃芒硝
防風通聖散　治時毒焮腫便秘熱燥若時毒饑饉之後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用
防風　當歸　川芎
芍藥　大黃　芒硝

連翹　薄荷　麻黄

桔梗　石膏　黄芩各壹兩

白术　山梔　荊芥各貳錢伍分

甘艸貳兩　滑石壹兩

右水煎服或為末白湯調下仍量人虛實

通聖消毒散　治時毒腫痛表裏俱實者

防風　荊芥　連翹

赤芍藥　當歸各　黄芩

麻黄　梔子　青木香

黄連　黄檗　石膏

滑石　大黄　朴硝

牛蒡子　川芎　桔梗

玄參　黄芩　甘草

右薄荷煎服　大便利去大黄朴硝

半表半裏中和湯　治時毒脉浮在半表半裏者

葛根　牛蒡子　川芎

羌活　防風　漏蘆

荊芥　麥門冬　前胡

甘草各等分　右㕮咀每服壹兩水煎

按此出足太陽陽明例藥也

內托　一婦頭面俱赤腫焮痛甚盛其脉浮數此形證俱在表也以平昔胃氣有損不可用發表之劑宜用潔古法托裏以防邪毒之內侵作內托復煎散一劑終日飲之兩日而平

內托復煎散見前癰疽門

治驗　泰和年東垣監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅伐無過殊不知適其病所為故遂處方用黄連黄芩味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠黏子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃白殭蠶味苦平散腫消毒定喘以為佐新升麻柴胡苦平行後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也

此却為客邪當為急去之是治客以急也且治主當緩
者謂陽邪在上陰邪在下各為本家病也若急治之
不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩
也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陽
分受陰邪陰分受陽邪客也凡所謂客者當急去之
此治急以客也　假令少陽陽明之為病少陽為邪
者出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃
連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用
大黃或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香㕮咀煎
去渣內芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微

利及邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第
用之取大便利邪已即止如陽明渴者加石膏少陽
渴者加瓜蔞根湯陽明行經加升麻葛根芍藥之類
太陽行經加羌活防風荊芥之類選而加之並與上
藥均合不可獨用散也[illegible]

芩連消毒飲　治時毒發熱惡寒頭項腫痛脉洪數

防風　荊芥　連翹
柴胡　黃芩　川芎
羌活　桔梗　藍葉
射干　白芷　牛蒡子
黃連　甘草　南木香
金銀花　右薄荷煎服

治驗　一婦表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃
瘀血作膿也以托裏消毒散潰之而愈　一婦腫痛
用硝黃之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退亦
瘀血欲作膿亦以前藥潰之愈　一人表裏俱解惟
腫不消以托裏消毒散四劑膿成針之而愈　少宰
李蒲汀用發散之藥托損元氣患處不消體倦惡寒
食少口乾用補中益氣加桔梗及托裏消毒散而愈
秋官陳同野元氣素弱脉微細而伏此形病俱虛
也用參朮芎歸陳皮柴胡升麻炙甘草以升舉陽氣
用牛蒡玄參連翹桔梗以解熱毒二劑腫頓消而脉
亦復矣苟以脉微細為屬陰以腫赤為屬陽而藥之
鮮有不誤者　一婦人潰後腫赤不消食少體倦膿
清色白乃脾肺氣虛也先用六君加桔梗芎歸後用
益氣湯加桔梗而斂

搐鼻通氣散　治時毒腫痛咽喉不利取嚏以泄其毒

玄參[illegible]　豬牙皂角　川芎[illegible]
北細辛　藜蘆　草烏頭　羊躑躅花

右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為度一日二次

流注

薛流注之證或因飲食勞倦脾胃傷損或因房勞陰虛陽氣湊襲或因營氣不從逆於肉理或因腠理不密外邪客之或暴怒傷肝或鬱結傷脾或濕痰流注或跌撲血滯或產後惡露皆因氣血凝滯而成也或生於四肢關節或生於胸腹腰臀或結塊或漫腫或作痛皆元氣虧損所致也宜急灸及用益氣養榮湯固其元氣則未成者自消已成者自潰若久而不斂佐以豆豉餅琥珀膏祛散寒邪補接陽氣若內有膿管而不斂者用針頭散腐化之經云形傷痛氣傷腫又曰真氣奪則虛邪氣盛則實若不補氣血節飲食慎起居戒七情而專用寒涼剋伐其不死者幸耳

黃不串流者俗曰馬疳串流者名曰走散流注俗曰瓜藤馬疳外形微腫骨節內疼其名曰蝲骨馬疳若遍身骨節內疼痛不能起坐無堆竹熱不退者亦曰蝲骨馬疳名脊骨及髀骨上起堆或一二个或三五个名曰過脊馬疳若尾骶骨上起堆作熱者名曰殺着馬疳若髀骨下痛其無堆但腫者名曰鎖脚馬疳若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬疳此證因風熱走散四肢治當疎風散熱初起不補用火針烙之腫勢盛者只宜刺以破針久患者可火針烙之流注入股者死　傷寒餘邪未盡者和解之以人參敗毒散次以小柴胡合二陳湯加羌活川芎枳殼當歸白朮　暴怒所致胸脇不利者調氣為主宜方脈流氣飲　抑鬱所致而不痛者宜調經脈補氣血益氣養榮湯　腫硬作痛者行氣和血宜療科流氣飲　潰而不斂者益氣血宜人參養榮湯十全大補湯　脾氣虛濕熱凝滯肉理而致者但腫一塊不痛肉色不變飲食少思宜健脾除濕六君子湯加芎歸黃芪白芍肉桂　閃朒瘀血凝滯為患者和氣血調經絡宜方脈流氣飲次以二陳合四物加香附烏藥桔梗　寒邪所襲筋攣骨痛或遍身痛宜溫經絡養氣血宜大防風湯及五積散合敗毒散加川牛膝杜仲或獨活寄生湯次以四物湯加黃芪羌活杜仲　病尚有潮熱者表有實邪未盡散宜榮衛返魂湯加乾葛升麻紫蘇川芎獨活蒼朮煎服　如無潮熱用榮衛返魂湯加獨活酒水各半煎服　接骨馬疳用穿山蜈蚣白田柯名楠藤山良薑九節香紫金皮倉朮黃芪木瓜明礬熱淋洗之却服續骨散九金六馬散

起堆核數枚但小些名馬疔又名馬鈴用紫金錘

紫金皮紫河車天南星磨醋燉塗又用紫金皮紫金藤紅內消馬蹄香馬蹄膝煎酒服　鎖腳馬蹄用野芋子根馬蹄黃梨盧子紫河車山枇杷根皮山布瓜根紫金皮搗爛鹽糟炒縛又以燕水煎淋洗之却服輕脚散九金六馬散　嘲骨馬旗用紫金皮石楠藤川柯溪風根九節香煎水淋洗却服嘲骨散九金六馬散四味浸酒方　過脊馬旗用山枇杷根皮小桁子根皮大門冬天南星仙人掌根山布瓜以凌霄根皮佛桑花馬藍草野芋子根大亦毛桃根

皮赤芍根皮搗爛半酒半醋調燉刷在封瓜藤馬旗並効却服獨聖散九金六馬散　瓜藤馬旗用山布瓜根多子根皮楊柳根紫金皮紫金鎖落鶏錢根七香大花粉根白芙蓉葉凌霄根皮溪楓根皮亦毛桃根皮搗爛鹽糟炒縛之又方山布瓜根烏谷根紫河車黎盧子馬鞭紫金皮山枇杷根皮凌霄根皮佛桑花落鶏鍋根白田柯搗爛鹽糟炒縛之又方山布瓜根紫金皮溪楓根皮搗爛酒炒縛之此方馬旗並大効却服九金六馬散四味浸酒方又用洗腳方煎淋之　殺若馬旗用紫河車山枇

杷根皮黎盧子山布瓜根凌霄根皮佛桑花烏药合根石蒜搗爛醋調刷香封用洗腳方淋洗却以九金六馬散獨聖散服之　諸馬旗有熱者用去熱散有表者用荊防敗毒散有裏者用內踈黃連湯有表復有裏者用追疔奪命湯却用水仙搗爛縛核膝上即効　馬旗有熱未成膿藥即能退之若已成者但要出膿其熱即退若生堆核四五个只一二个未成膿餘者皆已出膿其熱亦不能退要五个盡出膿熱方退也　若潰爛者即係潰瘍宜查本門治之

一人因怒脇下作痛以小柴胡對四物加青皮

桔梗枳殼而愈　一人臀腫一塊微痛脉弦緊以瘡科流氣飲四劑而消　一人因怒脇下腫痛胸膈不利脉沉遲以方脉流氣飲數劑少愈以小柴胡對二陳加青皮桔梗貝母數劑頓退更以小柴胡二十餘劑而瘥　一婦因悶肋有患腫遍身作痛以黑丸子服而痛止以方脉流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香附枳殼桔梗而愈　一婦腿患筋攣骨痛諸藥不應脉遲緊用大防風湯一劑頓退又一劑而安　又一婦患之亦然先用前湯二劑更服黑丸子而痊此二患若失治潰作敗症　一婦禀弱性躁

脇脅腫痛胸膈痞滿服流氣敗毒反發熱少食用四七湯數劑胸寬氣利以小柴胡對四物加香附陳皮腫痛亦退　一人腿患潰而不斂用人參養榮湯及附子餅灸更以補劑煎膏貼之兩月餘愈　一人脾氣素弱臂腫一塊不痛肉色不變飲食少思半載不潰先以六君子加芎歸炒藥二十餘劑飲食漸進更以豆豉餅日灸數壯十前柴再加黃芪肉桂三十餘劑膿潰針去以十全大補湯及附子餅灸之月餘而愈　一人腿腫肉色不變不痛脉浮而滑以補中益氣湯加半夏茯苓倍殺木香飲之以香附餅熨之彼

謂氣無補法乃服方脉流氣飲愈虛始用六君子湯加芎歸數劑飲食少進再用補劑月餘而消　夫氣無補法世俗論也以其為病痞滿壅塞似難為補殊不知正氣虛不能運行則邪氣滯而為病不用補法氣何由行乎　一人臂肺筋攣骨痛年餘方潰不斂診脉更虛以內塞散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸而愈　精要云留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰多成瘻宜早服內塞散排之　一人腿腫一塊經年不消且不作膿飲食少思強食則脹或作瀉日漸消瘦診脉微細此乃命門火衰不能生土以

致脾虛而然也遂以八味丸飲食漸進腫患亦消　一人背髀患之微腫形勞氣弱以益氣養榮湯間服黑丸子及木香生地黃作餅覆患處熨之月餘膿成針之仍服前藥而愈　一人腿患久而不斂以大補藥及附子餅以針頭散經之而愈　一人背患年餘尚硬飲食少思朝寒暮熱以八珍湯加柴胡地骨皮牡丹皮月餘寒熱少止再用益氣養榮湯附子餅灸兩月餘膿成針之更服人參養榮湯半載而愈　一婦腰潰清稀脉弱惡寒久而不愈服內塞散灸附子餅而瘳

一人臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脉浮大而澀乃氣血俱損須多服生氣血之劑庶可全彼謂火尚未盡乃用涼藥內服外敷幾危求治其形甚悴脉愈虛先以六君子加芎歸月餘飲食漸進以八珍湯加肉桂三十餘劑瘡色乃赤更以十全大補湯外以附子餅僅年而差　一人傷寒表邪未盡股內患腫發熱以人參敗毒散二劑熱止灸香附餅又小柴胡加二陳羌活川芎歸朮枳殼數劑而消　侍御朱東溪左脇下近腹肝膽經部分結一塊兩寸許漫腫不赤按之則痛余曰此當補脾胃彼謂腫瘍宜表散乃服流氣飲後胃氣頓虛始信余言遂用四

君子加芎歸酒炒芍藥薑桂胃氣復而惡症退乃去
乾薑加黄芪數劑微赤微痛又三十餘劑脉勝大痛
此膿内潰也遂針之用補中益氣湯加減八味丸而
愈　一男子脇腫一塊日久不潰按之微痛脉微而
濇此形氣俱虚當補不當瀉乃用人參養榮湯及熱
艾熨患處膿成以火針刺之用豆豉餅十全大補湯
百劑而愈　一婦腰間患一小塊肉色如常不潰發
熱予欲治以益氣養榮解鬱之劑彼却別服流氣飲
後針破出水年餘而殁　一婦久不斂忽發寒熱予
決其氣血俱虚彼反服參芪之劑果發大熱亦殁

一人元氣素弱患此胸膈不利飲食少思予欲健脾
解鬱養氣血彼反服木香流氣飲之劑致腹脹又服三
稜蓬朮厚朴之類飲食少四肢後腫兼腰腫一塊不
潰而殁　一婦患此不消兩月或一月一至四肢腫飲
食少日晡發熱口乾體倦此氣血虚也用養脾滋氣
血藥飲食進則瘡腫自消元氣復則經水自調彼以
爲緩用峻劑先通經果腹痛瀉不止遍身浮腫飲食
少沒於木旺之月　一人年逾三十小腹腫硬逾年
成瘡頭破時出血水此七情所傷營氣逆于肉理也
名曰流注診之肝脉濇盖肝病脉不宜濇小腹正屬
肝經須濇傷金脉退乃可予欲以甘溫之藥補其氣
血令自消潰彼不信乃服攻伐之藥氣血愈虚果殁
于金旺之月　一男子腹患此腫硬不潰脉弱時嘔
欲用敗毒等藥令内消腫硬不潰乃陽氣虚弱嘔吐少
食乃胃氣虚寒當溫補脾胃彼不信仍用攻伐而
嘔愈甚復請治脉微弱而發熱余以熱而脉反洪脫
血脉反實汗後脉反躁者皆爲逆也辭不治後果殁
瘡科流氣飲　治陰發流注走移氣結堆核腫硬作
痛或胸膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡或血不和
結成腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭或陰發若

乳等證未成速散已成速潰敗膿自出惡肉自去
非常之驗

桔梗	人參	當歸
肉桂	甘草	黄芪鹽水炒
厚朴薑製	紫蘇	白芍藥
烏藥	防風	枳殼
檳榔	南木香	川芎

白芷　右生薑煎服　疼痛加乳香沒藥
不乾加知母貝母　瘡不乾加炒皂角刺　流
注加羌活獨活　氣滯加香附　胃虚加陳皮

此乃行氣散血之劑若服之過度則氣血虛弱
以爲醫學者知之
敗毒流氣飲　治流注初發堆核硬痛不可忍者宜
用此藥踈邪流氣
羌活　獨活　青木香
赤芍藥　當歸　紫蘇
陳皮　香附　白芷
三稜　蓬莪茂　枳殼
川芎　桔梗　柴胡
半夏（薑水泡）　赤茯苓　甘草

右生薑生地黃煎服　熱加大黃黄芩　虛加人
參黃芪
方脉流氣飲　治陰發流注瘰癧及鬱結腫聚結塊
或走注疼痛或心胸痞悶腸腹脹滿嘔吐不食上
氣喘急咳嗽痰盛或面目四肢浮腫大小便秘者
紫蘇　青皮　白芍藥
當歸　白茯苓　烏藥
桔梗（炒）　半夏（湯泡製）　黄芪（炒）
川芎　枳實（炒）　陳皮
防風　南木香　大腹皮

甘草　檳榔　枳殼
右生薑煎服　流注加羌活獨活白芷䓁　小便
不通加木通梔子　浮腫加豬苓澤瀉　氣滯加
香附　血滯加肉桂　嘔吐加藿香　瘰癧加夏
枯草
此行氣和血之劑不過一二劑止之不可多服
去熱散　治馬斑發熱者此藥退熱腫瘍亦效
吉面消　山烏豆　雞條子
雞肫根　水竹子　過山龍
金涼傘（大葉）　白根子　紫金藤

九牛天竹　貝木符（根）　連叉大青
落鴉爪藤　右水煎服
九金六馬散　治馬斑流注馬瘡馬面馬腿馬挪難
瘟肺癆乳癰腸癰便毒頭風風核等發者
鈌馬鞭　白馬骨　地馬稍
紫金藤　馬蹄藤　金星草
金鶯根　金銀花　山紅花（根）
馬蹄金　紫金皮　金涼傘（根）
金腳香（二）　山烏豆　雞屎子
毛裹金釵（二）　水滾子（根）　穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

散血消核湯　治馬瘓

紫金皮　大薊根　山蘇木

溪楓根　山烏豆　雞屎子

赤牛膝　馬蹄金　馬蹄鞭

鉄馬鞭　白馬骨　馬蹄香

穿山蜈蚣　右水煎入酒和服

二馬散　治馬瘓

馬蹄金　鉄馬鞭　撥雪根

右水煎入少酒和服

立効散　治馬瘓

水滚子根又名房蜜果又名水楊梅多　淡茶樑根中

晚祥西根少

右水煎入酒和服或合六馬散亦効

浸酒方　治馬瘓創入此藥退創

老公鬚根　毛裏金釵　狗骨子根

大紫毛吹曲　右浸酒燉服不可煎

續骨散　治接骨馬瘓

天燈心　紫背草　赤牛膝

山蘇木　鈎鈎藤　馬蹄香

馬蹄金　紫金皮　天花粉

白馬骨　鉄馬鞭　臭木待根

酒餅子根　右酒水各半煎服

鎖脚散　治鎖脚馬瘓

天燈心　紫背草　赤牛膝

鈎藤根　山蘇木　酒餅根

白馬骨　馬蹄金　鉄馬鞭

穿山蜈蚣

右酒水各半煎服

剔骨散　治剔骨馬瘓

馬蹄金　馬蹄藤　白馬骨

紫金皮　鈎鈎藤　鉄馬鞭

酒餅根　馬蹄香　天燈心

山蘇木　赤牛膝　地茄根

紫金藤　李子根　臭木待根

烏苞子根　穿山蜈蚣

右水酒各半煎服

鋼脊散　治過脊馬瘓

紫金皮　天燈心　酒餅根

馬蹄香　馬蹄金　紫背草

狗骨根　地茄根　山蘇木
白馬骨　鉄馬鞭　臭木待根
右生地黃酒水各半煎服

鐲獸散　治發斑馬瘨
溪楓根　白閂莿　赤牛膝
白馬骨　鬱金根　馬蹄金
金罌谷　馬蹄藤　馬蹄香
地馬稍　穿山蜈蚣
右水酒各半煎服

退創散　治馬瘨滿身犯人轉動不便
地馬稍根　白馬骨　鉄馬鞭
頭形花根　雞屎子　苦死子
馬蹄金　山茄根　狗骨根
對節金鬱根
右水煎入酒和服

鉤鉤藤散　治馬瘨腫瘍病後筋脈拘急
鉤鉤藤　伸筋藤　石楠藤
羊帶歸根　天燈心　狗骨子根
真珠簾根　豬苓艸根
右水煎入酒和服

馬鞭散　治馬瘨
石楠藤　涼藤子　晚祥西
雪裏開　馬蹄金　鉄馬鞭
鬼股帶根
右水煎入酒和服又用雪裏開搗糟炒縛之又用
棉樹根皮山鈕包根皮搗糟炒縛之

妙草散　治病馬瘨
白根丁　赤芍根皮
右搗糟炒縛之又用七節楼煎酒服之

二妙散　治滿身起斑是馬瘨
馬蹄香　香圓橘葉
右搗爛糟炒縛之又用秦椒酒煎

楊梅瘡

或問廣瘡何如曰此肝腎二經濕熱或色慾太過腎經虛損感邪穢之氣而成或因下疳毒氣綿綿不已而作一名翻花瘡肉反於外狀如黃色有如翻花瘡又名綿花瘡此則邪毒盛細小者名廣豆或腫不發膿窠此則邪毒淺凡患此瘡先宜瀉毒物以發之後服通聖散之類須用土茯苓對停服方爲穩後入八珍十全大補湯之類以補氣血必守禁忌方保全愈大忌房勞如犯之服藥不効遺後結毒一忌氣惱發軟邪毒後結廣瘡一忌口腹能發火以致纏綿不已一忌輕粉及冷水致後筋骨疼痛結成風塊或二三年或數年方發其狀堅硬肉色不變或痛或痒多結於骨節頭面喉鼻之間經絡交會之處已破則膿水淋漓其可畏也輕則發廣瘡亦名下疳癖多生手心足底重疊不已又有餘毒亦名氣毒筋骨疼痛來去不定亦名濕毒筋骨痛酸乍作乍止宜隨其淺深治之先服消風敗毒後服細辛瀉瘡藥及結毒深者必用熏藥後服通聖散以泄火毒後服八珍湯大補湯之類弱者不宜熏恐不能勝火氣也　脅餘元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患受症在肝腎二經故多在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患而後痛者初起脉浮數邪在脾肺經也先用荊防敗毒散解散之脉弦數邪在肝膽經也先用龍膽瀉肝湯清解之脉沉數邪在臟腑也先用內疏黃連湯通導之後用換肌消毒散爲主愈後肉熱筋骨疼痛之患若瘡凸亦作痛熱毒熾盛也若微作痛毒將發也瘡色白而不結痂陽氣虛也色赤而不結痂陰血虛也搔痒脉虛浮氣不能相榮也搔痒脉浮數血不能相榮也腎背間或頸間作痒晡熱陰虛也陰囊間或股內痒肝經血虛也陰囊作痒重墜肝經陰虛濕熱也小便頻數短少色赤肝經陰虛也小便頻數色白短少脾肺氣虛也面目搔痒或搔變赤外邪相搏也眉間痒或毛落肝膽血燥也飲食少思口乾飲湯胃氣虛也飲食難化大便不實脾氣虛也侵晨或夜間泄瀉脾腎虛也若治失其法有蝕傷眼目腐爛玉莖拳攣肢體者但用九味蘆薈丸以清肝火六味丸以生腎水獨搜解毒飲以養血祛邪亦有可愈者若概用輕粉等劑反爲難治　濕勝者宜先導濕　表實者宜先解表　裏實者宜先疏裏　表裏若俱實解表攻裏　表虛者補氣　裏虛者補血　表裏俱虛者補氣

血　一人遍身皆患左手脈數以荊防敗毒散表症
乃退以仙方活命飲六劑瘡亦愈更以萆薢湯月餘而
瘥　一婦頰瘡發熱便秘作渴脈沉實以內疏黃連
湯二劑表症已退以龍膽瀉肝湯數劑瘡亦退間
服萆薢湯月餘而瘥　一人下部生瘡諸藥不應延
及遍身突腫狀如翻花筋攣骨痛至夜尤甚此肝腎
二經濕熱所致先以導水丸五服次以龍膽瀉肝
湯數劑再與除濕健脾之藥外貼神異膏吸其膿隔
蒜灸拔其毒而愈　若表實者荊防敗毒散　裏實
者防風通聖散　氣虛者四君子　血虛者四物仍

加兼症之藥並愈　若服輕粉等藥反收毒于內以
致迭發　緊服防風通聖則氣血愈虛因而不治者
多矣　一人患之發寒熱作渴便秘兩手脈實用防
風通聖散而退以荊防敗毒散兼龍膽瀉肝湯而瘥
一人患之腫痛先以龍膽瀉肝湯導水丸各四劑
少愈再以小柴胡加黃蘗蒼术五十餘劑而平　一
人玉莖腫潰小便赤澁肝脈弦數以小柴胡加木通
青皮龍膽草四劑又龍膽瀉肝湯數劑而瘥　一童
玉莖患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯吞
蘆薈丸更貼神異膏月餘而瘥　一人愈後腿腫一

塊久而潰爛不斂以蒜搗爛傅患處以艾灸其上更
貼神異膏及服黑丸子并托裏藥兩月而愈　一婦
然輕粉藥於被中熏之致遍身皮塌膿水淋漓不能
起居以滑石黃蘗為末菉豆粉等分鋪席上令可臥
更以金銀花散月餘而瘥　一人背愈但背腫一塊
其硬肉色不變年餘方潰出水三載不愈氣血俱虛
飲食少思以六君子湯加當歸藿香三十餘劑更飲
萆薢湯兩月余而瘥　一人患之[illegible]損脾胃氣血
皆虛亦服前藥而瘥　一婦患之皆愈惟兩腿兩臁
各爛一塊如掌兼筋攣骨痛三載不愈諸藥不應且

晡熱甚飲食少思以萆薢湯兼逍遙散倍用白术茯
苓數劑熱止食進貼神異膏更服八珍湯加牛膝杜
仲木瓜三十餘劑而瘥　一人楊梅瘡後兩腿一臂
各潰二寸許一穴膿水淋漓少食無睡久而不愈以
八珍湯加茯神酸棗仁服每日以[illegible]患處灸
良久隨貼膏藥數日稍可却用[illegible]灸更服十全大
補湯而愈　凡有腫硬或作痛者用蒜灸及敷中和
膏內服補藥並效　一婦若患瘡先下疳作痒出
水後陰囊股內小腹脇臂發小瘡或乾膿窠誤服祛
風等藥肢體倦怠惡寒發熱飲食漸減大便不實左

尺洪數左關弦數右關浮緩按之微弦余曰此患屬
肝膽經也左關脉弦左尺脉浮數者皆水少而虚熱
傳於肝也右關脉浮緩脾胃之氣弱也按之而弦者
肝木乘脾土也用六味地黄丸補中益氣湯爲主佐
以換肌消毒散而愈　一儒者患前症色焮赤作痛
大便秘而不實服祛風敗毒等藥苦痛口乾脉浮而
數此邪氣去而陰虚所致用六味丸料加山梔當歸
四劑脉症頓退又用八珍湯加山梔丹皮瘡色漸白
後用四君加歸芪而愈　一患者服攻毒等藥患處
凸而色赤作痛肢體倦怠惡寒發熱脉浮而虚此元

氣復傷而邪氣實也用補中益氣湯二劑而痊　一
儒者患之誤服祛風消毒之藥復傷元氣因勞役過
度内熱口乾腐爛作痛右關脉洪數而虚此脾胃受
傷而火動用清胃散之類而愈　進士劉華甫患之
數月用輕粉硃砂等藥頭面臂臀各結一塊二寸許
潰而形氣消弱寒熱口乾舌燥唇裂小便淋漓痰涎
上湧飲食少思此脾胃傷諸臟弱而虚火動也先用
六君子二十餘劑又用補中益氣加山茱萸山藥麥
門五味服之胃氣復而諸症愈惟小便未清痰涎未
止用加減八味丸而痊　一儒者患之頭面搔痒或

成粒或成片或出水膿肺脉洪數此風邪所傷先
用荊防敗毒散加萆薢鉤藤鉤數劑漸愈但口乾内
熱用四物加山梔鉤藤金銀花甘草節而愈後遍身
搔痒内熱口乾佐以六味丸而痊　一商人每勞役
飲酒後則遍身生瘡服祛風敗毒之劑而口胸背臂
潰爛一塊如桃栗四五枚痛腹水瀉氣血虚甚寒
熱往來作渴痰甚此濕熱熾盛元氣虚而不能愈也
外敷當歸膏内服補陰八珍湯加萆薢倍錢并換肌消
毒散加乾葛鉤藤鉤各錢二十餘劑諸症漸退仍
以前藥爲主佐以調理之劑兩月餘正氣復而瘡愈

萆薢湯

川萆薢 一名土茯苓 俗呼冷飯團

每服貳兩水參鍾煎貳鍾半去柤徐徐溫服病甚
患久者以此一味爲主而加以兼證之劑

換肌消毒散　治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓伍錢　當歸酒洗　白芷
皂角刺　薏苡仁各壹錢　白鮮皮
木瓜不犯鐵器　木通　金銀花各柒分
炙甘草伍分
右水煎服

蠲痺消毒散　治時瘡肢節拘攣

蒲黃　土茯苓　獨活各伍錢
白术　當歸各壹錢　赤芍藥壹錢
白芷伍分　右水煎服
調治後飲　治楊梅瘡　右以長流水肆大椀入砂
冷飯團打碎　皂角子各木槌
鍋內煎至叁大椀入後藥
黃柏　連翹各壹錢切碎　黃芩
白芍藥　當歸各壹錢半　木瓜
白芷　防風　白鮮皮
貝母　天花粉　蒺藜

皂角刺　甘草節各　漢防已伍分
鱉虱胡麻　金銀花叁錢　猪胰子壹兩切碎
右剉煎至壹大椀通口頻服胃弱者分為貳服日
三服
又方
木瓜　牛膝去蘆　生地黃
當歸　金銀花　貝母去心各
粉草節　五加皮　天花粉
地骨皮各壹錢半　鱉虱胡麻仁貳錢半炒香研
白芷　大風藤各壹錢　薏苡仁炒叁錢

柴胡伍分　獨核肥皂子去弦殼六个
皂角子七个打碎炒　冷飯團肆兩打碎
猪胰子壹兩切碎　白鮮皮
河水叁大椀入砂鍋內煎至壹大椀空心上午
飢時各壹服忌食茶醋牛肉河豚猪肝腸
洗湯方
五倍子壹兩　皮硝壹兩　地骨皮叁兩打碎
甘草壹兩打碎　艾葉貳兩　葱拾枝
入麻布囊中煎極濃湯壹鍋勿使生水先以一分
滾湯乘熱熏洗旋添熱湯浴至汗出為度浴時先

服前煎藥一服
點藥方
真輕粉各分　杏仁去皮　冰片叁釐
三味同搗極爛洗淨點上
楊梅瘡丸藥方
白花蛇酒浸　露蜂房　全蝎
蜈蚣　龜板　雄黃
飛丹各　槐花米　雨前細茶
孩兒茶　辰砂各伍分　麝香
右用黃米飯為丸日進二三服好酒送下七日後

痊自光矣　當加樺皮灰

發徹瘡毒方　用雄羊肉一斤水一桶砂鍋者熬入後藥

川芎　大黃　蟬蛻

麻黃　威靈仙各等分 此味虛人不可多用

共五味入羊肉內煎至一大碗空心服其羊肉任意食之蓋被取汗天明洗浴　只用一貼立効

圍藥方

丁香　檀香　沉香　乳香各伍錢　赤石脂壹兩

麝香六分　桑葉霜壹兩　醋水調圍

廣瘡膏　亦治結毒

黃連　黃蠟各六錢　木鱉子去殼

蘄艾各壹錢　韶粉　白蠟各壹錢

雄黃壹錢　爐甘石伍錢　龍骨伍分

冰片壹分

香油煎膏　原方有樟腦叁錢恐作痛故去之

熏法　治楊梅瘡毒流注四肢或徧身結成大瘡久不能愈者用此法熏之極妙能收輕粉毒

好艾葉[illegible]　雄黃壹兩　黃丹壹兩

松香[illegible]　蒼术米泔浸[illegible]

右四味為末入艾拌勻用黃紙做成藥筒五寸長以火燒着一頭將烟熏瘡口待筒燒盡一寸去筒用水銀膏貼之次日又洗又熏之半月有効如熏二十日有効

洗藥方

石菖蒲　荊芥　防風

羌活　獨活　金銀藤

地骨皮　何首烏　甘草

右日日煎湯洗之

水銀膏　亦治臁瘡

無名異　水銀　銀朱

黃丹　百草霜各等分

右研極細和勻用桐油調成膏油紙攤作隔紙膏貼之其油紙先用黃連黃蘗煎湯刷數遍然後[illegible]

又擦法　治楊梅瘡不問新舊並効不過旬日用膽礬白礬末并水銀各叁錢半入香油津唾各少許和勻坐無風處取藥少許塗兩腳心以兩手心對腳心擦磨良久再塗藥少許仍前再擦用藥盡即卧汗出或大便去垢口出穢涎為驗連擦三日煎通聖散滌洗更服內踈黃連湯或敗毒散愈後服萆薢湯有熱加芩連氣虛參芪血虛四物之類

惡瘡

諸痛痒瘡皆屬於心諸濕腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合濃敗腥穢浸淫不收不可以定名命之故謂之惡瘡也然有辨焉如疥癬癮疹之類怫鬱氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已者是也若鬱氣血在肌肉之分外達皮膚作寒熱而生膿者或七情所招或膏粱之變皆宜解內熱不宜汗也張仲景所謂瘡家不可發汗汗之則痙者是已一瘡而有宜汗不宜汗之別熱有淺深表裏故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之汗之浴之外以殺蟲潤燥皆解凝結涎沫之藥傅之瘡在肌肉則當因其重而減之瀉經絡之熱消涼氣血外以化膿生肌當瘡之瘡在頭顛則當射而取之用酒製寒涼劑更以風藥升而上之外以殺蟲解熱藥傅之能明此三者其於治瘡思過半矣

乳香消毒散 宣明 專治惡瘡

大黃 煨　黃芪　牛蒡子 炒

金銀花 各伍兩　甘草 叁兩　牡蠣 鹽泥裹燒伍兩

乳香　沒藥　懸蔞 各壹兩

右為粗末每服伍錢水煎瘡在上食後服在下食前

通危飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血風斑因熱開爛成瘡痒痛流黃水汁

連翹　當歸　瓜蔞根

生乾地黃　荊芥　黃芩

赤芍藥　麥門冬　瞿麥

木通　牛蒡子 炒　山梔子

防風　川芎　粉草 各等分

右㕮咀每服肆錢水壹盞半燈心貳拾莖煎至捌分去滓不拘時服

救苦黃芪散 治惡瘡癰癤

黃芪　當歸　芍藥

瓜蔞根　甘草 各壹兩伍錢　瓜蔞 壹對

金銀花 伍兩　熟地黃 不拘多少　皂角刺 [illegible]

右㕮咀每服半兩無灰好酒壹升同引子裝入磁瓶內瓶頭用箬葉封將瓶坐於鍋內上以大盆覆鍋口盆外以黃泥封之勿令出氣煮至外聞藥香為度取出瓶候定飲清將藥滓再添酒[illegible]前煮服若欲少者酒水各半煎服瘡在上食後[illegible]臥服在下空心服此藥治病萬無一失神驗如[illegible]應聲常於五月五日修合

千金紫花地丁散　治諸惡瘡腫毒發痛

金銀花　黃連　當歸

紫花地丁　赤芍藥　黃芪

人參　甘草節　桔梗

大黃各半兩　乳香　白檀香

沒藥　連翹各參錢　黃芩

梔子仁　玄參各壹兩　麥門冬去心

前胡　甘草炙各壹兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞酒壹盞煎至捌分去滓

隨病上下溫服

紫花地丁散　治諸惡毒瘡腫痛如神

紫花地丁　當歸　大黃

赤芍藥　金銀花　黃芪各半兩

甘草節貳錢

右㕮咀每服壹兩用水壹盞酒壹盞同煎至壹大盞去滓隨病上下服

增益四物湯　治一切惡瘡

川芎　當歸　芍藥

地黃　防風　荊芥

甘草各等分　鳳尾草斟量加入

右㕮咀每服參大錢水壹盞半煎至捌分去滓食前溫服

治惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

豆粉半兩　乾臙脂參錢　定粉貳錢

右為細末新水調下

鍼挺子　治惡瘡神効了不覺疼痛者

銅綠　硇砂各貳錢　蟾酥壹錢

右為細末燒飯和作麥粟挺子鈹刺不覺痛者須刺出血方絍藥在內以膏藥貼之

蝕惡瘡方　非奇異惡瘡不可用

銅綠貳錢　硇砂壹字　石膽礬半錢細研

右為細末傅之

治惡瘡或有小蟲

膽礬　輕粉　乳香各壹錢

龍骨　虎骨　露蜂房

白礬各貳錢半　硇砂　土蜂房

雄黃各貳錢半　麝香伍分　片腦壹字

右為細末刺破瘡用米泔洗看緊慢上藥神効

拔毒散　治諸惡瘡消腫去毒

天花粉　無名異　黃檗

黄芩　木鼈子　大黄
牡蠣各等分
右為細末好酢調敷貼立効
桑螵蛸散　治諸惡瘡
桑螵蛸　地龍　貝母
黄柏各半兩　銃丹炒壹兩　乳香壹錢半
粳米粉壹錢　麝香半錢　雄黄
輕粉各壹錢
右為細末以新汲井水和沙糖調傅

洗瘡藥　洗諸般惡瘡
貫衆　川芎　茵陳
地骨皮　黄芩　獨活
防風　扁蓄　甘草各貳錢
當歸壹錢　㕮咀水叁碗煎三沸去滓通手洗之
又洗藥
白芷　荆芥　萎蕤
何首烏　茯苓　苦參
川芎　白牽牛　防風
蔓荊子各兩錢
為細末用漿水肆盞煎五七沸臨卧洗[illegible]

塗藥
輕粉　白礬　䑸上硫黄各等分
右為細末用酥油調臨睡塗三夜
萬寶代針膏　治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用
針刺膿此藥代之但用小針點破瘡頭却貼上膏
藥膿即自潰此秘妙良方
蓬砂　血竭　輕粉各壹錢半
金頭蜈蚣壹條炙　蟾酥半錢　雄黄壹錢
片腦少許　麝香壹字
右為細末用蜜和為膏看瘡有頭處用小針挑破

以藥些小紙花上封貼次早其膿自出如腋下有
耍核兒名暗疔瘡或有走核可於腫處用針挑破
如前用之忌雞羊魚酒麵等物喫白粥三日為妙
龍葵散　治諸惡瘡多出膿水不乾
龍葵加子人　景天火草倒鈎　黄連去鬚
天靈蓋各壹兩　龍骨　木鼈子
乳香　黄蜀葵花各半兩
右為細末入膩粉少許蜜調隨瘡大小紙攤貼之
神効方　治一切惡瘡醫所不識者
水銀　黄檗　黄連

松脂（黄明者） 膩粉 土蜂窠（[illegible]）
多者之或 云鷄翎窠 甘草（各等分）

右將水銀放掌中以唾津殺爲泥入磁器中以生麻油和研生絹濾如稀餳和藥末再研如稠餳先温水洗瘡帛拭乾塗之一切無名瘡塗一次即差有黄水者塗之痛止便愈痒不堪忍者塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳抓破敷藥

乳香散 治遠年惡瘡

乳香 膩粉（各半錢） 黄蘗（去粗皮）
龍骨 大黄（[illegible]） 麝香（少許）

右爲細末先以苦竹瀝洗瘡拭乾摻藥

熊膽膏 治一切惡瘡

熊膽（研壹錢） 膩粉（壹錢貳分半） 雄黄（研）
麝香（各研半錢） 檳榔（研壹字）

右研勻於臘月用豮猪膽一枚取汁和藥仍入在膽内用線繫定採令以松明黑烟熏通黑掛於陰處如惡瘡有指面大者用如黍米大貼之如錢大者用如菉豆大貼之恐藥乾難貼薄以津唾調如稀糊塗之仍用薄樺皮蓋貼以帛子繫之藥不可多用

烏金膏 治一切惡瘡

桑枝 槐枝 榆枝
枸杞枝 桃枝 柳枝

右各長壹尺粗如小指俱壹寸截劈肆破用油肆兩炒令焦黑濾去滓入鉛丹壹兩黄蠟壹兩復熬令黑色須在甕合内候冷以新汲水浸出火毒用塗瘡

桃花散 治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

烏魚骨 虎骨 龍骨（各[illegible]）
寒水石（[illegible]） [illegible] 赤石脂
白斂（各[illegible]） 黄丹（[illegible]）

右入白芨半兩同爲細末[illegible]大小敷貼

丹毒

內經運氣丹熛皆屬火經云少陽司天客勝則丹疹外發及為丹熛是也 聖惠云夫一切丹毒者為人身體忽然變赤如丹之狀故謂之丹毒也或發手足或發腹上如手大皆風熱惡毒所為重者亦有疽之類也若不急治則痛不可忍久則壞爛出膿血數升若發於節間便令人四肢毒腫入於腸則殺人小兒得之最為急也 戴復菴云發丹色狀不一痒痛亦異大槩皆因血熱肌虛風邪所搏而發然色赤者多以赤故謂之丹宜消風散入燒楓樹子存性為末酒調服有發而色白者謂之冷瘼宜消風散雞黑神散酒調此病多緣肌肉疎為風邪所襲而成風熱則赤風冷則白今人但呼赤為丹白為瘼所以用酒調土硃服之而愈者亦以脾主肌肉土能入脾各從其類古方亦名為癮疹非特分寒熱亦兼備四氣近世方論呼為白婆瘼赤為血風赤白二證並可用烏藥順氣散和消風散酒調服白者多用順氣散赤者多用消風散病此者俱宜用藿香正氣散煎有人一生不可食雞肉及獐魚動風等物纔食則丹隨發以此見得係是脾風脾主身之肌肉藿香正氣散乃治脾之藥而土硃亦入脾之藥此方屢試屢驗 丹溪云內傷斑者胃氣極虛一身之火游行於外所致宜補以降之 嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹熛用諸般敷貼丹熛藥及用刀於個個丹頭出血丹皆不退後以二陳生薑加補劑治嘔不効遂純用參半兩歸朮各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱漸減約五十餘貼熱始除神氣始復

金花散 治一切丹毒熱痛焮赤

鬱金 黃連 黃芩各壹兩

糯米一合

右為末每用蜜水調如泥雞翎掃丹上乾即易之

治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍 簡要濟衆

車前草 益母草 地膽草

右等分爛研塗乾再塗之如無新者只以乾者為末以水調傅

治一切丹毒惡氣五色無常不即治之痛不可忍若皮膚壞則出膿血或發節解則斷人四支此蓋疽之類也宜速治之方

大蒜或小蒜

右杵如泥厚塗之乾即再塗以差為度

又方 赤小豆一升 羊角燒灰半兩

右爲末雞白和塗如無羊角即單用小豆亦良

治一切丹毒走皮中淫淫疼痛方

蠐螬 研

右以雞子白和塗乾再塗 丹先剌破塗之良

治一切丹毒徧身

芸薹子 壹兩

右以酒壹大盞和研去滓煎五七沸無時温服壹合孫眞人云治丹神驗方搗芸薹葉傳之即差未愈但三日內傳之臣以正觀十七年三月八日內江縣飲以酒多至夜睡中覺四支骨肉疼痛日眩

頭疼額角上如彈丸大腫不得手近痛至午時至右角至夜諸處皆到其眼合並不得開幾至於斃縣令周公種種藥治不差經七日臣自處此方其効如神故疏之以傳於世 又藏行之家傳方云如無丙者以乾者爲末水調傳凡丹毒遍身或連腰腹周匝百方不能治惟此藥能治之凡治二十四般丹毒

仙人水鑑治火丹

蕎麥麪　黃連各少許

右二味同研細塗立差切不得入油及鹽

孫眞人曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之狀大者如掌甚者遍身有痒有腫無定色或有白丹肉中腫起痒而復痛微虛腫如吹瘾疹狀亦有雞冠丹赤色而起大者如錢小者如麻豆粒狀如雞冠色皮澁一名茱萸丹或有火丹或有水丹遍身起遇水濕搏之亮晃然如黃色如有水在皮中喜著腹及陰此雖小疾令人至死也

治丹毒搨方

升麻　漏蘆　芒硝各二兩

梔子 貳拾枚　黃芩 參兩　蒴藋 伍兩

右件以水參升浸良久煮取壹升以故布染汁搨後須服漏蘆湯

漏蘆湯方　非裏實證不可用

漏蘆　白歛　黃芩

麻黃　白薇　枳殼

升麻　芍藥　甘草

大黃 各參兩

右以水壹斗煮取參升分三服快下之無藥處只單用大黃下之

五香湯　主熱毒氣卒腫痛結核或似癰癤使人頭

一疼實熱氣急者數日不除殺人方

青木香　藿香　沉香

丁香　薰陸香各壹兩

右以水伍升煮取貳升分三服不差更服之

劉涓子鬼遺方治丹癰疽始發焮熱浸淫長成搨湯方

升麻　黃芩各三兩　黃連、

大黃各貳兩　當歸　甘草炙各壹兩

芎藭貳兩　芒硝參兩　羚羊角屑各壹兩

右㕮咀以水壹斗參升煮取伍升絞去滓鐺中內芒硝上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱貼帛搨癰上數過其熱隨手消散王練甘林所秘不傳此方

朱氏家傳治火丹

伏龍肝　豬槽下土各等分　朱砂少許

右為末雞子清調鵝毛掃

又方

躑躅花根　蚰蜒土　壁上多絲蟲窠

[illegible]　伏龍肝　豬槽下土

右如上法用之

金花散 治一切丹毒

鬱金　黃芩　甘草

山梔子　大黃　黃連

糯米各等分

右七味生為末冷水和少生蜜調藥以鵝毛掃之

長沙醫者鄭愈傳治大孕丹名救母塗散

凌霄花　萬州黃各等分　芦根

右同杵爛以酒和塗同調服少許仍塗丹上立効

麻黃散 治惡毒丹及風疹

麻黃　升麻　葛根

射干　雞舌香　甘草

石膏

右㕮咀以水叁升煮取壹升大人作壹服二歲兒分三服日三

本事治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末壹兩搗和如泥塗之又方治螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

丹毒監療傳授即易秘方

肘丹者惡毒之瘡五色無常以苧根參斤水參斗煮汁頻日塗之

治赤丹用黃瓜種中瓤水去子以器貯之用時以水

塗患處　又方用臘雪貯器中久化爲水以水塗赤
游妙（初虞世）
丹諸丹毒腫蚯蚓矢水和傅之（聖惠方）
千療丹癮疹方酪和鹽煑以手摩之手下消
治赤游風腫蕎麥麵苦酒調傅（兵部手集）
錫治熱赤游丹梔子末二大兩釅醋調塗之
治五色丹毒煑栗皮有刺者洗之佳
拔毒散　治熱毒丹腫游走不定
石膏　寒水石（各壹兩）　黄檗
甘草（各貳兩）
右爲細末以新水調稀之或紙花子小貼尤妙涼
水潤之
十二件單方　治丹毒或得一物瘥
水苔　生地黄　生松葉　蒴藋葉
慎火草　浮萍　豆豉（和水）　大黄（和水）
梔子（和水）　黄芩（和水）　硝石　豆葉
右十二味但得一味搗以貼之即瘥赤小豆末
和雞子塗之無雞子水和用之
療瘡丹從兩脚赤如火燒
右用五加葉燒作灰伍兩取煅鐵槽中水和塗之

治丹毒癅
蜈蚣（乾者壹條）　白礬（如皂子大）　雷丸（壹个）
百部（貳錢）
右爲細末醋調塗之
郭氏金黄散　治熱毒丹流遊走不定疼痛不止
寒水石（貳兩）　鬱金（壹錢）　藍實
大黄　黄檗　黄連
景天（各壹兩）
右爲細末用雞子清調敷水亦可
風丹　痛者爲丹毒痒者爲風丹
賈宅小娘風痒黄精丸四十粒與
白朮（半分）　枳實　黄芩（肆錢）
右分入貼下之食前
通身風痒瘾疹凌霄花細末酒下一錢立止
鮑允中年五十歲風丹痒且腹微疼咽不利面身微
腫五六日不退兩寸脈滑大實右浮大左浮弦小以
炒芩炒連歸尾芍地枳殼黍粘紫蘇各一錢防風黄
芪各半錢几五六貼而安
世河間神佑丸（治風丹愈而復發或一月發或隔十年發者此丸下之百發百中方見）
雜病水腫門

丹　一人患風丹遍身作痒因酒得者
浮萍半兩　防風　黄芪
羌活貳錢　當歸貳錢　乾葛
麻黄壹錢　生甘草一錢
世治冷丹風
、防風　甘草　白僵蠶
、蟬退　川芎　白芷
、茯苓　荆芥　陳皮
、厚朴　蒼朮　人參
一右為末豆淋酒調服貳錢
丹痒者用韭菜搽患處以香油以手摩熱後用上措之立愈　治風丹用穿山甲洗去腥於瓦上炒過存性每一兩入甘草二錢為末米飲調服　治血風瘡瘙癢搔爛流黃水取白蒺藜酒浸淋酒下四物湯酒下亦可
用川芎鮮荷根生搗爛以好醋塗旋旋刮取塗患處未愈更入硫黃少許磨塗之

赤白遊風

證赤白遊風屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒閉腠理內熱怫鬱或陰虛火動外邪所乘或肝火風熱血熱治法若風熱用小柴胡湯加防風連翹血熱用四物加柴胡山梔丹皮風熱相搏用荊防敗毒散內熱外寒用加味羌活散胃氣虛弱用補中益氣湯加羌活防風及消風散血虛用加味逍遙散陰虛逍遙散六味丸若肝腎虛熱用六味丸則火自息風自定痒自止若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛腠理不閉風客內淫腎氣受傷相火翕合血隨火化反為難治矣　一男子秋間發疙瘩此元氣虛而外邪所侵也先用九味羌活湯二劑又用補中益氣加羌防而愈後不慎起居盜汗晡熱口乾唾痰體倦懶言用補中益氣湯加減八味丸而愈
一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈日晡益甚用加味逍遙散而愈　一婦人患赤白遊風晡熱痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛筋攣又服化痰順氣之劑四肢痿弱而歿　一婦人患前症數用風藥煎湯泡洗以致腹脹而歿　一女子赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡湯加生地

黃連甚牡丹皮而愈

如冰散 治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成腫血遊膚腠如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝焮赤熱痛

朴硝（伍兩研）　寒水石　蛤粉（各叁兩）

白芷（壹兩）　片腦（壹錢）

右為細末研勻每用新汲水調稀稠得所以雞翎掃不令藥乾

治赤遊腫方

川大黃

右各搗塗之乾即再塗

治赤遊腫流偏身赤色入腹即死方

右用生豬肉傅上數數換之其肉蟲鳥俱不食是惡甚也

○紫白癜風（白駁　癧瘍風）

烏龍蛇散 治風虛頑麻遍身紫白癜風瘙癢者

白花蛇（去骨）　黑稍蛇（去骨）　萆薢

天麻　黃芪　金毛狗脊

自然銅　骨碎補　楓香（研）

草烏頭（鹽水浸劉）　地龍（去土）　乳香

沒藥（各叁錢）　麝香

右為細末酒糊丸……食後

為末酒調服亦得

經驗何首烏散 治白癜紫癜諸風筋骨疼痛遍身疥癬手足皴裂睡卧不穩行步艱難兼療癘疾眼斷白仁鼻梁崩塌並宜服之

何首烏　蔓荊子　石菖蒲

荊芥穗　甘菊花　枸杞子

苦參（去蘆）　威靈仙（各半兩）

右為細末每服叁伍錢食後溫酒調下或茶清或蜜水亦得日進二服

當歸散 治皮風紫白癜風

當歸（去蘆）　赤芍藥　苦參（去蘆各十兩）

赤土（壹兩）

右為細末生豬脂貳兩熬油去柤同擣勻分作一
處調藥隔一宿空服以大匙熱酒調下空心食後
名一服並忌雞鴨魚鰻鱔魚肉等物
木香烏頭丸　治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮
片鎊油四肢麻痺
草烏頭壹斤　入竹籃內以水浸用瓦片於籮內就
水中漉洗如打麥餅法宜候漉洗去大皮及尖控
起令乾用麻油肆兩鹽肆兩入銚子內炒令深黃
色傾出油只留鹽并烏頭再炒令黑烟出為度
取一枚劈破心內如米一點白恰好如白多再炒

趂熱取羅為末用醋糊丸如梧桐子大每服叁拾丸
空心晚食前溫酒下真州資福院文雅白老有此
疾服數年黑點頓除腳力強健視聽不衰有一宗
人遍身患紫癜風身如墨服過半體貌悅澤十服之
六一年出風疥瘡瘍皆瘥此方云上奇要之五
七日作烏頭粥啜之為此藥用藥當集中者作

外治　治紫白癜風浴藥
白礬　緑礬　生砒霜各等分
右研極細如粉用生茄子蘸藥擦患處先浴後擦
三黃膏　治紫白癜風疥瘡癬疥

雄黃　雌黃　硫黃各半兩別研
白礬　黃丹並另研　蛇床子少炙
藺茹各壹兩　白膠香另研　輕粉各半錢
右件用清油肆兩入巴豆拾粒煎令黃色去巴豆入
諸藥又入黃蠟少許熬成膏先用荊芥湯洗後
用藥擦神効
四神散　治紫白癜風
雄黃　雌黃　硫黃
白礬各等分
右研為細末每用時先浴令通身汗出次用生薑
蘸藥擦患處良久熱湯洗當日色淡五日除根

又方
紫癜白癜兩般風附子雄黃最有功薑汁調勻茄
蒂蘸擦來兩度更無蹤
治紫白癜風只用焰硝為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神
効　又方以白石灰研極細用真香油調如
泥擦過一宿取清油傅之愈　又方用金獅草擣作
擦之累効
又方杜大黃　飛礬　右以醋糊為丸擦之
紫癜　人紫癜風者由皮膚生紫點搔之皮起而不

痛者是也此皆風濕邪氣客於腠理與氣血相搏致榮衛否澀風冷在於肌肉之間故令色紫也

白花蛇散 治紫癜風

白花蛇(酒浸去皮骨) 晚蠶蛾(去翅足微炒) 白僵蠶(炒)
烏犀角屑 麻黃(去節) 何首烏
天南星(炮製) 天麻 白附子(炮)
桂心 白蒺藜(炒去刺) 白蘚皮
羌活(去蘆) 蔓荊子 防風(去蘆各半兩)
磁石(壹兩燒醋淬七次)

右為細末入研令勻每服貳錢食前溫酒調下忌熱麵豬魚等物

酸石榴丸 治紫癜風其效如神

酸石榴(壹拾枚去皮於飯甑上蒸爛絞取汁) 羌活(去蘆)
防風(去叉) 薄荷葉 人參(去蘆各壹兩)
羌蔚子 白附子(炮) 苦參(去蘆)
烏喙(搗碎炒) 犀角屑(各半兩) 冬消梨(貳拾枚去皮核)

右件為末取前二味汁煎如膏和丸如梧桐子大每服貳拾丸溫酒送下不拘時候

桑枝煎 治紫癜風

桑枝(剉壹升) 益母草(剉半升)

右件用水伍斗漫火煮至伍升濾去柤入小鐺內熬為膏每夜臨臥服半合溫酒調下

硫黃膏 治紫癜風

硫黃 白礬(各壹兩細研) 硇砂(細研)
白附子(炮) 附子 雄黃(細研各半兩)
蛇蛻(壹條)

右為細末入研令勻用清油肆兩黃蠟貳兩先煎油三五沸下蠟後入藥末煎成膏每取塗所患處日三度用之

灸荏膏 治紫癜風

灸荏草(不以多少燒作灰用重紙濾水淋取汁拾盞) 蝦蟆灰
白礬灰 硫黃(各半兩) 雄黃(貳錢)
硃砂(末水飛壹錢半) 膩粉(研) 麝香(各壹錢研)

右外藥為細末同研令勻用灸荏膏調塗所患處乾即再塗之

治紫癜風

硫黃(貳兩細研)

右先用麄布擦患處令傷用面油調藥末如膏一日三度塗之

白癜風夫肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交并邪毒之氣伏留於腠理與衛氣相搏不能消散令皮膚皺起生白斑點故名白癜風也

烏蛇散 治身體頑麻及生白癜風

烏蛇酒浸 白殭蠶 獨活
天麻 胡麻子 天南星
白附子 川烏頭 桂心
防風 細辛 枳殼
蟬殼

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時

白癜風 外科五

防風湯 治白癜風

防風 地骨皮 山梔子
王不留行 荊芥穗 惡實
人參 生乾地黃 甘草

右㕮咀每服伍錢水貳盞入惡實根少許煎至壹盞去柤溫服不拘時候日進二服大有神効

苦參散 治肺臟久積風毒皮膚間生白癜不止

苦參 松脂 附子
梔子仁 木蘭皮 露蜂房各壹兩
烏蛇酒浸

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時候

庶風膏 一治白癜風

附子 川烏頭 防風各貳兩
凌霄花 躑躅花 露蜂房各壹兩

右件細剉用豬脂叁斤煎煉看藥黃焦去柤候冷收瓷合中用摩風瘢上以差為度

又方

硫黃 密陀僧 膩粉
乳香另研 杏仁 白殭蠶炒

右為細末酥調成膏用漿水洗瘡以半布揩破塗之日夜四五次甚妙

癜風 外科五

治白癜風

紅灰藋草 蒼耳根莖各伍斤 茄子根莖叁斤

右件並曬乾一處燒灰用水壹斗煎湯淋取汁却於鐺內熬成膏以瓷合盛用好乳香半兩研又入鉛霜膩粉各貳錢半相和入於膏內用煉成黃牛脂貳兩入於膏內調攪令勻每取摩塗所患處日塗三上夜塗一上

治白癜風胡桃塗之

胡桃 硫黃半兩細研 白礬貳錢半細研

右件和研爲膏日三兩次塗之瘥

治白癜風

附子壹枚生用　硫黃半兩研　鷄子冬个用米醋浸經七日看殼軟取出以白調藥

爲細末用米粉貳錢半更研令勻雞子白調塗之

玉粉膏　治白癜風

白礬　硫黃各半兩

右件同研如粉用醋調塗即瘥

治白癜風如雪色

硫黃　香墨各壹分半

右件同研如粉用生布揩瘢上微傷用醋和如膏塗之作瘡未差更塗

三聖膏　治白癜風

硫黃生研　黃丹各半研

右件用生絹袋盛緊縛定蘸生薑自然汁於白瘢上擦之日夜十次自愈

治白癜風

草烏半兩　巴豆貳錢半

右爲細末以醋和爲劑用絹布裹定浴後擦之其藥力自下矣

紫桂散　治白點漸長如癬

紫桂不以多少去粗皮

右爲細末唾津和調傅每日三四次塗傅之甚妙

又方　雞毛白汁　生白礬貳錢　先用生布揩令微破調之不過三十上差

又方　楸木白皮　細剉用水伍斗煎取伍升去滓於慢火上再熬如稠膏用不津器收每用膏以手摩塗所患處日三五次上効

治白癜風淋洗

桑柴灰叁斗　右內大甑內蒸使氣溜下釜中取湯淋汁熱洗不過五六度瘥

白駮病源論云風白駮者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白駮此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也　夫白駮者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不瘙痒不能早療即便浸淫也

治面上風白駮

蜂房　蜣頭　蛇蛻皮

故麻鞋底　落帚　甑帶各壹兩

右件藥以月蝕之夜盛蝕時合燒灰爲細末每服壹

錢溫酒調下日進三服更用此散醋調塗之甚妙
忌雞豬魚肉大蒜等物

治白駮
硫黃研細　草決明　半夏生用
槲樹皮燒灰各等分　蛇蛻皮一條燒灰
右為末用清漆和之薄塗白處欲塗藥時先用巴豆中截摩白處令皮微起即敷藥一二遍即愈

又方
雄黃　硫黃各一兩　附子生用一兩
右為細末醋調塗之

又方
雌黃　硫黃各等分　蛇蛻皮一條燒灰
右件同研為末用醋調如膏先以巴豆中截揩白處令皮起然後敷藥三二遍差

又方　硫黃一兩用烏頭兩個炮為細末醋調塗之

又方　桂心為末以唾調塗駮上日再塗即愈

又方　取樹孔中水溫熱洗之然後搗桂心牡蠣等分為末用面油調塗白駮上日三夜一

又方　先用新布揩令赤用醋摩巴豆塗之効

又方　鰻鱺魚脂　右先洗拭駮上揩令微痛用魚脂塗之一上便愈

治白駮　用蛇蛻燒末醋調敷上神効

癧瘍風　夫風邪積熱居於肺府久而不散流溢皮膚令人頸邊胸前腋下自然斑駮點點相連其色微白而圓亦有紫色者亦無痛痒謂之癧瘍風也凡此皆風之與熱伏留肌膚之間氣血不和乃生此疾也

烏蛇散　治癧瘍風斑駮如白癜
烏蛇三兩　犀角屑半兩　防風
羌活去蘆　黃芩三分　苦參去蘆各半兩
人參　丹參　玄參
沙參各一兩　桂心　秦艽去蘆土

川芎　梔子仁　白鮮皮
川升麻　通草　白蒺藜
枳殼麩炒去穰各半兩
右為細末每服貳錢溫酒調下食後良久服之忌雞豬魚蒜熱麵等物

蛇蛻散　治頸項忽生白駮狀如白癬名曰癧瘍
故紙燒　鼈甲　鞋底
蛇蛻皮各等分
右件四味以月蝕夜伺候月正蝕時都燒之成灰

研令細每服貳錢溫酒調下不拘時候仍用醋調
藥如膏塗瘢駮上即消
又方 烏蛇壹條 右爲細末每服貳錢用熱豆淋酒
調下日進三服
女萎膏 治身體瘢瘍斑駮
女萎 附子 雞舌香
木香 白芷各半兩 麝香壹錢另研
右件細剉用臘月豬脂半斤煎藥看黃焦便去滓
入麝香攪令勻放凝用簾布揩斑駮上微疼塗之
即瘥

蜀水花膏 治瘢瘍
蜀水花 鷹糞白 白附子
白歛 當歸各壹兩 麝香壹錢另研
右件剉碎用豬脂壹斤合煎當藥焦黃去柤候冷
入麝香攪令勻於瓷合中盛先揩微破敷塗之
蒼耳丸 治瘢瘍風
蒼耳葉五月五日採陰乾 莨菪子
右爲細末每用伍兩取粟米貳合煮作粥即研如
膏却用莨菪子淘去浮者炒令黃黑色搗爲末用
壹兩相和令勻丸如菉豆大每服貳拾丸空心溫
酒送下晚食前再服
又方
附子 硫黃各半兩研 蒼耳陰乾壹握
右爲細末用醋調先以生布揩擦微赤破敷塗之
乾即更塗 一方加鐵精無蒼耳
又方 蒴藋壹斤 防巳壹斤 並燒灰用水淋取釅汁
洗瘢瘍訖後別用醋研防巳塗之即愈
又方
羊蹄草根蘸醋於生鐵上磨旋旋刮取塗於患處
未瘥更入硫黃少許同磨塗之

又方
青胡桃皮叁枚 硫黃壹錢半細研
右件爛搗入醬少許更研令勻先用泔清洗之然
後塗於患處
又方 烏賊魚骨用三年陳醋研磨如糊先用生布
揩令肉赤即塗其上
又方 五月收赤腳蜈蚣燒灰醋調塗之
又方 用白欵蜒蚰爲末先用布揩擦患處令熱敷
之一宿即瘥

烏白癩

論曰夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癮疹赤黑手足頑痹針刺不覺痛脚下痛頑不得踏地凡食之時開口出氣而喘鼻亦如是身體生瘡痛痒而時如蟲行或兩肘如繩纏此名烏癩又有黑癩凡二癩之症大同小異故不別錄也

蜩皮丸　治烏癩

蜩皮　蝮蛇頭[illegible]　鯉魚膽[illegible]
蜈蚣壹條[illegible]　䗪蟲去足翅　蜣螂焙乾
紅娘子去頭足翅　水蛭[illegible]　斑蝥去頭足翅
蜘蛛[illegible]　鮫鯉甲[illegible]　龍骨研
川椒炒　川大黃　黃連
麝香研　桂心　水銀各半[illegible]
石膏[illegible]　川芎[illegible]　白礬枯
滑石[illegible]　甘遂[illegible]　[illegible]
附子[illegible]　巴豆[illegible]　[illegible]

右為細末入研令勻煉蜜和丸如小豆大每服壹丸溫水送下空心臨卧各一服未覺再服加壹丸如小便壅中痛即有蟲下皆死也細觀形狀痛多即減一丸痛少則加至貳丸以瘥為度

右方乃攻毒取蟲之峻劑非灼知臟腑有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服仍參薛氏治癘風變症類症治法用之[illegible]

治烏癩皮膚變黑生瘡腫痛殺蟲雄黃藥塗之

雄黃水飛　金星石　銀星石
紫石英　白石英　太陰玄精石
馬牙硝　白礬[illegible]各壹[illegible]

右為細末入瓷合中用白土泥固濟候乾用炭火伍斤煆通赤即止以土蓋卷藥合候來日取出於濕地上紙襯盆蓋出火毒一伏時再研如粉取楓樹膠煮汁和調每日用塗之以瘥即止

硫黃散　治烏癩瘡久不瘥

硫黃　雄黃[illegible]　雌黃
金星石　銀星石　握雪石
水消石　寒水石　密陀僧
馬牙硝　不灰木　楓白皮
蝉蛻　亂髮灰　蜂窠灰
牽牛子　牡蠣　麝香已上各[illegible]

白礬（一錢）

研細用水銀半兩以津唾殺研如泥另入膩粉貳
錢半用生清油肆兩調勻每於患處遍塗之立効

大黑神膏　治烏癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭　芎藭　川升麻
防巳（去皮）　黃蘗　藜蘆
黃連　白礬（細研）　雄黃
雌黃（研細）　胡粉（各半兩）　巴豆
杏仁（各拾粒）　松脂　亂髮（各如雞子大）

右剉如大豆粒用豬脂貳升并藥同煎以亂髮消

盡為度綿濾去粗後入雌黃雄黃胡粉白礬攪勻
收入甆器中每用塗於瘡上一日至夜三次塗之
每次以熱鹽湯洗過然後更塗之藥勿令入口服

治烏癩殺蟲

雌黃（不拘多少）　右研如粉用醋和雞子黃攪勻塗於
瘡上乾即再塗

蜂房釀酒　治烏癩

露蜂房（伍兩）　苦參（肆斤）

右件細剉用水參斗煮取壹斗貳升去粗浸麴肆
斤半炊糯米參斗入麴蘗攪拌如常醞法酒熟每

去糟每溫一小盞食前服之

【白癩】夫白癩病者其語聲嘶嗄目視不明四肢疼
身體大熱心中煩躁手腳緩縱背膂拘急肉如針刺
或生癮疹而起往往正白在皮肉裏鼻有息肉目生
白珠當於瞳子視無所見名白癩也

白花蛇散　治癩病語聲嘶嗄者

白花蛇（酒浸）　晚蠶蛾（炒）　天麻
槐子　羌活　防風（各去蘆）
蔓荊子　威靈仙　白鮮皮
枳殼（去瓤麩炒各壹兩）　甘草（炙半兩）

為細末每服貳錢溫酒調服不拘時日進二服

鮫鯉甲丸　治白癩

鮫鯉甲（炙伍片）　蝮蛇（半條）　蛤蚧（半枚）
水蛭（生用）　蜘蛛（生用）　斑蝥（去頭足）
虻蟲（去足翅各貳箇）　蠐螬（炙生用）　蜈蚣（壹條）
龍骨（半兩研）　石膏（研水飛細）　白礬（枯）
消石　川芒硝　硝石
水銀（與錫石同研令星盡）　川大黃
黃連　桂心（各半兩）　附子（炮去皮臍貳枚）
雷丸（拾枚）　巴豆（去皮心研出油）　川椒（去目錢半）

外治

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳叁拾丸空心臨臥溫水送下日進二服

天麻煎 治白癩

天麻壹斤 天蓼木叁斤

右件剉如大豆粒用水叁斗入銀鍋或石鍋內煎熬至壹斗二升濾去柤再入銀器以慢火上熬如稀餳每服半匙食前用荊芥薄荷酒調下

又方 治白癩

馬鞭草不以多少

為細末每服壹錢食前用荊芥薄荷湯調下

苦參酒 治周身白點如癬如榆莢搔之白屑落或痒或痛色白漸展世呼白癩

苦參伍斤 露蜂房伍兩 蝟皮壹具

右剉碎用水叁斗煎取壹斗去柤浸細麯伍斤炊黍米叁斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前溫飲一小盞

治白癩

蠶蛾伍拾枚 大蝮蛇壹條乾者頭尾全

右件用酒伍升入甆瓶中用糠火煨酒及壹升濾去柤收於合中每用塗於白癩上

癮疹

孫真人論曰風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為痒也所以有風疹瘙痒皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩痒極者重抓疹起搔之逐手起又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱 大風癮疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癮疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由風氣搏於肌中風冷結為白疹也遇冷則極或風中亦極得晴明則瘥著厚煖衣亦瘥也其脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏則成癮疹致身體為痒也 丹溪云疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同作寒施治也 朱陀君三十餘久患癮疹身痒而紫色可與防風通聖散加牛蒡子為極細末每服貳錢水壹盞半入薑汁令辣煎食前熱飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相

搏則成白疹亦疹得熱則劇得冷則減盖熱氣欝於
內故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴則消盖熱氣
散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪以肝發於
表則亦若風濕搏於氣分則氣澁不行因邪并發於
表則白矣如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而
喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣分治中又有風痞瘟
者即赤白疹所謂汗出見濕乃生痤疿又曰汗出當風
寒薄為皶鬱乃痤皶即瘾疹屬也假熱類也此皆謂
外邪鬱肌肉玄府之熱者突然則與內經言少陽少
陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發若方論中則

無有也故人氣若相二火鬱發而發者宜平木之及
耳若此條是人氣所發之一者也故二火鬱發出血
氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發癍癧之外必
作出疹二火亦是君相二火發出沐盖之脈者也
幼稚世治皮膚風熱遍身生瘾疹不止勞于淫痒令分
以薄荷湯調下食後日二服
仰卧有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胸脛臍
腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩
皂角貳兩水壹升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參
為丸如桐子大食後溫水服二十丸次日便愈

千金方治法白疹宜煮礬石汁拭之或煮蒴藋和少
酒以浴之良一云以酒和少水浴之或煮石南汁拭之良或水煮雞
屎汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風
尸疹若石南湯主之
石南湯肘後方名石南湯 治風瘾疹痊久則作瘡風尸身
痒卒風面目腫起

石南葉 乾薑 黃芩
細辛去苗 人參各壹兩 桂心
麻黃去節 當歸 芎藭各半兩
甘草炙貳兩 乾地黃 食茱萸

右為㕮咀每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎
至捌分去柤熱服不拘時候衣盖令出汗
加味羌活飲 治風寒暑濕外搏肌膚發為癮疹憎
寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶
亂口苦咽乾

羌活 前胡並去蘆各壹兩 人參
桔梗並去蘆 甘草炙 枳殼去穰麩炒
川芎 天麻 茯苓去皮
薄荷 蟬蛻去頭足各半兩

右為細末每服肆大錢水壹盞半生薑五片煎至柒

分去柤溫服無時

羚羊角散　治風癮疹遍身瘙癢心神煩悶

羚羊角屑　白鮮皮　白蒺藜

防風去蘆　麻黃去節　甘草炙

羌活　枳殼麩炒　人參去蘆

杏仁去皮尖　黃芩　生乾地黃

右為㕮咀每服肆錢水一中盞煎至陸分去柤入

酒壹合更煎一兩沸溫服

樺皮散　治肺臟風毒遍身瘡疥及風癮疹

枳殼去瓤　樺皮　甘草炙壹兩

荊芥穗　杏仁

聖濟　卷　外科五

右件除杏仁用水壹椀於銀器內熬去水一半已

來放令乾另研令細次用諸藥末同研勻於瓷合

內收之每服叁錢食後溫酒調下

犀角散　治風癮疹心悶

犀角屑　川升麻　人參

玄參　沙參　防風去蘆

白鮮皮　白蒺藜微炒去刺　甘草炙

馬牙硝各半兩　牛黃細研貳錢半

右為細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉

湯調下不拘時

鬼箭羽散　治風癮疹累醫不効

鬼箭羽　白蒺藜　防風去蘆

白斂　甘草炙　白礬枯各壹兩

右為細末先用粟米粉伍合拌勻每服貳錢溫

熟水調下不拘時

漏蘆丸　治風癮疹

漏蘆壹兩　枳殼麩炒去瓤　苦參

防風去蘆　川大黃　烏蛇

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每

聖濟　卷　外科五

服叁拾丸用溫漿水送下食後服

楓香丸　治風癮疹痒不可忍

楓香　白鮮皮　白蒺藜

蛇床子　羚羊角屑　川烏頭炮去皮臍

藁本去蘆　仙靈脾　蔓荊子

芥草　赤箭各半兩

右劑服法同前

加味烏荊丸　治癮疹上攻頭面赤腫瘙痒抓之皮

脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行

川烏頭湯洗去皮尖　荊芥穗各半兩

當歸（水浸二日洗焙乾秤壹兩） 薄荷（[illegible]）
右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸
溫酒或茶清送下
治風癮疹痰痒不可忍
赤土（不拘多少細研） 每服壹錢空心溫酒調下
治遍體疹風 側子（作末）冷酒調服
治風癮疹痒不止
枳殼（麩炒去瓤叁兩）為細末每服貳錢水壹中盞煎至柒
分去滓溫服無時 一方水煮枳殼為煎塗之
治風疹入腹身體腫強乾燥
蔓菁子（叁兩為細末） 每服貳錢溫酒調下

又方
白蜜（壹合） 酒（貳合） 二味調和空心溫服
又方
僵蠶（不拘多少焙令黃色） 右為細末用酒調服之立瘥
治烏蛇膏 治風癮疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治
筋脉攣急
烏蛇 當歸（去蘆） 木鼈子（去殼）
枳殼（去穰） 大黃（各兩） 天麻
附子 烏喙 天南星

桂心 細辛（去苗） 吳茱萸
羌活（去蘆） 蒼朮（去粗皮） 防風
牛膝 川椒 白芷
白殭蠶 乾蝎（各半兩）
右件藥並生用剉碎以頭醋半升拌淹一宿用臘
月煉成豬脂貳斤於鐺中入藥以慢火煎看白芷
變黃紫色下火濾去柤令淨入於甆合內盛之摩
痒塗於所患處立効
藜蘆膏 治風瘙癮疹皮膚中苦痒搔之血出
藜蘆根 薔薇根（各貳兩） 白蒺藜

附子 獨活（去蘆） 白芷
防風（去蘆） 苦參（去蘆） 川升麻
漏蘆 漢防己 川椒
木香 蛇銜草 茺蔚子
枳殼（去瓤） 莽草 犀角屑（各壹兩）
右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石銀
鍋中盛慢火上以臘月煉成豬脂貳斤半與藥同
煎令白芷赤色浴成膏濾去柤盛甆合中每取塗摩
患處累用即差 一方無薔薇根
莽草膏 治身體赤癮疹而痒搔之隨手腫起

莽草半錢 當歸 芎藭
大戟 細辛 芍藥
芫花 川椒 躑躅花
附子 蒴藋根各伍兩 苦參貳兩
豬膏叁斤成煉者
右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黃膏成去柤以敷病上日三用之
青羊脂膏 治風熱赤疹搔之逐手作瘡
青羊脂肆兩 甘草 芍藥各叁兩
白芷 白及 黃芩
防風去蘆 黃耆 升麻
寒水石各壹兩 石膏 竹葉切各壹升
右爲㕮咀先用水捌升煮石膏竹葉取肆升去柤浸諸藥以豬脂貳斤合煎膏成敷病處效
蒴藋煎 治赤白風瘾疹
蒴藋根 白蒺藜 藿
細辛 虎杖各叁兩 辛夷
白礬 鹽各貳兩
右剉並生用拌勻每藥伍兩水壹斗煮取貳升去柤再煎至半升用綿蘸藥塗患處頻塗之即效

治風腫及瘾疹
白礬 石灰各壹兩
右件爲末用生薑自然汁調和如稀糊薄塗患處
日用一上效
治風瘾疹宜用楓香湯洗之
楓香半斤 芎藭 川大黃
黃芩 當歸 川升麻
甘草 射干各貳兩 苦參叁兩
蛇床子壹兩
右件藥並生用㕮咀每用伍兩水壹斗煮取伍升去柤看冷熱洗病上日三五度
治風身體生瘾疹宜用蒴藋根湯洗之
蒴藋根 蒺藜苗 當歸各伍兩
蛇床子 細辛各貳兩
右件細剉用水壹斗伍升煮取壹斗去柤看冷熱洗患處日用三五度藥水冷再溫用之
地骨皮湯 治風瘾疹
地骨皮半斤 當歸肆兩
白礬末壹兩 鹽貳兩
右件細剉每用藥伍兩水玖升煎取貳升去柤再

煎至壹升收甆器中以綿蘸拭患處五七度瘥

治風癮疹淋洗神効

蒴藋　白蒺藜　白礬細研後入

茵芋　馬藺子　茺蔚子

細辛　扁竹各貳兩

右剉用醋漿水壹斗煮取伍升去柤入白礬洗之

治風癮疹百治不瘥神効

白礬伍兩 右爲末用酒叁合小便壹升煎如稀膏以綿蘸藥於上輕手揩之令熱徹入皮膚其風疹須臾消散 一方只用白礬末酒浸帛蘸染患處

治十種癮疹

右用石灰不拘多少研極細和醋漿水塗疹上隨手即滅 千金方用石灰淋取汁洗之良

又方

蒴藋煮湯和少酒塗之無不瘥亦可作湯浴

治癮疹痒 茺蔚子莖作湯浴之

治風疹痒不止

芸薹菜叁握擣取汁於疹上熱揩時時取少藥揩令熱徹又續煎椒湯洗之

又方

蛇蛻皮壹條水壹升煎取半升鷄翎蘸熱藥湯塗上即瘥

單方 治面目身體生瘢或痒或瘙子腫起甚殺人

右用羚羊角燒爲灰研令極細以鷄子清和極神驗無鷄子水和塗亦妙

癮疹入腹亦能殺人用蠶沙煎濃湯洗之

夫風邪客熱在於皮膚遇風寒則起癮疹熱多則色赤風多則色白甚

卷栢散 治風皮膚癮疹及風熱生毒瘡

卷栢　枳殼去穰麩炒　羌活去蘆

麻黃去節　五加皮各壹兩　赤箭

天竺黃　藁本去蘆　防風去蘆

芎藭　黃芪　桑耳

犀角屑各半兩　烏蛇酒浸貳兩

右爲細末每服貳錢食前薄荷湯調下忌熱麵鷄豬魚蒜等物

丹參散 治風瘙皮膚赤癮疹瘙痒隨搔生瘡

丹參　人參　苦參並去蘆

雷丸　牛膝酒浸　防風去蘆

白附子炮　白花蛇酒浸貳兩

右爲細末每服貳錢食前煎甘草酒放温調下

升麻膏　治諸熱風毒氣攻衝皮膚搔生癮疹赤起生瘡無有黃水結爲膿疱痛

川升麻　白斂　漏蘆

枳殼　連翹　藍葉

黃芩　梔子仁　蒴藋根

玄參去蘆　大黃　蛇銜草

川芒硝　犀角屑各壹兩

右件細剉用竹瀝叁升拌匀經一宿用成煉豬脂貳斤同煎候白斂色焦黃絞去柤令凝用摩塗患處日六七次瘥

治風瘙癮疹遍身皆痒搔之成瘡

茵蔯生用　苦參各伍兩

右件細剉用水壹斗煮取貳升温熱得所蘸綿拭之日五七度瘥

又方

蠶砂壹升

右用水貳斗煮取壹斗貳升去柤温熱得所洗之宜避風處

疥癬

夫疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者爲疥風毒之深沉者爲癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥焮赤痒痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥瘖瘰含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癮疹或圓或斜或如苺苔走散內藏汁而外有筐其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然

彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔則痺頑不知痛痒四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而且堅五曰狗癬時時作微痒白點相連六曰刀癬則輪郭全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒之藥敷之內服和脾清肺除風散濕之劑庶絕其根又面上風癬初起瘖瘰或漸成細瘡時作痛痒發於春月名吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱

之藥敷之則自愈矣　戴院使云此雖皮膚小疾不
足爲害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癆嗜膚尤爲頑擾
甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傅
藥須內當其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼
飲犀角飲皆可用

通治瘡癬方

內服

升麻和氣飲　治瘡腫癬疥痒痛

升麻　桔梗　蒼朮
乾葛　甘草　大黃 煨各壹兩
陳皮 貳錢　當歸　半夏
茯苓　白芷　乾薑
枳殼 各伍分　芍藥 各陸錢

右件一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

當歸飲子　治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸　川芎　白芍藥
生地黃　防風　白蒺藜
荊芥 各壹兩　何首烏　黃芪
甘草 伍錢

右件一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服或爲末亦可

除濕散　治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參　何首烏　荊芥穗
蔓荊子　薄荷 各壹兩　白芷
天麻　川芎　防風 並生用
烏蛇

右爲細末每服貳錢茶酒任調下無時日進三服
六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故

苦參丸　治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參　玄參　黃連
大黃　獨活　枳殼
防風　黃芩　梔子
菊花

右爲細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服
叁拾丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

四生散　治腎臟風瘡癬等瘡及眼目昏花視物不
明

白附子　黃芪
沙苑蒺藜　羌活

右爲細末每服貳錢空心鹽酒調下用豬腰子
切開夾藥在內合定扲住紙裹煨熟尤妙人有患
赤眼睛痛不可忍臨睡一服日反大府至二鼓時

乃得睡更三四服大愈再有頑癬經年服藥貼藥俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風及眼疾頑癬無不効

治面身瘙痒明日爽神

威靈甘艸石菖蒲苦參胡麻何首烏藥末貳錢酒壹碗渾身瘙痒一時無

羌活散 治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活 獨活 明礬

白鮮皮 硫黃 狼毒各壹兩

輕粉貳錢 白附子 黃丹

蛇床子各壹兩

右為細末油調成膏傅之

疥藥神効散 治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔 蛇床子各壹兩 全蠍半兩

倭硫黃壹兩伍錢

右化開硫黃入荊芥末攪滾數沸候冷加輕粉貳錢冷再攪末加三柰半兩妙右為細末先將小油滚過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥氣神効

香疥藥 治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉 水銀 樟腦各叁錢

大楓子去殼 川椒各肆拾粒 柏油燭壹對

杏仁少許

右為細末疥用絹包裹瘡上熨黃水瘡擦上此藥功効如神

八仙散 治遊風腫痒疥癬瘡[illegible]洗遊風瘙痒生瘡

細辛 荊芥 白芷

黃芩 川芎 防風

地骨皮 甘艸各等分為粗末

右每用藥貳兩水貳碗煎十沸去滓熱搨患處

一上散 治諸般疥癬必効

雄黃通明手可捻者 熟硫黃 黑狗脊

蛇床子炒各 寒水石陸錢 蟠蝥叁個去翅足研碎

右各研雄黃硫黃寒水石如粉次入蟠蝥和勻蛇床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去痂油調手中擦熱鼻中嗅兩三次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火炙湯燙者加硫黃只嗅不止亦可愈

治一切男子女人渾身疥癬一家染易經年搔痒不效者

百部 半兩碎切　亂髮　木香 碎切

檳榔 搥碎　苦參 碎切各壹分　川椒

鯽魚 壹箇不要見水切成片

右以油伍兩煎前藥得所去藥却用麝香壹分膩粉各錢硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏 治疥癬

硫黃　白礬　白芷

吳茱萸　川椒 各等分

右爲細末煎油調塗之

楓實膏 治風瘡燥痒疥癬

大楓子肉 半兩　輕粉　枯礬 各些少

右搗爲膏擦瘡上

疥

薛己云夫疥癬之爲病雖若不害人然而至難可者多矣素問云諸痛痒瘡皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體或痒或痛或膿或腫或皮肉隱嶙或抓之凸起或膿水浸淫治之內則當理心血外散風熱外則加以敷洗理無不愈　大抵疥者皆由風熱而生遍體瘙痒搔之皮起或血出或水出結作乾痂其中有蟲人往往以針頭挑出狀如水內瘑蟲此宜出肌肉之間深受風邪熱氣之所致也　用藥在上多服通聖散在下多以瀉用丸下　腳膝出血加血分濕熱藥

薛疥瘡屬脾經濕毒積熱或肝經血熱風熱或腎經陰虛發熱其體倦食少爲脾經濕熱用補中益氣湯飲令作痛爲脾經積熱用清熱消毒散搔痒發熱爲脾虛風熱用人參消風散搔痒作痛爲風熱用當歸飲子便祕作痛爲熱毒用升麻和氣飲熱渴便利爲脾肺虛熱用竹葉黃芪湯內熱晡熱或時寒熱爲肝經血虛風熱用加味逍遙散六味丸體倦少食或盜汗少寢爲脾氣鬱結用加味歸脾湯逍遙散地黃丸

若發熱盜汗或吐痰口乾者爲腎經虛熱用六味丸
料煎服　稍數李龍岡遍身患此腿足爲甚日晡益
甚口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣湯
六味丸而痊　一儒者善飲患瘡余以爲肉有濕熱
腠理不密外邪所搏也與補中益氣湯加白芷川芎
治之不從自服荊防敗毒散盜汗發熱作渴焮痛膿
水淋漓仍用前湯倍加參芪五味而痊　一儒者患
在臂脚日晡或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處
發腫小便赤澁此肺腎陰虛余用補中益氣湯加五
味子麥門冬而愈　一儒者患此恪用攻伐之劑元

氣虛而不能愈用補中益氣湯加茯苓其瘡頻愈又
因勞役大宜日晡益甚用八珍湯加五味麥門五十
餘劑而愈　一男子色黯作痒出黑血日晡益甚其
腿日腫夜消余以爲氣血虛而有熱朝用補中益氣
湯夕用加味逍遙散而愈　一男子時瘡愈後所患
如之用前藥補養而愈有同患用砭法出血而死此
因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉　一婦
人久不愈食少體倦此肝脾虧損而虛熱先用補中
益氣湯加川芎炒山梔元氣漸復更以逍遙散而瘡
漸愈若夜間譫語此熱入血分用小柴胡湯加生地

黃治之血虛者四物合小柴胡湯熱退却用逍遙散
以補脾胃生陰血亦有寒熱如瘧亦治以前藥
丹何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下
丸

表

防風通聖散治風熱瘡疥久不愈

麻黃飲　治上體生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂堆
起蔓延於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃去根節　防風　蒼朮
陳皮　紫背浮萍　黍粘子
黃芩　滑石　羌活
石膏煅　縮砂　荊芥各貳錢
蒼耳草　生甘草各壹錢　薄荷葉壹錢

右㕮咀每服陸錢水壹鍾半溫火煎取陸分入好
酒四五滴去滓熱服須得通身有汗其瘡自安甚
者服至百服之後有汗出到何處若自上而下出
過脚曲脉其瘡自愈

消毒散方

防風壹兩　甘艸貳兩　荊芥穗參兩
黍粘子肆兩

爲粗末每服參錢水一盞煎柒分去柤食後溫服

子和治楨吉韓吉卿自髀至足生濕𤻙瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行袴襪愈而復生瘢痕成凹十餘年不瘥戴人哂之曰此濕𤻙瘡也由水濕而得故多在足下以舟車浚川大下十餘行一去如掃

升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢臀髀痛痒不常甚致增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫及濕風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛

蒼朮（壹兩） 桔梗（二兩） 升麻
乾葛（各壹兩） 陳皮（一兩半） 甘草（一兩半）
芍藥（各七錢半） 半夏（炮七錢） 當歸（去蘆）
白芷 茯苓（去皮各） 枳殼（麩炒去穰）
厚朴（薑製） 乾薑（炮各半錢） 大黃（蒸半兩）

右爲㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑叁片燈心拾伍莖煎至柒分去滓食前服

枳殼散 治疥瘙痒麻痺

枳殼（麩炒去穰） 白蒺藜（炒去刺） 苦參（去蘆）
蔓荊子（各壹兩）

右爲細末每服叁錢溫酒調下不拘時日進二服

枳殼丸 治一切風熱生瘡疥

枳殼（肆兩麩炒去穰） 苦參（去蘆各肆兩）

右爲細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服叁拾丸食後溫酒送下

苦參丸 治瘡疥瘙痒

苦參（為末） 皂角（一斤）

右用皂角將水壹斗浸揉濃汁濾去粗用清汁熬成膏子和苦參末爲丸如梧桐子大每服叁伍拾丸煎荊芥酒送下或薄荷酒亦得不拘時候

赤小豆散 治乾濕疥

赤小豆（貳合炒乾內醋中如此七次） 升麻
薏苡仁 黃芪（各半兩） 人參
白歛 瞿麥穗 當歸（切焙）
黃芩（去黑） 豬苓（去黑皮） 防風（去叉）
甘草（炙各）

右爲細末每服叁錢匕空心粥飲調下日二夜一

豬脂調散 治疥瘡膿臭瘡神効

蛇床子（貳兩） 藺茹 草烏頭
荊芥 花椒 苦參（各壹兩）
雄黃 硫黃 明礬（各半兩）

右爲細末豬脂調搽

掃疥散　治諸疥瘡熱瘡徧身瘡癤神效
大黄　蛇床子　黄連
金毛狗脊　黄蘗　苦參 各伍錢已上六味為末
烏梢蛇 酒浸入藥為末　硫黄　水銀 各伍錢同末殺之
雄黄　黄丹 各伍錢　輕粉 壹錢
大楓子 去殼　木鼈子 六十個去殼各伍錢同研令勻
右用生豬脂調洗浴後搽瘡上此藥宜調和合之不
見火塗瘡疥効如掃故名掃疥
秘傳一擦光　治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹
諸般惡瘡神効
蛇床子　苦參　蕪荑 各壹兩
雄黄 半兩　枯礬 壹兩貳錢　硫黄 貳錢
輕粉　樟腦 各貳錢　大楓子 取肉
川椒 伍錢
右為細末生豬油調傅
又方　治瘡如前兼小兒癩頭瘡治之
蛇床子　硫黄　黄蘗 各壹兩
大楓子　川椒　雄黄 各半兩
枯礬 貳兩　輕粉 貳錢　牛皮灰 燒牛皮燒存性
如無以香爐灰代之　黄丹 各壹兩

右為細末生豬油調傅
一上散　治諸般疥瘡或痛或癢或湯火燒洗
者
蛇床子 略炒　雄黄 別研　黑狗脊
寒水石 別研　白膠香 細研　各壹兩
白礬　黄連 各半兩　吳茱萸 伍錢
硫黄 貳錢半別研　斑蝥 去翅足
右為細末香油調傅治疥瘡先以芽草或羊不
食草藤濃煎湯洗去瘡痂然後以此藥傅可一次
愈
又諸般瘡疥加減法　膿多加白芷開鬱　痛多加
白芷方解石　癢多加枯礬　陰囊瘡加吳茱萸
濕多香油調　乾癢出血多加大黄黄連豬脂調
蟲多加蕪荑錫灰檳榔藜蘆斑蝥　紅色加黄
丹　青色加青黛
羅網散　治疥經年不瘥
水銀 壹錢　好茶 貳錢　蕳茹 貳錢
輕粉 少許
右為細末每用不拘多少麻油調塗之
本事　治疥瘡不問新久方

白蕪荑壹兩　檳榔　吴茱萸各半兩

硫黄貳錢別研　右為末麻油調抓破揩之

世 治疥癬以臘月猪脂不拘多少同生白礬杏仁加

輕粉擣爛擦之

丹 疥癬瘡

白礬　吴茱萸　蛇床子

黄蘗　大黄　硫黄

寒水石貳錢半　樟腦　檳榔

輕粉　右為末猪脂油調搽

丹砂膏　治一切惡瘡疥瘙痒不止宜用此

硃砂　雄黄　雌黄研細

亂髮　白蠟　松脂

蘭茹　巴豆　猪脂

右件藥先以猪脂煎亂髮令消盡次下巴豆蠟松

脂煎十餘沸用綿濾去相似稠即入雄黄硃砂等

末攪令匀瓷合内盛不拘時候用少許摩塗之以

瘥為度

巴豆膏　治一切疥瘡有蟲時作瘙痒

巴豆　蕪荑　硫黄研細

白礬枯各半兩　猪脂

右為細末煉猪脂成油入前藥末調和令匀每用

蓮子大於手掌内搓塗之

神異膏　治一切瘡疥

雄黄細研　蛇床子叁錢　巴豆

皁角　輕粉　全蝎

黄蠟　清油

右先用皁角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黄

蠟化開取出入雄黄蛇床子末輕粉和匀成膏

先用苦參湯温洗却以擦瘡疥上甚妙

白礬散　治一切疥

白礬　硫黄　雌黄並細研

胡粉　黄連各壹兩　蛇床子

右為細末研令匀以猪膏和如稀麵糊每以鹽漿

水洗拭乾塗之

苦參散　治一切疥及風瘙痒搔之成瘡

苦參　丹參　蛇床子半斤

右為細末先以温水洗瘡拭乾後敷之

治諸瘡有白蜘復發

大蒜　鼠糞

為細末以蒜研和如膏塗瘡上日二三次甚妙

苦參湯
苦參　蛇床子　荆芥穗
白礬各等分
右爲㕮咀煎湯放温洗
治瘡疥因風致腫
苦參　蛇床子　白礬各貳兩
右以水叁斗濃煮汁却入盆中把漬之淋洗其瘡
腫日夜數次爲妙
一笑散　治渾身疥癩搔痒生惡瘡
檳榔　藁本　硫黄
蛇床子　枯礬　五倍子
白膠香各等分
右爲細末濕者乾傅乾者香油調傅如頭上瘡便
搽上不用剃甚者不過二五次平復如故
神捷散　治諸疥瘡
吴茱萸　白蒺藜各壹兩　白蕪荑仁
輕粉各半兩　赤小豆[illegible]　石硫黄研少許
右爲細末研勻每用半錢匕生油調於手心内摩
熱後徧揩周身有疥處便睡輒覺其疥自愈
殺疥藥

羊蹄根[illegible]　草烏頭[illegible]　硫黄壹錢
白礬半錢　生薑[illegible]分
右以米泔水淹一宿研極細入釅醋和勻入浴時
抓破疥傅之須㬰以温湯洗去妙
治疥神効
狼毒　細辛　水銀[illegible]壹錢
輕粉半錢
右爲細末油蠟和劑作兩丸綿裹兩手將於周身
疥多處擦之
葛氏療疥瘡方

右取楝根削去上皮切[illegible]皮[illegible]等分熟搗下
篩膽膏和搔疥去痂以塗之護風勿使女人小兒
雞犬見
熏疥方
明信　雄黄各半錢　椒目壹錢
右研細用紙以方尺熟艾攤平摻勻捲成長錠子
兩日合紙捲子火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油
塗眼耳口鼻小兒只空衣蓋被卧亦効宜淨室溫
床牢擁衾被無令透烟以熏至其人口鼻爲効
治癰疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黄水出瘥後

復發取羊蹄根去皮細切熟蒸以大醋和先洗後傅
上一時再以冷水洗之日一傅瘥若爲末傅尤妙
治疥取羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳
治徧身風痒生瘡疥茵蔯蒿煮湯濃洗立安
衍有人患徧身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸
而止粘著衣被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以
菖蒲三斗剉日乾之舂羅爲末布席上使病瘡人恣
臥其間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五
七日其瘡如失應手神驗
乾疥乾疥者但搔之皮起作乾痂此風熱氣深在肌
肉間故也
秦艽丸 治徧身生疥乾痒搔之皮起
秦艽去蘆 黄耆 苦參各去
大黄各貳 漏蘆 防風各去蘆
黄連 烏蛇肉
右爲細末煉蜜和擣三二百下丸如梧子大每服
叁拾丸食後温酒送下
皂角膏 治皮膚風熱生疥乾痒
猪牙皂角 巴豆去皮 烏頭生

吳茱萸 硫黄 膩粉
白礬 黄蠟
右爲細末研令勻先入清油叁貳合以慢火
了攪和令勻日用二三次塗之
治疥瘡生乾痂瘙痒不止
硫黄 巴豆 黄蠟各
猪脂
右先煎猪脂令沸入巴豆煎候黄焦去下蠟候消方
下硫黄末攪令勻瓷盒內日三五度塗之
一上散 治風痒裂折燥瘡
苦參 白芷 焰硝
枯礬 荆芥穗 寒水石煅
白芨
右爲末油調搽
濕疥 大濕疥者起小瘡皮薄常有黄水出此風熱毒
氣入皮膚間故也
烏頭散 治濕疥常有黄水搔痒不絕
川烏頭 藜蘆 馬藺根
石菖蒲 杏仁 苦參
硫黄 膩粉 白礬各半兩

右爲細末研令勻用時先以桃湯洗拭乾後以油
漿水和塗之三日一塗不過三兩上瘥

黃連散　治濕疥有黃水皮膚瘙癢

黃連 貳兩　蛇床子 壹兩　赤小豆
糯米　胡粉 各壹兩　水銀 壹兩

右件爲細末以生清油和研候水銀星盡如膏旋
取塗之

治濕疥遍身

黃蘗　綠礬　膩粉
硫黃 各等分

右爲細末研令勻用生油調塗之

又方 兒用　硫黃 各二兩 共爲細末以醋貳升熬爲膏
塗之

濕疥 元希聲侍郎治疥瘡秘驗方用石灰隨多少
和醋漿水調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣
香油調傅

又方　淋石灰汁洗之

又疥 木香散 寶鑑　治多時不歛一切惡瘡此肉能生
肌肉止痛

木香　檳榔　黃連 各半兩

白芷 各叁錢

以上同爲細末先洗淨每日一遍乾貼有水者密
怪未効又貼　又方同上加地骨皮爲細末先於
瘡口上用溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可
述　暨治下疳瘡神効

用諸瘡疥久年者千年韭根炒存性末之豬油調傅
三次 良驗

多年惡瘡不瘥或痛癢生衅爛研馬糞并齒灰傅上
不過三兩遍効武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得
此方便瘥

丹風瘡久不瘥燒狗屎末傅之

沙瘡 丹溪云沙瘡殺蟲爲主

蕪荑　寒水石　黃蘗 各貳錢
蛇床子 叁錢　白礬 飛　明礬
前草　吳茱萸 各壹錢　蒼术
厚朴　雄黃 各五錢　輕粉 拾盝

世治沙瘡山蜈窠黃荊葉雞雞毛等分燒存性
香油調傅　又方用陳年船底灰搗細篩過細油調
傅立効　又方治沙瘡用水蔦苣燒灰存性香油調
傅立愈水多者乾傅 水蔦苣如百合狀生水邊七八月開花又如野蒜狀

瘑瘡 大抵瘑瘡者由腠理虛風濕之氣入於血氣結聚所生也多著手足遞相對如新生茱萸子痛癢爬抓成瘡黃汁出浸淫生長坼裂時差時發變化生蟲故名瘑瘡也

瘑蘆散 治風瘑瘡熱腫

瘑蘆[illegible] 川升麻 木通去皮

赤芍藥 甘草炙 防風各[illegible]

羌活[illegible] 枳殼[illegible] 川芎[illegible]

右為㕮咀每服伍錢水壹大盞煎至陸分去滓食後溫服

治洗毒風生瘑疥

螺殼[illegible] 亂髮燒灰 龍膽草末

胡粉各半兩

右件為細末研令勻用清油[illegible]調塗之

治瘑瘡

[illegible]

分為細末[illegible]以水煎什沸及入鹽少許淨洗乾便以藥末[illegible]上便若惡刺以[illegible]成[illegible]

又方

[illegible]日用二度

生韭[illegible]

右用湯浸五合浸良久以布絞取汁塗摺瘑瘡日三四度用之

治乾瘑濕瘑疥癬

右取連根生葱白豬脂和搗塗之

夫瘑瘡積久不差者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間生長則常痒痛故經久不差也

藜蘆膏 治瘑瘡經久則生蟲

藜蘆 松脂[illegible] 苦參

雄黃細研 白礬[illegible]

右件先搗藜蘆苦參為細末入豬脂壹斤相和煎十餘沸綿濾去租次入松脂雄黃白礬等末攪令勻待冷收於瓷合旋取塗之以差為度

治瘑瘡經年久不差宜用之

零陵香 杏仁各[illegible] 硫黃細研

膩粉[illegible] 黃蠟[illegible] 油[illegible]

右件細研如粉先煎清油沸下蠟令消次入諸藥末同煎如稀膏候冷收於瓷器中旋取塗之

苦參湯洗方

地榆 桃皮 苦參各伍兩

右件藥並細剉以水貳斗煮濾去柤稍溫每日一
度洗之甚妙
[玉]手疥　勞宮灸　太陵灸
世瘡疥頑癬　絕骨　三里各灸各刺　間使　解溪各五
分　血郄灸寸
集渾身生瘡疥　曲池　合谷　三里　絕骨　行間
瘤　委中
理疥癬　陽谿主之

癬

病源論云癬發之狀皮肉癮疹有如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭癬內生蟲搔之有水此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏血氣閉澁則發此疾　風癬者是惡風冷氣客於皮折於血氣所生亦作圓文匡郭但抓搔頑痺不知痛痒內亦有蟲　又有逸風瘡生則遍體狀如癬疥而痒此由風氣逸於皮膚因名為逸風瘡也　乾癬者但有匡郭皮枯索痒搔之白屑出是也亦是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若風毒氣多濕氣少故風沉入深故無水而為乾癬中亦有蟲　又有白癬其狀白色而痒此由腠理虛而受風風與氣并血澁而不能榮肌肉故也　濕癬者亦有匡郭如蟲行浸淫赤濕搔痒搔之多水成瘡蓋風毒氣淺濕氣偏多而為濕癬中亦生蟲

服丹溪云癬瘡用防風通聖散去芒硝大黃加浮萍皂角刺

又方治癬用
浮萍壹兩　蒼耳　蒼朮貳兩
苦參壹兩半　黃芩半兩　香附壹兩半

右為末酒調服或酒糊丸

何首烏散 羅氏 治脾肺風毒攻腫遍身癬變成癮疹搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫癜白癜頑麻等風並宜服之

荊芥穗 蔓荊子 威靈仙

何首烏 甘草炙 防風

蚵蚾草各等分

右搗羅為末每服壹錢食後 溫酒調下沸湯亦得

白蒺藜散 治一切癬及疥風痒痛瘡等疾

白蒺藜 秦艽去蘆土 枳殼麩炒去穰

獨活 防風並去蘆各貳兩 人參

苦參 玄參 丹參

沙參各去蘆 甘菊花 梔子仁

黃芩 茯神去木 茱萸

細辛去苗 麻黃去節各[illegible] 烏蛇酒浸取肉[illegible]

右為細末每服貳錢食前溫酒調下

苦參丸 治肺毒邪熱生瘡疥癬並宜服之以苦參一味為細末粟米飯丸如梧桐子大每服伍拾丸空心溫水飲湯送下

苦參丸 治一切癬皮膚瘙痒

苦參[illegible] 菖蒲肆兩 烏蛇[illegible]

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服叁拾丸熱水送下不拘時候

三神丸 治一切癬

蒺藜炒 海桐皮[illegible] 草烏頭鹽炒熟去皮[illegible]

用各壹兩

右為細末麵糊和丸如菉豆大每服拾丸加至拾伍丸溫酒鹽湯送下

胡粉散 治一切癬疥瘙痒甚者

胡粉別研 雄黃別研 硫黃別研各壹錢半

大草烏[illegible] 蛇蛻[illegible] 砒伍分

蝦稍[illegible] 麝香壹分

右為細末先用羊蹄根蘸醋揩動次用藥少許擦患處

銀粉散 治一切頑癬

輕粉 黃丹 白膠香

瀝青各[illegible]分

右為細末麻油調拭淨或抓破竹篦挑擦一次便

乾數次剝去殼也治牛皮癬如神

八寶散 治風癩松皮頑癬久不愈者一鄉人患此疾數年不愈後得此方試用有効

藿香 破故紙 檳榔

大腹皮 雄黃 輕粉

硫黃 白礬各等分

右爲細末小油調搽日上三五次痊則搽之

五倍子散 治癬久不瘥

五倍子 去穰焙乾 黃蘗 銼 當歸 銼炒

膩粉 漏蘆 白礬 枯各等分

右爲細末先用鹽漿水洗拭乾敷之

丁香散 治一切癬

丁香 蝦蟆灰各壹兩 麝香 研貳錢半

白礬 枯 五倍子 研 膩粉 研各半兩

右研勻乾傅癬上以瘥爲度

水銀膏 治一切癬

水銀 壹錢半 蕪荑仁 研末 薑黃 研末各半兩

酥 貳兩

右先將酥和水銀以柳槌研攪候水銀散即下蕪荑薑黃末攪勻磁盒盛旋取塗癬上日三二次

定粉膏 治乾濕癬風癬不拘年月

定粉 水銀 蕪荑

胭脂 各壹分

右同研勻用陳豬脂壹兩同研成膏先用湯洗後以膏于臨卧塗之一上便瘥本法豬脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

楝實 [illegible]如無實[illegible] 楝葉及嫩枝 細剉

凌霄花及藤 [illegible]各 枳殼 去穰

蛇床子 地榆 丹參

皂莢 苦參 各壹兩

右同煎濃汁熱洗患處

黃連膏 治一切久瘡積年不瘥四畔潛侵後變成瘑瘡疱赤黑痒不可忍搔之出血

黃連 去鬚 黃蘗 去粗皮 豉 細研

蔓菁子 杏仁 湯浸去皮尖雙仁細研各半兩

水銀 壹錢

右先以水銀於掌中唾研如泥次入乳鉢內下生油壹合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上

癬瘡方 接樹皮不犯銅鐵每貳兩入麝香半錢同

芬卖錢細研爲末刮癬出血用好醋調傅雖痛抑
一傅可愈
一方用　蘆薈　大黄　輕粉　雄黄　蛇床子
樺樹皮　檳榔　右先刮破癬用醋調藥末塗之
頑癬用樺樹皮加巴豆斑蝥爲細末又加生砒少許
水調傅
治癬積年不瘥者
右用蟹殼壹個去頭翅足以針簽燈焰上燒米醋
内淬如此三兩次就燒成存性黑灰研爲細末用
紅棗壹個湯泡剝去皮核與蟹殼一處同研爛先

以手抓或生布揩動癬然後搽藥不可使好肉恐
有毒
治牛皮癬用清香油壹兩入全蝎柒枚巴豆貳拾枚
斑蝥拾枚同熬候色焦者先去之去了入黄蠟壹
錢候熔收起朝擦暮愈不損皮肉
又方
綠離根多少不拘　花椒壹兩　信些少
防風　白芨　百部
白斂各半兩　江子拾箇去殼
右各爲末和綠離根搗熟成團將藥於癬上擦之

傚痛過洗浴
又方一味綠離根去粗皮取細皮與肉者搗爛用醋
調塗癬上立愈
治癬用川槿皮細搗爲末生油調傅
治癬神效方
藜蘆根半兩　輕粉貳錢半
右爲細末凉水調搽癬上
簡要濟衆治癬疥久不瘥羊蹄根搗絞取汁用膩粉
少許調如膏塗傅患處三五遍即瘥如乾即用豬脂
調和傅之

取楮皮枝中白汁塗癬甚妙
治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傅癬上
經驗方　治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以豬
脂調傅之三五度瘥　又方用癬瘡搗山豆根末臘
月豬脂調塗之
半夏散　治一切癬
右以半夏爲兩搗爲末以陳醬汁調和如稠膏塗
癬上日兩三度即瘥
東坡先生家藏方
决明子不以多少爲細末

右用水銀輕粉少許與藥末同研為膏散以物搽
破瘡上用藥傅之立瘥
鯽魚膏　治諸癬瘡或乾或濕痒痛不可忍
鯽魚中者壹枚　亂髮如雞子大　豬脂半斤
雄黃壹兩半　硫黃半兩
右件藥先煎豬脂令沸即下魚煎令焦盡次下髮
令銷盡去柤下雄黃硫黃末攪令勻於瓷器中不
拘時候塗之以瘥為度
凌霄花散　治風濕無熱生諸癬久不愈
凌霄花　黃連　白礬各半兩
雄黃　天南星　羊蹄根各半兩
右為細末抓破用生薑汁調藥搽之如癬不痒只
用清油調藥立效
貼葉荷草散　治一切癬無問風濕氣血與夫相染
而生並宜用之
貼葉荷草鋪瓦上焙乾壹兩　枯白礬壹錢
雄黃半錢
右為細末用羊蹄菜根先蘸醋擦癬上令痒破即
用藥末乘濕塗敷不過兩三次即愈
是齋治諸癬

貫衆　吴茱萸　官桂各等分
右為細末先用手抓破用藥搽之米醋調敷亦得
砒霜散　治諸癬不問乾濕積年不瘥
砒霜半錢　硫黃　密陀僧
膩粉半錢
右件同研令勻如癬乾即用生油調塗若癬濕即
用藥摻之
治癬疥瘡痒不可忍
皂角去皮炙壹挺　黃連去鬚壹兩　膩粉壹分
右將皂角為末用米醋貳大盞同煎如稀餳以絹
濾去柤入黃連末膩粉調令勻候癬發時惡水出
便可先用構樹白皮搽破後塗藥三兩上便愈
治疥癬　用松膠香研細約入輕粉和勻凡疥癬上
先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度
治癬瘡　取蟾蜍燒灰為末用豬脂和敷之
又方　使云癬如牛皮搔痒其上不可忍若又疼則痊
治木香黃蘗皮杉木節貳兩明礬少許以上各等分
為末用好真香油調塗大效
烏蛇丸　治一切風癬多年不瘥者
烏蛇酒浸去骨　白附子炮　附子炮去皮臍

天麻各貳兩　全蠍炒　羌活
乳香　殭蠶炒各壹兩半　苦參拾兩
槐花半斤
右為細末用生薑汁壹斤蜜壹斤二味同熬成膏
入藥和丸如梧桐子大每服叁肆拾丸空心用溫
酒送下夜晚荊芥湯送下
白花蛇丸　治風癬瘡皮膚瘙痒久不瘥
白花蛇酒浸叁兩　苦參去蘆叁兩　麥門冬去心壹兩半
黃芩　防風去蘆　白鮮皮
甘草炙　枳殼麩炒去穰　梔子仁

赤芍藥　川大黃　蒼耳子
羌活去蘆　黃芪去蘆　白蒺藜各壹兩
右件為細末煉蜜和搗一二五百下丸如梧子大每
服叁拾丸食後薄荷酒送下
本事烏頭丸治風癬妙[illegible]
宣風換肌散　治一切風癬疥瘡疙瘩風瘡
甘草炙　黃芪　當歸各壹兩
黃連　黃芩酒炒各[illegible]　大力子炒
防風　白芷　荊芥穗
川芎　烏蛇肉酒浸各半兩　羌活

蒼朮　何首烏各叁錢　全蠍炒拾枚
右為細末酒調服茶清亦可每服貳錢
雄黃膏　治風毒疥癬
雄黃細研　膩粉研　白礬枯
川椒　藜蘆各貳錢半　附子去皮臍生研
右為細末入乳鉢內再研如粉用煉了臘月豬脂
半斤黃蠟貳兩淨鐺內慢火煎候蠟銷傾於甆合
內入雄黃等末攪勻每日四五度取少許敷塗之
硫黃散　治風毒癬徧身皆生瘙痒
硫黃研　雄黃　硃砂細研

麝香細研　吳茱萸　附子生用各貳錢半
巴豆去皮　川椒各壹錢
右為細末同研令勻先用新布揩癬令水出便用
醋調塗之不過三兩上即瘥
治風癬及寒熱瘡疥
韭根數多年者　藜蘆　瓜蒂
白礬　雄黃　水銀
胡粉各貳錢半
右先將硫黃白礬同研研極細卻入水銀用柳木
槌研勻用豬脂壹斤將韭根藜蘆瓜蒂煮數沸去

但放溫湯前藥塗瘡大有神効

祛風白芷散 見面部面瘡

丹參湯 治風癬瘙痒洗浴

丹參去蘆 蛇床子各叁兩 苦參伍兩

白礬研貳兩

右除白礬外篩為麄散用水叁斗煎取貳斗濾去柤入白礬攪令勻乘熱於避風處洗浴用水冷為度拭乾了用藜蘆末粉之相次用之以瘥為度

乾癬 治乾癬痒痛不止

草烏頭 狼毒各等分 斑蝥去翅足

右件生用為細末用唾津調用竹篦子刮破塗藥熱搽入肉候出黃水三兩日即瘥

又方 盤蝥五月五日取拾枚 麝香半錢 同研為細末醋調塗癬上出少黃水瘥

又方 川烏頭貳枚生用 乾蝎伍枚 為細末面油調作膏塗之

治乾癬積年生痂搔之黃水出每遇陰雨即痒

巴豆拾粒

右於炭火燒之令油出盡即於乳鉢內用少許酥和研如膏薄塗之不過一兩度愈

又方 用狼毒醋磨塗之

又方 盤蝥半兩微炒研細末蜜調薄敷即瘥

羅氏柏脂膏 治乾癬

柏油壹斤 黃蠟半斤 杏仁肆拾伍搗研碎

朴硝壹兩

右件相和於鐵器內用老生葱白叁根一順攪五七次煎沸濾過成膏於癬上搽之

一抹散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭各等分生用

為細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

濕癬 濕癬在頸項間後延上至耳成濕瘡他治不應以蘆薈壹兩甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭乾傅之神妙

硫黃散 治濕癬痒痛不可忍

硫黃壹兩 膩粉貳錢 龍腦壹錢

盤蝥壹兩

右件藥同研細如粉用生油調如泥痒痛時抓破後用藥搽之立瘥

又方

烏梅拾肆枚和肉 大蒜拾肆顆 梁上塵貳合

右件相和入瓷盒子內熟搗用醋調塗并浸一宿塗
於瘡上即瘥
黄連散 治癬濕痒不可忍
黄連 黄檗 胡粉各等分
雄黄半兩各研細
右為細末同研令勻先用温漿水洗瘡然後取藥
敷之不過三兩度即瘥
治濕癬白禿
右取馬齒莧膏塗之若燒灰敷之亦瘥
孟詵云蕪荑和蜜治濕癬
治濕癬方
黄連 明礬各半兩 胡粉
黄丹 水銀各
右為細末用猪脂油調研令水銀星盡散磁
盒收用
螺殼散 治濕癬痒不可忍
螺殼 亂髮灰 龍腦
胡粉各半兩
右為細末研勻以油淀和塗之
荊芥散 治多年濕癬
荊芥穗 膩粉伍錢
寒水石 麝香
右研勻先以口含鹽漿水洗瘡令破用手揾乾
了以生油調藥傅之
羅祛濕散 治多年濕癬大有神效
蟾沙 滑石
為細末每用不問多少乾摻瘡上或用生油調搽
子但一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝
發痒時爬搔湯火俱不解痒定黄赤水流又痛不可
忍灸焫熏渫硇蒜斑猫(?)俱用皆不效
其父母求療於戴人戴人曰能從予言則瘥父母諾
之以排針磨尖快當其痒時於癬上各刺百餘針其
血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡
以告後人恐為癬藥所誤濕淫於血不可不砭者矣
灸法 日中時灸病處影上三姓灸之呪曰癬中蟲毛
戎戎若欲治待日中 又法八月八日日出時令病
人正向東面戶內長跪平舉兩手持戶兩邊取肩頭
小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三壯若七壯
十日愈

浸淫瘡

浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止搔痒者初如疥搔之轉生汁相連者是也仲景云從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可治　運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

升麻湯　治心有風熱生浸淫瘡徧體

升麻　大黄（剉微炒）　黄芩（去黑心）

枳實（麩炒）　芍藥（各壹兩）　當歸（切焙）

甘草（炙各半兩）

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半燈心壹握煎至壹盞去滓空心溫服

香瓣瘡方　治面上耳邊生浸淫瘡有黄水出久不愈

羖羊鬚　荆芥　乾棗（去核各貳錢）

右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許清油調搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効亦治大人小兒兩吻生瘡

雞冠血塗方　治卒得浸淫瘡不早治則遶身周匝能殺人外臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心

右以雄雞冠上刺血傅之日三五度

簡要濟衆方浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺薊末水調傅瘡上乾即易之

又方鯽魚（長五寸者）豆豉（壹合）右杵如膏塗之亦療馬鞍瘡

又方苦瓠（壹兩）蛇退（半兩燒）露蜂房（半兩微炙）梁上塵　右為末油調塗

又方伏龍肝（末壹錢）亂髮（燒灰）右為末豬脂和塗

又方以雞冠血和黄連末塗　煎鯽魚膏塗　生切鯽魚片和鹽貼　燒胡燕窠水和塗

山妻年五十舊患發腳之處腠理虛疎每食則汗出成流一日忽成浸淫瘡膿汁所至輒皮破肉腐傅銀粉黄連黄丹枯礬之屬皆不驗用豬膽汁調蘆薈末塗之膿水即乾而瘉

[illegible]玉粉散　七寶散[illegible]

天泡瘡

天泡瘡即丹毒之類而有泡者由天行少陽相火為病故名入泡為火熱客於皮膚間外不得泄怫熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或頭亦赤隨處而起若自裏達於外發在春夏三焦俱熱則服通聖散若若止從頭項兩手起若此上焦熱也則服涼膈散若從身半已下起者則服黃連解毒和四物湯若發於秋冬則宜升麻葛根犀角或加黎芩一二味外傳如馬齒莧吳藍赤小豆苧根之類皆解毒消腫可用於初起之時或蚶殼或龜甲水龍骨各煅存性則收濕濕生肌可用於浸淫之後

痤小癤也謂之熱癤是也王註云大如酸棗或如豆色赤而內有膿血也

海藏云汗出見濕乃生痤疿疿為疹癤也勞汗當風寒薄為皶鬱乃痤　痤色赤腫內有膿血

旋覆花丸

旋覆花 叁兩　防風　白芷

甘菊花　南星　半夏

石膏　川芎　陳皮

白附子 各壹兩　蝎稍　僵蠶 各叁錢

右細末薑汁糊丸梧桐子大茶湯下叁伍拾丸食後服

黑末子 治癤毒

用羊角連內骨燒存性為末酒調叁錢分上下服之瘡可散

按此方未嘗用服蓋秘方也常治面上或身卒得赤斑或痒或瘭毒不治殺人以羖羊角燒存性研令極細末以雞子清調塗之甚効本草亦云然

熱瘡痱子

千金云凡熱瘡起便生白膿即今俗名膿窠瘡是也其初起即淺但出黃汁名肥瘡又名黃爛瘡初作亦如肥瘡者手足常相對生隨月生死痛痒坼裂春夏秋冬隨瘥劇者名為瘑瘡治法已見瘑門

膿胞瘡治熱為主

黃芩　黃連　大黃各叁錢
蛇床子　寒水石貳錢　黃丹伍分
白礬壹錢　輕粉　白芷
無名異各少許　木香少許痛者加

右為細末麻油調塗

又方　蕎麥麵[illegible]　硫黃[illegible]　水銀制鉛壹錢研　或油或豬膽汁調搽

白蒺藜散　治熱毒瘡瘙痒心神煩躁

白蒺藜炒去刺　白鮮皮　防風去蘆
川大黃剉炒　赤芍藥　梔子仁
子芩　麥門冬去心焙　玄參
桔梗去蘆　甘草炙赤剉　前胡去蘆各壹兩

右為細末每服貳錢食後用薄荷湯調服

密陀僧散　治熱毒惡瘡臭爛久不生肌

密陀僧　雄黃　雌黃
定粉各半兩　膩粉壹錢

右研為細末先用柳枝壹握生甘草壹兩捶碎以漿水貳升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傅之

白金散　治風毒攻注遍身及手足生熱瘡疼痛出黃水

用桂府滑石為細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許水貳碗煎上項藥至壹碗去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾上摻滑石末令通身使匝至明決愈

玉粉散　治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉壹兩　蛤粉玖兩半　白石脂
白龍骨　石膏各半兩　滑石半兩研
寒水石燒通赤放冷地上出火毒壹兩　粟米粉貳兩

右為細末研勻每用些少乾摻患處

七寶散　治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪　當歸　防風
荊芥穗　地骨皮　木通各貳兩
白礬壹兩

右為粗末每用藥壹兩水叁大碗煎五七沸濾去

淬㴱熱淋潔患處避風少時

赤石脂散 治痱子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂細研 黄檗去粗皮剉 臘茶末各半兩

白麪貳兩 龍腦半錢另研

右為細末研勻每用時綿揾撲之

龍腦粉方 治痱瘡痒痛

龍腦壹錢研 粟米粉伍兩

右研勻先用棗葉湯洗後用綿揾撲之

玉女英 治痱瘡痒痛

滑石半兩細研 菉豆粉肆兩微炒

右研勻以綿揾撲之 一方有棗葉壹兩

楝花粉傅方 治痱子瘙痒

右用苦楝花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末各少許研勻日頻傅之

治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡

右取臘雪水和蛤粉傅之

戴院使治痱子用香撲粉入朴硝末如常撲使更入少許枯礬末

治熱痱瘡徧身如蠶子用不灰木棗葉為末瘡上搽之即止 又法用茭菰葉陰乾為末傅之 又方用

臘雪以瓶收貯遇生痱時以所化水塗傅 又方用黄瓜切斷擦痱子上即安 又方用棗葉煎湯浴之

又方用蚌粉肆兩菉豆粉貳兩滑石壹兩為末乾擦之

瘖癗

夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與
熱氣并則生瘖癗狀如麻豆甚者漸大搔之則成瘡
也

羚羊角散 治風熱皮膚生瘖癗或癢痛

羚羊角屑 白蛇肉酒浸 川大黃
玄參去蘆各壹兩 枳殼去瓤麩炒 白蒺藜
甘草炙各半兩 秦艽去蘆土 防風去蘆各
右件㕮咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去柤入
牛蒡根汁半合更煎一兩沸溫服不拘時候

秦艽湯 治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘖癗如麻
豆

秦艽去蘆壹兩 防風去蘆 黃芩
麻黃去節 甘草炙 玄參去蘆
犀角屑 牛蒡子炒 枳殼去瓤麩炒
川升麻各柒錢半
右件㕮咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去柤溫
服不拘時候

當歸飲子 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚徧身
瘡疥或癢或痛或膿水浸淫或發赤疹瘖癗

當歸去蘆 白芍藥 川芎
生地黃 白蒺藜 防風去蘆
荊芥穗各壹兩 何首烏去蘆 黃芪去蘆
甘草炙各半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎至捌分去
柤溫服不拘時

烏蛇散 治風熱遍身生瘖癗瘙癢

烏蛇肉酒浸貳兩 羌活去蘆 白鮮皮
桂心 甘草炙 枳殼去瓤麩炒
蒲黃炒 蔓荊子 芎藭

當歸去蘆各半兩 天麻 麻黃去節
秦艽去蘆 牛蒡子炒 藁本去蘆
白殭蠶炒各柒錢半
右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時

荊芥散 治風熱皮膚瘙癢生瘖癗

荊芥 赤茯苓去皮 苦參去蘆各壹兩
蔓荊子 天麻 人參去蘆
防風 獨活各去蘆 枳殼麩炒各半兩
牛蒡子炒 黃芩各柒錢半 烏蛇肉酒浸貳兩
右為細末每服同前法

防風散 治風瘖瘰

防風去蘆 杏仁麩炒另研為泥 白殭蠶炒各半兩

甘草炙壹兩

右為細末每服叁錢空心蜜水調下或溫酒調服亦得日進二服

牛膝散 治風瘖瘰

右用牛膝酒浸搗為末每服貳錢食前溫酒調下兼治骨疽風癩皆効

蒺藜丸 治風瘙痒生瘖瘰

白蒺藜 蒼朮去蘆 赤茯苓去皮各壹兩

羌活 苦參並去蘆 黃芩

細辛去苗各半兩 枳殼去穰麩炒 烏蛇肉酒浸

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸溫蜜湯送下不拘時候

黑龍丸 治風毒上攻頭面多生瘖瘰

羌活去蘆 薄荷葉 蔓荊子

細松烟墨 獨活去蘆各壹兩 川芎

甘草炙 白附子炮 山梔子

白芷 防風去蘆 荊芥穗

天南星 草烏頭生 白殭蠶炒

川烏頭炮去皮臍各半兩

右為細末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服一丸細嚼茶湯或溫酒送下食後服

莽草膏 治風瘙痒皮膚生瘖瘰隱疹瘡

莽草去土 當歸去蘆 芎藭

大戟去皮 川椒 附子

細辛去苗 赤芍藥 芫花

躑躅花 蒴藋

右細剉用醋浸一宿以猪脂肆斤同煎令附子色黃為度綿濾去粗候冷用摩之日三五上

治風瘙痒皮膚生瘖瘰及瘡用此粉身即瘥

芎藭 麻黃根 白芷各叁兩

雷丸伍兩 藿香貳兩 藜蘆壹兩半

右為細末入英粉伍兩相和令勻逐日粉身上

治風熱皮膚瘙痒搔之生瘖瘰粉身

麻黃根伍兩 蛇床子肆兩 白蒺藜

白礬各貳兩 白米粉貳升

右為細末用疎生絹袋盛痒即粉身

治風瘙皮膚生瘖瘰搔之腫痒柳枝湯洗之

嫩柳枝 桃枝 蒴藋

苦參各伍兩　槐白皮肆兩　茵蔯
狼毒　青葙葉　麻黃各叁兩
右細剉和勻每取壹斤以水伍斗煮取肆斗去粗
更入鹽及朴硝各貳兩攪勻看冷熱於溫室中洗
浴浴罷不覆出汗瘥切慎外風
治風熱皮膚生瘡癟苦痒成疥丹參湯洗之
丹參　苦參各肆兩　蛇床子生用叁兩
右件藥用水壹十伍升煎至柒升去相乘熱洗之
治皮膚風熱生瘡癟或痒痛宜用垂柳湯洗之
垂楊柳壹斤　杏仁叁兩　白礬叁兩
右件用水壹斗伍升煎至柒升去滓於無風處洗
浴極妙

結核

河間云結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消　丹溪云結核或在項在頸在臂在身皮裏膜外不紅不痛不硬不作膿多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核　結核在頸項方僵蠶　大黃　青黛　膽星各等分為末蜜丸噙化　結核在下頦　二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡　結核在臂　二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂角刺　蓋行太陰經痰之積痰使結核自消甚捷　風核以去風消核散常服消之　風熱結核以大連翹飲加羌活桔梗牛蒡子　凡一切風核疼痛宜以大蕎麥根及金絲釣葫蘆根磨半研半醋塗之

一儒者楊梅潰之缺盆間結一核余謂此肝火血燥而筋攣法當滋腎水生肝血彼反用行氣化痰外敷南星附膝等藥大如碗余用補中益氣湯六味地黃丸以滋腎水間用蘆薈丸以清肝火年餘元氣復而消　一男子頸間結核大潰　一婦人左眉及髮際結核並用梔子清肝散海藻散堅丸以清肝火養肝血益元氣而愈此症亦有大如升斗者亦治以前藥可愈　一

婦年二十耳下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥愈甚治以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘劑而愈　一婦因怒結核頭痛發其氣血俱實先以神效散下之更以益氣養榮湯三十餘劑而消　常治此症虛者先用益氣養榮湯待其氣血完充乃取神效散去其毒仍進前藥無不效者　一兒七歲項結二核時發寒熱日夕不愈治以連翹丸而消若患在胸臂等處尤宜此丸若潰而不斂兼以托裏之藥　一兒項結一核堅硬如櫻面色痿黃飲食不甘服托裏藥不應此無辜疳也以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按之轉動軟而不痛者內有蟲如粉急針出之若不速去則蟲隨氣走內蝕臟腑不治（蟾蜍夏月溝渠中腹大不跳不鳴者先取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶上加蓋令蛆不得出將蟾蜍撲死投蛆中任蛆食盡一晝夜以新布袋包繫置急水中浸一宿取出瓦上焙為末入麝香一字軟飯為丸如麻子大每服二三十丸空心米飲送下）

結核　外科五　百五十六

一婦因怒不思飲食發熱倦怠骨肉痠疼日漸瘦而經斷不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之不可復自誤服下輕等藥血氣愈虛遂致不救

海藻連翹湯　治肩腋結核腫痛瘰癧痰核

白茯苓　陳皮去白　連翹
半夏薑制　黃芩酒炒　黃連酒炒
[illegible]鹽水炒　牛蒡子炒　柴胡
三稜酒炒　莪朮酒炒　殭蠶去絲炒
昆布　海藻　羌活
防風　桔梗　夏枯草
川芎　升麻

右生薑薄荷煎食後服

連翹丸

連翹　防風去蘆　黃柏
肉桂去皮　桑白皮　香豉
獨活　秦艽　牡丹皮各半兩
海藻貳錢半

右為末煉蜜丸如菉豆大每服拾丸燈心湯下

五香散　治肉中忽有惡核腫硬不消惡肉惡脈瘰癧風毒腫氣

木香　雞舌香　沉香各壹兩
麝香細研貳錢　射干　薰陸香
羚羊角屑　川升麻　獨活
桑寄生　連翹　甘草生各貳兩
川大黃剉微炒

右剉碎入麝香研勻每服叁錢水一盞中煎至伍

結核　外科五　百五十七

分去滓入竹瀝半盞更煎一二沸溫服日三

連翹散 治項上惡核焮腫

連翹 射干 獨活

川升麻 木香 沉香

木通剉各 桑寄生 丁香各半

川大黃剉微炒各一兩

右爲細末每服貳錢清粥飲調下日三服

獨活散 治惡核風結腫毒四肢煩熱拘急

獨活 木香 射干

桑寄生 連翹 升麻

沉香 川大黃生用 甘草生各壹兩

右剉如麻豆每服肆錢水壹中盞煎至陸分去滓入竹瀝半合更煎一二沸放溫服日三得快利爲度

清肝解鬱湯 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛或作瘰子并一切肝火之症

山梔 當歸 木瓜不犯鐵器

茯苓各壹錢 柴胡 川芎

芍藥炒各七分 熟地黃一錢 白朮一錢

龍膽草捌分 炙甘草伍分 右每服水煎服

癭瘤

靈樞云虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲骨蝕有所疾前筋一作結筋屈不得伸邪氣居其間而不反發爲筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得反津液久留合而爲腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則爲骨疽有所結中於肉宗氣歸之邪留而不去有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也此言虛邪中人……

三因方云癭多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不變者名曰肉癭筋脈露結者名曰筋癭赤脈交結者名曰血癭隨憂愁消長者名曰氣癭五癭皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致夭枉瘤則有六骨瘤脂瘤氣瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈 丹溪云服癭瘤藥先須斷厚味

海藻丸　治癭瘤通用
海藻洗晒　川芎　當歸
官桂　白芷　細辛
藿香　白歛　昆布洗晒
明礬枯各　海蛤煅　松蘿各等分
爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後含嚥下

守癭丸　治癭瘤結硬
通草貳兩　杏仁一兩去皮尖研　牛蒡子各壹合
昆布洗　射干　訶黎勒
海藻洗各肆兩
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後噙化日三

海藻酒方　治癭下如結核漸大欲成癭瘤
右用海藻洗去鹹一斤酒貳升漬一宿取酒貳合飲之酒盡將海藻曬乾搗末酒調壹錢匕日三即瘥如浸用絹袋盛了浸春夏二日秋冬三日

白頭翁丸　治氣癭氣瘤
白頭翁半兩　昆布拾分洗　通草
海藻洗各柒分　連翹　玄參各捌分
桂心參分　白歛陸分

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服伍丸用酒送下忌蒜麵生葱猪魚

海藻散堅丸　治肝經癭瘤
海藻　昆布各貳兩　小麥醋煮炒乾
龍膽草壹兩
右爲末煉蜜丸桐子大每服貳參拾丸臨卧白湯送下併噙化嚥之

五癭　五癭在頸項間皮寬不急累累而垂者皆是也宜破結散消癭丸海藻丸昆布丸黃藥酒深師藻散無以針灸法同施方有効及常服復元通氣散蠟礬丸自然痊

小

木通散　治頸下卒生結囊欲成癭
木通　松蘿　桂心
蛤蚧酥炙　白歛　琥珀
海藻洗　昆布洗各壹兩
右爲細末每服貳錢不拘時溫酒調下

五癭丸
菖蒲貳兩　海蛤　白歛
續斷　海藻　松蘿
桂心　倒掛草　蜀椒

半夏各壹兩　神麯叁兩　羊靨百枚
右爲細末以牛羊脂髓爲丸如芡實大每服壹丸食後臨臥噙化服

昆布丸
檳榔　昆布　海藻各貳兩
右爲末煉蜜丸彈子大每用壹丸含嚥化下

藻藥散　治氣癭
海藻酒洗壹兩　黄藥子萬州者佳貳兩
右爲末置掌中以舌時時舐以津嚥下消三分之二止藥先須斷厚味戒酒色[illegible]方效
[illegible]

二海丸　治氣癭
海藻　昆布各酒洗曬乾
右等分爲末煉蜜丸杏核大稍稍嚥汁又用海藻洗淨切碎油醋熟作常菜食之

消癭散　治癭氣
海藻酒洗　海帶酒洗　昆布酒洗
海馬酒炙　海紅蛤　石燕各煅
海螵蛸各壹兩
右爲末酒茶下兼服含化丸兼灸相濟以收全功

含化丸　治癭氣
海藻　海蛤煅　海帶
昆布　瓦壟子煅　文蛤即花蛤背有斑文
訶子去核　五靈脂各壹兩　猪靨乾者肆个焙另研
右爲末煉蜜丸臨臥含化時時嚥下　兼灸法以助丸功

通氣丸　治癭氣
海藻　海帶　昆布
夏枯艸　木通各壹兩　訶子
薄荷各伍錢　杏仁少許
右爲末煉蜜丸如芡實大每用壹丸噙化　兼灸以泄癭氣方効

黄藥酒　治忽生癭疾及一二年者
右用萬州黄藥子半斤須緊重者爲上如輕虛即是他州者力慢須加一倍以無灰酒壹斗投藥在內固濟瓶口以糠火燒一伏時停待酒冷即令患者時時飲壹盞勿令絶酒氣經三五日常把鏡自照覺消則停飲不爾令人項細也用火時不可多惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待經宿也已驗如神忌毒食

昆布散　治癭氣上炎風火鬱滯散痰氣塞結

防風　荊芥　黃連酒炒

昆布　海藻　海粉

羌活　升麻　連翹

青皮　膽星　貝母

牛蒡子炒　夏枯草　沉香

香附子　撫芎　黃芩酒炒

右薄荷煎服或末或丸俱可痰多加南星半夏

又宜灸天突穴為妙

三因破結散

海藻洗　草龍膽　海蛤

通草　昆布　礬石枯

松蘿各叁分　麥麯肆分　半夏

貝母各貳分

右為末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜諸毒物十日知二十日愈

玉壺散　治三種癭

海藻洗　海帶洗　昆布

雷丸各壹兩　青鹽　廣茂各半兩

右等分為細末陳米飲丸如榛子大噙化以煉蜜丸亦好

子和人參化癭丹

海帶洗　海藻洗　海蛤

昆布已上四味皆焙　澤瀉炒　連翹已上各

豬靨　羊靨各十枚

右為末蜜丸如芡實大臨臥噙化一丸忌油膩物

羅氏寶金散　治男婦癭氣無不痊

豬羊靨各十對暖水洗去脂膜晒乾杵為細末

海藻洗　海帶各貳兩　丁香　木香

琥珀研　麝香各錢　真珠研各半兩

右件先將丁香木香海藻海帶杵為細末入下項藥末合和再研細重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜卧服在室男女十服必効如男子婦人一月見効有胎不可服

海帶丸　治癭氣久不消

海藻洗　貝母　青皮

陳皮各等分

右件為細末煉蜜為丸彈子大食後噙化壹丸効

針砂方　治氣癭

右用針砂浸於水缸中平日飲食皆用此水十日
一換針砂服之半年自然消散

昆布散 治瘦氣結硬胸膈不利宜服

昆布洗 海藻洗 松蘿
半夏湯洗 細辛 海蛤細研
白蘞 甘草炙各 龍膽草
土瓜根 檳榔各一兩

右爲細末每服一錢食後溫酒調下

治瘦氣胸膈壅塞頸項漸粗宜服此方

商陸 昆布洗 射干

羚羊角 木通 海藻洗
杏仁湯浸去皮尖麩炒 牛蒡子微炒

右㕮咀每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

治瘦氣神驗方

蛇蛻 桔梗各半兩 烏賊魚骨
昆布 赤小豆 小麥各

右爲細末煉蜜丸如小彈大綿裹一丸常噙嚥津

神效開結散 治瘦疾不問年歲極驗

沉香 木香 橘紅

豬靨子 珍珠

右爲末每服一錢臨臥冷酒調杵徐徐嚥下輕者
三五服重者一料全愈修合用除日忌鹹酸油
膩濇氣等物

六瘤者隨氣凝結皮膚之中忽然腫起狀如梅李皮
軟而光漸如杯卵若發腫都軟不痛者日
漸增長而不大無痛時常痛者久而
不消後亦成膿者瘤痛自內潰治
於壯年可無後憂按之推移得動者可用取法去之

如推之不動者不可取也瘤無大小不量可否而妄
取之必不可輕易不爲無理
治法先以鐵鍼上令肉黑腐不痛方可
以刀剪去黑腐又以藥塗令肉腐潰又可剪之又塗
又剪腐根去盡爲度若怕針刀者却以針倉散塗之
令肉黑極十分腐爛方可用刀剪之剪之若稍有些
肉不黑盡恐肉未死肉未死血亦未死血未死則不
可剪割恐血來多致有昏暈之失其肉十分黑極十
分腐爛推得動者此肌肉死也肌死則血死其血死
方可剪割無妨雖血瘤肉瘤取之亦無妨也小瘤取

之即愈大瘤取之有半截肌肉壓抑也宜服養氣血藥久之自愈 ■內經云肝統筋而藏血心裹血脈主脈脾主肉而統血肺主氣而司腠理腎統骨而主水若怒動肝火血涸而筋攣者其自筋腫起按之如筋久而或有血縷名曰筋瘤用六味地黃丸四物山梔木瓜之類若勞役火動陰血沸騰外邪所搏而為腫者其自肌肉腫起久而有赤縷或皮俱赤名曰血瘤用四物茯苓遠志之類若鬱結傷脾肌肉消薄外邪所搏而為腫者其自肌肉腫起按之實軟名曰肉瘤用歸脾益氣二湯若勞傷肺氣腠理不密外邪所搏而壅腫者其自皮膚腫起按之浮軟名曰氣瘤用補中益氣之類若勞傷腎水不能榮骨而為腫者其自骨腫起按之堅硬名曰骨瘤用地黃丸及補中益氣湯主之夫瘤者留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣血乖違當求其屬而治其本大凡屬肝膽二經結核八珍加山梔膽草以養氣血清肝火六味丸以養肺金生腎水若屬肝火血燥須生血涼血用四物二地丹皮酒炒黑膽草山梔中氣虛者補中益氣兼服若治失其法脾胃虧損營氣虛弱不能潰於患處或寒氣凝於瘡口榮氣不能滋養於患處以致久不生肌

而成漏者悉調補脾胃則氣血壯而肌肉自生矣若不慎飲食起居及六淫七情或用寒涼蝕藥蛛絲纏芫花線等法以治其外則誤矣 一長洲庠王天爵辛丑春左腿近環跳患之狀如大桃按之濡軟恪服除濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脈洪大而虛氣瘤也肺主之盖膽為木肺為金然發於膽經部分乃肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰矣遂用十全大補湯數劑出清白稀膿甚多頓加寒熱煩渴頭痛殊類傷寒狀余謂此因膿泄而血氣益虛耳仍用前湯其勢益甚脈洪數大按之如無乃加附子一錢其勢愈甚而脈復如前此虛甚而藥未能及也更加附子二錢三劑諸症頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各三十餘劑出腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患處復潰諸症更發咽間如焚口舌無皮用十全大補加附子一錢服之諸症悉愈二日不服內病悉至患處復潰二年後又患服前藥不應診其尺脈微細如絲此屬命門火衰用八味丸為主佐以十全大補湯稍愈至乙巳仍患虛寒之症而歿 一男子左腿外側近臀腫一塊上有赤縷三年矣飲食起居如常觸破涌出血膿發熱惡寒此

肝經受證故發於腿外側診其脉左尺洪數右關弦洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊　一男子小腹患之膿水淋漓此足三陰之症用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黃丸以生腎水更用蘆薈丸以清肝火而斂　一老儒腎間患之二年其狀如紫桃下墜蓋日按之如水囊此肝脾之症膿瘀內潰而然耳遂刺出血膿日即開以炒黑膽草山梔芎歸芍藥柴胡白朮茯苓之類而愈

薛善周上舍兩耳下項間病瘰癧腫脖堅硬咳嗽氣喘內熱盜汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚予

診之左關弦滿左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須滋腎水生肝血慎調攝至水旺之際庶可愈矣彼欲速效乃外敷商陸石灰等藥內服海藻通木之類至秋金旺之際元氣愈虛其腫愈甚而歿　鎮江孫上舍缺盆間揮如覆甌堅硬色亦內熱晡熱自汗盜汗就治於余曰此皆以散堅行氣降火破血之劑欲其內消而反甚其脉左尺洪數按之而弱左關洪數按之而濇此怒氣傷肝血涸而筋攣也因其急於仕進予辭不能治彼亦不信後果歿此症若補脾肺滋肝腎則木得水而敷華筋得血而滋潤多有得生者

張子和治新寨一婦人年四十餘有瘤三處令以鹹吐之三涌三汗三下瘻已消半次服化痰之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳　又在西華衆人皆訕以為吐瀉而已一日魏壽之與戴人入肆中見一夫病一瘤正當目上綱內眥色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術其人從之乃引入一小室中令俯臥一床以繩束其胻刺委中大出血先令以手揉其目瘤上

亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎　郜城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類雞距一類丫角腕不能鍼向明望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者為膠瘤在面者為粉瘤此膠瘤也以鈹鍼十字刺破按出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法耳

消瘤湯　治痰火氣血鬱結作核成瘤脉弦而滑在上部者

昆布洗　玄明粉　陳皮

半夏　　黄連　　海藻
莪朮　　川芎　　香附
青黛　　白芥子
解下除濕湯　治濕熱搏結血氣凝滯作核成瘤在
下部者
海藻　　黄蘗　　三稜
香附　　青皮　　梔子
連翹　　檳榔　　木通
右薄荷煎服
南星散　治皮膚頸項面上瘤大者如拳小者如栗
或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸
多致不救
生南星大者一枚
右細研爛入好醋伍柒點杵如膏先以細針刺患
處令氣透却以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取効
枯瘤膏　治六瘤瘰癧丹漏如無此藥以蟾酥代之更捷
草烏肆兩　　川烏貳兩　　乾桑耳
桑朽木各壹兩半　　礦石灰　　桑柴灰
蕎麥稭灰各壹碗
右將草烏川烏桑耳桑朽木共燒成灰和礦石灰

桑柴灰蕎麥稭灰一處裝入酒瓶內以棕塞其瓶
嘴用水二斗煎滚淋汁澄火熬濃以十碗取一碗
爲度以厚實磁器收貯密封固如用入礦石灰調
勻爲糊點瘤頂上以濕紙數重貼藥上如若未乾
不須貼若欲久藥乾以唾調塗直待十分黑腐以
刀剪刮取之腐肉未盡又點又刮如怕剪刮者却
用井金散點之以漸腐爛自去不用針刀後却以
膏藥貼之去盡腐肉爲度
井金散　治六瘤瘰大有神効
土黄　　硇砂　　雄黄各壹錢
輕粉　　朱砂　　乳香
沒藥　　麝香　　片腦各少許
爲末以唾調爲稀糊塗瘤頂上唾濕紙兩重蓋之
後用黄龍膏貼紙上間日一度上藥次添藥徹的
周廻大如韭葉如此上之無復漸漸析之後根搖
自然有裂疊隨後自下來若腐肉未去盡者撚針
頭散於瘡口腐肉上貼膏藥一日一換直待腐肉
去盡爲度
造土黄法
信石生貳兩　　硇砂生貳錢　　木鼈子肉

巴豆肉各五錢

右以信礵研末以木鱉巴豆搗成膏入石腦油和一作一塊油紙數重包裹埋於土坑内四十九日取出磁器收貯聽用如無石腦油亦可

黄龍膏 涼肌退腫

黄蘗 黄芩 大黄

右末蜜水調爲糊攤紙上

又枯瘤方

砒 硇砂 黄丹

雄黄 輕粉各壹錢 硃砂

乳香 没藥各壹錢 斑蝥生用叁拾箇

右研爲末糯米粥爲丸捏作棋子樣爆乾先灸破瘤頂三炷以藥餅蓋上用黄蘗末以水調貼之數日自然枯乾落下

一方以銅綠爲末草刺瘤破摻上以膏藥塗之

世懸瘤贅方神驗

桑柴灰 棗樹灰 黄荆灰

桐殼灰各[illegible]

右以沸湯淋汁五碗許澄清入斑蝥肆拾箇穿山甲伍片乳香嫋子不拘多少約伍碗煎作貳碗用

磁器盛之乳香腦子候冷入之後臨用時入新石灰調成膏神妙傅瘤上乾以清水潤之其効如神

龍骨散 生肌肉

訶子肉 龍骨生 細茶各等分

右末乾摻

麻藥

南星 半夏 川烏

川椒 石灰 草烏各等分

右六味各生爲末醋調塗瘡上用藥則不痛

止血藥

京墨燒 百草霜各等分

右爲末摻之即以手按住

桃紅散 止血大効

石灰各用 麻油 大黄伍錢水浸透取汁各

[illegible]

右將石灰炒紅入麻油大黄汁和勻慢火炒如桃花色磁器收貯聽用

瘻

如諸瘻忌氣 竹瓶[illegible]

又法 天附[illegible] 銜瘻[illegible]

甲瘻大忽[illegible] 及腦會上之 瘻瘡[illegible]

之
本事治果報面生瘡瘤方用艾丸灸治在即用醋磨
硫黃塗紙上剪如螺螄揜于人患處多處更用膏藥
重貼二日一換候拜擠出膿如粢米粉即愈硫黃疑
誤甫作雄黃

肬 肬音休俗呼雞眼子是也

手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生肬小者指
痂疥取之所別也　肘後方手足生肬以鹽傅之舌
舐之只三次瘥　初虞世方用雞胃中食擠肬上揩
餘者以石壓之驗　鬼饅頭尖上揩破有白汁出頻
拭之佳
薛肬屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客
淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也
宜以地黃丸滋腎水以生肝血為善若用蛛絲纏螳
螂蝕著艾灸必多致誤大抵此症與血燥結核相同
故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋
受傷瘡口翻突開張卒成敗症　府庠朱宏仁年二
十右手背近中指患五肬中一大者如黃豆餘皆如
聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮用清肝益
榮湯五十餘劑而愈　府庠沈姬文幼嚙指甲及長
不能自禁余曰此肝火血燥也又頸側常生小肬子
屢散屢發又臂生一塊如茱豆大若觸碎如斷束纏
扯之則長縱之則縮後兩鬢發白點求治余曰子素
肝病此部亦屬肝膽經也夫爪為筋之餘膽行人身
之側正與嚙爪生肬等症相應須滋補腎水以生肝

膽則諸病自愈矣乃與六味地黃丸服之二年目照自退胱亦不生　一男子臉患胱初如赤椹雜用攻毒之藥翻張如菌又用腐蝕潰大如榴此足三陰經虛症悉具治以補脾肺生肝腎等劑而尋愈　一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應尤以為血鱉服行氣逐血之劑後手背結一胱子漸長寸許形如鱉狀肢節間如豆大者甚多彼泥鱉生子發於外亦用行血虛症悉至左尺洪數關脈洪數弦余以為腎水不能生肝木以致肝火血燥而筋攣用六味地黃丸生腎水滋肝血三月餘諸症悉愈

一男子因勞役過度而色青黑發熱咳嗽而生胱子腹內一塊攻上攻下作痛口乾小便秘澀服消塊之藥愈甚察其脈左右關俱弦洪元氣消甚此肝脾受病而筋攣也投以加味逍遙散合地黃丸料元氣遂復若誤以為血鱉之類消之必致不起　一男子素膏粱醇酒先便血便結驚悸少寐後肛門周生小顆如胱子如鼠乳大小不一用清熱消毒等藥半載之間腿內股亦然又用化痰之藥寒熱耳痰頸間俱作肝腎脈浮數按之而弱余以為足三陰經血虛火燥洪當滋化源彼不信別服四物黃蘗知母之類諸症蜂起此胃氣復傷各經俱病也先用補中益氣湯三十餘劑諸症漸愈乃朝用前湯夕用八珍湯又各五十餘劑諸症尋愈於是夕改用六味丸加五味子又半載諸症悉愈　一婦人左手背并次指患五六枚如熱椹內熱晡熱月經素不及期余曰此因肝脾血虛而有熱也當調補二經使陰血生而諸症自愈不信乃用艾灸手腫發熱手指皆攣兩脇項及胸乳間皆患胱經行無期余用加味逍遙散少加炒黑黃連數劑漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯其患漸愈又百餘劑經行如期再用地黃丸三料而痊　一婦人

小腹內一塊或時上攻或時下墜寒熱胸痞小便淋漓或用行氣化痰等劑前症愈甚月經兩月餘而一行或以為內有肉鱉欲其血而經不行服驅逐之劑下血甚多兩手背結一胱如大豆許兩月漸長寸許又兩月餘又患數枚疑以鱉子行於外仍行驅逐兩耳下各患胱又疑為痞毒余曰此屬肝火血燥也用加味逍遙加味歸脾二藥兼服佐以六味丸二月餘而愈　一婦人患之用蛛絲纏芫花綫螳螂喫等藥蝕落又灸大潰腫痛發熱出血余曰此陰血虛也不信仍服降火之藥而殁

痣

〔世〕取痣餅藥

糯米百粒　石灰拇指大　巴豆三粒去殼研

右爲末入磁瓶同窨三日每以竹簽挑粟許點上自然蝕落

〔濟〕取黶

風化石灰壹兩　花鹼半兩

右爲細末上三大如大色冷濕用

〔衍〕石灰水調壹盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑黶子及紋刺者微微以針頭撥動置藥少許於其上經半日許黶汁自出剔去藥不用旧不得着水二三日愈　又方用水蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之直至水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

手足皴裂

大抵冬風寒燥糺人手足爲之皴瘃皆由血少肌膚虛故易傷也外則以膏澤內服益氣和血之藥可也

東垣潤肌膏治手足皴澀皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青四兩　白黃蠟八錢　乳香二錢

右二味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鍋內隨手便下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡溶開微微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿濾淨入水中折揣扯之以白爲度油當旋旋入勿令軟了以瓷器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用紙少許貼之自然合矣

東垣老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴裂足痛兩手不能執轅足不能履地而車上宿制此藥傳之即効明日遂行自後屢用屢効故錄於此

衍慶世治手足皴裂春夏不愈者

生薑汁　紅糟　白鹽

猪膏（蜜用者佳）

右每爛炒熟搽入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合口用即安

再手足寒皴裂台椒三四合煮汁去渣浸半食頃須臾再浸

又傳以羊猪髓腦甚妙（方 魏師）

世治脚跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬（令頭髮）入油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用白沸湯泡洗皴裂令軟傳其上即安一方加水粉

山脚裂爛蒸橘研成膏傳之（千足皮厚）（外科五）（百八十三）

世用五倍子為末同牛骨髓塡縫內即好

又治脚指縫爛瘡將鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性為末濕則摻之 一方用生桐油塗之妙

黃蠟膏 治冬月手足坼裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎熔入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火上烘乾即用藥傳以紙貼之其痛立止入水亦不落若合藥入粉多則硬而成塊以火炙動挑傳不妨 一方無五倍子

止痛

凍瘡

子和經曰寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用野中淨土曬乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾為度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡痂覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傳之如夏月醫之更妙

世足跟紅腫凍瘡（外科五） 足跟（在足跖面後跟赤白肉際）（下針入五分彈針出血）（可灸叁）

足跟凍瘡潰破用葱椒湯洗剜去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入牛骨髓調和傳之効

爲錫取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出柤再煎成膏塗凍瘡及折破瘡

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

丹治凍瘡用煎熱桐油調密陀僧傳

山用川五倍子煎湯洗

如神散（氏） 治凍瘡皮爛痛不可忍用川大黃不拘多少為細末新水調搽凍破瘡上痛止立効

子和戴人女僧足有凍瘡戴人令服舟車丸濬川散
人之送心人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑
之有

雉腦膏 治凍瘡久不瘥年年發歎先痒後痛然後
腫破出黃水及血出不止

雉雞腦一枚研爛 黃蠟等分 清油減半

右同於慢火上熬成膏去滓入瓷合中盛候用塗
瘡上

柏葉膏 治凍瘡手足指欲脫落及耳欲落

柏葉炙乾為末四兩 杏仁去皮研四十箇 頭髮一拳大

食鹽研半兩 乳香研半兩 黃蠟一兩

油一斤

右先煎油沸次下頭髮[illegible]下黃蠟攪
勻瓷盒收先以熱小便洗瘡以綿挹乾後以藥塗
即以軟帛裹勿令寒氣侵入每日一換如瘡漸差
三四日一換

橄欖散 治脚凍瘡

右用橄欖核燒灰存性為末入輕粉油調塗

一女年數歲嚴寒[illegible]足受凍不仁用湯泡漬至
十指俱爛牽連未落予用托裏之劑助其陽氣自
潰脫得保其生此因寒邪遏絕運氣不至又加熱湯
泡漬故爾而不痛也余嘗見人之被寒而出凍傷其
耳不知痛痒若以手觸之其耳即落當以怯處良久
或熱手熨之無恙若以火烘湯泡其耳即死至春必
潰脫落矣北方寒氣損人若此可不察之

漆瘡

聖濟總録治漆瘡諸方

生柳葉三斤冬用皮煎湯適寒溫洗之

芒硝五兩湯化浸洗之

豬膏一味熬去滓停冷塗之

生螃蟹一味取黄塗傅日三五次

荷葉燥者一斤煮水洗之以貫衆末摻之乾則油和傅

雞子黄塗瘡上乾則易之不過三五次

黄櫨木煎湯頻洗之

一方榖精草煎湯洗甚速效

又方用白礬煎湯浸洗

又方用杉木煎湯洗之効

又方用芥菜葉煎湯洗

又方用無名異末水調傅

又方用羊乳傅之亦治蜘蛛瘡飲之尤妙

治漆瘡凍瘡人咬瘡並用秫米嚼爛傅

治漆瘡久不差用漆草搗爛傅患處立効

發痓

瘡瘍發痓因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其形牙關緊急四肢勁强或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔痓風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛痓寒能濇血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多潰瘍產後多患之乃敗症也若大補氣血多有復生者若作風治速其危矣　秋官張同野臂有流注因禁寒腫焮日口抽搐手足戰掉余以為氣血虛熱而然用參芪歸朮川芎山梔柴胡半夏天麻炙甘草治之而愈　吳瞻之

給事墜馬傷首出血過多發熱煩躁肉瞤筋攣或作破傷風欲發汗驅風余曰此亡血火動也無風可驅無汗可發當峻補其血用聖愈湯二劑而愈又用健脾胃養氣血而全愈　一儒者背瘡潰後發熱煩躁自用降火之劑項強口噤自汗惡寒此汗多亡津血筋無所榮也用補氣血之劑及地黄丸而愈　一男子素勞苦早行遍身發疙瘩口噤目直脈弦緊此勞傷氣血而外邪所搏也用補中益氣加山梔羌活川芎而痊半載後遍身作痒搔破成瘡發熱作渴脉洪大而虛復以前湯加芎藥參苓熟地天麻而愈

一儒者善怒患瘰癧復因大怒跳躍忽仆地兩臂抽搐唇口喎斜左目緊小此肝火血虛內熱生風用八珍散加牡丹皮鈎藤山梔而愈次年春前病復作兼小便自遺左關脉弦洪而數余謂肝火血燥用六味丸加鈎藤五味麥門冬治之漸愈又用補中益氣加山梔鈎藤牡丹皮而安　一痙婦因怒仆地痰口出血語言謇澀口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿或用驅風之劑六脉洪大肝脉尤甚此肝火熾盛也用加味逍遙散加鈎藤及六味丸尋愈　一婦人患內痔因勞出血甚多不時發痙飲食少思形體倦怠其面色白余謂此氣傷而不能統血也用補中益氣湯反寒熱出血此陽氣虛寒也仍以前湯加炮薑四劑寒熱漸止飲食漸進又四劑而血頓止後因勞役或怒氣便血或發痙投以補中益氣湯加鈎藤而愈

一婦人素性急患偏身瘙癢或項間結核常服搜風順氣之劑後大怒吐血昏口噤小便頻數或時自遺此怒動肝火而血妄行也用小柴胡湯加山梔牡丹皮而愈　一癧婦因勞兼怒四肢攣屈頭痛自汗小便短少畏見風寒脉浮弦緩此氣血虛而風寒濕熱所乘也先用東垣清燥湯漸愈再用加味逍遙散及八珍湯加牡丹皮而痊　一婦人素有肝火脇拗悶或腹痛或寒熱忽然昏憒痰涎抽搐善伸數欠四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚而血液衰少也用清燥丸六味丸兼服尋愈　一婦人因大勞患臁瘡發疙瘙搔碎成瘡口噴熱甚或口噤發搐或頭目眩暈此肝脾氣血虛而內熱以八珍散加柴胡山梔治之諸症少愈復因怒前症復作經行不止此肝脾血熱用加味逍遙散漸愈又用八珍散加柴胡山梔而痊　一婦人發疙瘩日晡熱甚月經先期或兩目昏眩或寒熱發熱或四肢抽搐此肝經風熱血燥用加味逍遙散治之尋愈後因怒前症復作口噤遺尿此肝火血燥也用加味小柴胡湯治之漸愈又夜間發熱譫語此血分有熱也用小柴胡湯加生地而愈更用加味逍遙散調理而安　一婦人患繭唇月經先期余以為肝火血熱不信乃泥用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不隨六脉洪大面目赤色用八珍加五味山梔丹皮麥門數劑漸愈兼用逍遙散六味丸料各三十餘劑全愈　一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰涌抽搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡加熟地黃山梔

子鈎藤鈎而愈　一婦素陰虛患遍身搔痒誤服祛風之藥口噤抽搐肝脉洪數余曰肝血為陰為水肝氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火遂用四物麥門五味柴胡山梔生草熱搐頓止又以八珍加黄芪麥門五味鈎藤炙草調理而愈　一婦人久患流注脾胃虛弱忽痰涎氣喘頭搖目劄手揚足擲難以候脉視其面黃中見青此肝木乘脾土也用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏茯苓而安

類破傷風

破傷風方論已載雜病第五此其似是而非者爾瘡大凡癰疽潰後筋糜肉爛膿血大泄陽隨陰散或筋脉拘急惡寒惕搐甚者舌強口噤項背反張痰涎壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與破傷風相類而主治之法當大補氣血若果係風症亦須以大補氣血為本而兼以治風之藥設若不審是非而妄藥之則誤矣　司徒邊華泉背患癰潰而發熱目直或瞤疏類中風日晡熱甚脉益數此足三陰氣血虧損虛火妄動用參芪歸术炙草加酒炒黑黄檗五味麥門肉桂四劑而愈又數劑而歛　陸大行背瘡內潰出膿二盌許用托裏之劑痛止腫消停藥忽寒熱作渴頭痛自汗此元氣虛而不能復也用十全大補加麥門五味肉桂二劑益甚診其脉如故此藥力未及仍用前藥加附子一錢二劑諸症悉愈乃去附子加肉桂數劑而歛　一儒者患腿癰深蓄於內肉色不變久不穿潰針出膿瘀五碗許惡症驟臻全類中風此脾胃虛而變症也用六君子加當歸炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯而愈　一儒者傷寒後患流注腫痛潮熱用十宣散

敗毒等劑出稀膿五六碗[illegible]
類破傷風症而殁　一男子背瘡未斂以膏藥剪孔貼之患破傷風症而殁此先失於內補外邪襲其虛耳余見此症貼膏藥剪孔欲其迎氣而反患破傷風搽斂藥生肌欲其收口而反助其餘毒以致殁者多矣可不慎哉

水入瘡

皂子散　治水毒入瘡腫痛成刺入骨者

皂莢子（柒粒）　大乾蝦蟆（壹枚）　胡椒（拾伍粒）

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒止盡取出研細每用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾摻藥次以別瘡藥貼之良久水盡出有刺者即自見

鉛丹散　治破傷入水腫潰不愈

鉛丹　蛤粉（等分）

右同炒令變色摻瘡口上水即出漸愈

去水膏　治瘡癰破穴後誤入皂角水及諸毒水以致疼痛及驢馬尿糞一切毒水入瘡並治

糯米粉　砂糖（各壹）　甘草（生末壹分）

右為膏攤在絹上貼毒水出効

馬汗入瘡

治馬汗入瘡毒氣攻心痛方

右用馬鞭[illegible]皮燒灰研細和和豬膏塗瘡上

一方以馬鞭梢燒灰豬脂和塗瘡上

治驢涎馬汗入瘡

右用乾冬瓜燒灰洗淨瘡口摻藥在內　一方用冬瓜青皮陰乾為末傅之

瘍醫準繩卷五終

瘍科證治準繩卷之六

金壇王肯堂輯　新安門人胡承詔校

跌撲傷損（金瘡　杖瘡　竹木刺　針入肉　箭頭入肉）

靈樞云人有所墜墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一痏見血則已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方素問云人有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下積於脇下則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可

取於腧者有所擊墮惡血在於內若肉傷痛未已可側刺不可遠取之也

東垣醫學發明論曰夫從高墜下惡血留於內不分十二經絡醫人俱作中風肝經留於脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人人有汗出皆屬風證諸風皆屬於肝木況敗血凝泣逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷寒無汗既自汗必自風化之也故以破血行經藥治之

靈樞又云身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體惰取小腹臍下三結交陽明太陰也臍下三寸關元也

劉宗厚曰打撲金刃損傷是不因氣動而病生於外外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷一證專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之證蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察

其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣無不效也頃見圍城中軍士被傷不問頭面手足胸背輕重劇者例以大黃等藥利之後大黃缺少甚者遂以巴豆代之以為不於初時瀉去毒氣後則多致危殆至於略傷手指亦悉以藥利之殊不知大黃之藥惟與有瘀血者相宜其有亡血過多元氣胃氣虛弱之人不可服也其巴豆大熱有毒止能破堅逐積用於此疾尤非切當所以有服下藥過後其脈愈見堅大醫者不察又

以後於血未盡而後下之因而夭折人命可不慎歟

內經云肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘逆　脉經云從高頓仆內有血腹脹滿其脉堅強者生小弱者死

金瘡云寸口脉浮微而澀然當亡血若汗出設不汗者其身有瘡被刀斧所傷亡血故也　脉經云金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死　金瘡出血脉沉小者生浮大者死　砍瘡出血一二石脉來大者二十日死　砍刺出血不止者其脉止脉來大者七日死滑細者生

有破傷之脉若瘀血停積者堅強實則生虛細澀則死若亡血過多者虛細澀則生堅強實則死皆為脉病不相應故也

戴院使云仆踣不知曰顛兩手相搏曰撲其為損一也因顛撲而迷悶者酒調蘇合香丸灌之因顛撲而損傷宜逐其惡血酒煎蘇木調蘇合香丸或雞鳴散或和氣飲加大黃入醋少許煎或童便調黑神散不用童便用蘇木煎酒調亦可顛撲傷疼酒調琥珀散極佳烏藥順氣散亦可

方法固以血之瘀失分虛實而為補瀉亦當看傷之輕重輕者頓挫氣血凝滯作痛此當導氣行血而已重者傷筋折骨此當續筋接骨非調治三四月不得平復更甚者氣血內停沮塞真氣不得亡者必死急瀉其血通其氣亦或有可治者焉 [illegible]

凡損必須求其源看其病之輕重審其損之淺深凡人一身之間自頂至足有斫傷打傷跌傷及諸刃傷者皆有之凡此數證各有其說有當先表裹而後服損藥者為醫者當循其理治之然醫者意也不知意者非良醫也或者稟性愚昧不能識其證之輕重明其損之淺深未經表裏通利先服損藥誤人多矣有因此瘀涎上攻有因此大小臟腑閉結者之蓋緣以千里所謂醫不三世不服其藥信哉　此論治損傷之大綱也然用藥固不可差而整頓手法尤不可孟浪今以人之周身總三百六十五骨節開列於後

人身總有三百六十五骨節以一百六十五字都關次之首自鈐骨之上為頭左右前後至轆骨以四十九字共關七十二骨巔中為都顱骨者一（有勢微有髓及有液）次顱為髑骨者一（有勢微有髓）髑前為頂威骨者一（女人無此骨）髑後為腦骨者一（有勢微有髓）腦左為枕骨者一（有勢）

枕就之上附下為大蓋骨者一（系之季）[illegible]蓋骨之後
為天柱骨者一（下屬脊）蓋前為言骨者一（言上復合於髑骨）
言下為高木骨者左右共二（有勢）髑前為顖骨
者一（無勢）顖下為伏委骨者一（俚人呼為伏委）伏委
之下為俊骨者一 骨上左為天賢骨
者一（無勢）骨上右為大貴骨者一 左睛之
上為智宮骨者一（無勢）右睛之上為命門骨者一
鼻之前為梁骨者一（無勢）梁之左為顴骨者
一（有勢無勢同下）梁之左為乳骨者一（無勢）乳之後 梁之端為
嵩柱骨者一（無勢）左耳為司正骨者一 右耳為
納邪骨者一 正邪之後為完骨者左右共二（無勢）
正邪之上附內為嚏骨者一（無勢）嚏後之上為通骨
者左右前後共四 嚏上為咽骨者一（無勢）其咽
後連屬為頷也左頷為乘骨者一 右頷為車骨
者一 乘車之後為轅骨者左右共二 乘車上
下出齒牙三十六事（無勢）復次鈐骨之下
為臆中左右前後至條以四十字關九十七骨輳
之下左右為鈐骨者二 鈐中為會厭骨者一（無勢）
鈐中之下為咽骨者左中及右共三（無勢）咽下為喉骨
者左中及右共三（同上）喉下為嚨骨者環次共十事

嚨下之內為肺系骨者累累然共十二（無勢）肺系之
後為谷骨者一（無勢）谷下為偏道骨者左右共二 嚨
次下為順骨者共八 順骨之中為順隱骨者共
八 順下之左為洞骨者一 順下之右為棚骨
者一 洞棚之下中央為髑髑骨者一
髑髑直下為天樞骨者一 鈐下之左右為缺盆骨
者二 左缺盆前之下為下猒骨者一（無勢）右缺盆
前之下為分饍骨者一 猒饍之後附下為倉骨者
一 倉之下左右為髎骨者共八 髎下之左為
胸骨者一 髎下之左右為蕩骨者一
大 久科六
胸之下為[illegible]骨者一 蕩之下為臆骨
者一 鈐中之後為脊窳骨者共二十二
脊窳次下為大動骨者一 大動之端
為歸下骨者一 歸下之後為篡骨者一
歸下之前為條骨者一 復次缺盆之下左
右至甑以二十五字關六十骨
其缺盆之後為偏甲骨者左右共二 偏甲之端
為甲隱骨者左右共二 前支缺盆為飛動骨
左右共二 次飛動之左為龍臑骨者一
次飛動之右為虎衝骨者一 龍臑之下為龍本

骨者一虎衝之下為虎端骨者一（俱有勢有髓）衝骨之下為臗也能本上內為進賢骨者一（男子此骨名豎虎骨）內為及爵骨者一（女人此骨高為合骨）腕前左右為上力骨者左右共八（多液無髓）次上力為駐骨者左右共十（同）次駐骨為搦骨者左右共十（同）次搦為助勢骨者左右共十（無髓）（男子為爪右外搦為甲）爪甲之下各有襯骨左右共十（無勢無液）後次髑骬之下左右前後至初步以五十一字關一百三十六骨此下至兩乳下分左右自兩足心衆骨所會處也髑骬之下為心蔽骨者一（無勢無髓）髑骬之左為脇骨者上下共十二（居小腸之上）左脇之端各有脇隱骨者分

跗跟傷損（八　久科六）

次亦十二（無髓）脇骨之下為季脇骨者共二（多液）季脇之端為季隱骨者共二（無髓）髑骬之右為肋骨者共十二（長太陽之分也）肋骨之下為脥肋骨者共二（各無隱骨唯獸有之）右肋之端為肋隱骨者共十二（無髓）膝骨之前為大橫骨者一（有勢少髓）橫骨之前為白環骨者共二（有勢有液）白環之前為內輔骨者左右共二（有勢有液）內輔之後為骸關骨者左右共二（同上）骸關之下為揵骨者左右共二（同上）揵骨之下為髀樞骨者左右共二（有勢多髓）髀樞下端為膝蓋骨者左右共二（無勢多液）膝蓋左右各有俠升骨者共二（有勢多液）髀樞之下為箭骨者左右共二（有勢多髓）箭骨之外為外輔骨者左右共二（有勢有液）箭骨之下為立骨者左右共二（同上）立骨左右各有內外踝骨者共四（有勢少液）踝骨之前各有下力骨者左右共十（有勢多液）踝骨之後各有京骨者左右共二（有勢少液）下力之前各有釋[illegible]之前各有起仆骨者共十（有勢）起仆之前各有平助骨者左右共十（有勢）平助之前各有襯甲骨者左右共十（無勢無液）襯甲兩傍各有核骨者左右共二（有勢多液）起仆之下各有初步骨者左右共二（有勢有液女人則無此骨）凡此三百六十五骨也天地相乘惟人至靈其女人則無頂威左洞右洞及初步等五骨止有三百六十（骨）男子女

（四　久科六）

人一百九十骨或隱或衰或無髓勢餘二百五十六骨並有髓液以藏諸筋以會諸脈谿谷相需而成身形謂之四大此骨度之常也

頭目鼻耳傷 凡腦骨傷破輕手撙捺平正若皮不破用黑龍散敷貼若皮破肉損者先用封口藥摻之外以散血膏貼之若血流者用止血散摻之[illegible]刑痛者用[illegible]藥[illegible]若破碎[illegible]不可見風著水恐成破傷風　凡腦骨傷碎在硬處可治若在太陽穴不可治如在髮際須剪去髮若皮不破依上用藥敷若欲洗宜用[illegible]和藥水洗或和湯[illegible]

之　凡傷目伊睛黑色用一紫散敷或紫金膏貼
傷重者用補肉膏敷貼　凡腦兩角及後枕或兩凹
有傷可治明瞭傷蹄伸不作可治或眼胞傷紫黑色
用一紫散敷貼或紫金膏敷貼傷重者用補肉膏敷
貼或頭頂心有損則難治　凡鼻兩孔傷凹者可治
血出無妨鼻梁打撲跌磕凹陷者用補肉膏敷貼若
兩鼻孔跌磕傷開孔竅或刀斧傷開孔竅用封口藥
摻傷處外以散血膏貼之退腫　凡耳斫跌打落或
上脫下粘或下脫上粘內用封口藥摻外用散血膏
敷貼及耳後看脫落所向用鵝翎橫夾定却用竹夾

子在上繫縛定縛時要兩耳相對縛縛住

舌唇口喉齒頭傷　凡被口刀斧砍磕跌墮等傷破皮
傷肉者先用桑白皮線縫合却以封口藥塗傳次以
散血膏敷貼縫住所封藥不令開落仍不言語　凡
跌破傷耳鼻面披缺者傳以封口藥摻外以散血膏
又唇皆缺破缺耳牙用麻藥塗之却以剪刀剪去外
些皮却以絹線縫合缺耳作二截縫合缺唇作三截
縫合以雞子黃油塗次以金毛狗脊毛薄撒些於上
次以封口藥塗摻一次日以茶清洗就換本一日換
一次至八日剪去線又換本　凡腮頰顴刀斧所磕

跌墮等傷破皮肉者用封口藥塗摻外以散血膏
敷貼或跌磕損傷未破皮肉者用補肉膏敷貼之
刀斧所磕跌破上唇面披缺者用絹片一小條從頭
後縛向前來縛合縫定次用封口藥外以散血膏敷
貼如下唇整法却以絹片從下縛兜縛及在耳上整
頓次換本妨藥或無腫不須用藥　凡偶含刀在口
內截斷舌頭未全斷者用封口藥塗一日換
二三次藥七八日全安　凡兩腮無囊被刀斧所磕
跌墮等傷傷開涎囊者用絹線縫合却以封口藥塗
敷外以散血膏敷貼七八日換作肉剪去線換封口

藥　凡牙齒被人打跌砍磕去了牙齒者只用補肌
散摻及封口藥摻服破血藥止痛藥煎用水煎藥服
不宜用酒煎藥須知此法乃大有功　凡牙斷跌落
所傷牙齒未動者用芙蓉膏末摻如齒動者用蒺藜
根燒存性爲末常揩擦之自牢　凡割喉者用騎屋
貼人頭項以絲線先縫內喉管却縫外頸皮用封口
藥塗傳外以散血膏敷貼換藥或喉被人打歪以手
揞正却以前膏敷貼若結喉傷重軟喉斷不可治以
湯與之得入腸者可治若並出者不可治

胸背脅腳腸肋傷　凡高處跌墮頸骨揷進者用手巾

一條繩一條繫在枋上垂下來以手兜縛須下繫於
後腳役縛接繩頭却以凡器一筒五六寸高有捺入
淺深斟酌高低令患人端正坐於其器上令伸腳坐
定醫者用手搜捺平正說話令不知覺以腳一踢踢
去器子如在左用手左邊擬出如在右用手右邊擬
出却以接骨膏定痛膏敷貼又一法令患人卧牀上
以人捺其頭雙足踏兩肩即出　凡左右兩肩骨跌
落失落其骨又出在前可用手巾繫手腕在胸前若
出在後用手巾繫手腕在背後若左出摺向右肱右
出摺向左肱其骨即入接左摸右須接右摸左醫却

以定痛膏接骨膏傅之　凡有井骨及脇下有損不
可束縛只捺令平正用補肉膏接骨膏定痛膏敷貼
兩肋骨亦然　凡有胛骨出相度如何整用椅一箇
令患人於椅後伸兩手於椅手陶住及以軟衣被盛
脇下使一人捉定兩人拔伸却墜下手腕又着曲
着手腕按捺平正却以定痛膏接骨膏敷貼絹片縛
之

手傷　手有四折骨六出臼凡手骨出臼此骨上段骨
是臼下段骨是杵四邊筋脉鎖定或出臼亦剉損筋
所以出臼此骨須撥手直一人拽須用手把定此間

骨損後歸窠有骨出那邊用竹一片夾定一邊一邊
不用夾須在側直處夾縫服藥後不可放定或時又
用拽須撥直此處筋多喫藥後若不側直則恐成疾
日後曲直不得　有胛上出臼只是手骨出臼歸下
身骨出臼歸上或出左或出右須用春杵一枚矮櫈
一箇令患者立櫈上用杵撑在於出臼之處或低用
物墊起杵長則墊櫈起令一人把住手拽去櫈一人
把住春杵令一人助患人放身從上坐落骨節已歸
窠矣神効若不用小櫈則兩小梯相對木棒穿從兩
梯股中過用手把住木棒正棱在出臼腋下骨節蹉

跌之處放身從上墜骨節自然歸臼矣　凡手脾手
腕骨腕綳直搜出醫用手撞起手脾腕以患人本身
膝頭墊定醫用手於頸項有處按下其骨還窠却用
定痛膏接骨膏敷貼若手腕失落或在上在下用手
搜伸却使手揻住方可用前膏敷貼樂夾縛若手脾
骨出用圓椅橫翻向上醫用足踏住椅將病人手在
椅橫內校曲入腕內以小書簿上下夾定平穩却用
前膏敷貼用絹布兜縛兜縛時要掌向上若手盤出
臼不可令伸用衣服向下承住用手撙按動搖挪令
平正却用前膏敷貼夾縛下用襯夾　凡手骨出向

左則將以右手拔入骨出向右則將用左手拔入一伸一縮搖動二三次却用接骨膏定痛膏敷貼夾縛　凡手脚骨只一邊斷則可治若兩手脚骨皆斷者不可治　凡手足骨斷者中間一半縛可帶緊兩頭放寬些庶氣血流蔭若如截竹斷却要兩頭緊中間放寬些庶使氣血聚斷處　若接縛手者前截放寬縛此使血散前去若接足者下截放寬些使氣血散下去　凡用盤出向下將掌向上醫用手撐損動處將掌曲向外捺令平正用前膏貼再用夾向背一片長下在手背外向面一片短下在掌按處向小指一

跌撲傷損　外科六

片長下在指曲處向大指一片短下在高骨處二度縛之　凡兩手臂骨打斷者有碎骨跌斷者則無碎骨此可辨之皆可用定痛膏接骨膏敷貼之　凡手指跌撲刀斧打碎用雞子黃油潤次搽封口藥末外以散血膏敷貼縛片縛定若跌撲咬傷者用澤蘭散傅之若有寒熱者用退熱散傅之寒熱退即去之

凡手掌根出臼其骨交互相鎖或出臼則是挫出鎖骨之外須是搦鎖骨下歸窠出或外則須搦入內或入內則須搦出外方入窠臼只只用手撚斷則難入窠十有七八成痼疾也宜接骨膏定痛膏敷貼夾縛

四折骨用杉皮竹片夾縛八出臼只宜以布帛包縛不可用夾要時時轉動不可一時不動恐接直骨

胸腹傷　凡胸前跌出骨不得入令患人靠實處醫人以兩脚踏患人兩脚以手從脇下過背外相叉抱住患人背後以手於其有擲起其胸脯其骨自入却用定痛膏接骨膏敷貼　凡胸脯骨有拳捶傷外有腫內有痛外用定痛膏敷貼內用破血藥利去瘀血次用消血草擣酒服如刀傷先宜安骨定皮合口掺令平正却以封口藥搽瘡口外以補肌散以雞子清調敷貼內服補損藥活血丹之類　凡胸骨肋斷先用

跌撲傷損　外科

破血藥却用定痛膏接骨膏敷貼皮破者用補肉膏敷貼　凡胸腸傷重血不過者用薑豆汁生韮和服以壯力人在後擒住自吐其血次用破血藥　肚上破傷肚皮但破腸出在外只腸全斷難醫傷破而不斷者皆可治療　凡腸出可以病人手搭在醫人肩隨其左右收起以麻油潤瘡口整入腹却以通關散吹鼻中打噴嚏令腸自入用桑白皮線向皮內縫合後以血竭末傅傷處外以補肌散以雞子清調勻敷貼或散血膏更妙　線上以花乳石散敷之　肚皮裂開者用麻縷為線或搥桑白為線亦用花乳石散

數線上須用從裏重縫肚皮不可縫外皮留外皮開用藥摻待生肉　若腸上有小損孔以燈火照之腸中有氣射燈不可治　又一法腸出用起病人手用醋煎山豆根汁服一口至二口却以針於病人頸上一刺其腸自入　凡肚皮傷破孔大肚腸與脂膏俱出放入內則用縫如孔小只有膏出用手擘去膏不用縫此膏出者已無用了不可復入肚中反成禍患只須擘去不妨此是閑肉但放心去之肚內被傷者專用利大小腸不可待秘恐成重患

腰骨股膝傷　凡腰骨損斷用門一片放地下一頭斜高此令患人覆眠以手伸上搬住其門下用三人拽伸以手按損處三時久却用定痛膏接骨膏敷貼病人渾身動作一宿至來日患處無痛却可自便左右翻轉仍用破血藥　凡臀臃左右跌出骨者右入左左入右用脚踏進擠捺平正用藥如跌入內令患人盤脚按其骨頭擠用膝旋入雖大痛一時無妨整頓平正却用接骨膏定痛膏敷貼只宜仰卧不可翻卧人動後恐成損患　凡腰腿傷全用酒佐通氣血藥但要加杜仲　凡胯骨從臀上出者用二三人捉定腿拔伸仍以脚捺送入却用前等膏敷貼如在襠內出者則難治　凡脚骨傷且難整當臨時相度難泥一說　凡兩腿左右打跌骨斷者以手法整其骨以手拽正上拽七分於前下拽五分於後整定用接骨膏定痛膏敷貼以夾縛縛時先縛中正後縛上下外用副夾若上下有腫痛無虛五日方可換藥　凡辯腿胯骨出內外者如不粘膝便是出向內從內捺入平正如粘膝不能開便是出向外從外捺入平正臨機應變　凡脚盤出臼令患人坐定醫人以脚從腿上一踏一搬雙手一撐捺搖二三次却用接骨膏定痛膏或理傷膏敷貼　凡膝盖損斷用手按捺進平

正後用前膏敷貼系白皮夾縛作四截縛之其膝盖骨跌剉開者可用竹箍箍定敷藥夾定要四截縛之膝盖不開也若腫痛須用針刀去血却敷貼用夾若或內外踝骨左右脚盤剉跌損傷用脚踏直拽正按捺平正却敷貼前膏若膝頭骨跌出臼牽合不可太直不可太曲直則不見其骨稜曲則亦然只可半直半曲以竹箍箍住膝盖骨以繩縛之　凡骨節損折肘臂腰膝出臼蹉跌須用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法治之

脚傷　脚有六出臼四折骨凡脚板上交胻處出臼須用

一人拽去自用手拔其骨節或骨突出在內用手正從此骨頭拽歸外或骨出向外須用力拽歸內則歸窠若只拽不用手整入窠內誤人成痼疾也宜接骨膏定痛膏敷貼夾縛四折骨用正副夾縛束六出臼只宜以布帛包縛不可夾之　凡脚膝出臼與手臂肘出臼同或出內出外只用一邊夾縛定此處筋脉最多時時要曲直不可定放又恐再出窠時時看顧不可疎慢宜接骨膏定痛膏敷貼夾縛　凡脚大腿根出臼此處身上骨是臼腿根是杵或出前或出後須用一人手把住患人身一人拽脚用手盡力搦歸

窠突或是挫開又可用軟綿繩從脚縛倒吊起用手整骨節從上墜下自然歸窠却用接骨膏定痛膏敷貼夾縛

背脊骨折傷

凡挫脊骨不可用手整頓須用軟繩從脚吊起墜下身直其骨使自歸窠未直則未歸窠須要待其骨直歸窠却用接骨膏或定痛膏或補肉膏敷以桑皮一片放在藥上杉皮兩三片安在桑皮上用軟物纏夾定莫令曲用藥治之　凡脚手骨被壓碎者須用麻藥與服或用刀刮開甚者用剪刀剪去骨鋒使不銜破肉或有粉碎者去其骨免膿血之禍然後用大片桑皮以補肉膏或定痛膏糊在桑皮上夾在骨肉上莫令差錯三日一洗莫令臭穢用藥治之又切不可輕易自恃有藥便割便剪便弃須要詳細審視當行則行尤宜仔細或頭上有傷或打破或刀傷或厭碎骨用藥敷貼縛之凡敷縛之際要於密屋無風之所勿使風入瘡口恐成破傷風之患切記切記

陰囊被傷

凡陰囊被人扯脫者用雞子黃油塗以金毛狗脊毛薄攤於上次換封口藥又用散血膏敷貼外却用中葉金鎖匙紫金皮木煎服洗用紫蘇葉

煎水洗　凡陰囊處有青黑紫色腫者用補肉膏敷貼或用定痛膏加赤芍藥草烏良薑肉桂各少許打和用韭葉砍爛同藥貼如無韭葉葱葉亦可仍服利小便藥　凡婦人腿骨出進陰門邊不可踏入用櫈一條以綿衣覆上令患人於上卧將以手拏患人脚用手一擲上在好脚邊上去其腿骨自入却用接骨膏定痛膏敷貼　凡下近腿胯陰囊等處不用通藥但貼不令血蔭

筋骨傷

凡斷筋損骨者先用手尋揣傷處整頓其筋骨平正用接骨等膏敷貼用正副夾縛定正夾用杉

皮去外重皮約手指大排肉上以藥敷杉皮上藥上用副夾用竹片去裏竹黃亦如指大疎排夾縛　凡骨碎斷或未碎斷但皮破損肉者先用補肌散塡滿瘡口次用散血膏敷貼如骨折要接骨膏敷貼夾縛或皮破骨斷者用補肉膏敷貼　凡骨斷皮破者不用酒煎藥或損在内破皮肉者可加童便在破血藥内和服若骨斷皮不破可全用酒煎損藥服之若只損傷骨未折肉未破者用消腫膏或定痛膏　凡皮破骨出差臼拔伸不入撙捺皮相近三分用快刀割開些捺入骨不須割肉肉自破了可以入骨骨入後

用補肉膏敷貼瘡四傍腫處留瘡口用補肌散塡之皮肉不破用接骨膏定痛膏敷貼若破者必有血出用力整時最要快便　凡皮裏有碎骨只用定痛膏接骨膏敷貼夾縛上分傷膏自然爛開肉其骨碎必自出然後摻補肌散外以補肉膏敷貼　凡骨碎看本處平正如何大抵骨低是不曾損左右骨高骨定損了如折骨要拔伸捺平正用藥敷貼以正副夾束縛勿令轉動使損處堅固如出臼曲處要時時曲轉使活處不強　凡敷貼用板子一片就板子上將蔫葉或紙破攤接骨膏定痛膏在上移在損處皮肉存

碎骨後來皮肉自爛先摻補肌散次敷補肉膏碎骨自出若破斷皮肉先以封口藥塡傘用線縫合外用補肉膏散血膏敷貼　凡平處骨斷骨碎皮不破者只用接骨膏定痛膏敷貼夾縛若手足曲直等處及轉動處只宜絹包縛令時數轉動不可夾縛如指骨碎斷止用苧麻夾縛腿上用苧麻繩夾縛冬月熱縛夏月冷縛餘月溫縛　凡拔伸捺正要鞾絹軟物単正仍拔伸當近在骨損處不得前去一節骨上仍拔伸相度左右骨各有正斜拔者　凡撙捺要手法快便要皮肉相執平正整拔亦要相度難易或用二四

人不可輕易　凡筋斷用楓香以金沸草砍取汁調塗傅次用理傷膏敷貼

束縛敷貼用藥

凡束縛春三日夏二日秋三日冬四日縛處用藥水泡洗去舊藥不可驚動損處洗了仍用前膏敷縛若束縛要杉木浸軟去粗皮竹片去黄用青其削約手指大片用杉木皮為正夾竹片為副夾踈排周匝以小繩三度縛縛時相度高下遠近使損處氣血相續有緊有寬說見前二三日一次換藥敷且要縛一箇月藥次以補損好膏貼之亦要以杉皮夾住令損處堅固骨老方不夾之其杉皮貼肉上

藥敷杉皮上紙被貼藥上竹片夾紙被上縛之　凡
腫是血作用熱藥水泡洗次敷貼等藥一時討不
及者只用理傷膏貼最便　凡用夾須擲藥於紙上
平兩頭要帶薄搭頭搭得不厚不礙肉平坦者無高
低不均之患若四岸高低不均此上便有空缺不着
肉處即生疱切記之　凡敷貼接骨等藥疼痛不止
者可加乳香沒藥楓香白芷肉桂南星獨活等味各
量加些於藥中敷貼其肉溫暖疼痛即住刀斧傷者
去肉桂南星獨活　凡換藥不可生換用手巾打濕
搭潤逐片取脫隨手盪洗換藥不可經停一時恐生

肉痂仍先攤藥隨即應手換之此大節病累遭害切
記之　凡傷重其初麻而不痛應拔伸捺正或用刀
取開皮二三日後方知痛須先匀氣血　凡被杖打
痛腫而未破者先用稜針出血若破者不須出血只
用撒地金錢山薄荷生地黃地薄荷豬秣草澤蘭
葉血見愁擂敷貼若成杖瘡用黑膏藥白膏藥紅膏
藥太乙膏牛脂膏貼之　凡刀斧傷者看輕重用藥
如輕者只用補肌散接重者宜用封口藥接緊縛住
如傷重者外用散血膏敷貼

用藥訣　打撲樹木壓或自高處顛下者此等傷皆驚

動四股五臟必有惡血在內專怕惡心先用清心藥
打血藥及通大小腸藥次第先服臨服加童子小便
入藥內立效專用大小腸洗利恐作隘寒利害之甚
清心藥加前方通利大小腸藥服之自然俱通無悶
煩無惡血汚心以次用止痛藥服之即止　攧撲傷
刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥次服清小
便三服去血藥或被傷者血未結打從瘡口出或結
在內用藥打入大腸時即泄或被打破攧破木壓惡
血未積者用藥打散四肢或歸臟腑者或歸上膈者
打從口中吐出或歸中膈打入大腸泄出先用此急

救次服止痛藥即二十五味藥中加減用　凡藥皆
凴湯使所使方先但用清心藥煎後用童便宜盞同
服或止痛重傷者則用薑湯燈心湯調二十五味藥
服之薄荷湯亦可　凡傷或刀傷及損內臟腑恐作
煩悶嘔血之患如折骨者同薑酒服接骨藥傅之如
骨碎被重打重攧重木及石壓者皆用先服湯使法
前法用酒服如輕攧撲損傷則用薑湯調下二十五
味藥立効　凡打撲傷損折骨出臼者便宜用何首
烏散若發熱體實之人用疎風敗毒散若虛寒血弱
之人用五積交加散後用黃白紅黑四味木子補損

用活血丹等藥調治之　凡折骨出臼者不宜用下瘀血之藥及通利大便之藥只宜跌損服氣勻血定痛補損而已　凡打撲砍磕從高跌墮瘀血攻心不能言語者用獨聖散及破血藥下去瘀血即能言語次宜臨證酌治之　凡打撲跌墮負於筋下瘀痛不可忍者先用破血藥及獨聖散次以復元活血湯調理　凡打撲跌墮損破皮肉紫黑色者先用破血藥次用獨聖散又次用清上瘀血湯消下破血湯　凡打撲損傷嘔惡血汁者先用獨聖散次用百合散又次用生料四物湯加硬骨牛乳根加減調理　凡打

撲刀斧斫磕等傷破皮損肉血出去多頭目眩暈者先用川當歸大川芎煎水服次加白芍藥熟地黃續斷防風荆芥羌活獨活南星煎水加童便和服則可不可用酒如血出少內有瘀血者以生料四物湯一半加獨聖散一半煎水服未破皮肉者上碗加酒和服　凡打撲刀斧斫磕等傷破傷風痛不可忍牙關緊急角弓反張者用生南星防風等分爲末米泔調傅患處又用熱酒童便各半調連進三服即甦次用疎風敗毒散調治之　凡刀斧砍磕傷破陰囊皮者先服獨聖散次服止痛藥如內有瘀血者用破血藥

凡刀斧傷破肚皮腸出者先用清心藥加童便和服及用獨聖散次用止痛藥如血出過多先用當歸川芎水煎服次加白芍藥熟地黃羌活獨活防風荆芥白芷續斷水煎調乳香沒藥末和服之　凡傷損藥中不可缺乳香沒藥此藥極能散血住痛　凡刀斧跌磕閃肭脫臼者初然不可便用自然銅久後方可用之折骨者宜便用之若不折骨不碎骨則不可用修合諸損藥皆要去之或用自然銅必用火煆方可服之然新出火者其火毒與金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍戒之　凡

墮傷內有瘀血者心腹脹滿而痛或胸脇滿也宜用破血藥清心藥及通利之自然血愈痛不止者用獨聖散服之効驗如史不止用止痛藥服之大効如神　凡金刃所傷從高墮跌皮肉破損出血過多此宜止疼無補爲先宜當歸補血湯若皮肉不破損者宜作瘀血停積治之先以獨聖散次以破血藥隨症加減續後痛不止者用止痛藥調理若胸脇疼痛用開心草雲根閉蘇木煎酒入童便和服即効又方單用蘇木煎酒和童便服　凡治刀斧金刃打撲從高跌墮皮肉破損若傷重者中間破處恢用止藥或補肌

散血遮用截血膏箍住使新血不來潮作此秘傳之
妙訣也　凡損傷妙在補氣血俗工不知惟要速効
多用自然銅恐成痼疾也初傷只用蘇木活血黄連
降火白术和中童便煎服在下者可下瘀血但先須
補托在上者宜飲韮汁或和粥喫切不可飲冷水血
見寒則凝但一絲血入心即死　凡老人墜馬被痛
不可轉側先用蘇木人參黄芪川芎當歸陳皮甘草
煎服次以前藥調下紅黑黄白四末子調理丹活血
丹　凡杖打悶肭疼痛皆滯血證宜破血藥下之痛
不可忍則傷血故也宜清心藥更不止用獨聖散大

効　凡刀斧打撲所磕跌斷血筋出如湧泉者此傷
經也用封口藥掺以手按實少時即止又止血散掺
之亦可如腫痛搗葱炒熱縛之　凡損大小便不通
未可使服損藥蓋損藥熱亦用酒澀恐愈其有惡人
虚實實者用破血藥加木通尚未通加芒硝虚者以
四物湯加枳殼麻仁桃仁滑腸之類虚人不可下者
四物湯加穿山甲　凡服損藥不可喫冷物魚牛肉
極冷尤不可喫若喫牛肉痛不可治又瘟猪肉猪母
肉尤不可喫切忌之　凡損不可服草藥服之所生
之骨必大不得入臼相兼君臣藥服則可要加溫補

氣血藥同煎　凡損藥必熱能生氣血以接骨也更
忌用火炙如敷藥不効服藥亦不効　凡用敷貼等
草藥皆要臨時生採新鮮者用之有効如出遠路討
不便者可爲末用研木不及生採者爲勝如無草藥
討處就用君臣藥接縛之　凡損藥內用酒者不問
紅白只忌灰酒且重傷不可便用酒反承起氣作腹
脹胸滿切忌切忌如稍定却用酒水煎或酒浸酒
凡打傷在兩脇兩胸兩用兩肋却用通氣通血清心
藥又看病人虚實不同虚者通藥須兼補藥放緩且
用貼藥在前通藥在後　凡用通藥及不通者後用

順氣藥服此全無膨脹而得安此爲不干血作乃是
氣閉不通如腹肚果有血作一通使下亦須以順氣
藥兼之庶胸膈肚腹不致緊悶氣順後却用損藥
凡人醉卧跌牀下脚背疼痛不可屈伸損藥不効服
黑豆酒數日愈且能下氣所損瘀也　凡小兒跌撲
角上止用雞子煎服愈亦順氣也　凡整作之法
除頂腦上不可用藥水洗恐成破傷風餘可加熱油
同藥水避風洗之且與作痛整時先用熱酒磨草烏
服或太益方整整時氣絕用蘇合香丸須與不醒以
黑豆防風甘草黄連煎冷服或以冷水服不可用

開之若吐加生薑汁　右皆專利用藥之法人有虛實不可一律而施即如木條整時先服草烏酒整而氣絕灌以蘇合香丸之劑未甦又以冷藥灌之若施之氣虛之人慘於加兵矣惟薛氏法甚於施治專於內補可以遵用見後分證處治條學者宜審焉

十不治證 撲損傷或被傷入於肺者縱未即死二七難過　左脇下傷透內者　腸傷斷一半可醫全斷者不可治　小腹下傷內者　證候繁多者　脉不實重者　老人左股壓碎者　傷破陰子者　血出盡者　肩內耳後傷透於內者皆不必用藥

整骨麻藥

草烏三錢　當歸　白芷各二錢半

右末每服伍分熱酒調下麻倒不知痛然後用手如法整理

草烏散　治傷骨節不歸窠者用此麻之然後下手整頓

白芷　川芎　木鱉子　豬牙皂角　烏藥　半夏　紫金皮　杜當歸　川烏各五兩　舶上茴香　草烏各一兩　木香半兩

右為細末諸骨碎骨折出臼者每服二錢好酒調下麻倒不知疼處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨筋歸元端正用夾板夾縛定然後醫治或箭鏃入骨不出亦可用此藥麻之或鐵鉗拽出或用鑿鑿開取出若人昏沉後用鹽湯或鹽水與服立醒

外治法 初氏云凡撲傷皮破血出處疼不可忍乃風寒所着宜用葱杵碎入鹽少許炒熱罨上其痛即住冷則再溫之

本事方云崔給事頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其將軍以杖相格乘勢不能止因傷李相拇指并爪甲擘裂遽索金刀藥裹之強坐頻索酒飲至數杯已過量而面色愈青忍痛不止有軍使言取葱新折者入溏灰火煨熱剝皮擘開其間有涕取罨損傷處仍多煨葱續續取熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度易用熱葱并涕裹纏遂畢席笑語

治腦骨破及骨折葱白爛研和蜜浮封損處立瘥

治殺傷氣偶未絕用葱白熱鍋炒熱徧傅傷處頃即

肉易其痛自止但古葉亦可

定痛膏　治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷赤腫疼痛

芙蓉葉四兩　紫金皮　獨活
南星生　白芷各五錢

右末加生採馬藍菜葉一菜各倍兩杵搗極爛和末一處用生葱汁老酒和炒暖鋪若打撲跌磕壓傷骨肉痠疼有紫黑色未破皮肉者加草烏肉桂良薑各兩錢研末薑汁調溫貼若紫黑色已退除良薑肉桂草烏薑汁却以韮汁茶清調溫貼之

若折骨出日者加赤芍根皮寶塔草各半兩搗爛和前藥一處又用肥皂拾枚去便去皮弦子膜杵搗極爛入生薑汁少許什白麵半兩攪爛和勻入前藥同杵搗勺用芭蕉葉托用前後皆副夾須仔細整頓其骨緊縛有後上下腫痛消方可換藥膝痛未退不可換藥

本治腕打傷筋損骨疼痛不可忍

生地黃一斤　藏瓜薑糟一斤　生薑四兩

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之曾有人傷折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告曰勿相害吾有奇方可療於夢中授此方神效

經驗方　治跌撲瘀血作痛或筋骨疼痛

黃蘗一兩　半夏五錢

右為末用薑汁調塗患處以紙貼之如乾薑汁潤之周日易之

消毒定痛散　治跌撲腫痛

無名異炒　木耳炒　大黃炒各五分

右為末蜜水調塗如肉有瘀血砭去敷之若腐處更用當歸膏敷之尤好

截血膏　治刀斧砍磕等血能化血破瘀退腫止痛

天花粉三兩　薑黃　赤芍藥
白芷各一兩

右末茶清調勻敷瘡口四邊若刀斧傷於頭面血不止者急用此末茶清調勻塗頸上周圍若傷手則塗臂周圍若傷足則塗腿上周圍若傷各處則塗瘡口周圍使截其血不來潮作也

金瘡若水肉翻花者用韮汁調此末傅瘡口四邊以火微炙之又用旱稻煙熏之瘡口出水即愈如無水出即是風襲倍加南星和敷

若瘡口肉硬不消者此被風[illegible]
熱酒調敷如又不消則風[illegible]紫
金皮和敷有必消之理也

散血膏　治打撲傷損跌磕刀斧等傷及虎傷猪
牛咬傷

耳草葉[illegible]
澤蘭葉[illegible]

右各生採杵搗爛冷敷縛刀斧打磕等傷破皮
損肉者先用羊毛餅貼次貼此膏熱日四邊用截
血膏敷貼令血不來潮作一人跌破陰囊又一人

跌破鼻孔二者俱先整理皮肉端正用此膏効驗
一法不用羊毛餅只用金毛狗脊毛薄薄鋪些於
患口上次換封口藥再加以此膏貼効更速

金毛餅法
雞子清桐油各等打勻以金毛薄捻作餅如紙樣
貼在患處上以散血膏或補肉膏敷貼

接補消腫膏　治證同前
耳草葉　雪裏開　木芍葉
白背葉　紫金皮
右為末以雞子清入桐油少許調勻敷貼

活血散　治打撲傷折手足
右用菉豆粉新鐵銚內炒令紫色用熱酒同熱醋
調令成膏傅貼損處用紙花蓋貼將杉木一片或
二片縛定其効如神

一赤散　治傷損傅藥後起疱者以銀針挑破摻末
大黃　赤石脂　石膏（煅各等分）
右末摻之

一黃散　治打撲傷焮紫黑有瘀血流注有熱者
大黃
右末薑汁調溫傅

白散　治打撲傷損焮紫黑有瘀血流注無熱者
半夏
右末薑汁調傅

萬金膏　治癰疽發背諸般瘡癤從高墜下打撲傷
損脚膝生瘡遠年臁瘡五般痔漏一切惡瘡並皆
治之
龍骨　鼈甲　苦參
烏賊魚骨　黃蘗　黃芩
黃連　猪牙皁角　白芨
白斂　厚朴　木鼈子仁

草烏　川芎　當歸各[illegible]
香白芷各六兩　沒藥[illegible]　乳香另研各半兩
楓枝　柳枝[illegible]　黃丹[illegible]
清油肆斤
右除乳沒丹外將諸藥於油內慢火煎紫赤色去
滓秤淨油叁斤放鍋內下丹不住手攪令黑色滴
入水不散及不粘手下乳沒末再攪勻如硬入油
些少以不粘手為度
洗藥荊葉散　治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血
結聚疼痛

頑荊葉[illegible]　白芷　細辛去苗
蔓荊子　桂心　川芎
丁皮　防風去[illegible]　羌活各等分
右件為[illegible]服入鹽半匙連根葱伍莖漿水伍升煎取
叁升去滓通手淋洗痛處冷即再換淋洗避風處洗之
接骨　接骨用好無名異叁兩為末別用乳香沉木五香
各半錢重為末先燒鐵銚紅以五香三之一彈入銚
內候煙起則全下無名異待漆退火定後再上火炒
熱又將五香彈三之一彈入銚內候漆又退火如此
者凡三次就用火[illegible]用骨碎補大[illegible]約壹斤與生

薑[illegible]以碗覆之候發熱[illegible]約取五之一入小
葱九莖連鬚去[illegible]同入沙盆擂細取其汁調前無名
異末貳錢衝老酒服之其骨從患處即愈如年老氣
衰者再作一劑多飲酒力助之為妙
接骨丹敷貼藥
天南星　木鱉子各半兩　沒藥
乳香各半兩　官桂壹兩
右為細末薑壹斤去皮爛研取自然汁入米醋少
許白麪為糊同調攤紙上貼傷處以帛縛之用篦
夾定麻索子縛

接骨丹　治折骨出臼無草藥討處用此方效
南星[illegible]　木鱉子叁兩　紫金皮
芙蓉葉　獨活　白芷
官桂　松香　風香各壹[illegible]
小麥麪貳兩　乳香　沒藥各伍[illegible]
右為末米醋生薑汁各少許入酒調勻攤油紙上夾
縛冬月熱縛夏月溫縛
又治攧撲筋斷骨折用粟米壹升木鱉肉貳拾箇半
夏[illegible]婦人髮一團葱白[illegible]一小[illegible]同炒煙盡存性
為末熱醋調傅神効　治攧撲筋斷骨折用糯米壹

升皂角切碎半升銅錢百箇同炒至半焦黑去銅錢爲末用好酒調膏厚紙攤貼患處神効

走馬散　治折傷接骨

栢葉　荷葉　皂角（俱生用）

骨碎補（去毛各等分）

右爲末先將折傷處揣定令入元位以薑汁調藥如糊攤紙上貼骨折處用杉木片夾定以繩縛之莫令轉動三五日後開看以溫葱湯洗後再貼藥復夾七日如痛再加沒藥

乳香膏　治打撲傷損

乳香　松香　楓香

五倍子　狗骨（炙灰）　鍋底墨

小麥麵（各等分）

右末用好酒調爲糊樣熱敷痛處不可敷破處若破爛者只用鳳尾草爲末摻之

骨碎補菴閭折筋骨折傷取根搗碎煮黃米粥和之裹傷處良

攧撲骨肉損醋搗肥皂爛厚罨之以帛縛之閃傷醋補中胃散相和罨之

一方治撲傷骨折及血暈者用益元散柒分人參湯調之次用薑汁好醋（或米醋）用獨子肥皂肆箇敲碎浸於薑汁醋中調和以絹濾過去粗煎成膏藥貼之傷處亦可

又方柑橘葉白酒糟作餅貼痛處或大段痛用火燒地令紅用醋并米泔潑地上鋪薦令患人薦上臥蒸出汗內則服藥外則貼壯易安

續筋　白膠香散　治皮破筋斷

右用白膠香爲末傅之又方金沸草根擂汁塗筋封口便可相續止痛

治傷斷筋骨續筋方

右取旋復根搗汁滴瘡中仍用滓傅瘡上封之三七日即筋骨便續更不用易

消腫　紫金皮散　治打撲傷損金刃箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮（醋炒）　南星　半夏

川當歸　黃蘗（鹽炒）　草烏（炮）

川烏（炮）　杜當歸　川芎

烏藥　破故紙　川白芷（鹽水炒）

劉寄奴　川牛膝　桑白皮（各等分）

右爲細末生薑薄荷汁兼水調傅腫處或傷處皮

熱甚加黃蘗皮生地黃半兩有瘡口者勿封瘡口
四邊傅之
本事治打撲傷損及一切癰腫未破令內消方
生地黃（研如膏） 木香（為末）
右以地黃膏隨腫大小攤於紙上摻木香末一層
又再攤地黃膏貼腫上不過三五度即愈昔許元
公入京師赴省試過橋墮馬右臂臼脫路人語其
僕曰急與接入臼中若血濇則難治矣僕用其
說許以昏迷不覺痛遂僦轎舁歸或曰非録事
巷田馬騎不能了此疾急召之至已日暮乃秉燭

視其面曰尚可治乃施藥封此處至中夜方甦遲
旦痛止去其封損處已白其青瘀乃移在臼上自
是日日易之腫直至肩背以藥下之瀉黑血三升
五日後當逐得赴試蓋用此法云
消腫膏 治胸脇跌僕打撲損傷腫痛或動筋折骨
芙蓉葉 紫金皮（炒各伍） 白芷
當歸 骨碎補 獨活
何首烏 南星（泡各叁） 橙橘葉
赤芍藥（各叁兩） 石菖蒲 肉桂（各伍錢）
右末以熱酒薑汁調乘熱縛腫用葱汁茶清調和

濕縛動筋折骨加山樟子紫毛銀藤皮及葉各伍
兩同前為末酒調暖敷縛
芙蓉膏 治打撲傷損腫痛紫黑色久不退者
紫金皮 南星（各壹兩） 芙蓉葉（貳兩）
獨活 白芷 赤芍藥（各伍錢）
右末生薑汁茶清調溫貼縛
傷損紫黑色久不退者加肉桂伍錢
紫金膏 治赤腫焮熱者
芙蓉花葉（貳兩白花者佳） 紫金皮（壹兩）
右生採入生地黃同搗傅貼或為末以雞子清入

蜜少許和勻調入生地黃研爛和傅
杖損膏 治諸傷損
天花粉 芙蓉葉 紫金皮
赤芍藥 南星 獨活
當歸 白芷（各壹兩） 牡丹皮（叁錢）
右末韭汁調熱傅貼疼痛甚者加乳香沒藥各少
許
松葱膏 治傷損
松香 葱連根葉（炒熱）
右杵搗成膏炙熱縛傷處先以生薑研爛炒熱罨

少驗次以此膏貼之退腫住痛

退腫膏　治頭腦破傷損或跌破或刀斧傷處或被杖棒打破及別處傷

芙蓉葉　地薄荷　耳草葉

澤蘭葉　金桐葉　赤牛膝

六黃各等分研末

右砍爛傅貼傷處中間留孔出氣用澤蘭葉盈軟貼住冬月用芭蕉葉一日一換藥用茶洗傷處若傷處浮腫用小青葉搗傅後用充油葉地薄荷搗傅後痛不住用葛葉毛藤併楓葉尖砍傅貼住痛

治擦落耳鼻用髮入罐子鹽泥固濟煅過為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹縛定効江陳禪師爲驢所咬下鼻一僧用此綴之効

一紫散　治傷損眼胞青黑紫色腫痛

紫金皮童便浸七日　生地黃各等分

右砍爛茶清調勻傅貼餘處傷不用架

一綠散　治打撲眼胞赤腫疼痛

芙蓉葉　生地黃各等分

右砍爛傅貼或為末雞子清調勻傅之

退熱散　治跌磕打傷惟大指中指傷命餘指無妨

山布瓜根各　景天草　澤蘭葉

地薄荷　魚桐根皮

右搗爛冷縛傷處大退身上寒熱

澤蘭散　治跌撲咬傷及咬傷手指并刀斧傷

芙蓉葉　澤蘭葉　白佛桑葉

地薄荷　耳草葉

右搗爛冷縛傷處留口通氣以七葉楊香葉或地黃草熱茶盪軟貼住

負重擔有破者剪貓兒頭上毛不語唾粘之

途行脚打泡用溜生麪糊貼過夜即乾不可擦破又法用飯粘貼過夜以紙蓋之次日平復神効

內服方藥

表脈浮緊發熱惡寒體痛此挾有外邪宜發散

四季傷損發散春五積散香蘇散夏香薷飲五苓散秋正氣散冬和解散加減敗毒散方見傷寒寒熱加柴胡前胡黃芩頭痛加川芎白芷脚氣加白芷檳榔木香痰加南星半夏烏梅氣喘加人參木香沉香寒加蒼朮半夏陳皮各等分㕮咀葱白煎空心服

踈風敗毒散　治打撲諸損動筋折骨跌磕墮傷者

當歸　川芎　白芍藥

熟地黃　羌活　獨活
桔梗　枳殼　柴胡
白茯苓　白芷　甘草
紫蘇　陳皮　香附
右生薑生地黃煎入酒和服
加味交加散　治打撲傷損折骨出臼發熱惡寒體弱之人用此服之若體實之人宜跌風敗毒散
當歸　川芎　白芍藥
生地黃　蒼朮　厚朴
陳皮　白茯苓　半夏
羌活　獨活　桔梗
枳殼　前胡　柴胡
乾薑　肉桂　甘草
右生薑煎服　有熱除乾薑肉桂
羌活乳香湯　治跌撲傷損動筋折骨發熱體痛挾外邪者
羌活　獨活　川芎
當歸　赤芍藥　防風
荊芥　丹皮　續斷
紅花　桃仁　陳皮

右生地黃煎服　有熱加柴胡黃芩
治凡所撲墜而長脇下痛不可忍宜行瘀血　海藏云若登高墜下重物撞打箭鏃刃傷心腹胸中停積鬱血不散以上中下三焦分之別其部分上部易老犀角地黃湯中部桃仁承氣湯下部抵當湯之類下之亦有以小便酒同煎治之　更有內加生地黃當歸煎者有大黃者又法虛人不禁下者以四物湯加穿山甲煎服妙亦有花蕊石散以童子小便煎或酒服之者此藥與前寒藥正分陰陽不可不辨也若瘀血已去用復元通氣散加當歸煎服亦可
仲景治馬墜及一切筋骨損傷
大黃（一兩切浸湯成）　緋帛　亂髮（如雞子大燒灰）
敗蒲席（餘寸）　久用炊單布（一尺燒灰）
桃仁（四十九個去皮尖）　甘草（如中指節炙剉）
右件味以童子小便量多少煎湯成內酒壹大盞次下大黃去滓分溫爲服先剉敗蒲席半領煎湯浴以衣被覆斷須通利數行通後立瘥利後浴水赤勿怪即瘀血也

瘀血重者下之

復元活血湯　治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍者經云有所墮墜惡血留內有所大怒氣

上而不行下損於腸則傷肝肝膽之經俱行於脇
下經屬厥陰少陽宜以柴胡爲引用爲君以當歸
活血脉又急者痛也以甘草緩其急亦能生新血
陽生陰長故也爲臣穿山甲栝蔞根桃仁紅花破
血潤血爲之佐大黄酒製以蕩滌敗血爲之使氣
味相合各有所歸痛自去矣

柴胡半兩　當歸　穿山甲炮

栝蔞根各三錢　甘草　紅花各二錢

桃仁去皮尖伍拾箇　大黄酒浸壹兩

右件桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服壹兩水貳

鍾酒半盞煎至柒分去渣大温服食前以利爲度
得利後痛或不盡服乳香神應散方見後

巴戟湯三因 治從高墜下及打撲內損瘀血噎悶不能
飲食此閉血閉臟腑不通

巴戟去心　大黄各一兩　當歸

地黄　芍藥　川芎各壹兩

右爲末水煎以利爲度

當歸導滯散 治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不
通紅腫青黯疼痛昏悶畜血内壅欲死

大黄壹兩　當歸貳錢　麝香少許

右叁味除麝香別研外爲極細末入麝香令勻每
服叁錢熱酒壹盞調下如前内瘀血去或骨節傷
折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹治之

又導滯散 治重物壓傷或從高墜下或吐血不能
禁止或瘀血在内胷腹脹滿喘促氣短

當歸　大黄

右爲細末每服叁錢不拘時温酒調服

奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血
凝積心腹疼痛大小便不通

水蛭剉碎石灰拌炒令乾黄色半兩　黑牽牛貳兩

右末每服貳錢熱酒調下約行四五里再用熱酒
調黑牽牛末貳錢催之須下惡血成塊以盡爲度

雞鳴散三因 治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀
凝積氣絶欲死煩躁頭痛叫呼不得並以此藥利
去瘀血治折傷神妙

大黄酒蒸壹兩　桃仁去皮尖貳拾粒

右研細酒壹碗煎至陸分去查雞鳴時服次日取
下瘀血即愈若便覺氣絶不能言取藥不及急擘
口開用熱小便灌之即愈

清上瘀血湯 治上膈被傷者

羌活　獨活　連翹
桔梗　枳殼　赤芍藥
當歸　梔子　黃芩
甘草　川芎　桃仁
紅花　蘇木　大黃
右生地黃煎和老酒童便服

消下破血湯　治下膈被傷者
柴胡　川芎　大黃
赤芍藥　當歸　黃芩
五靈脂　桃仁　枳實

梔子　赤牛膝　木通
澤蘭　紅花　蘇木
右生地黃煎加老酒童便和服

大紫金皮散　治打撲傷折內損肺肝
紫金皮　降真香　補骨脂
無名異燒紅酒淬七次　川續斷　琥珀另研
牛膝酒浸壹宿　桃仁去皮炒　當歸洗焙
蒲黃各壹兩　大黃濕紙裹煨　朴硝另研各壹兩半
右爲細末每服貳錢食前濃煎蘇木當歸酒調服

破血藥　治打撲墮馬從高跌下皮肉不破者此瘀血停積內攻不能言語而或譫妄此宜攻利爲先若皮破血流者宜作金瘡亡血過多治之
柴胡　黃芩　五靈脂
枳實　當歸　赤芍藥
川芎　生地黃　大黃
朴硝　桃仁　紅花
蘇木
右水煎入酒童便和服皮破血流者不用酒

羅氏花蕊石散　治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損貓狗咬傷或至死血瘀傷處以藥摻之其血化爲

黃水再摻藥便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許調一大盞服之立效若牛觝腸出不損者急內腸入用細絲或桑白皮爲線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭煖腹急以童子小便調一盞取下惡物如肝片終身不患血風血氣證若膈上有血化爲黃水即時吐出或隨大便出

右硫黃（壹兩） 花蕊石（貳兩）

右貳味相拌合勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礶子壹箇內可容藥候泥乾入藥在內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭壹秤籠疊周匝自巳午時從下着火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡又放經宿罐冷取出細研以絹羅子羅極細磁盒盛之依法使用

破血消痛湯（出甲乙）治乘馬損傷跌破脊骨惡血流下脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活 防風 官桂（各壹錢）

蘇木（壹錢半） 柴胡 連翹

當歸梢（各貳錢） 麝香（少許另研） 水蛭（炒去煙盡另研）

右為麤末只壹服酒貳大盞水壹盞水蛭麝香另研如泥餘藥煎至壹大盞去火稍熱調貳味服之兩服立愈

經治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下壹錢食頃痛更壹服痛止便將接骨藥封以物夾定直候至好

世治從高至下墜及打撲內傷神効麝香水蛭各壹兩剉碎炒煙出貳件研為細末酒調貳錢當下畜血

未止再服其効如神

衍自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損傷研極細末飛過用當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

海治墜落車馬筋骨疼痛不止用玄胡索壹兩搗羅為散不計時服以豆淋酒調下貳錢

本童便治卒血及心破打內有瘀血者煎服之壹服壹升

山擲撲傷損松節煎酒喫 擲撲重傷用生薑自然汁肆兩香油肆兩打勻無灰酒熱調下

寒上方治墜傷損撲瘀血在內煩悶者用蒲黃末空心熱酒調下參錢瘥

聚寶二十五味藥 治擲撲損傷骨碎骨折筋斷刺痛不問輕重並皆治之

香白芷 紫金皮 破故紙（各醋炒）

劉寄奴 川當歸（鹽炒） 赤芍藥（米泔浸）

黑牽牛 川牛膝（茶水浸） 生地黃（鹽水浸炒）

川芎 乳香 沒藥

木通 自然銅（骨不碎不用 火煅醋淬）

草烏（醋炒 不用） 木香 川烏（火煨 不用）

藿香　骨碎補　木賊
官桂　羌活　獨活（已上各壹兩）
熟地黃（鹽水炒）　杜牛膝（茶水炒各半兩）
金刀傷挫曰若去自然銅骨碎骨折者用之然須
於此方內去自然銅臨好時却入用之如早服以
成他疾同研為末用蜜為丸如彈子大用黃丹為
衣或被攧撲損傷金刀箭鏃不問輕重每服壹丸
溫酒磨化服或細嚼酒送下如被刀傷全斷內損
重者以薄荷湯或木瓜湯薑湯燈心湯皆可服病
在上食後病在下食前在中者不拘時服　老人

骨脉冷宜加當歸川芎川烏木香丁香人參半兩
去白芍藥生地黃
沒藥降聖丹　治打撲傷損筋斷骨折攣急疼痛不
能屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩
縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力
沒藥（另研）　當歸（酒浸焙）　白芍藥
骨碎補（燎去毛）　川烏頭（生去皮臍）　自然銅（火煅醋淬拾貳次研為末水飛過焙各壹兩）
生地黃　川芎（各壹兩半）
右為細末以生薑自然汁與煉蜜和丸每壹兩作
肆丸每服壹丸搥碎用水酒各半盞入蘇木少許

煎至捌分去蘇木空心服
清心藥　治打撲傷損折骨出臼刀斧斫磕等
傷及肚皮傷破腸出者
牡丹皮　當歸　川芎
赤芍藥　生地黃　黃芩
黃連　連翹　梔子
桃仁　甘草
右燈心薄荷煎入童便和服
本治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛木仙散
木展荷葉陰乾壹味為末食前以童子熱小便壹

小盞調下叁錢以利下惡物為度
又治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以大乾荷葉伍
片燒令煙盡細研食前以童子熱小便壹小盞調叁
錢七日叁服
止痛藥　治打撲傷損折骨出臼金瘡破傷
當歸　牛膝　川芎
淮生芐　赤芍藥　白芷
羌活　獨活　杜仲
續斷（各壹兩）　肉桂　八角茴香
乳香　沒藥（各伍錢）　南木香

丁皮　沉香　血竭各貳錢半
右末老酒調服
散血定痛補損丹　治諸般傷損腫痛
當歸　川芎　赤芍藥
生苄　白芍藥　牛膝
續斷　白芷　杜仲製
骨碎補　五加皮　羌活
獨活　南星製　防風各壹兩半
官桂　乳香　沒藥各壹兩
南木香　丁皮　角茴各伍錢

右末酒調服
定痛當歸散　治諸損腫痛
當歸　川芎　赤芍藥
白芍藥　熟苄　羌活
獨活　牛膝　續斷
白芷　杜仲各貳兩　川烏炮
乳香　沒藥　肉桂各壹兩
南木香　角茴　丁皮各伍錢
右末酒調服
四草定疼湯　治打撲跌墮壓磕傷腫痛

山薄荷　寶塔草　汝金屯葉
皺面藤葉
右生採葉擂酒服根梗煎酒服
聖靈丹　治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者
並宜服之
乳香伍錢　烏梅去核伍箇　白米壹撮
蒿苣子壹大盞炒黃取貳兩貳錢
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸細嚼熱
酒吞下食後青伏時痛不止再服
活血順氣何首烏散　治打折筋骨初然便宜服此
藥順氣踈風活血定痛

何首烏　當歸　赤芍藥
白芷　烏藥　枳殼
防風　甘艸　川芎
陳皮　香附　紫蘇
羌活　獨活　肉桂
右薄荷生地黃煎入酒和服　疼痛甚者加乳香
沒藥
調經散　治跌撲損傷踈利後用此藥調理
川芎　當歸　芍藥

黃芪各壹錢半　青皮　烏藥

陳皮　熟地黃　乳香另研

茴香各壹錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

本宜和中有一國醫忽承使行宣押就一佛剎將內人醫診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由獨恐無地良久有二三老內人至下簾環而泣之方得其實云因蹴鞦韆自空而下墜死醫者云打撲傷損自屬外科欲申明又恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥篋中有蘇合香丸急取半兩於火上焙

去腦麝用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更下惡血數升調理數日方瘥　凡夫人之喪一寸靈婦登高取物墜下昏悶不省人事者急令煎蘇木湯調蘇合香丸灌之明日已平復矣

活血　活血丹　治打撲傷損動筋折骨跌墮斫磕刀斧等傷諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人血風渾身疼痛冷痹一切損傷悉皆治之

青桑炭壹斤　當歸　牛膝

川芎　赤芍藥　熟苄

黑豆酒煮　何首烏　南星製

白芷　老松節燒　杜仲炒

破故紙　羌活　獨活

蒼朮　防風　荊芥

骨碎補　桔梗　粟間

續斷酒浸焙　草烏去皮炒　川烏炮

肉桂　木鱉子去殼　角茴

地龍去土　白斂　白芨

細辛　降真香　檀香

松香　楓香　五靈脂

京墨煅　血竭　乳香

沒藥各壹兩

右末醋煮秫米粉糊為丸彈子大曬乾以生漆抹于上挪漆為衣陰乾却以布袋盛挂於風處經久不壞亦不失藥味每服用當歸酒磨下　傷筋折骨加自然銅煅醋淬貳兩若余刃出曰不可用之

人活血丸　治打撲傷損折骨碎筋瘀血腫痛癱瘓頑痹四肢痠疼一切痛風等證

青桑炭壹斤　粟間　骨碎補

南星製　白芍藥　牛膝

川烏炮　黑豆　自然銅

木鱉子各捌錢 細辛壹兩 降真香貳錢
楓香各伍錢 乳香 沒藥
血竭各陸錢
右末醋煮秫米粉糊集聚于搓為丸緩剛候乾如
彈子大候乾用生漆為衣久則不壞每用一丸用
無灰酒磨化服

黄末子 治證同前
川烏炮 草烏醋炙炒 降真香
楓香 肉桂 松香
薑黃 乳香 沒藥

跌撲傷損 卷八 外科六 五十五

細辛各伍錢 當歸 赤芍藥
羌活 獨活 川芎
蒲黃 白芷 五加皮
桔梗 骨碎補 蒼朮醋炙
何首烏 川牛膝 片薑黃各壹兩
右末酒調下欲好之際加自然銅製壹兩只折骨
者便可用之

白末子 治證同前
白芷 南星製 白朮
何首烏 桔梗 羌活

獨活 白芍藥 白楊皮
川芎 白伏苓 白斂
當歸 薏苡仁炒 骨碎補
牛膝 續斷 川烏炮
細辛 肉桂 楓香
乳香 沒藥各壹兩
右末酒調下欲好之際加自然銅製壹兩只折骨
者便可用之

紅末子 治證同前
獨活 何首烏 南星製

跌撲傷損 卷八 外科六 五十六

白芷 羌活 當歸
骨碎補 蘇木 牛膝
赤芍藥 紅花 川芎各貳兩
細辛 川烏製 桔梗
降真香 楓香 血竭
乳香 沒藥各壹兩
右末酒調下欲好之際加自然銅製壹兩只折骨
者便可用之

黑末子 治證同前
雌雞毛燒 桑炭 老松節炒存性

嫩松心　側栢葉焙各肆兩　當歸
牛膝　何首烏　黑豆炒
南星製　骨碎補　熟地黃
羌活　獨活　赤芍藥
川芎　白芷各貳兩　細辛
肉桂　川烏炮　草烏製
木鱉子　南木香　五靈脂
降真香　乳香　沒藥
楓香各壹兩　自然銅醋淬七次
右末熱酒調下欲好之際加自然銅製壹兩只折

骨者便可用之
牡丹皮散　治跌撲閃肭傷損滯血疼痛
牡丹皮　當歸　骨碎補
紅花酒浸　續斷　乳香
沒藥　桃仁　川芎
赤芍藥　生地黃
右水酒煎服如用秫米飯熱罨縛冷又蒸熱換縛
橘術四物湯　治跌撲磕傷滯血體痛飲食少進
當歸　川芎　白芍藥
淮生芐　陳皮　白术

紅花　桃仁
右生地黃煎服　骨節疼加羌活獨活　痛不止
加乳香沒藥
黑神散和血
黑豆半升去皮炒　熟乾地黃酒浸　當歸去蘆酒製
肉桂去粗皮　乾薑炮　甘艸炙
芍藥　蒲黃各肆兩
右為細末每服弍錢酒半盞童子小便半盞不拘
時煎調服
當歸補血湯　治金刃所傷及跌磕打撲皮肉破損

亡血過多此宜止痛兼補為先若皮肉不破損者
宜作瘀血停積治之
當歸　川芎　白芍藥
熟芐　防風　連翹
羌活　獨活　乳香
沒藥　白芷　續斷
杜仲
右生地黃煎入童便和服不可用酒　氣虛加人
參白术黃芪　按補血須用參芪為君此止用四
物亦活血之藥非補血也况加以羌獨防芷之耗

散平

順氣復原通氣散　治打撲傷損作痛及乳癰便毒初起或氣滞作痛

木香　茴香炒　青皮去白

穿山甲酥炙　陳皮　白芷

甘草　漏蘆　貝母各等分

右為末每服壹貳錢溫酒調下

薛按前方治打撲閃錯或惱怒氣滞血凝作痛之良劑經云形傷作痛氣傷作腫又云先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也若人元氣素弱或因叫號血氣損傷或過服尅伐之劑或外傅寒涼之藥血氣凝結者當審前條人法用溫補氣血為善

接骨　接骨神効無比累驗用當[illegible]錢宜自[illegible]備[illegible]以鐵線穿定用活桑木壹根作柴燒錢紅米醋壹大碗末煎者不入鹽將所燒錢焠入醋中如此焠之以醋乾為度取醋中焠落銅錢末就用醋洗去灰曬乾為極細末再用黑雄雞壹隻清湯煮熟去肉用骨宜副以醋炙酥為末入乳香沒藥各壹兩與銅錢末一處和勻每服壹字臨服時用患人髮在頂上者洗去垢燒灰入藥中無灰酒調服不吐只壹服如吐出再服如痛止不可再服必須先夾縛所折骨端正用楊樹皮刮去肉糊并外黐皮傅之下咽便不痛五七日便能運動必終身忌莧菜一名地栗

一方用五銖錢醋焠壹兩貳錢黑雞骨炙壹兩研細勻每服病在下肆錢跌服食前病在上貳錢半頻服食後

一方有乳香沒藥

潔古方用醋焠半兩錢蘇木定粉硇砂各壹錢為末作壹服當歸酒一二三服痛止勿服

預接骨散

沒藥　乳香各壹錢　自然銅壹兩醋淬

滑石貳兩　龍骨炙　赤石脂

白石脂各壹錢　麝香少許另研入

右為細末以好醋浸沒煮多為上候乾就炒燥為度臨服入麝香少許桃小茶匙在舌上溫酒下病分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨石脂而多服儘好

世又方接骨

乳香　沒藥　蘇木

降真節　川烏去皮尖　松明節

自然銅米醋淬各壹兩 地龍去土麻油炒半兩 血竭叁錢
龍骨半兩生用 水蛭油炒半兩 土狗拾箇油炒
右為細末每服伍錢酒調下在上食後在下食前

定痛接骨紫金丹

麝香 沒藥 紅娘子各壹錢半
烏藥 地龍去土 茴香
陳皮 青皮各貳錢半 川烏
草烏炮各壹兩 五靈脂去皮 木鱉子去殼各半兩
黑牽牛伍分生用 骨碎補 威靈仙
金毛狗脊 防風去蘆 自然銅醋淬七次各伍錢

禹餘糧醋淬肆錢
右為細末醋糊丸如桐子大每服拾丸至貳拾丸
溫酒送下病上食後病下食前服

麥兒散

半兩錢煅醋淬火 自然銅煅醋淬火 地鱉蟲焙乾
右叁味等分每服酒調壹分不可多多則骨高起
矣
一方用五銖錢煅淬研細每服壹麥殺許麝蟲類調
下

接骨仙方

人骨小兒者尤佳煆壹兩 乳香貳錢 舊紅絹壹尺燒存性
末之每服貳錢溫酒下

又方

小兒骨煆壹兩 乳香伍錢 白芨炒叁錢
右為末無根水調為丸如梧桐子大每服叁拾丸
熱酒吞下

搜損尋痛丸 能接骨徧身疼痛久損至骨如金瘡
傷則後用之

乳香 沒藥 茴香炒各貳錢
肉桂叁錢 軍薑炒 丁皮

獨活炒 草烏炒黃色 赤芍藥炒
石粘藤炒 白芷炒各伍錢 當歸
川芎 薏苡仁炒各壹兩如前絕肆錢多加乳壹味
骨碎補炒貳兩
右作末蜜為丸用生薑細嚼溫酒吞下如為末用
薑酒調服亦可浸酒喫亦可如折傷則須用藥徧
身頂麻方可用藥接骨加草烏壹七多熱酒調服
量人老弱虛實加減用之如其人麻不解可用大
烏豆濃煎汁解之如無豆淡煎濃豉亦可如吐加
薑汁

金瘡 治金瘡白藥

黃蘗　黃芩　當歸

赤芍藥　黃芪　牡丹皮

生地黃　木鼈子去殼　黃連

地骨皮　桑白皮　甘草各壹錢半

白芷　馬藜稍葉[illegible]各壹錢

右用桐油叁兩煎黃色濾去滓再煎油稍熱入細白板松香壹斤慢火煎須頻頻柳枝攪勻却入乳香沒藥黃丹各柒錢煎數沸出火頃以綿鋪於前濾藥滓布上濾過先用[illegible]盛滿清水攔分却濾藥於鉢水中將去清水中如綱麪狀綱三二百度愈綳愈白故名白藥常以清水浸傾於冷地上用物遮蓋勿令塵入五七日一換水刀斧一應金傷并傷孔大小取膏塊填於傷孔中以白紙護之隨手不疼一日一換五日生肉筋斷加杜仲續斷各壹錢同煎收瘡口加龍骨半錢碎了煎入藥內打損只敷於油紙上貼之即愈却不須入接筋龍骨等劑

太乙膏　治金瘡箭鏃不問輕重并瘰癧痈癤毒用此傅之

白芷　蒼朮　石膏煅[illegible]

白膠香　乳香　沒藥

黃丹各伍錢

右爲末用真麻油肆兩桐油亦可以當歸壹兩先煎油柳枝攪次入白芷等煎少頃却入白膠香石膏等同煎試欲成珠却入蠟同煎片時用生布濾過入罐收藏用油單紙攤之損傷傅瘡口自然肉不痛速愈

理傷膏　治打撲傷損折骨出臼刀斧跌磕等傷

陀僧　黃丹　白蘞[illegible]

黃蠟　猪油各肆兩　乳香

沒藥各伍錢　松香　麻油各壹斤

右以折傷木皮壹兩剉碎入油煎數沸濾去滓入陀僧黃丹慢火熬成膏次入松蠟熔化再熬滴水中成珠爲度却入乳香沒藥自然銅末和勻攤貼

金瘡神効方

五倍子　降眞香

右各炒焦出火毒後研爲末等分乾摻虛者加人參末

封口藥　治刀斧傷割喉斷耳缺脣傷破肚皮跌破

陰囊皮等縊大刎
乳香　沒藥　兒茶
當歸　杉皮炭各壹　麝香伍釐
片腦壹分　豬獮騰葉壹錢如無孔葉用葛葉亦可
右各另研細末秤合和勻入磨研細次入腦礪勻
磁罐收貯如缺唇先以小氣針作三截針之用絹
線一條兩頭搓豬毛以唾蘸濕抹封口藥於針上
將藥線三截穿定却以麻藥抹缺處以剪刀口抹
封口藥薄剪去些皮以線即縫合就以雞子黃油
搽患處以金毛狗脊毛薄鋪於上却以封口藥末

摻於上每日用藥水輕洗去搽油換藥每日只換
一次待八日剪去線搽藥
洗藥
桑白皮　荊芥　黃連
黃檗　當歸　白芷
赤芍藥　連翹　生地黃
右煎去滓洗淨
麻藥
川烏　草烏　南星
半夏　川椒

右末唾調搽之
本事地黃散　治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生
肌肉
地黃苗　地松　青蒿
蒼耳苗　生艾汁叄合　赤芍水煎取汁各伍兩入
右五月五七月七日午時修合以前藥汁拌石灰
陰乾入黃丹叄兩更杵為細末凡有金瘡傷折出
血用藥包封不可動十日瘥不腫不膿
又治金瘡風化石灰韭菜搗汁同搗入雞血用和成
餅乘風陰乾為末傅上金瘡亦行　治金瘡血不止用

半夏石灰鬱金三物為末摻上傷處即住
雀瘡金鎗刀斧傷破血以石灰壹升石榴花半斤搗
取末少許搽少時血斷便瘥
百草散　治金瘡
右五月五日平旦使四人出四方各於五里內採
一方草木莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正
午時細切碓搗并石灰極令爛熟壹石草斷壹斗
石灰先鑿大實中桑樹令可受藥取藥納孔中實
築令堅仍以桑樹皮蔽之用麻油搗石灰極粘密
泥之令不泄氣又以桑皮纏之使堅牢至九月九

日午時取出陰乾百日藥成搗之日曬令乾更搗
絹篩貯放凡一切金瘡出血傷折即時以藥封裹
治使牢勿令動轉不過十日即瘥不腫不膿不畏
風若傷後數日始得藥須暖水洗令血出然後傅
此藥大驗平時無事宜多合以備倉卒金瘡之要
無出於此一方云採時不得回頭任意摘取方回
入杵臼內爛搗如泥量藥多少以急入石灰和勻
取出捍成膏日中曬乾遇用旋取撚碎若刀斧傷
乾傅取血止為度湯火傷冷水調開塗傅蛇蝎犬
鼠咬傷先以溫水洗以津液調傅搭瘡先抓損以

藥末乾貼濕瀰以醋調傅其效如神

灰彈散　治刀斧傷血出不止及多年惡瘡

右用多年石灰細研雞子清調成團煅過候冷再
研細若刀斧傷摻之患處若多年惡瘡以薑汁調
傅一方单用石灰摻患處裹定並瘥

潔古木藥散　刀箭藥止血住痛

定粉　風化灰各壹兩　枯礬叁錢

乳香伍分　沒藥壹分各另研

右件各研為細末同和勻再研摻之

生肌止血立効方　治金瘡辟一切風冷續筋骨

石灰貳升搗生地黃青蒿汁和作團火煅赤細研　狗頭灰細研

芎藭　艾葉　地松

密陀僧各半兩　黃丹壹兩　麒麟竭叁分細研

右為細末研勻密封之每遇金瘡傅之

丹溪云刀斧傷石灰包之痛止血住

猪胆合方治刀斧傷止血生肌蠶蛾散晚蠶蛾為末
摻勻絹帛裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治　一法
用生晚蠶蛾石灰二味同搗成餅陰乾為末傅之

凡殺傷不透膜者

右用乳香沒藥各壹皂子大研爛以小便半盞好
酒半盞同煎通口服然後用花蕊石散或烏賊魚
骨或龍骨為末傅瘡口上立止

殺傷氣偶未絕

右取葱白熱鍋炒熱徧傅傷處頃即再易其痛自
止但青葉亦可

[本]劉寄奴散　治金瘡止疼痛

劉寄奴一味為末散摻金瘡口裹昔宋高祖劉裕
微時伐荻見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有
杵臼聲往覘之見青衣童子數人於中搗藥問
其故答曰我王為劉寄奴所射合藥傅之帝曰神

何不殺之答曰寄奴王者不死不可殺帝叱之皆
散收藥而去每遇金瘡傅之効寄奴高祖小字也
此藥非止治金瘡治湯火瘡大妙經驗方云劉寄
奴為末先以糯米漿雞翎掃着傷處後摻藥末在
上並不痛亦無痕大凡湯火傷急用鹽末洗之護
肉不壞
世治金瘡打撲損傷用葛黃草研細入鹽少許罨之
愈　金瘡血出不止挼小薊葉封之　金瘡止血杵
覆盆花苗傅瘡立止梅師方
本治金瘡血不止無痛用血竭末傅立止

精治惡瘡金瘡刀斧傷見血方以好降真香為末貼
之入水並無傷痕絕妙方見本草　治刀箭傷出血不
止并骨折
檳榔壹箇　木香　胡地黃各叁錢
右為末傅瘡口血立止又可接骨
神仙刀箭藥
右取桑葉陰乾為末乾貼如無旋熨乾為末傅之
一方用新桑葉研取白汁塗之能合金瘡
治刀斧傷磕擦及破傷風浮腫者
右用平胃散以薑汁調傅若急卒只以牛蒡和皮
爛搗罨患處止痛截血且無瘢痕
又方
用海船縫內久年油灰研碎摻之
治刀傷及竹木刺出血
右急以自己小便淋洗二三次立止不妨入水
治金瘡
右以牛蒡葉貼之永不畏風亦不潰膿及搗傅之
麒麟竭散　治刀箭傷筋斷骨止痛定血避風
麒麟竭　白芨各　黃檗
密陀僧　白芷　白斂

當歸炒　炙甘草各等分
右為細末每用少許乾摻瘡上立効
如神散　治一切刀斧所傷血出不止并久患惡瘡
虎骨炙研　鉛丹火煅各半兩　龍骨研各
乳香如皂子大另研　膩粉一錢　丹砂研各壹錢
麝香少許另研
右研極細勻一切瘡以黃連湯或鹽湯洗拭乾摻
藥在瘡上不得衣粘着瘡口
金傷散　治金刃箭鏃所傷血出不止及落馬打傷
肉綻血出

白芨　白斂　乳香各壹兩
石灰半斤遠年者佳　龍骨半兩　黄丹少許
右為細末入黄丹研如淡紅色每用乾摻患處上
用軟紙更以絹帛裹護忌風水乾痂為妙
定血散　治一切刀傷血出不止收斂瘡口
南星生　槐花炒　鬱金各肆兩
半夏生用去臍　乳香研　沒藥另研各錢半
右為細末研勻每用乾摻患處忌水洗
治金刃或打傷血出不止
降真香末　五倍子末　銅[illegible]
研細等分

右拌勻傅損處昔安豐手擊宋嵩碎首用此而愈
治金瘡傷損血出
右用生牛膽入石灰末候乾摻上即止以臘月牛
膽入風化石灰懸當風處候乾用
五倍散　治金瘡血出不止亦治指瘡
右以五倍子生研為末乾貼血立止
神奇散　治刀斧傷并箭傷血出不能止者
麒麟竭　沒藥各研　自然銅煅
南星炮　乾薑燒灰　鉛丹炒黑

膩粉　瓦蘚各少許　麝香少許
右為細末和勻先以鹽湯洗瘡却以燒葱搗汁塗
然後乾摻瘡上三二次
軍中一捻金散
金櫻葉　嫩苧葉各[illegible]　桑葉[illegible]
右搗爛傅若欲致遠陰乾作末用帛納上血止
合名草蛸經進方以五月五日或閉日收藥良
治諸傷瘀血不散
右於五六月收野苧葉搗爛塗金瘡上如瘀血在
腹用順流水擂爛服即通血皆化水以殺猪血試
之可驗秋月恐無葉可早收之

龍骨散　治金刃箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡斂
口
龍骨　滑石　枯礬
寒水石　乳香　沒藥
黄丹各一分　輕粉少許
右為細末每用乾摻外用膏藥貼之効
金傷散　治刀斧傷辟風生肌止痛
白芨　黄丹　陳石灰風化
桑白皮各兩　龍骨　南星

白附子（各半兩）
右爲細末每用乾貼之
完肌散　治金瘡
陳石灰（二兩）　黄丹（半兩）　龍骨
蜜陀僧　桑白皮（各一兩）　麝香（少許）
右爲細末乾摻患處
生肌膏　治金瘡及一切打損瘡
胡粉　白芍藥　熏陸香
乾薑（各一兩）　油（一斤）　黄蠟（一兩）
右爲細末以油蠟相和煎如膏用貼瘡上日二換

之
治金瘡生肌肉
右生搗雞白以火封之更以火熟炙令熱氣徹瘡
中乾即易之白色者好亦治金瘡中風水腫痛
止血收瘡口方
右以雞內金焙爲末傅之立止
定血散　治刀斧傷止血定痛生肌
蜜陀僧　烏賊魚骨　龍骨
白礬（枯各一兩）　桑白皮（半斤）　黄丹（一兩）
右爲細末每用乾摻患處定血如神

松皮散　治金刃箭鏃傷用此生肌
老松皮（一兩）　石灰（[illegible]）
（炒令[illegible]研細）
右爲細末和勻傅之止血收瘡口立効
樂蛆方　治金瘡內爛生蛆者
右以皁礬飛過乾貼其中即效
蒲黄方　治金瘡中風寒水露腫痛入腹
右用蒲黄并舊青布內在小口瓶中燒取煙熏瘡
汁出愈
治金瘡因風水腫
跌撲傷損（[illegible]）
右取蠟不以多少熔化入鹽少許滴在瘡上或先
以鹽摻瘡上後熔蠟令熱滴所灌瘡中亦可
艾葉方　治金瘡中風瘈痛并手足不仁
右用艾葉生熟各令探內得所內瓦瓶中塞諸孔
獨留一口以通氣熏蒸患處良久身體自知立愈
仲景金瘡方王不留行散主之
王不留行（[illegible]）　蒴藋細葉（[illegible]）
桑根（[illegible]白皮[illegible]東南[illegible]）　甘草（各拾分）
川椒（[illegible]）　黄芩
乾薑　芍藥　厚朴（各貳分）

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各別研杵篩合治爲散服方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之產後亦可服如風寒桑東南根勿取之前三物皆陰乾百日用

定痛乳香散　治金傷并折骨打撲傷損

乳香　沒藥(各貳錢)　敗龜板(壹兩)

紫金皮(貳兩)　當歸鬚　骨碎補

虎骨(酥炙各半兩)　穿山甲(火炮少許)

半兩錢(如無以自然銅火煅醋淬代之)

右爲細末每服壹錢如病沉服貳錢以好酒調服

損上者食後服損下者食前服

地榆絹煎　治刀刃所傷內損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭透射傷損腸胃及治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神妙餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內用長肉散子作爐子引散藥入瘡裏面候長肉出外其痕即自合

地榆(捌兩先淨擣爲細末)　絹(壹疋小絹薄者)

右用清水洗淨絹糊以炭灰淋清汁貳斗煮絹灰汁盡爲度絹以爛熟擘得成片段伍寸至參寸即取出壓盡灰汁於清水內洗三五度令去灰力盡重入鍋內以水貳斗入地榆末煎煮熟爛以手撚看不作絹片取入砂盆研之如麪糊得所分爲二服用白粳米粥飲調空心服之服了仰卧不得驚動轉側言語忌一切毒食熟爛黃雌雞白米軟飯餘物不可食之其餘一服至來日空心亦用粥飲調服其將養一月內切須慎護如是產後所傷服壹定分作四服每服粥飲壹中盞調服日一服

止血

刀傷血不止一味白芍藥散白酒調服即以散摻傷

處其有血出不止勢難過者用龍骨乳香等分研末罨患處蚰蜒草搗塞尤妙

療金瘡血不止痛白芍藥壹兩熬令黃杵細爲散酒後米飲下貳錢並得初二服漸知

當歸散(一名內補散 一名蓯蓉散)　治金瘡去血多虛竭此藥內補

當歸(微炒)　川芎　乾薑(炮)

川椒(去目閉口炒出汗)　桂心　黃芩

桑白皮　吳茱萸(湯浸焙乾)　白芍藥

炙甘草(各半兩)　肉蓯蓉(壹兩酒浸一宿去皮炒乾)

人參　黄芪　厚朴（去麄皮剉汁炙令香）
熟各壹兩
右為細末每服貳錢食前温酒調下日三四服一
方有白芨無黄芩桑白皮
內塞散　治金瘡去血多虚竭疼痛羸弱内補
黄芪　當歸　白芷
芎藭　乾薑　黄芩
芍藥　續斷（各貳兩）　附子（半兩）
細辛（壹兩）　鹿茸（酥炙叁兩）
右為細末每服伍分七食前酒調下日三服稍增
[illegible]表傷科　外科六　十五
至方寸七一方無芍藥
蒲黄散　治金瘡血出腹脹欲死
蒲黄　生地黄（各壹兩半）　黄芪
當歸　芎藭　白芷
續斷（各壹兩）　炙甘草（陸分）
右為細末每服叁錢七空心酒調下日三四服血
化為水而下若口噤斡開口與之仍加大黄壹兩
十
神仙止血散
龍骨（五色紫者）　訶子（去核各壹兩）　白石脂

苧麻葉（五月五日午時採陰乾各壹兩）
右為細末每服壹錢半食遠水調服之如修合時
忌婦人雞犬見
治金瘡出血内漏用蝙蝠貳枚燒煙盡以水調服方
寸七令一日服盡當下血如水血自消也
血出不透致瘀滯為患傷處赤腫或攻四肢頭面並
雞鳴散或煎紅花調黒神散
金瘡腸出欲入之磁石滑石各叁兩為細末白米飲
送下方寸七日再用
磁石散　治金瘡腸出宜用之
[illegible]　外科八　十八
磁石（煅研）　滑石（研）　鐵精（各叁兩）
右為細末研勻每服壹錢七温酒調下空心日午
晚間各一服仍以針砂塗腸上其腸自收入一方
用白米飲調服一方無鐵精
治傷破腸出不斷腸出欲燥而草土着腸者
右作大麥粥取汁洗腸推内之當研米粥飲之二
十日稍稍作强糜百日後乃可瘥草土當跟在皮
外
治金瘡中腸出不能入者
右以小麥叁升用水玖升煮取伍升綿濾過候冷

合噴瘡上漸入以冷水噴其背不宜多令人見亦
不欲令傍人語又不可令病人知或腸未入取病
人臥席四角令病人舉身搖須臾腸自入十日內
食不可飽頻食而少勿使病人驚驚則殺人

治金瘡腸出者

右以桑白皮作線縫之更以熱雞血塗上立愈唐
安藏訶腹用此法効

敗弩筋散　治金外弓弩所中筋急不得伸屈

敗弩筋 燒作灰　秦艽 去苗　杜仲 炙去皮
熟地黃 焙各半兩　附子 炮去皮臍　當歸 切焙各壹兩
大棗 叁枚取肉焙　羌活

右為細末每服貳錢匕溫酒調下空心日午夜臥
各一服一方有續斷無大棗

生乾地黃散　治金瘡煩悶

生乾地黃　白芷　當歸 炒
桃仁 去皮尖雙仁麩炒　續斷　黃芩
赤芍藥　羚羊角屑　炙甘草 各壹兩
芎藭　桂心 各叁分

右為細末每服貳錢食前溫酒調下日三四服

白薇散　治金瘡煩悶不得眠困疚痛

白薇　枳實 麩炒　辛夷仁
括蔞根　赤芍藥　炙甘草 各壹兩
酸棗仁 微炒 貳兩

右為細末每服貳錢食前溫酒調下日三四服

琥珀散　治金瘡弓弩箭中悶絕無所識

右用琥珀研如粉以童子小便調壹錢服三服瘥
高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡

虎骨散　治金瘡中風痙服筋脈拘急

虎脛骨　敗龜板 各塗酥炙　當歸
乾蝎 各微炒　桃仁 去皮尖雙仁麩炒　羌活 各壹兩
黑豆 伍合　松脂 貳兩　桂心 叁分

右先將松脂并黑豆炒令熟後和諸藥搗為末每
服貳錢不拘時溫酒調下

豆淋酒　治因金瘡中風反強者

大豆 貳升　雞矢白 壹合

右炒令大豆焦黑次入雞矢白同炒乘熱瀉於叁
升酒中密蓋良久濾去滓每服伍合如人行五里
更一服汗出佳未瘥即更作服之汗出為度服後
宜喫熱生薑粥投之

必効酒　治金瘡中風角弓反張者

右用蒜四破去心頂壹升以無灰酒肆升煮蒜令極爛并滓每服伍合頓服之須臾得汗則瘥

又方　治金瘡中風痓欲死者及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人

右用生葛根壹斤剉碎以水伍升煮取叁升去滓每服熱飲壹小盞日三四服若乾者搗為末每服貳錢溫酒調服若口噤不開但多服竹瀝即止

塗封方　治金瘡中風角弓反張

生雞子壹枚　烏麻油貳兩

右先將雞子打破與麻油相和煎之稍稠待冷塗封瘡上

葫蘆方　治金瘡得風身體痓強口噤不能語或因打破而得及刀斧所傷得風臨死服此並瘥

右取未開葫蘆量枝長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡大小相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔取麻子油燭兩條並燃以葫蘆口向下熏之燭盡更續之不過半日即瘥若不止亦可經一二日熏之以瘥為度若燭長不得內葫蘆可中折用之

元史布智兒從元太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血內移時遂甦

李庭從伯顏征郢州砲傷左脇矢貫於胸幾絕伯顏命剖水牛腹內其中良久甦

按此以血補血之良法也虜日以弓矢為事以達為救死扶傷之法及出吾中國上策騎者守死方治活病寧不自愧

羅謙甫踏鐵膏取箭頭一切針刺入肉箭頭入肉

雞鼠頭壹箇或用八肉汁內熬　螻蛄生用貳拾枚

芫青壹兩　土消蟲　巴豆

馬肉內蛆　信　蜣蜋焙乾

夏枯草　硇砂　磁石

黃丹　地骨皮　蘇木

蜣螂各壹兩　石腦油參兩　蒿柴灰汁參升

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等末令勻磁器內收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭自湧出

箭頭入肉　雄黃散　治藥箭頭在身未出

雄黃壹分　粉霜壹分研　蜣螂肆枚研

巴豆叁粒去皮殼研如泥生用

右同研勻以銅筯頭取乳汁塗藥點瘡上頻頻用之
七日瘡熟箭頭自出
紅散子　療金瘡上
草烏尖　麒麟竭　茄子花
曼陀羅子　蓖麻子去殼細研各半兩
右為細末好酒調如膏瘡口上塗摩之箭頭自出
牡丹散　治金瘡箭頭在骨遠年不出
牡丹皮去心　白斂各壹兩　桑白皮貳兩
藿香葉　丁香　麝香壹分研各
右為細末每服貳錢七溫酒調下日三服淺者十
日深者二十日箭頭自出

蠐螬丸　治金瘡箭鏃在骨中遠年不出者
蠐螬乾者伍枚　螻蛄乾者叁枚　赤小豆壹分
赤鯉魚鮓壹兩　硇砂壹錢　紅花末叁錢
右研細以鮓研和丸如菉豆大如有瘡口只於瘡
口內紝壹丸如無瘡口以針撥破內藥不過叁丸
至伍丸箭頭自動輕搖卽出
出箭頭方
蜣螂自死者搗爛　土狗子叁箇　婦人髮灰少許
右將蜣螂去殼取白肉與二味同研如泥用生塗

中箭處如膏塗後內微痒卽以兩手撼之其箭頭
自出
解骨丸　治箭鏃不出
雄黃研　蜣螂研　象牙末各等分
右為細末煉蜜和丸如黍米大內瘡口內後細嚼
羊腎脂摩貼之覺痒箭頭自出
治箭鏃入骨取不出疼痛宜用此方
巴豆　蜣螂去殼各叁
右研塗所傷處候痛定微痒忍之極痒不可忍卽
撼動拔出次用生膏藥傳之以黃連貫衆湯洗畢
以牛膽製風化石灰傳之無治惡瘡

夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏
傳之說者云無治瘡鄆得方後至洪州旅舍主人
妻患背瘡呻吟鄆遂用此方試之愈
治箭頭不出方
磁石煅醋淬細研　雄黃研各叁分
右用研勻每服貳錢七空心棗豆汁調服十日後
輕撥便出手足上用此藥貼之自出
取箭鏃方
右用天水牛壹箇獨角小者尤妙用小瓶盛之用

硇砂壹錢研細用水些少滴在內浸自然化水以藥水滴在傷處箭頭自然出也

淮西總管趙領衛名儀殿嚴密之子云仇防禦方張衛王履求不得因奏知德壽宮取以賜之有奇効與楊氏方中用巴豆蜣螂者大率相似

治箭頭在咽喉中或胷膈中及諸處不出者

右用鼠肝五具細切爛研傅之（無以鼠腦髓或鼠頭血塗之並良亦治人鍼折在肉不出并刀刃傷者

牛膝膏　治箭頭在咽喉中或胷膈中及諸處不出者

右擣牛膝不拘多少為末以熱水調塗箭頭即出若火瘡灸瘡不瘥者塗之亦効

治箭頭在肉不出方

右以白項蚯蚓拾肆條內銅器中次入鹽壹兩於日中曬並化作汁塗有箭鏃并刀傷須臾痒則出

又方　治箭頭及諸刀刃在咽喉胸膈諸處不出者

右嚼杏仁不拘多少塗之一方研杏仁細傅之

又方　治箭鏃中傷在咽喉胸膈不出及針刺不出者

右用螻蛄即土狗蟲乾者濃煎汁滴上三五度箭頭自出又一方以螻蛄腦拾枚細研塗瘡上亦出

鼠油膏　出箭頭

鼠（臘月者一枚）　蜣螂　皂角（燒灰）

定粉　龍骨（各壹錢）　乳香（少許別研）

右為細末以鼠油和成膏點藥在瘡口內其上更用磁石末蓋之箭頭自出

胡椒餅　出箭頭及木竹刺入肉不得出者

胡椒（研末）

右以飯擣爛入胡椒末和一處貼傷處不過一二餅即出或擣蜣螂傅即出或以賭錢牛蟲擣傅亦妙

萬全神應丹　出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之

莨菪科（[illegible]）

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一科根枝葉實全者口道先生爾却在這裏道罷用柴灰自東南為頭圍了用木篦子撅起周迴七次日端午日日未出時依前持不語用木撅只一撅取出水洗淨不令婦人雞犬見淨室中石臼內擣為泥丸如彈子大以黃丹為衣以紙袋封懸在高處陰乾若有箭不能出者以絳絹袋盛

此藥壹丸放瘡中用綿裹肚緊縛定先用象牙末貼
瘡上後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以
象牙末貼之隨出陝西行者出軍曾用有効
本療鏃不出搗括蔞根傳瘡口三易自出
世李勣治箭鏃不出及惡刺以齒垽和鶴蝨傳之
姚毒箭有二種交廣夷俚用燋銅作箭此一種纔傷
皮便悶膿沸爛而死若中之用飲屎汁并以傅之亦
可惟此最妙又有一種用射罔以塗箭鏃人中之亦
困若着寶處不必近腹亦宜急治今葛氏方治射罔
者是葛氏方用藍汁大豆猪羊血解之

藍汁飲　治毒箭所中
右搗藍汁壹升飲之滓傳瘡上若無藍取青布漬
絞汁服之并淋瘡中鏃不出搗鼠肝塗之鼠腦亦
得用之即出

貝子散　治毒箭
右以貝子搗為末每服壹錢匕溫酒調下不拘時
日三四服此方治中毒并金瘡止痛

竹木刺針入肉

綠礬散　治竹草刺瘡發腫作疼傷
時不曾出血蓋被惡毒氣注痛不止夜卧不安初
破時其瘡紫赤黑色較時起三五重皮是也

綠礬半兩小便燒熱放礬於內候冷取出日乾　丹參半錢
麝香壹字　馬兜鈴根壹錢
右為細末漿水洗淨瘡口上敷貼立効

又方　治被刺入肉或鍼棘竹木等多日不出疼痛
龍葵根壹把洗淨取皮　人參各等分俱為末　醋少許
臘月豬脂壹兩
右和搗令勻每用少許傳瘡上其刺自出

治手足卒中刺中水毒方
韭　藍青
右搗置瘡上以火炙熱徹即愈

又方
右嚼豉不以多少塗之良若治狐尿刺人者當看
豉中有毛為度如無再傳之

治竹刺不出者
右爛研蓖麻以絹帛襯傷處然後傳藥時時看覷
若覺刺出即拔恐藥太緊并好肉努出也一方不
用絹襯

牛蒡葉散　治一切金木竹所傷
右用牛蒡葉惡實是六七月收者風乾為末每用
乾摻不得犯別藥如經著月蠅蟲下蛆在瘡上或

因肌肉生合行成瘢子名印引杏仁研成膏子撚
作條子入在瘢內其蛆蟲自出
治刺傷中風水疼腫
右用鯉魚目燒灰研傅患處汁出即愈鯊魚目皆
可用鯨魚目尤佳
松脂方　治刺入肉疼悶百理不差
右以松脂傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛
不痒不覺自落甚良
治針入肉方　本綱凡針刺入肉及竹木刺者嚼人指甲末用酸棗搗爛塗之次日定出神效方
右刮指甲末同酸棗仁搗爛唾調塗上次日定出

一方用酸棗核燒為末服之
又方　治烏雄雞刺在肉中不出者及治竹木針刺
右用烏雞尾翎二七莖燒作灰以乳男子奶汁和
封瘡口其刺即出
桂蠟丸　治惡刺入肉
右用桂去麁皮擣為末熔黃蠟丸看病大小泥瘡
內濕紙三五重搭蓋以火熔候藥丸熔入肉其刺
自出如無刺所傷者尤見愈速
補凡諸竹木刺入肉中不出以蠐螬研傅立出　又
方用白茅根搗傅之立出　又方嚼牛膝根罨之即
出
簡治竹木刺扎入深不得出用烏羊糞搗爛水和罨
於傷處厚傅之令有匪僕腳心中刺不得出苦痛欲
死以此藥黃拌傅之至四更其刺出遂安
山蘆草刺入肉者細嚼栗子查盦傷處　木竹刺已
出痛者螻蛄罨之妙
簡治針入肉不出用螻蛄腦子同硫黃研細調傅以
紙花貼定如覺痒時其針自出
醫神聖膏取針誤入皮膚用車脂不拘多少成膏攤
紙上如錢許二日一換三五次其針自出　又取針

誤入皮膚用烏鴉翎三五枚火炙焦黃色碾為細末
好醋調成膏子塗在瘡上紙蓋一二時針出効
簡治針入肉不出用雙仁杏仁搗爛以車脂調勻貼
在瘡上其針自出
聖治秀針刺足已出痛者用黃泥罨之
簡主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出者水煮白
梅肉研爛調象牙末厚傅骨刺處自軟
圖生象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傅瘡上
刺立出如咽中刺用水調飲之舊象梳屑尤佳
孟魚骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出

破傷風血凝心針入肉遊走三進如神方用烏鴉
翎燒灰存性研細調壹錢服

杖瘡 鬼代丹 主打着不痛
無名異　沒藥　乳香各研
地龍去土　自然銅醋焠　木鼈子去殼各等分
右爲末煉蜜丸如彈子大温酒下一丸打不痛

乳香散 治杖瘡神効
自然銅半兩火煅醋焠　乳香　沒藥各參錢
茴香肆錢　當歸半兩
右爲細末每服伍錢温酒調下

傳授 雞鳴散下杖痛腹中惡血甚好（方見外科六之一）

五黃散 治杖疼定痛
黃丹　黃連　黃芩
黃檗　大黃　乳香各等分
右爲細末新水調成膏用緋絹上攤貼

潔古沒藥散 治杖瘡止痛令瘡不移
蜜陀僧　沒藥　乳香各壹兩
乾胭脂半兩　膩粉半兩
右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓
生用同研如泥攤在緋帛上貼之

治杖瘡
片腦　麝香各壹分　龍骨
蜜陀僧　胭脂　輕粉
乳香　沒藥　寒水石煅各壹錢
右爲細末乾摻瘡上四邊以生麪糊圍定次用緋
紅絹帛貼之

乳香散 治杖瘡腫痛
大黃　黃連　黃檗
黃芩各參錢　乳香　沒藥各另研壹錢
片腦少許
右爲細末研勻冷水調攤緋絹上貼之（方見外科六之三）

治杖瘡
血竭　輕粉　乾胭脂
蜜陀僧　乳香　沒藥各等分
右研細末先以冷水洗淨拭乾以豬脂調搽紅紙
貼之愈

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛
龍腦一字　輕粉壹錢　麝香半錢
蜜陀僧貳錢　黃丹壹兩
右爲細末每用乾摻上用青帛貼之內留一孔

丹溪云杖瘡痛用黃蘗入地黃紫荊皮傅此皆要藥
也只是血熱作痛用涼藥去瘀血爲先須下鷄鳴散
之類
又方用生地黃黃蘗童便調傅或加韭汁　不破者
以韭菜葱頭杵貼冷即易之皆藥用紫荊皮乳香没
藥生地黃大黃黃蘗之類　又方用木耳盛於木
內用沸湯浸爛攪水令乾於砂盆內擂細傅瘡上
又方用大黃黃蘗爲末生地黃汁調傅如乾再傅
又方用野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗傅在
瘡上神效傷重多用鹽

世杖瘡丹用劉寄奴末陸錢馬鞭草末壹錢蜜調傅
如濕者乾摻馬鞭草四錢先第此方甚妙
圍藥　治腫不破用此消腫定疼
無名異　木耳五十　大黃各炒各肆分
右爲極細末用蜜水調圍四邊腫處
傅杖瘡妙方　治林杖打腫痛者
豬獅聹　地園荽　田茶菊
地薄荷　血見愁　山薄荷
澤蘭葉　生地黃
右搗爛取汁泡酒服渣傅貼

又方
金疤葉　寶塔草　山薄荷
豬獅聹　芙蓉葉　地薄荷
桑葉尾　澤蘭葉
右搗爛取汁泡酒服以渣和大黃末傅貼
又方
豬獅聹各　澤蘭葉　生地黃揀葉俱用
右搗爛取汁泡酒服以渣傅貼
又方
朴樹葉　水芋葉
右搗爛傅貼

又方
菉豆粉　側栢葉各研等分
右以雞子清和桐油打勻調豆粉攪勻時時以鴨
毛掃之
又方
大黃氣兩　檳榔氣錢　石膏煅醋
右末用豬膽汁雞子清桐油打勻入末攪勻時時
鴨毛掃塗之
生肌桃花散

輕粉　血竭　蜜陀僧
乾胭脂各壹錢

右研細每用乾掺仍以膏藥貼之

靈異膏　治杖瘡金瘡顛撲皮破湯火傷久年惡瘡

川鬱金叁兩　生地黄貳兩　粉草壹兩
臘豬板脂壹斤

右剉細入脂内煎焦黑色濾去滓入明淨黄蠟肆兩熬化攪勻以磁器貯之水浸久去水收用時先以冷水洗瘡拭乾却敷藥在瘡上外以白紙貼之止血定疼且無瘢痕湯潑火燒不須水洗治凍瘡尤妙

乳香膏　治金瘡杖瘡神効

乳香　沒藥　川芎
自然銅各半錢　當歸　羌活
獨活　川牛膝　石膏
劉寄奴　黑牽牛　黄蘗皮
破故紙　白膠香　生地黄
熟地黄　赤芍藥　白芍藥
紫金皮　黄丹　白芷各伍錢
黄蠟壹兩　清油肆兩

右除膠香丹蠟外餘藥為末入油内煎以柳枝不住手攪試將成膏却入叁味更試成膏以生布濾淨以瓦罐盛水傾在水中用篦攤開貼瘡孔深者撚成膏條穿入孔中不問淺深放瘡上如作熱加輕粉片腦朴硝入膏内貼之

銀粉膏　治杖瘡

光粉壹兩　乳香　沒藥
赤石脂　樟腦各壹錢　水銀貳錢

右末用豬脂貳兩黄蠟伍錢熔化調末成膏油紙攤貼

又方

水銀　樟腦各貳錢　乳香
沒藥　血竭各壹錢　片腦壹分
黄蠟　水牛油　豬油各壹兩

右末先將油蠟熔化候冷和末攪勻油紙攤貼

牛脂膏　治杖瘡神効

乳香　沒藥　樟腦各伍錢
黄蠟肆兩　水牛油壹斤

右末先熔蠟次入油和勻調末攪勻油紙攤貼或以天芋葉攤貼極妙

紅膏藥　治杖瘡及臁瘡
黃丹飛炒貳兩　乳香　沒藥
兒茶　血竭　硃砂
樟腦　水銀各壹錢　麝香
片腦各壹分　黃蠟　水牛油
豬油各壹兩
右末先以蠟熔化次入油和勻候冷入末攪勻油
紙攤貼臁瘡作隔紙膏貼之
白膏藥　治杖瘡及臁瘡
光粉貳兩　甘石銀末各壹兩　白石脂煅

龍骨　乳香　沒藥
楓香　樟腦　水銀各壹錢
麝香　片腦各壹分　黃蠟半兩
柏蠟壹兩　豬油半兩
右末先熔蠟次入油和勻候冷調末攪勻油紙攤
貼臁瘡作隔紙膏貼之
黑膏藥　治杖瘡及諸瘡神効
防風　荊芥　連翹
大黃　黃連　黃芩
黃檗　當歸　赤芍藥

玄參　紫金皮各壹兩　木鱉子
白芷　杏仁　桃仁
生苄各伍錢　地園荽　黃花苑
側柏葉　地薄荷　豬殃殃各貳兩
乳香　沒藥　兒茶
大黃　當歸各壹兩　杉木炭
楓香　龍骨煅　赤石脂煅
血竭　樟腦各伍錢　孩兒骨煅
硃砂　水銀各貳錢半　麝香伍分
右將後十五味為末將前二十一味剉碎以水煎

熬濃汁濾去滓再煎令汁如餳後入豬油貳斤慢
火熬令汁乾入光粉壹斤旋入攪令黑色成膏滴
水中成珠可丸不粘手為度次入黃蠟貳兩熔化
出火再數日再微火熔入乳香後十五味末攪勻
油紙攤貼
秘傳杖瘡膏方　專治打傷又治金瘡及無名腫毒
臁瘡若跌傷及別樣瘡毒貼
香油肆兩煎看沸將穿山甲箱投入油中煎數沸去渣貳作渣柔軟將渭藥再煎後入
穿山甲壹片留中煎沸以火下華大月用油伍兩
柘枝壹根已上貳件止取出煎汁不用其法見前
槐枝已上藥須另報開小條

不用大樹上者入藥內用此頗燒兩剉取細末壹兩作貳次入油 水花硃（淨水飛乾取細末貳錢） 府丹（研淨水飛去腳貳錢）

血竭 沒藥 乳香

孩兒茶（已上肆件各五錢和勻共入銅鍋炭火上炒焦爲細末）

新珍珠 新紅象牙（各麵包燒存性取細末舊者不用）

面粉（炭火上炒黃各壹錢） 人指甲（炒黃） 三七（細末乾助）

石乳（細末） 黃連（細末） 黃芩（細末各叁分）

海螵蛸（五分細末） 半夏（大者炒去皮爲細末已上和勻）

（勻分作伍分留壹分作肆分用）

樟冰（細末肆錢） 黃蠟（貳錢） 冰片（壹分）

麝香（叁分） 阿魏（成塊者伍分已上肆件待諸藥俱下盡臨起鍋時方下）

（下麝香取出同麝香）

右藥先將細末藥分五分其四分以次下鍋如左

其一分留看藥厚薄以爲增減如四分已下盡藥

尚薄亦將此分漸下如正好留此一分待貼膏藥

時摻在患處尤妙

煎法用上好香油肆兩入銅鍋中炭火煎沸沸時

入栢枝一莖穿山甲一片在內煎數沸去二藥查

將薄綿紙乘熱濾淨油將淨鍋復入油於鍋中煎

沸下府丹五錢用槐條急攪不住手至成膏方止

仮六七煎後用清水漱淨口噴清水少許於鍋中

仰取起鍋

一起鍋時於前四分中細末藥將一分漸漸逐一

挑下急攪如前此分藥約均和了將槐條蘸藥

滴水日本要成珠復置鍋火上急攪候沸起鍋

二起鍋復將前末藥一分漸下鍋中急攪如前約

均和滴水要成珠復置鍋炭火上急攪候沸起鍋

三起鍋漸下藥攪如前約均和將藥滴水雖成珠

尚要粘手復置鍋火上如前

四起鍋漸下藥如前急攪約均和將藥滴水成珠

珠要將至不粘手了復置鍋炭火上候沸起鍋

五起鍋即下黃蠟貳錢府丹伍錢急攪如前將藥

滴水成珠要須不粘手又不可太老了如尚粘手

將前留下一分末藥漸下以不粘手爲度如不粘

手了即下水花硃貳錢次下樟冰末肆錢急攪方

下麝香叁分阿魏伍分水片壹分急攪不住手畢藥

已均和了撩阿魏查去之以藥入磁罐內浸冷水

中片時候凝將藥罐露天大陽淨地掘坎將磁罐

倒覆於坎中仍以土覆好候七日後方起

一藏法用油紙及箬包好餅口以防洩氣

一攤膏藥時用湯中煎過淨油單紙攤上藥不用
火烘止用熱湯入罐中將油紙放罐上以藥放上
攤開又不用太厚須於紙上照得見爲妙如以紙
攤用湯蒸烊藥攤上
一貼時先將葱艾汁桑葉煎湯露中露過一宿同
以洗患處方用貼之
一既貼後每日洗一徧不要換膏藥至二三日後
血散風去方換收口服膏藥

萬應膏方 專主杖瘡收口神効

香油 貳斤 黃連 黃蘗
黃芩 各伍 栢枝 槐枝 各伍錢
府丹
乳香 沒藥 血竭
孩兒茶 各伍錢
象皮灰 龍骨 海螵蛸 各伍分
半夏 阿魏 伍分

右將頭香油貳斤濾淨入銅鍋中煎沸入黃連黃蘗黃芩槐條煎三四沸將細夏布及薄絹紙濾去查將淨銅鍋仍入油於鍋中煎沸入前府丹用槐條急攪煎至滴水成珠入磁罐中將前細末藥八味及阿魏漸入藥中急攪不停候和勻去阿魏查藥冷爲度七日後可用紙攤先法並如前

一凡人一杖後切不可用手摸之急用明淨松香水龍骨炭火煅過須多年者各一味俱爲細末雞子清調敷惡血自出若能預製此藥以待杖過即敷尤妙 膝松用不用松香亦可大黃云亦有効

薛氏分證主治大法

脇肋脹痛 若大便通和喘欬者也用小柴胡湯加青皮山梔清之若脇脹痛大便不通喘欬吐血者瘀血停滯也用當歸導滯散通之內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木生火侮土肝火既熾肝血必傷脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝滯肌肉不致偏潰次壯脾健胃則瘀肉易潰新肉易生若行尅伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣 有一患者患處脹痛發熱欲嘔兩脇熱脹肝脈洪大薛曰肝火之症也但令飲童便并小柴胡湯加黃連山梔歸梢紅花諸證果退此證若左關脈浮而無力以手按其腹反不脹者此血虛而肝脹也當以四物參苓青皮甘草之類治之若左關脈洪而有力胸脇脹

痛者按之亦痛此怒氣傷肝之證也以小柴胡芎歸青皮芎藭桔梗枳殼主之蓋此證不必論其受責之輕重問其患處去血之曾否但被人扭按甚重努力恚怒以傷其氣血瘀血歸肝多致前證甚則胸脇脹滿氣逆不通或血溢口鼻卒至不救 有一患者愈後口苦腰脇脹痛服補腎行氣等藥不愈脅按其肝脉浮而無力此屬肝膽氣血虛而然耳用參芪芎歸地黃白朮麥門五味治之而愈 李進士季夏傷手出血不止發熱作渴兩脇作脹按之即止此血虛也用八珍加軟柴胡天花粉治之頓愈更用養氣血之

藥調理而痊

小柴胡湯 治一切撲傷等證因肝膽經火盛作痛出血自汗寒熱往來日晡發熱或潮熱身熱欬嗽發熱脇下作痛兩胠痞滿

柴胡貳錢 黃芩壹錢伍分 半夏
人參各壹錢 炙甘草伍分

右薑水煎服

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其疼苦楚不可轉側

羌活 防風 肉桂各壹錢
水蛭石灰炒半錢另研 柴胡 當歸稍
連翹各貳錢 麝香少許另研

右作壹服水壹鍾酒壹鍾煎至壹鍾去滓入水蛭麝香末調勻不拘時溫熱服

腰脊痛 地龍散 治腰脊痛或打撲損傷從高墜下留在太陽經中令人腰脊或脛腨臂股中痛不可忍

地龍 官桂 蘇木各玖
麻黃伍分 黃柏 當歸稍
甘草各壹錢半 桃仁去皮

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

戴復菴云顛撲傷疼酒調琥珀散極佳再有烏藥順氣散用以治之風腰疼尤宜有顛撲人服藥并熏洗搽貼藥皆不效白若或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙乳香沒藥等分為末和勻酒調服隨即痛減其半

腹痛 或大便不通按之痛甚瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之不痛血氣傷也用四物湯加參芪白朮補而和之若下而胸脇反痛肝血傷也用四君芎歸補之既下而發熱陰血傷也

用八物參术補之既下而惡寒陽氣傷也用十全大補湯補之既下而惡寒發熱氣血俱傷也用八珍湯補之既下而欲嘔胃氣傷也用六君當歸補之既下而泄瀉脾腎傷也用六君肉果破故紙補之若下後手足俱冷昏憒出汗陽氣虛寒也急用參附湯吐瀉手足俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極之壞證也急投大劑參附湯多有得生者　有一患者杖後服四物紅花桃仁大黃等劑以逐瘀血腹反痛更服一劑痛益甚按其腹不痛脉目此血虛也故喜按而

不痛宜溫補之劑遂以歸身白术參芪炙草二劑痛即止　有一患者仲秋夜歸墜馬腹內作痛飲酒數杯翌早大便自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而行散也　一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚益甚大便不通血欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此因元氣不足瘀血得寒而凝聚也故產婦金瘡者不宜食此　一男子孟秋墜梯腹停瘀血用大黃等藥其血不下反加胸脇脹痛喘促短氣欲用肉桂木香末各貳錢熱酒調服即下黑血及前所服之藥而蘇此因寒藥凝滯而不行故用辛溫之劑散之

陳侍御墜馬腿痛作嘔服下藥一劑胸腹脹痛按之即止惟倦怠少氣診其脉微細而濇予曰非瘀血也乃痛傷氣血復因藥損脾氣而然耳投養脾胃生氣血之藥而愈

加味承氣湯　治瘀血內停胸腹脹痛或大便不通等證

大黃　朴硝各貳錢　枳實
厚朴　當歸　紅花各壹錢
甘草伍分

用酒水各壹鍾煎至壹鍾服仍量虛實加減病急不用甘草

[illegible]定痛乳香神應散　治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛

乳香　沒藥　雄黑豆
桑白皮　獨科栗子　當歸各壹兩
破故紙炒貳兩　水蛭半兩

右為末每服伍錢醋壹盞砂石器內煎至六分入麝香少許溫服

小腹引陰莖作痛　有一患者瘀血失砭脹痛煩渴縱飲涼童便渴脹頓止以蘿蔔細搗塗之瘀血漸散已

而患處作痛仍塗之痰止後口乾作渴小腹引陰莖作痛小便如淋時出白津此肝經鬱火也遂以小柴胡湯加大黃黃連山梔飲之諸證悉退再用養血之藥而安夫小腹引陰莖作痛等證往往誤認為寒證投以熱劑則諸竅出血或二便不通以及危殆輕亦損其目矣

【腹肉作痛】營衛之氣滯也用復元通氣散筋骨作痛肝腎之氣傷也用六味地黃丸內傷下血作痛脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之氣虛也用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也吐瀉不食脾胃之氣敗也苟預為調補脾胃則無此患矣

【創口痛】若痛至四五日不減或至一二日方痛欲作膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬痰也當生肝血補脾氣　有一患者患處脹痛悲哀忿怒此厥陽之火為七情激之而然耳遂砭去瘀血以小柴胡湯加山梔黃連桔梗而安後用生肝血養脾氣之藥瘡潰而斂　戴給事墜馬腿腫痛而色黯食少倦怠此元氣虛弱不能運散瘀血而然耳遂用補中益氣去升麻柴胡加木瓜茯苓芍藥白朮治之而痊　儒者王清之跌腰作痛用定痛等藥不愈氣血日衰面耳黧色薛曰腰為腎之府雖曰閃傷實腎經虛弱所致遂用杜仲補骨脂五味山茱蓯蓉山藥空心服又以六君當歸白朮神麴各二錢食遠服不月而瘥　一三歲兒閃腰作痛服流氣等藥半載不愈薛曰此稟腎氣不足不治之證也後果歿

【瘀血作痛】有一患者腫痛發熱作渴汗出薛曰此陰血受傷也先砭去惡血以通壅塞後用四物柴胡黃芩山梔丹皮骨碎補以清肝火而愈　有一患者傷

處揉散但腫痛不消薛曰此瘀血在內宜急砭之不從薛以藉葡自然汁調山梔末傅之破處以當歸膏貼之更服活血之劑而瘥數年之後但遇天陰仍作痒痛始知不砭之失　有一患者臀腿黑腫而皮不破但脹痛重墜皆以為內無瘀血惟傅涼藥可以止痛薛診其尺脈澀而結此因體肥肉厚瘀血蓄深刺去即愈否則內潰有爛筋傷骨之患薛入針四寸漂黑血數升腫痛遂止是日發熱惡寒煩渴頭痛此氣血俱虛而然也以十全大補之劑遂痊　一男子閃傷右腿壅腫作痛薛謂急砭去滯血以補元氣庶無

後患不信乃外傅大黃等藥内服流氣飲後潰出穢膿數碗許其膿不止乃復求治視其腿細而脉大作渴發熱辭不治後果歿　憲友王汝道環跳穴處閃傷瘀血腫痛發熱作渴遂砭去瘀血知其下焦素有虛火用八珍加黃蘗知母牛膝骨碎補四劑頓止用十全大補湯少加黃蘗知母麥門五味三十餘劑而斂

血虛作痛　婦人磕臂出血骨痛熱渴煩悶頭暈日晡益甚此陰虛内熱之證用八珍加丹皮麥門五味骨碎補肉桂及地黃丸治之悉愈却去桂加牛膝續

斷三十餘劑而瘡愈

骨傷作痛　一小兒足傷作痛肉色不變傷在骨也頻用炒葱熨之五更用和血定痛丸日間用健脾胃生氣血之劑數日後服地黃丸三月餘而差　一小兒臂骨出臼接入腫痛發熱服流氣等藥益甚飲食少思薛以葱熨之其痛即止以六君黃芪柴胡桔梗續斷骨碎補治之飲食進而腫痛消又用補中益氣加麥門五味治之氣血和而熱退愈矣

没藥丸　治打撲内損筋骨疼痛

没藥　乳香　川芎

加山梔黃連二劑痛止用四物山梔黃蘗知母調理而康　有一患者瘀血内脹焮痛發熱口乾作渴飲食不甘四肢倦怠薛曰此肝火熾盛脾土受制故患前證喜其稟氣年壯第用降火清肝活血之劑而愈

青腫不潰　凡腫不消用補中益氣湯以補氣腫黯不消用加味逍遙散以散血若焮腫脹痛瘀血作膿也以八珍湯加白芷托之若膿潰而反痛氣血虛也以十全大補湯補之若骨骱接而復脫肝腎虛也用地黃丸腫不消青不退氣血虛也内用八珍湯外用葱熨法則瘀血自散腫痛自消若行血破血則脾胃愈

閃作痛服透骨丹反致肢節俱痛下體益甚以二陳南星羌活防風牛膝木瓜蒼朮黃芩黃蘗治之身痛遂安以前藥再加歸尾赤芍桔梗治之而痊　鄭吏部素有濕痰孟冬墜馬服辛熱破血之藥徧身作痛發熱口乾脉大而滑此熱劑激動痰火為患耳治以清燥湯去人參當歸黃芪加黃芩山梔半夏黃蘗熱痛頓去患處少愈更用二陳羌活桔梗蒼朮黃蘗薑製生地當歸遂痊

肝火作痛　楊司天骨已入臼患處仍痛服藥不應肝脉洪大而急薛曰此肝火盛而作痛也用小柴胡湯

加山梔黄連二劑痛止用四物山梔黄蘗知母調理
而康　有一患者瘀血内脹焮痛發熱口乾作渴飲
食不甘四肢倦怠薛曰此肝火熾盛脾土受制故患
前證喜其禀實年壯第用降火清肝活血之劑而愈

青腫不消　用補中益氣湯以補氣腫黯不
消用加味逍遙散以散血若焮腫脹痛瘀血作膿也
以八珍湯加白芷托之若膿潰而反痛氣血虚也以
十全大補湯補之若骨斷接而復脱肝腎虚也用地
黄丸腫不消青不退氣血虚也内用八珍湯外用葱
熨法則瘀血自散腫痛自消若行血破血則脾胃愈

虚運氣愈滯若敷貼涼藥則瘀血益凝内腐益深致
難收拾　一婦人閃臂腕腫大已三月手臂日細肌
瘦惡寒食少短氣脉息微細屬形病俱虚也遂投補
中益氣加肉桂引諸藥以行至臂再加貝母香附以
解久病之鬱間服和血定痛丸以散瘀之腫消二三
因怒患處仍脹胸膈兩脇微痛以前湯更加木香山
梔半夏桔梗服之少可復因驚不寐少食盜汗以歸
脾湯加五味麥門二十餘劑而安腫消三四手臂漸
肥但經水過期而少此心脾之血尚未充足而然也
乃用八珍加五味麥門丹皮遠志香附貝母桔梗四

十餘劑諸證悉愈後因怒發熱譫語經水如漏此怒
動肝火以小柴胡湯加生地黄五錢一劑遂止以四
物加柴胡調理而康　州守陳克明子閃右臂腕腫
痛肉色不變久服流氣等藥加寒熱少食舌乾作渴
薛曰傷損等證腫不消色不變此運氣虚而不能愈
當助脾胃壯氣血爲主遂從薛法治之不二月形氣
漸充腫熱漸消半載諸證悉退體健如常　一小兒
閃腿腕壅腫形氣怯弱薛欲治以補氣血爲主佐以
行散之劑不信乃内服流氣飲外傅寒涼藥加寒熱
體倦薛曰惡寒發熱脉息洪大氣血虚極也治之無

功後内潰瀝盡氣血而亡　李孝功子十四歲腳腕
閃傷腫而色夭口出清膿少許肝脉微澀此肝經受
傷氣血虚而不能潰難治之證也急止尅伐之劑不
信乃雜用流氣等藥後果出爛筋而歿

腐肉不潰　或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而不
潰用八珍湯若因尅伐而不潰者用六君子湯加當
歸其外皮黑堅硬不潰者内火蒸炙也内服八珍湯
外塗當歸膏其死肉不能潰或新肉不能生而致死
者皆失於不預補脾胃也　有一患者瘀血已去飲
食少思死肉不潰又用托裏之藥稍潰而清此血

氣虛也非大補不可彼不從薛強用大補之劑飲食進而𭔃肉潰但少寐以歸脾湯加山梔二劑而寐因勞心煩躁作渴脉浮洪大以當歸補血湯二劑而安

有一患者受刑太重外皮傷破瘀血如注內肉糜爛黯腫上徹胸背下至足指昏憒不食隨以黑羊皮熱貼患處灌以童便酒薄粥更以清肝活血調氣健脾之劑神思稍蘇始言徧身強痛又用大劑養血補氣之藥腫消食進時仲冬瘀血凝結不能潰膿又用大補之劑壯其陽氣其膿方熟遂砭去洞見其骨塗以當歸膏及服前藥自餘新肌肉漸生　火宗伯劉

五清臁傷一塊微痛少食用六君子湯倍加當歸黃芪其痛漸止月餘瘀血內涸而不潰公以為痊予曰此陽氣虛極須用調補不從至來春頭暈痰涎壅塞服清氣化痰病勢愈盛脉洪大而微細欲以參芪歸朮附子之類補之不信至秋初因怒昏憒而厥

新肉不生若患處夭白脾氣虛也用六君芎歸患處緋赤陰血虛也用四物參朮若惡寒發熱氣血虛也用十全大補湯膿稀白而不生者脾肺氣虛也用補中益氣湯膿稀赤而不生者心脾血虛也用東垣聖愈湯寒熱而不生肝火動也用加味逍遙散晡熱而不生肝血虛也用八珍牡丹皮食少體倦而不生膿閉氣虛也用六君子湯膿穢而不生者陰虛邪火也用六味地黃丸四肢困倦精神短少而不生者元氣內傷也用補中益氣湯如夏月用調中益氣湯作渴用清暑益氣湯秋令作瀉用清燥湯　有一患者潰肉不斂以內有熱毒欲用寒涼之藥薛曰此血氣俱虛而不能斂耳非歸朮參芪之類培養脾土則肌肉何由而生豈可復用寒涼剋伐之藥重損氣血耶遂用前藥治之而愈

出血若患處或諸竅出者肝火熾盛血熱錯經而妄行也用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱血無所附而妄行用加味四君子湯補益中氣或元氣內脫不能攝血用獨參湯加炮薑以回陽如不應急加附子或血蘊於內而嘔血用四物加柴胡黃芩凡傷損勞碌怒氣肚腹脹悶誤服大黃等藥傷陽絡則為吐血衄血便血尿血傷陰絡則為血積血塊肌肉青黯此臟腑虧損經隧失職急補脾肺亦有生者但患者不悟此理不用此法惜哉　張地官墜馬傷腿服草烏等藥致衄血欬嗽臂痛目黃口渴齒痛小便短赤此因燥劑傷肺與大腸而致薛用生地芩連黃檗知

丹山梔山藥甘草以潤肺之燥而生腎水小便頓長諸證並止以山藥五味麥門參芪芎歸黃蘗黃芩知母炙草以滋陰血養元氣而瘡斂　俞進士折腿骨已接二月尚發熱出血不止正體類要治不應左關脈洪數此肝火熾甚血得熱而妄行也遂投小柴胡湯加山梔芍藥生地防風血止熱退又用八珍五味麥門治之瘡口即愈　田宗伯姪仲秋因怒跌仆遍身作痛發熱衄血肝脈弦洪至冬衄脈弦洪乃肝火盛而制金也至春則肝木茂盛而自焚或戕賊脾土非易治之證當滋腎水以生肝木益脾土以生肺金

乃雜用瀉肝火等藥歿於仲春之月　大尹劉國信金瘡出血發熱煩躁屬陰虛為患用聖愈湯治之遂火息而血歸經矣　梁閣老姪金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附而血不歸經也用補中益氣五味麥門主之陽氣復而愈

瘀血泛注 有一患者瘀血流注腰膂兩足俱黑隨飲童便酒砭出瘀血糜肉投以小柴胡湯去半夏加山梔芩連骨碎補以清肝火用八珍茯苓以壯脾胃死肉潰而新肉生後瘡復潰得静調治年餘而痊　有患者瘀血攻注陰囊潰而成漏膿水清稀所服皆寒涼之劑診其肝脈短濇餘脈浮而無力此肝木受肺金尅制又元氣虛不能收斂遂用壯脾胃生氣血之方元氣少復後終歿於金旺之日

昏憒 傷重昏憒者急灌以獨參湯雖內瘀血切不可下急用花蕊石散內化之恐因瀉而亡陰也若元氣虛甚者尤不可下亦用以前散化之凡瘀血在內大小便不通用大黃朴硝血凝而不下者急用木香肉桂末各貳錢以熱酒調灌服血下乃生如怯弱之人用硝黃須加肉桂木香同煎假其熱以行其寒也

一婦人孟冬傷足亡血頭汗內熱作渴短氣煩躁不

時昏憒其脈洪大按之微弱此陰血虛於下孤陽炎於上故發厥而頭出汗也以四物合小柴胡湯一劑汗即止以四物去川芎加參芪麥門五味炙草少用肉桂四劑諸證悉去又三十餘劑血氣復而愈　一男子孟夏折腿出血過多其初眩暈眼花後則昏憒此陰血傷損陽火熾甚制金不能平木木旺生風所致急灌童便更用人參當歸各伍錢荊芥川芎柴胡芍藥白朮各貳錢山梔黃蘗黃芩桔梗各壹錢甘草伍分服之隨爽又用四物參芪各叁錢生地柴胡各壹錢四劑煩躁悉去

眩暈有一患者腹脹嘔吐眩暈用柴胡黃芩山梔紫蘇杏仁枳殼桔梗川芎當歸赤芍紅花桃仁四劑而定後又出血過多昏憒目黑用十全大補等藥而蘇時肌肉潰爛膿水淋漓筋攣骨痛薛切其脈浮而澀沉而弱此因氣血耗損不能養筋筋虛不能束骨遂用養氣血之藥治之而愈 有一患者杖瘡愈後失於調理頭目不清服祛風化痰等藥反眩暈服牛黃清心丸又肚腹疼痛杖痕腫痒發熱作渴飲食不思痰氣上升以為杖瘡餘毒復作診左尺脈洪大按之如無薛曰此腎經不足不能攝氣歸源遂用人參黃芪茯苓陳皮當歸川芎熟地山藥山茱萸五味麥門炙草服之而尋愈後因勞熱渴頭痛倦怠少食用補中益氣湯加麥門五味而痊

煩躁有一患者兩脇脹悶欲欬不欬口覺血腥遍身臂腿脹痛倦怠不食煩渴脈大此血脫煩躁也與童便酒及砭患處出死血糜肉甚多忽發熱煩躁汗出投以獨參湯二劑少止又用補氣血清肝火之藥數劑飲食稍進後用獨參湯間服諸證悉退飲食頓加但不能多寐以歸脾湯加山梔竹茹四劑而熟睡因勞心遂煩渴自汗脈大無力以當歸補血湯二劑而

安又以十全大補去川芎加麥門五味牡丹地骨麻黃根炒浮麥數劑而汗止死肉且潰又二十餘劑而新肉生 有一患者煩躁面赤口乾作渴脈洪大按之如無薛曰此血虛發躁也遂以當歸補血湯二劑即止後日晡發熱更以四物加柴胡牡丹地骨黃蘗知母治之熱退而瘡斂東垣云發熱惡寒大渴不止其脈大而無力者非白虎湯證此血虛發躁也宜用當歸補血湯治之裴先生云肌熱躁熱目赤面紅其脈洪大而虛此血虛也若誤服白虎湯輕則危重則斃 有一患者頭額出汗熱渴氣短煩躁骨痛瘀肉不潰遂割去之出鮮血服芩連之藥益甚其脈洪大而微此氣血俱虛邪火熾盛所致以四物加參芪朮炙草少用柴胡炒芩二劑頭汗頓止又加麥門五味肉桂二劑諸證悉退後用參芪歸朮炒芍熟地麥門五味十餘劑瘀血潰而膿水稠矣但新肉不生以前藥倍用白朮而斂 吳給事墜馬傷首出血過多發熱煩躁肉瞤筋惕或欲投破傷風藥予曰此血虛火動所致當峻補其血為善遂用聖愈湯二劑即安又養氣血而瘡瘥 張進士季秋墜馬亡血過多出汗煩躁翌日其汗自止熱躁益甚口噤手顫此陰血虛

以火乘之而汗出爲寒氣收斂腠理故汗不得出火
不得泄怫鬱内甚而益增他證也予用四物加柴胡
黄芩山梔四劑少止又用四物參芪軟柴胡五味麥
門治之而痊

發熱若出血過多或潰膿之後脉洪大而虚重按全
無此陰虚發熱也用當歸補血湯脉沉微按之軟弱
此陰盛發躁也用四君薑附若發熱煩躁肉瞤筋惕
亡血也用聖愈湯如汗不止血脱也用獨參湯其血
脱脉實汗後脉躁者難治細小者易治外臺秘要云
陰盛發躁欲坐井中用附子四逆湯加葱白王太僕

先生云凡熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動
者名曰無火此無根之虚火也　一傷損上傷手指焮
痛發熱服寒涼之藥致飲食頓減患處不潰薛用托
裡養血之藥食進瘡潰後因勞每日晡發熱此陰虚
而内熱也以四物軟柴胡地骨皮乃退更用養血氣
之藥而瘡斂　一男子墜馬腹有瘀血服藥下之致
發熱盜汗自汗脉浮濇薛以爲重劑過傷氣血所致
投以十全大補湯益甚時或譫語此藥力未及而然
也以前藥加炮附子伍分服之即睡覺來頓安再劑
而痊　一婦人余時正金瘡焮痛出血不止惡寒發熱

用敗毒等藥愈甚此亡血過多氣無所附而然耳遂
以四物黄蘗知母軟柴胡玄參五味麥門治之即愈
一女子年十七腦右側微腫作痛寅申時發熱薛
以其膽經血虚火盛經水果先期而至先以四物合
小柴胡湯四劑熱退更以加味四物湯加香附地骨
皮山梔各伍分芩連炙草各叁分二十餘劑其腫亦
消乃去黄連山梔又五十餘劑經水調而元氣充矣

筋氣脱陷梁閣老姪跌傷腿外敷大黄等藥内服破
血之劑遂致内潰針出穢膿碗許虚證悉具用
大補之劑兩月餘少能步履因勞心手撒眼閉汗出

如水或欲用祛風之劑薛曰此氣血尚未充足而然
也急以艾炒熱頻熨肚臍并氣海穴處以人參肆兩
炮附子伍錢煎灌良久臂少動又灌一劑眼開能言
但氣不能接續乃以參芪歸术四味共壹斤附子伍
錢水煎徐徐服之元氣漸復飲食已進乃去附子服
之而瘡愈

胷腹痛悶跳躍搥胷閃挫舉重勞役恚怒而胷腹痛
悶喜手摸者肝火傷脾也用四君柴胡山梔畏手摸
者肝經血滯也用四物柴胡山梔桃仁紅花若胷脇
作痛發熱晡熱肝經血傷也用加味逍遥散若胷脇

作痛飲食少思肝脾氣傷也用四君芎歸柴梔丹皮若胸腹脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君加柴胡芎歸若胸腹不利食少無寐脾氣鬱結也用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳白朮芎歸梔子青皮若咬牙發搐肝旺脾虛也用小柴胡湯川芎山梔天麻鈎藤鈎或用風藥則肝血益傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛肝火愈熾若用大黃等藥內傷陰絡反致下血少壯者必爲痼疾老弱者多致不起

作嘔 若因痛甚或因黜伐而傷胃者用四君當歸半夏生薑或因忿怒而肝傷者用小柴胡湯加山梔茯苓若因痰火盛用二陳薑炒黃連山梔若因胃氣虛用補中益氣湯生薑半夏若出血過多或因潰後用六君子湯加當歸　有一患者痛甚發熱嘔吐少食胸膈痞滿用行氣破血之劑益甚口乾作渴大便不調患處色黯余用此痛傷胃氣所致遂以四君當歸炒芩軟柴藿香一劑諸證漸愈又用大補之劑潰之而瘳　有一患者發熱煩痛服寒涼藥更加口乾作渴肚腹亦痛自以爲瘀血欲下之薛按其肚腹不痛脉微細而遲飲食惡寒此涼藥傷胃而然也急用六君加芍藥當歸炮附子各一錢服之前證益甚反加譫語面赤薛意其藥力未至耳前藥再加附子伍分服之即睡覺來諸病頓退而安　一膏粱之人跌腿青腫作痛服辛熱之藥反發熱作渴患處益痛口乾唇揭薛曰膏粱之人內多積熱再服辛熱之劑益其胃火而使然也頻飲童便以清胃散加山梔黃芩甘草治之頓止患處以葱熨之腫即消散　一婦人傷指手背俱腫微嘔少食彼以爲毒氣內攻診其脉沉細此痛傷胃氣所致也遂刺出膿碗許先以六君藿香當歸而食進繼以八珍黃芪白芷桔梗月餘而瘡愈

嘔吐黑血 加味芎藭湯　治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血如豆汁

芎藭　當歸　白芍藥
百合水浸壹日　荊芥各壹錢

右作一服水一鍾半酒半鍾煎八分不拘時服

百合散　治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血汁者

川芎　赤芍藥　當歸
百合　生地黃　側柏葉
荊芥　犀角　牡丹皮

黃芩　黃連　梔子
鬱金　大黃
右水煎加童便和服　大便利者去大黃

喘欬若出血過多面黑胸脹或胸脇痛而發喘者乃氣虛血乘於肺也急用二味參蘇飲若欬血衄血者乃氣逆血蘊於肺也急用十味參蘇飲加山梔芩連蘇木　舉人杜克弘墜馬服下血藥反作喘日晡益甚此血虛所致耳非瘀血爲患遂以四物加參芪五味麥門治之其喘頓止又用補中益氣加五味麥門而愈此證果係瘀血蒸熏於肺而喘只宜活血行血亦不可下若面黑胸脹或脇痛作喘當用人參壹兩蘇木貳兩作一劑水煎急服緩則不治產婦多有此疾

二味參蘇飲　治出血過多瘀血入肺面黑喘促
人參壹兩　蘇木貳兩
右水煎服

十味參蘇飲　治氣逆血蘊上焦發熱氣促或欬血衄血或痰嗽不止加黃芩山梔卽加味參蘇飲
人參　紫蘇　半夏
茯苓　陳皮　桔梗
前胡　葛根　枳殼各壹錢
炙甘草五分
右薑水煎服

作渴若因出血過多用四物參朮如不應用人參黃芪以補氣當歸熟地以養血若因潰後用八珍湯若胃熱傷津液用竹葉黃芪湯胃虛津液不足用補中益氣湯胃火熾盛竹葉石膏湯若煩熱作渴小便淋濇乃腎經虛熱非地黃丸不能救　有一患者瘀血雖去飲食形氣如故但熱渴焮痛脇痞有痰以小柴胡湯加天花粉貝母桔梗山梔二劑少愈又加生地歸尾黃芩柴胡山梔花粉而愈余治百餘人其杖後血氣不虛者惟此一人耳

大便秘結若大腸血虛火熾者用四物湯送潤腸丸或以豬膽汁導之若腎虛火燥者用六味地黃丸腸胃氣虛用補中益氣湯

肉死不潰若元氣虛弱或不戒房勞或妄行攻伐致死肉上延或腐而不痛黑而不脫者當大補元氣庶可保生若手足節骱斷去者無妨骨斷筋連不急剪去若侵及好肉則不治若預爲調補脾氣則無此患

大凡膿瘀內焮者卽針之而投托裏散或口噤遺尿

而似破傷風者急用十全大補湯加附子多有生者

手足疼痛 有一患者愈後腿作痛薛意膿血過多疼甚愈肝經血氣尚未充實而濕熱乘虛也遂以八珍加牛膝木瓜蒼术黄蘗防己炙草以祛濕熱養陰血痛漸止乃去防己黄蘗服之遂瘳

應痛丸 治折傷後爲四氣所侵手足疼者

破故紙　骨碎補 去毛　蒼术 生用

草烏 各半斤　穿山甲 去膜燒焦 桑灰炒泡 或灶灰炒亦可

舶上茴香 炒各四兩

右除草烏半斤用生薑一斤擂爛同草烏一處淹

兩宿焙乾爲末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸用酒或米湯送下忌熱物片時

乳香散 治打傷損手足疼痛不可忍者

乳香　沒藥 各另研　白芷 各五錢

肉桂 各五錢　白术　當歸 各炒

粉草 各五錢

右爲細末研勻每服二錢不拘時酒調下

破傷風 河間云風證善行數變入臟甚速死生在反掌之間宜急分表裏虛實而治之邪在表者則筋脈拘急時或寒熱筋惕搐搦脉浮弦用羌活防風湯散之在半表半裏者則頭微汗身無汗用羌活湯和之傳入裏者舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胸腹滿悶便溺閉赤時或汗出脉洪數而弦以大芎黄湯導之既下而汗仍出表虛也以白术防風湯補之不時灌以粥飲爲善前六乃氣虛未損之法也若膿血太泄陽隨陰散氣血俱虛而類前證者悉宜大補脾胃切忌祛風之藥 詳見雜病第五 有一患者仲夏誤傷手腰背反張牙關緊急脉浮而散此表證也遂用羌活防風湯一劑即解此證若在秋冬腠理緻密之時須用麻黄之類以發汗此乃暴傷氣血

不損之治法也 有一患者仗瘡將愈而患此脉洪大而實此裏證也用大芎黄湯一劑大便微行一次悉退若投表藥必死宜急分表裏虛實而治之庶無誤矣 有一患者發熱口乾用四物參芪白术軟柴炒芩麥門五味四劑少退彼欲速去瘀血不從後怔忡不寐飲食少思牙關牽緊頭目疼痛惡寒發熱此膿內焮也遂砭去之即安以八珍棗仁麥門五味二十劑而證漸愈又用前藥及獨參湯瘀肉漸潰後因勞又少寐盜汗以歸脾湯麥門五味遠志而瘳後牙關脹悶面目焮赤又似破傷風仍以爲虛用八珍等

藥亦安　有一患者腹痛喘促作渴寒熱臂腫爛
與肉血相和如皮囊盛糊用童便煎四物桃仁紅花
柴胡黃芩麥門花粉服之頓退彼用黑羊皮貼之益
甚後砭去膿血甚多氣息奄奄脣口微動牙關緊急
患處色黯或欲用破傷風藥薛曰此氣血虛而變證
也用參芪芎歸白朮并獨參湯人乳汁元氣復而諸
證愈乃用十全大補湯調理而安此證若膿瘀內焮
者宜針之若潰後口噤遺尿而類破傷風等證者乃
氣血虛極也急用大補之劑若素多痰患風證者宜
清痰降火若因怒而見風證者宜清肝降火若人不

慎房勞而忽患前證此由腎水不足心火熾甚宜滋
陰補氣血為主若誤作風證治之即死

羌活防風湯　治破傷風邪初在表者急服此藥以
解之稍遲則邪入於裏與藥不相合矣

羌活　防風　甘草
川芎　藁本　當歸
芍藥各肆兩　地榆　細辛各貳兩

右每服伍錢水煎

防風湯　治破傷風表證未傳入裏急宜服之

防風　羌活　獨活
川芎各等分

右每服伍錢水煎調蜈蚣散服大効

蜈蚣散

蜈蚣壹對　鰾伍錢

右為細末用防風湯調下

羌活湯　治破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪
入於裏不宜用

羌活　菊花　麻黃
川芎　石膏　防風
前胡　黃芩　細辛

甘草　枳殼　白茯苓
蔓荊子各壹兩　薄荷　白芷各伍錢

右每服伍錢水煎

地榆防風散　治風在半表半裏頭微汗身無汗不可
發汗兼治表裏

地榆　防風　地丁草
馬齒莧各等分

右為細末每服叁錢米湯調服

大芎黃湯　治風在裏宜疎導急服此湯

川芎　羌活　黃芩

大黃各壹兩
右伍柒錢水煎溫服臟腑通和爲度
白术防風湯　治服表藥過多自汗者
白术　黃芪各壹兩　防風貳兩
右每服伍柒錢水煎服臟腑和而自汗者可服若
臟腑秘小便赤者宜用大芎黃湯下之
白术湯　治破傷風汗不止筋攣搐搦
白术　葛根　升麻
黃芩　芍藥各貳兩　甘草貳錢伍分
右每服伍錢水煎無時服

蕪甫硃砂丸　治破傷風目瞪口噤不語手足搐搦
項筋強直不能轉側目不識人
硃砂研　半夏泡　川烏各壹兩
雄黃伍錢　鳳凰壹衣錢　麝香壹字
右爲末棗肉丸桐子大每服壹丸或貳丸冷水下
以吐爲度如不吐加壹丸或吐不住煎葱白湯止
之汗出爲効
左龍丸　治直視在裏者
左盤龍野鴿糞也　白殭蠶　鰾各炒伍錢
雄黃壹錢

右爲末燒飯丸桐子大每服拾伍丸溫酒下如裏
證不已當用前藥末一錢加巴豆霜半錢燒飯丸
桐子大每服加入壹丸如此漸加以利爲度利後
服和解藥
江鰾丸　治破傷風傳入裏[illegible]而發搐臟腑秘澀
江鰾剉炒　野鴿糞炒　白殭蠶各半兩
雄黃壹錢　蜈蚣壹對　天麻壹兩
右爲末作叁分貳分燒飯丸桐子大硃砂爲衣壹
分入巴豆霜壹錢亦用燒飯丸不用硃砂者貳拾
丸入巴豆者壹丸漸加至利爲度後止服前丸

養血當歸地黃散
當歸　地黃　芍藥
川芎　藁本　防風
白芷各壹兩　細辛伍錢
右依前煎服
廣利方　治破傷風發熱
栝蔞子玖錢　滑石叁錢半　南星
蒼朮　赤芍藥　陳皮
炒蘗　黃連　黃芩
白芷　甘草各伍

右薑水煎服
右二方用竹瀝拌煎治破傷風熱痰脉洪者
前方用南星半夏草烏川烏煎則治破傷風寒痰
脉無力者
白丸子　治一切風痰壅盛手足頑麻或牙關緊急
口眼歪斜半身不遂等證
半夏柒兩　南星貳兩　川烏去皮臍錢各生用
右為末用生薑汁調糊丸桐子大每服壹貳拾丸
薑湯下
本事玉真散　治破傷風及打撲傷損項強口噤欲
死南星有防風製其毒不麻人
天南星湯泡柒次　防風等分
右為末先以熱童子小便洗淨瘡口拭乾摻之良
久渾身作痒瘡口出赤水是効又以溫酒調下壹
錢如牙關緊急腰背反張用藥貳錢童子小便調
服至死心頭微溫者急灌之亦可救累効累効
治打撲傷損腫痛傷風者
天南星　半夏　地龍各等分
右為末用生薑薄荷汁調搽患處
急風散　治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折
口噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治
之
麝香另研伍分　硃砂壹兩　生黑豆貳錢半
草烏煉存性叁兩半
右為細末研勻破傷風以酒調壹錢不拘時服如
出箭頭先用酒調壹錢就將此藥貼上箭瘡上
如聖散　治破傷風止血定痛
蒼朮肆兩　川烏炮去皮　兩頭尖各炮肆兩
草烏炮去皮　防風　細辛各貳兩半
白朮　川芎　白芷各壹兩半
蝎稍微炒　雄黃各半兩
右為細末每服壹錢不拘時酒調下如損骨折亂
香伍錢
一字散　治破傷風
金頭蜈蚣壹條去頭足炙　草烏
天麻各半兩　全蝎壹錢　香白芷叁錢
右為細末每服半錢如發熱茶清調下發寒溫酒
調下不拘時服
發痙　仲景云諸痙項強皆屬於濕又云太陽病發汗
太多致痙風病下之則痙復發汗則拘急瘡家發汗

則痓是汗下重亡津夜所致者汗而不惡寒曰柔痓以風能散氣也宜白朮湯加桂心黃芪無汗而惡寒曰剛痓以寒能濇血也宜葛根湯皆氣血內傷筋無所營而變非風也杖瘡及勞傷氣血而變者當補氣血未應用獨參湯手足冷加桂附緩則不救　詳見雜病第五　有一患者內潰針出膿三五碗遂用大補之劑翌日熱甚汗出足冷口噤腰背反張衆欲投發散之劑薛曰此氣血虛極而變痓也若認作風治則悞矣用十全大補等藥而愈此證多因傷寒汗下過度與產婦潰瘍氣血虧損所致但當調補氣血為

善若服尅伐之劑多致不救　有一患者兩月餘矣瘡口未完因怒發痓瘡口出血此怒動肝火而為患耳用柴胡芩連山梔防風桔梗天麻鈎藤鈎甘草治之頓愈劉宗厚先生云痓有屬風火之熱內作者有因七情怒氣而作者亦有濕熱內盛痰涎壅遏經絡而作者惟宜補虛降火敦土平木清痰去濕

行氣之非有一患者服行氣之劑胸痞氣促食少體倦色黯膿清此形氣俱虛之證也先用六君桔梗二劑胸膈氣和後用補中益氣去升麻加茯苓半夏五味麥門治之元氣漸復而愈若用前劑戕賊元氣多至不救

[illegible]有一患者夫其患處瘀血用四物柴胡紅花治之瘀痛頓止但寒熱口乾飲食少思用四物白朮茯苓柴胡黃芩花粉四劑寒熱即退用六君芎歸藿香而飲食進腐肉雖潰膿水清稀以前藥倍用參芪歸朮茯苓二十餘劑腐肉俱潰膿水漸稠悞服下藥一鍾連瀉四次患處色黯喜其脉不洪數乃以十全大補倍加肉桂麥門五味數劑肉色紅活新肉漸生喜在壯年易於調理又月餘而愈否則不救凡杖瘡跌撲之證患處如有瘀血止宜砭去服壯元氣之

劑蓋其氣血已損切不可再用行氣下血之藥復損脾胃則運氣愈難營達於下而反為敗證怯弱者多致夭枉

寒藥之非有一患者腫痛敷寒涼之藥欲內消瘀血反致臀腿俱冷瘀血併胸腹痞悶薛急去所敷之藥以熱童便酒洗患處服六君木香當歸傅回陽膏臀腿漸溫又以前藥去木香加川芎藿香肉桂四劑瘀而解乃刺之更以壯脾胃養氣血得痊蓋氣血得溫則行得寒則凝寒極生熱變化為膿腐潰深大血氣既敗肌肉無由而生欲望其生難矣　雲間曹子容

衙室人中風灌藥誤咬去指半節焮痛寒熱外敷大黃等藥內服清熱敗毒患處不痛不潰膿清色黯甚薛曰此因涼藥過傷隧道而然也遂敷玉龍膏以散寒氣更服六君子湯以壯脾胃數日後患處微痛腫處漸消此陽氣運達患處也果出稠膿不數日半指潰脫更服托裏藥而斂　上舍王天爵傷足焮腫內熱作渴外敷內服皆寒涼敗毒患處益腫而不潰且惡寒少食欲作嘔吐薛曰此氣血俱虛又因寒藥凝結隧道損傷胃氣以致前證耳遂用香砂六君子芎歸炮薑外證悉退惟體倦晡熱飲食不甘以補中

益氣湯加地骨皮五味麥門治之而愈　州守王廷用傷指即用帛裹之瘀血內潰焮腫至手薛謂宜解患處以出瘀血更用推陳致新之劑不信乃敷涼藥痛雖少止次日復作又敷之數日後手心背俱潰出瘀穢膿水尚服敗毒之劑氣血益虛色黯膿清飲食少思仍請予治投以壯脾胃生氣血之劑由是膿水漸稠而愈

不從之非有一患者發熱煩躁用四物黃芩紅花蘇柴山梔花粉煩熱已清瘀血深蓄欲針出之不從忽牙關緊急患處作痛始針去膿血即安用托裏養血新肉漸長忽患處癢痒此風熱也用祛風消毒之劑而痊

不補之非有一患者臀腿脹痛發熱煩躁刺去瘀血脹痛少寬熱躁愈甚此血脫邪火旺而然也急用獨參湯補之少愈又以健脾胃養氣血藥治之腐肉漸潰遂愈大抵此證宜預調補以顧收斂切不可伐其氣血不行補益以至不能收斂矣

湯火瘡

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛愼勿以冷物搨之及井底泥傅之使熱氣不出爛入肌肉用火燒以好酒洗之又以鹽傅其上 如皮塌者以酒熬牛皮膠傅之 如湯傷以淋過第二次灰査傅立安 熱酒傷糯米粉炒黑末酒調傅之 治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰雞子黃和傅之如成瘡用白蜜封之以竹中膜貼上日三

世治湯火瘡鰱皮炒黑灰爲末傅上神效此方行補性始終皆可用 治湯火瘡取荷烹銀爐中燒過焦

黃土研細如粉以生韭調於帛上貼之痛止一方用溶銀鍋子細末油調傅佳

治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉傅之燥即瘥

治湯火燒方

右用蕎麥麵炒黃色釜水調傅如神

保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切人蓄損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少爲極細末調塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作膿無分毫瘢痕苦楚日近完復永無破傷風證

水霜散 治火燒皮爛大痛

寒水石生 牡蠣燒 朴硝

青黛 輕粉各等分

右爲細末新水或小油調塗之立止

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃各等分

右爲末以新汲水調塗傷處

治火燒

桐油 水銀各等分

右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏

末和以牛皮膠入少水溶開外用猫兒肚底毛細剪摻上貼之

綠白散治湯熨火燒疼痛用苦參不拘多少爲細末每用以小油調搽

凡被傷熱油痛不可忍取廁下黑淤泥塗傷大小其酌多少次以老韭汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈以青黛傅之亦妙

治湯火傷

大黃 黃芩 黃連

山梔子 黃蘗 知母

貝母　　密陀僧　　乳香
沒藥　　輕粉　　甘草各等分
右爲細末用鷄子清加蜜調不住手時時搽之
清涼膏　治湯潑火燒此藥止痛解毒潤肌生肉
梔子仁　　黃連去鬚　　白芷各錢半
生地黃貳兩　　葱白拾莖　　黃蠟半兩
清麻油肆兩
右細剉於油鐺中煎地黃焦黑色綿濾去滓澄清
却於鐺內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盒內用時
以鷄羽掃少許塗瘡上以瘥爲度

麻子膏　治火燒人肉爛壞
麻子仁壹合取　　栢白皮　　柳白皮
山梔子仁碎　　白芷　　甘草各貳兩
右剉細以猪脂壹斤煎三上三下去滓以塗瘡上
日三
黃蘗散　治湯火傷
黃蘗　　大黃　　朴硝
鷄子殼　　寒水石各等分
右爲細末用水調塗極効
栢葉散　治湯火傷

栢葉　　梔子仁各壹兩　　胡粉兩半
右爲細末以羊髓五大合熔化和藥以木椎研三
五百徧一日三次塗之瘥
蛤粉散　治湯火傷
右以蛤蜊殼不拘多少炙焦黃色擣爲細末用生
油調如膏傅之如水仍無痕一方以蜜水調傅之
疼立止不膿不瘢吳內翰居鄉中隣家釜翻一小
兒自頭至踵皆傷忽以傅之啼立止遂無恙唯纔
傷隨手用卽効少緩卽不及當須先合以備用耳
治湯火燒瘡
右以側栢葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作
膏傅傷處以帛子繫定二三日瘡當斂仍滅瘢一
方燒灰存性爲末以鷄子清調傅如乾再上或蜜
調亦可或擣末以脂調塗瘡上乾卽易一方以山
梔子葉爛擣塗傅

治人向火生火斑成瘡有汁及治火氣入瘡
右用黃蘗薄荷爲末乾摻之卽愈一方用黃蘗皮
爲末摻之立愈薄荷煎塗亦可
補
治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和塗之
經
治湯火瘡至妙用劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎

掃傷處後搽藥本在上前不痛亦無痕大凡湯傷先
用鹽末摻之護肉不壞然後傅藥　又方以榆白皮
末猪脂油塗瘡愈
又方治火湯瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲末香油調
傅　治湯火瘡用髮一束香油煎以髮盡爲度放冷
搽患處驗
又方治中熱油及火燒除外痛以丹參捌兩細剉以水
微調取羊脂貳斤煎三上三下以傅瘡上愈
止痛膏　治炙瘡及湯火傷日夜啼呼此藥止痛滅
瘢

松脂　羊脂　豬膏
黃蠟各壹分
右取松脂破銚中切脂嚼蠟著松明上少頃銚內
燒諸物皆消以杯盛汁傅之松明是肥松節也
神效當歸膏　治湯火瘡初起瘭漿熱毒侵展焮赤
痛毒氣壅盛腐化成膿此藥斂口生肌拔熱毒止
疼痛
當歸　黃蠟各壹兩　麻油肆兩
右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪化
放冷以磁盒盛用時以故帛子攤貼一方用白蠟

紫雪　治湯潑火燒疼不可忍或潰爛成惡瘡
右用松樹皮燒灰貳錢澱青壹分研爲細末清油
調傅濕則乾摻忌冷水洗　一方不用澱青以
松樹皮陰乾爲細末入輕粉少許生油調傅如傅
不住絹帛縛定即生痂
治湯火傷
右用霜後芙蓉葉桑葉等分陰乾研爲細末用蜜
調塗傅之濕則乾摻
鷄黃油　治湯火傷
右用鷄子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒
直待都化作油去火毒毛翎掃下入部粉夜明沙

爲末香油調傅濕則乾摻之
灸瘡止痛生肌散　治灸瘡
牡蠣半兩煆研　寒水石煆研　滑石研各壹分
右爲細末凡用之時切護爪甲勿令中風仍須洗
瘡令淨然後摻藥薄薄令徧以輭絹帛繫之候肌
生漸用栢皮膏
栢皮膏　治灸瘡久不瘥
栢樹白皮　伏龍肝各肆兩　猪脂半斤煉
右同熬成膏濾去滓入磁罐中每用時薄薄塗之

上以油紙隔蓋貼之

柏葉散 治灸瘡痛

柏葉 芙蓉葉 並端午日午時採不拘多少陰乾

右爲細末每遇灸瘡黑蓋子脫了即用水調少許如膏藥攤楮紙上貼之養膿更無痛楚

四時貼護方 治灸瘡未着痂及出膿久不合者

春以柳絮 夏以竹膜 秋以新綿 冬以兔毛

右各隨時貼瘡上

內托黃芪丸 治鍼灸傷經絡流膿不止

黃芪 當歸 肉桂 去皮

木香 乳香 另研 沉香

綠豆粉

右爲細末生姜汁煮糊爲丸如梧桐子大每服伍拾丸不拘時白湯送下

諸蟲獸螫傷

聖惠治蛇咬蠍螫蜈蚣咬妙

雄黃 各錢 信 壹錢 皂角子

巴豆 各半去油 斤塞 麝香 各少許

右五月五日不聞雞犬婦人處不語搗爲細末在杏子核內封之鍼挑出上痛處大有神効

世治一切蛇蟲傷貝母末酒調服効 詳見蛇咬 又方用酥和鹽傳之 又方用益母草搗爛厚貼傷處 又方用雞糞傳之 又方扁豆葉搗爛傳 又方用獨蒜酸漿草搗傳傷處 又方用酒暖洗瘡上日三次

又方紫蘇葉油浸塗傷處

山諸般惡蟲咬以油浸紫草塗之

丹治蛇咬蟲咬惡蟲咬猪窩蘋搗汁傳 蠆蟲蠍亦治狗咬

治山溪中沙虱射工等毒用葱小蒜茱萸煮汁浸或搗傳大効

治二十七般蟲咬傷人及瘡腫者用麝香雄黃乳香硇砂各貳錢七蜂窩露蜂窩燒灰存性研細以醋調少許塗咬處或不能辨認疑是惡瘡三五日不痊即毒入心難痊忌雞魚油膩物

治蛇傷犬咬一切蟲毒用試劍草搗爛貼之

治蛇犬及狂狗咬用蚯蚓糞和鹽研傅神効
海治蜈蚣蜘蛛蛇毒雞卵輕敲一小孔合咬處即瘥
又方先問彼傷人是甚蟲傷即默念火德星君黑殺
攝吹在傷處自然不痛　又方用艾炷於傷處炙三
五壯拔去毒即愈
治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻
腹內成塊逡巡不救用蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒
和灌之將滓厚罨所傷處
簡治毒蛇射工沙蝨等物傷著人眼黑口噤手足強
直毒氣入腹用白礬甘草等分爲細末每服貳錢冷

水調下
治毒蛇所傷毒用青黛雄黃等分新汲水調服貳錢
又方用蒼耳嫩葉一握搗汁溫酒和飲滓厚傅傷
處口噤身強者灌之
治蛇犬咬即破傷風用荊枝葉一握約炙兩以好酒
貳椀煎至壹椀服即歸出汗汗不止以溫白粥補之
治惡蛇風犬傷用雄黃爲搗細等分入麝少許爲
末每服貳錢好酒調下

毒蛇咬

治毒蛇傷急以小便洗出血次取口中唾塗
之又以牙垢封傷處傅血散之甚妙且不痛腫

犬毒傳患處亦佳　又方用好酒一二碗服令毒氣不隨血
之或飲清油一二盞亦可次以麻繩扎定傷處兩頭
次用白芷末半兩白水調服須臾傷處黃水出盡腫
消　又方用白礬雄黃貝母等分如指頭大置在
着傷燈上燒開滴傷處或以竹筒拔上引入觸毒不
散
世路行李彼蛇咬當急扯裏帶扎縛傷處上下寸
許使毒氣不能恢傷肌體又急用白礬安刀頭火上
溶汁沸滴於傷處待冷以長鍼子速挑去腐則毒血
隨出黯腫尚未退更滴之以退爲度　村店山僻及

途中夜行卒被蛇傷咬難求白礬處速作艾炷炙五
壯以唾調鹽塗之如黯腫尚未消釋當更炙更搽毒
涎自然流出且不透裏傷人蜈蚣咬亦宜炙
又治一切毒蛇咬用透明雄黃研細末以醇酒濃調
厚搽傷處水流出如涎痛腫即消一方以蒼耳汁和
雄黃末作餅子候乾爲末每用少許貼瘡口立効
又有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥貳錢
灌之遂甦及以藥滓塗患處良久復灌貳錢其苦皆
去問之乃五靈脂壹兩雄黃半兩同爲末止此耳後
有中毒者用之無不効驗　又方用乾薑雄黃等分

爲末傅之兼碎蛇用絹袋盛繫臂上男左女右𥄋開
氣遠避
[世]治毒蛇所傷
細辛　香白芷各伍錢　雄黃貳錢
右爲末加麝香少許每服貳錢溫酒調服効
[丹]治一切蛇咬用香白芷嚼碎傅患處又用溫酒調
服効　水蓼擣汁飲滓傅傷處　櫻桃葉絞汁服滓
傅傷處
[世]治一切蛇蟲所傷用貝母爲末酒調令病人盡量
飲之頃久酒自傷處爲水流出候水盡却以藥滓傅
瘡上即愈　治蛇咬腫悶欲死者用重臺陸分續
隨子陸顆去皮研爲細末以酒服方寸匕又以唾調
少許傅患處立安崔氏方　又方用白礬貳錢服之
防毒氣攻心　又方合綠豆攪以水磨少許傅咬處
又爲細末酒服之　又方用柏樹葉魚腥草地松節
纖齒草尖明其一處研細傅傷處極佳　地榆生
絞汁飲及濃煎漬之半日愈　治蛇傷用馬蘭草即
消前蒻生擣傅傷處亦解酒疸止鼻衄合金瘡　治
蛇咬瘡用蒜去皮壹升擣破以童便壹升煮三四沸
熱漬損處壹兩時初咬未腫即嚼蒜封之六七易

又方用蒜壹升乳貳升煮熟空腹頓服以飯壓之次
日依前再服
治諸惡蟲蛇傷用地菘擣汁傅之
[海]治蛇虺咬人以獨頭蒜酸草擣汁傅咬處佳
[濟]治蛇咬男子陰毛口含二十莖嚥其汁毒不入腹
[世]治諸般蛇咬此傳之於被咬者藥味不全亦可
大青　小青　青木香
烏桕葉　火炊草　山慈菇
過山龍　地蜈蚣　天門冬
白芍藥　香薷
右細末用白木香研細生白酒調服渣罨咬處累
効
[聞]治蛇咬毒食茱萸壹兩爲細末冷水調分爲三服
立差
[丹]治蛇毒咬菰蔣艸根灰取以封之其草即蔣茭白
是也廣濟方　蛇咬作瘡暖酒浸日三次　絲瓜根擂
生酒飲醉立愈　治蛇傷用小青一握細研入香白
芷半兩酒調服却以手捻患處候黃水出爲効　毒
蛇傷人目黑口噤毒氣入腹以甘草白礬等分末之
冷水調下貳錢蒜壹升乳貳升煮食仍煮童便熱漬

孔入　蛇蟄人

之　麻油米醋並急飲或嚼毒即散　大黄塗之
頭垢耳塞并泥蚯蚓糞和搗塗咬處黄水出愈　一
方加白丁香
蛇咬忌食酸物梅子犯之大痛
蛇入人口并七孔中者割猪母尾頭瀝血在口中并
孔口上即出
聖治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出者用刀破蛇
尾內生椒二三粒裹着即出
治卒爲蛇繞不解以熱湯淋之無湯令人尿之
諸見蟲毒傷
蜈蚣咬 治蜈蚣咬生雞血傳上立愈累効　一男子爲
蜈蚣入咽喉中咬之垂死之際一醫令殺生雞血乘
熱灌喉中蜈蚣即出而愈實良方也　又方用雞糞
塗之　又方治蜈蚣諸毒蟲傷麻油點燈於瘡口上
對口熏之登時愈　又法大油紙撚燒燈吹滅以餘
烟熏之亦治蠍及諸毒傷　治蜈蚣咬竹葉滴研汁
傳之立愈　又方用南星磨汁傳之累効　蜈蚣草
曬乾爲末入鹽少許水調傳患處能解諸毒
海治蜈蚣咬痛不止獨頭蒜磨螫處立愈
聖治蜈蚣咬方用蝸牛搗取汁滴入咬處
孫蜈蚣咬取蜘蛛一枚安咬處當自飲毒如蜘蛛死

而痛未止更易生者
蚖蜈蚣咬嚼鹽傳其傷處次以鹽湯洗之 海上方　蜈
蚣咬頭垢塞之不痛則痒　治蜈蚣咬及諸蟲咬毒
先用鞋底上擦之用大蒜小蒜桑葉塗傷處如無用
油豉鹽傷處或鹽豉塗擦之亦効　治蜈蚣毒蟲咬
用桑枝汁同鹽擦痛處或滴黄蠟滴患處肉黑爲度
又方用皁角於咬處上用艾灸熱去之効　用生
薑汁調雄黄末傳　又方灰莧葉擦其痛即止　又
方燈草蘸香油點煙熏之　又方凡被傷急以手指
於地上乾處書王字內撮土擦在咬處即愈　又方
諸見蛇毒傷
用耳塞少許塗咬處疼即止　又方用茱萸嚼爛搽
之　又方用生薑汁調蚌粉搽
蠼螋傷 治蠼螋尿成瘡初如粟漸大如豆如火燒泡
大痛者速以草茶細末生油調傳瘡上立止甚妙 又方
集驗莓搗汁傳之　草茶即茶茗也
治兩點蠼螋瘡用百合搗爛入
鹽少許傳之効
千治蠼螋尿人影着便令人病瘡如粟粒纍纍痛似
刺蟲所螫惡寒壯熱用犀角磨汁塗之則愈
山蠼螋蟲又名八脚蟲隱壁間以尿射人徧身生瘡
如湯火傷用烏雞翎毛燒灰雞子白塗之　治小兒

蠼螋咬遶腰即死用梨葉研爛傅之
食蠼螋尿瘡鹽叁升水壹斗煮取陸升以綿浥湯淹瘡上

蝎螫 雄黃消毒膏 治蝎螫不可忍

雄黃 信 巴豆

白礬

右爲細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻爲錠子如棗子大用時將錠子於燈焰上炙開滴於螫處其痛立止

一上散 治蝎螫痛

半夏 雄黃 巴豆 去皮

右三味同研和勻上之 治蝎螫用溶化白礬乘熱滴傷處痛止毒出

廣 治蝎螫人研蜘蛛汁傅之瘥

山 蝎螫苦荬汁塗之

世 治蝎螫地磨小兒塗之 又方南星米醋調擦之 人參嚼封之 白礬半夏等分爲末醋調貼痛止毒出 又方用葱白切豆片厚 分置螫處艾灸

蜂螫 治蜂螫薄荷貼之瘥 人參嚼封之 以酥傅之 雄黃塗 蜂房末豬脂調傅 黃蜂螫熱酒洗之立効 又方清油搽之愈

蜘蛛咬 張薦昔在劍南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箭繞項上從胷前至心經二宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財五百千募能療者忽一人應召云可治張相初不甚信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甆碗取蜘蛛投入藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令

點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡痂落如舊

濟 蜘蛛咬徧身成瘡用青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯蚓一條捏兩頭不令透氣搖動化爲水點咬處瘥

治蜘蛛瘡用羊乳傅其上或用清油搽之即安

斗 蜘蛛咬處嚼韭白傅之

山 蜘蛛等諸般蟲咬用烏桕生韭汁調傅

經 蜘蛛咬唾和山豆根末塗之 狗咬蚯蚓瘡蛇咬並水研山豆根傅之 又方蜘蛛咬一身生絲羊乳一升飲之 灰搗膏和油傅之

沈存中 蒼皮一味治人蛇毒似癩而非癩也天

蛇仰草間黃花蜘蛛入破其瘡仍爲露所濡乃成此疾以奈皮煮汁一十飲之瘥

壁鏡大如蜘蛛而形扁斑五色足而長竹白帶如錢貼壁間咬毒人必死用桑柴燒灰水煎三四沸濾汁傳瘡上兼治蛇毒　又方雄黃醋磨搽妙　又方大黃側醋煮水洗效

刺毛蟲傷 春夏月樹下牆壁間有一等雜色毛蟲極毒凡人觸着者則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨其初皮肉微痒以漸不痛[illegible]痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不効用好豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚傳痛痒處經[illegible]時久豉氣透骨則引出蟲毛紛紛可見取下豆豉埋在土中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸即烏賊魚骨爲末傳之愈　一方取蒲公英根莖白汁傳之立瘥　又方用鍋底黃土爲末以酸醋搜成團於疥痛處搓轉其毛皆出在土上痛痒立止神効無比[illegible]　按治刺螫傷無如甘草妙口內細嚼傳之即時痛今蘇州虎丘山下民家皆以種植樹木爲生周十里內無刺螫乃時用甘草汁灑樹故也

蚰蜒傷 治蚰蜒咬用老茶葉細末調傳妙　治蚰蜒咬如大風眉鬚皆落夜則蚰蜒鳴於身上[illegible]服作鹽湯浸數次安傳信方

又昔有病腹大夜聞蚰蜒鳴於身有人教用鹽水浸之而愈

蠼螋傷 治蠼螋咬用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取汁洗拭乾納少許灰於瘡中　又方治蠼螋咬人用[illegible]灰醋和塗之

[illegible] 用麝香研蜜調傳　又方用苧根搗汁飲塗[illegible]

犬咬 犬咬人係傳之[illegible]咬人以頭垢傳傷處又用熟牛糞塗於外

瘈犬傷人用杏仁量所傷大小嚼爛沃破處以帛繫定立瘥

世治犬咬用杏仁去皮尖同馬藺根研細先以葱湯洗後以此藥塗傷處効　治犬咬傷用萆麻子五十粒去殼以井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏傳貼　一方用虎骨為末傳之　治犬咬人不要洗用紅炭火以物[illegible]細待冷取塗咬處即愈　治犬咬用蘭荊葉搗罨瘡上即安　又方炙生薑乘熱搽之尤妙　又方甑[illegible]和牛糞塗

【卅】狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗之　犬咬破傷風腫以
人參於桑柴火上燒成灰末傅之安
蟬花散　治夏月犬傷及諸般損傷蛆蟲極惡臭
惡不可近者
蛇退皮壹兩火燒存性　蟬殼　青黛各半兩
細辛貳錢伍分
右為細末每服叁錢酒調下如六畜損傷成瘡用
酒灌下如犬咬傷用醋子和喫蛆皆化為水蠅子
不敢再落又以寒水石末乾摻上
【濟大咬】定風散　治風犬咬先口噙漿水洗淨用綿
拭乾貼藥更不再發大有神効
天南星生　防風各等分
右為細末乾上更不再發無膿効不可具述
【丹】治犬咬梔子皮燒灰石硫黃等分研細傅瘥
【世】治風狗咬用桃核殼半箇將野人乾糞填滿以榆
皮蓋定罨於傷處又用艾於桃核上灸十四壯即愈
永不再發或用野犬糞如前法灸之　又方艾灸傷處五七壯
【山】風狗咬即用犬糞塗仍拔去頂上紅髮
【世】瘋狗咬方用盤蝥七枚去頭足翅以糯米少許於
新瓦上同炒以米黃香為度去米不用以盤蝥研碎

好酒調下能飲人再進酒一杯傷在上食後服在下
空腹服當日必有毒物從小便出如小狗狀如未下
次日再進亦不下又進以毒物出為度若進至七服
雖不下毒亦不妨矣服藥後腹中必不安小便莖中
刺痛者不必慮此毒受攻將下耳痛甚者以蕪青一
匙煎甘草湯送下即止如無蕪青青黛亦可疾愈後
急以香白芷多雄黃少許為末搗韭根自然汁湯酒
調下去盤蝥毒以水淨漱口嚼生葱白罨傷處留小
竅子出毒氣不可用他草藥罨忌犬豬羊及發風毒
物小兒量歲數加減盤蝥食癲狗肉致病者治同即

愈或過二三年再發治如前　治癲狗所傷用盤蝥
貳拾壹箇去頭翅并足用糯米壹勺先將盤蝥入米
內微火炒不令米赤去此盤蝥別用盤蝥再於前米
內炒令盤蝥色變復去之又別用盤蝥如前法炒以
米出青煙為度去盤蝥不用以米研為粉用冷水入
清油少許空心調服須又再進一服以小便利下惡
物為度如不利再進一服利後腹肚疼痛急用冷水
調青黛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可
不宜便食熱物或以益元散水調服尤妙　又方用
米泔洗淨以沙糖塗之後用益元散肆兩盤蝥拾肆

筒去頭翅足同煎空心溫服　又方用雄黃伍錢麝
香伍分研勻酒調貳錢服下去惡物再服得下黃鷩
覓或經久復發亦宜服此
世風狗咬取小兒胎髮炒香傅野菊花研細酒調服
盡醉止効　又方韮菜根搗汁一二三盞服　又方桃
白皮一握水貳盞煎壹盞服
世治顛犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗
雄黃者伍錢　麝香貳分
右研勻用酒調貳錢服如不肯服者則撚其鼻而
灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利

下惡物再進前藥則見効矣
丹瘋犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口愈　又方煑
地榆汁飲之無細末傅瘡上服方寸匕日三忌酒若
瘡瘥者搗生韮汁飲一二升（後同附）　風犬咬後毒
發如狗叫聲於化人壇拾頭頂骨燒末傅之　風狗
咬再發如狗叫者百方不治以人骨燒末之水下方
寸匕雞鳴亂者亦治　腊蓼為末貼瘡立愈
馬咬細嚼栗子傅傷處　又方用益母草細切和醋
炒封之　毒入心馬齒莧湯飲之瘥
鼠咬用猫兒毛燒灰傅之　猫糞填咬處　麝香末
傅包之
火咬龜甲或鱉甲燒為灰末之香油調傅
虎咬用野生菜搗爛塞所傷孔中濃汁必換自然新
肉長出而愈曾有人被咬已效用此方治之
丹熊虎傷毒痛煑生鐵令有味以洗之（附後方）　虎傷
人瘡取青布緊捲燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏
入瘡口中佳　清油洗瘡口仍與清油壹椀
又方用乾葛濃煎湯洗　又方用沙糖水調塗仍服
沙糖水壹兩椀
世虎傷人瘡用莓子葉杵細塗之

熊咬熊傷人燒青布熏瘡中毒出仍煑葛根汁方
洗之日十次并搗葛根為散以葛根汁方寸匕日五
服瘥
驢涎馬汗瘡驢涎馬汗入瘡腫漸甚可急治之遲則
毒深不治以生烏頭末傅瘡口上良久黃水出立安
世治驢涎馬汗入瘡用遠志去心為末酒調塗　又
方用冬瓜青皮陰乾為末貼瘡上　又方馬汗入肉
毒氣引入如紅線者急用烏梅肉嚼爛塗瘡上　一
方用烏梅和核爛研用好醋和成膏先將瘡口針破

出盡紫紅血拭乾傅上以帛縛定　王氏治驢涎馬汗毒所傷白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相裹合以貼患處

孟詵馬齒莧又主馬毒瘡以水煎令服一升一半塗瘡上　濕癬白禿以馬齒膏和灰塗効